

Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique
Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique
Band: 21 (1975)
Heft: 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: INTRODUCTION A LA THÉORIE DES SURFACES DE RIEMANN
Autor: Guenot, J. / Narasimhan, R.
Kapitel: §2. Espaces de Sobolev
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-47334>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 17.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

est alors un sous-espace vectoriel de dimension 1, ce qui achève la démonstration de la proposition.

COROLLAIRE. On désigne par u une fonction de $L_c^1(\mathbf{R}^n, \mathbf{C})$, par K' et K'' des ensembles compacts de \mathbf{R}^n vérifiant la relation

$$\text{supp}(u) + K' \subset K''.$$

Le produit de convolution $u*$ induit alors un opérateur compact de $L_{K'}^2(\mathbf{R}^n, \mathbf{C})$ dans $L_{K''}^2(\mathbf{R}^n, \mathbf{C})$.

La norme de l'opérateur $u*$ vérifie la relation

$$\|u*\| \leq \|u\|_{L^1, \mathbf{R}^n}.$$

Comme dans la proposition 6, on se ramène immédiatement au cas où u appartient à $\mathcal{C}_c^0(\mathbf{R}^n, \mathbf{C})$. On remarque alors que $u*$ n'est autre que l'opérateur de noyau

$$w(x, y) = u(x - y)$$

et l'on applique la proposition 6.

§ 2. ESPACES DE SOBOLEV

On désigne par X un ensemble ouvert de \mathbf{R}^n et par α un multi-indice de \mathbf{N}^n . On dit qu'une fonction u de $L_{\text{loc}}^1(X, \mathbf{C})$ est *faiblement dérivable d'ordre α* s'il existe une fonction v de $L_{\text{loc}}^1(X, \mathbf{C})$ vérifiant la relation

$$\int_X hv \, d\mu = (-1)^{|\alpha|} \int_X u D^\alpha h \, d\mu$$

pour toute fonction h de $\mathcal{C}_c^\infty(X, \mathbf{C})$. Si elle existe, une telle fonction v est unique (chap. 0, § 4, lemme 2 et chap. II, § 1, proposition 4, corollaire). On l'appelle la *dérivée faible d'ordre α de u* .

LEMME 1. On désigne par X un pavé ouvert

$$X = X_1 \times \dots \times X_n$$

de \mathbf{R}^n et par u une fonction de $L_{\text{loc}}^1(X, \mathbf{C})$. On suppose que l'on a

$$\int_X u \frac{\partial h}{\partial x_1} \, d\mu = 0$$

pour toute fonction h de $\mathcal{C}_c^\infty(X, \mathbf{C})$. La fonction u est alors indépendante de x_1 . De manière plus précise, pour presque tout point (x_2, \dots, x_n) de

$X_2 \times \dots \times X_n$, la fonction partielle $u(, x_2, \dots, x_n)$ est presque partout constante.

Il résulte du théorème de Fubini que l'on a

$$\int_{X_1} u(t, x_2, \dots, x_n) \frac{\partial h}{\partial x_1}(t) dt = 0$$

pour toute fonction h de $\mathcal{C}_c^\infty(X_1, \mathbf{C})$ et pour presque tout point (x_2, \dots, x_n) de $X_2 \times \dots \times X_n$ (loc. cit.). La mesure de Lebesgue sur \mathbf{R} induit une forme linéaire δ sur $\mathcal{C}_c^\infty(X_1, \mathbf{C})$ dont le noyau est l'image de l'opérateur différentiel

$$\frac{\partial}{\partial x_1} : \mathcal{C}_c^\infty(X_1, \mathbf{C}) \rightarrow \mathcal{C}_c^\infty(X_1, \mathbf{C}).$$

L'équation ci-dessus montre que la forme linéaire $\lambda(x_2, \dots, x_n)$ définie sur $\mathcal{C}_c^\infty(X_1, \mathbf{C})$ par

$$\lambda(x_2, \dots, x_n)(g) = \int_{X_1} u(t, x_2, \dots, x_n) g(t) dt$$

est proportionnelle à δ ce qui démontre l'assertion (loc. cit.).

PROPOSITION 1. On désigne par X un ensemble ouvert de \mathbf{R}^n , par m un entier naturel.

(1) Toute fonction u de $\mathcal{C}^m(X, \mathbf{C})$ est faiblement dérivable d'ordre α pour tout multi-indice α de longueur au plus m et sa dérivée faible d'ordre α coïncide avec sa dérivée partielle usuelle $D^\alpha u$.

(2) Toute fonction u de $L_{\text{loc}}^1(X, \mathbf{C})$ faiblement dérivable d'ordre α pour tout multi-indice α de longueur au plus m et dont les dérivées faibles d'ordre α sont continues pour tout multi-indice α de longueur m appartient à $\mathcal{C}^m(X, \mathbf{C})$.

La première assertion est une conséquence immédiate de la formule d'intégration par parties. Démontrons la seconde. La question étant locale, on peut supposer que X est un pavé de la forme

$$X = X_1 \times \dots \times X_n.$$

Par récurrence, on se ramène immédiatement au cas où m est égal à 1. Pour tout entier j compris entre 1 et n , il existe donc une fonction v_j de $\mathcal{C}^0(X, \mathbf{C})$ vérifiant la relation

$$\int_X h v_j d\mu = - \int_X u \frac{\partial h}{\partial x_j} d\mu$$

pour toute fonction h de $\mathcal{C}_c^\infty(X, \mathbf{C})$. Montrons par récurrence sur j que u est continue par rapport aux j premières variables et que l'on a

$$v_j = \frac{\partial u}{\partial x_j}.$$

Pour tout point x de X , on pose

$$w(x) = \int_0^{x_j} v_j(x_1, \dots, x_{j-1}, t, x_{j+1}, \dots, x_n) dt.$$

Il est clair que w est une fonction continue sur X et l'on a

$$\frac{\partial w}{\partial x_j} = v_j.$$

Il résulte alors du lemme 1 que $u - w$ est indépendante de x_j , ce qui établit l'assertion.

Si elle existe, la dérivée faible d'ordre α d'une fonction u de $L_{\text{loc}}^1(X, \mathbf{C})$ se désigne par $D^\alpha u$. La proposition 1 montre que cela ne risque pas d'entraîner de confusion.

LEMME 2. On désigne par X , X' et X'' des ensembles ouverts de \mathbf{R}^n tels que X' contienne $X - X''$, par u une fonction de $L_{\text{loc}}^1(X', \mathbf{C})$, par v une fonction de $L_c^1(X'', \mathbf{C})$ et par α un multi-indice de \mathbf{N}^n . Si l'une des fonctions est faiblement dérivable d'ordre α , il en est de même de $u*v$ et l'on a

$$D^\alpha(u*v) = (D^\alpha u)*v \quad (\text{resp. } D^\alpha(u*v) = u*(D^\alpha v)).$$

C'est une conséquence immédiate du théorème de Fubini.

Soit X un ensemble ouvert de \mathbf{R}^n et soit m un entier naturel. On désigne par $H_{\text{loc}}^m(X, \mathbf{C})$ l'ensemble des fonctions u de $L_{\text{loc}}^2(X, \mathbf{C})$ dont les dérivées faibles $D^\alpha u$ existent et appartiennent à $L_{\text{loc}}^2(X, \mathbf{C})$ pour tout multi-indice α de longueur au plus m . C'est un espace de Fréchet pour la topologie la moins fine rendant continues les applications D^α de $H_{\text{loc}}^m(X, \mathbf{C})$ dans $L_{\text{loc}}^2(X, \mathbf{C})$.

Soit X une variété différentielle et soit π un fibré vectoriel complexe sur X . On désigne par $H_{\text{loc}}^m(X, \pi)$ l'ensemble des sections s de π vérifiant la condition suivante: pour toute carte Φ de π et toute carte ϕ de X ayant même domaine U , les fonctions coordonnées de $(s_\phi)_\phi$ appartiennent à $H_{\text{loc}}^m(\phi(U), \mathbf{C})$. C'est de manière évidente un espace vectoriel localement convexe et complet. C'est un espace de Fréchet si X est dénombrable à l'infini.

Pour tout ensemble compact K de X , on désigne par $H_K^m(X, \pi)$ le sous-espace fermé de $H_{\text{loc}}^m(X, \pi)$ formé des sections dont le support est contenu dans K .

On désigne par $H_c^m(X, \pi)$ l'ensemble des sections à support compact de $H_{\text{loc}}^m(X, \pi)$, muni de la topologie vectorielle limite inductive des espaces $H_K^m(X, \pi)$.

Notons que les inclusions canoniques

$$H_{\text{loc}}^{m'}(X, \pi) \subset H_{\text{loc}}^m(X, \pi) \subset H_{\text{loc}}^0(X, \pi) = L_{\text{loc}}^2(X, \pi)$$

et

$$H_c^{m'}(X, \pi) \subset H_c^m(X, \pi) \subset H_c^0(X, \pi) = L_c^2(X, \pi)$$

sont continues pour tout entier m' au moins égal à m .

PROPOSITION 2. *On désigne par X , X' et X'' des ensembles ouverts de \mathbf{R}^n tels que X' contienne $X - X''$. Pour tout entier naturel m , le produit de convolution induit des applications bilinéaires continues (et même hypocontinues)*

$$* : L_{\text{loc}}^1(X', \mathbf{C}) \times H_c^m(X'', \mathbf{C}) \rightarrow H_{\text{loc}}^m(X, \mathbf{C})$$

$$* : H_{\text{loc}}^m(X', \mathbf{C}) \times L_c^1(X'', \mathbf{C}) \rightarrow H_{\text{loc}}^m(X, \mathbf{C})$$

$$* : L_{\text{loc}}^2(X', \mathbf{C}) \times H_c^m(X'', \mathbf{C}) \rightarrow \mathcal{C}^m(X, \mathbf{C})$$

$$* : H_{\text{loc}}^m(X', \mathbf{C}) \times L_c^2(X'', \mathbf{C}) \rightarrow \mathcal{C}^m(X, \mathbf{C}).$$

C'est une conséquence immédiate des définitions et des propriétés du produit de convolution.

COROLLAIRE 1. *On désigne par m un entier naturel et par ϕ une fonction marteau sur \mathbf{R}^n . Pour toute fonction u de $H_c^m(\mathbf{R}^n, \mathbf{C})$ (resp. $H_{\text{loc}}^m(\mathbf{R}^n, \mathbf{C})$), le produit de convolution $u * \phi_\varepsilon$ converge vers u dans $H_c^m(\mathbf{R}^n, \mathbf{C})$ (resp. $H_{\text{loc}}^m(\mathbf{R}^n, \mathbf{C})$) lorsque ε tend vers 0.*

COROLLAIRE 2. *Pour toute variété différentielle X , tout fibré vectoriel complexe π sur X et tout entier naturel m , l'ensemble $\mathcal{C}_c^\infty(X, \pi)$ est dense dans les espaces $H_c^m(X, \pi)$ et $H_{\text{loc}}^m(X, \pi)$.*

COROLLAIRE 3. *On désigne par u une fonction de $L_c^1(\mathbf{R}^n, \mathbf{C})$, par K' et K'' des ensembles compacts de \mathbf{R}^n vérifiant la relation*

$$\text{supp}(u) + K' \subset K''.$$

Pour tout entier naturel m , le produit de convolution $u*$ induit un opérateur compact de $H_{K'}^m(\mathbf{R}^n, \mathbf{C})$ dans $H_{K''}^m(\mathbf{R}^n, \mathbf{C})$.

C'est une conséquence immédiate du corollaire de la proposition 6 du paragraphe 1.

LEMME 3. Pour toute fonction u de $H_c^n(\mathbf{R}^n, \mathbf{C})$ dont le support est contenu dans la boule de rayon r , on a

$$\|u\|_{L^\infty, \mathbf{R}^n} \leq (2r)^{n/2} \left\| \frac{\partial^n u}{\partial x_1 \dots \partial x_n} \right\|_{L^2, \mathbf{R}^n}.$$

On peut supposer que u appartient à $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbf{R}^n, \mathbf{C})$. On a alors

$$u(x_1, \dots, x_n) = \int_{-r}^{x_1} \dots \int_{-r}^{x_n} \frac{\partial^n u}{\partial x_1 \dots \partial x_n} d\mu$$

pour tout point (x_1, \dots, x_n) de \mathbf{R}^n et l'assertion résulte de l'inégalité de Hölder.

THÉORÈME 1 (Sobolev). On désigne par X une variété différentielle de dimension pure n , par π un fibré vectoriel complexe sur X et par m un entier au moins égal à n . Alors l'ensemble $H_{\text{loc}}^m(X, \pi)$ est contenu dans $\mathcal{C}^{m-n}(X, \pi)$.

La question étant locale, il suffit de montrer que $H_c^m(\mathbf{R}^n, \mathbf{C})$ est contenu dans $\mathcal{C}_c^{m-n}(\mathbf{R}^n, \mathbf{C})$. Or toute fonction u de $H_c^m(\mathbf{R}^n, \mathbf{C})$ est limite d'une suite $(u_j)_{j \in \mathbf{N}}$ de $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbf{R}^n, \mathbf{C})$, et puisque la suite $(D^\alpha u_j)_{j \in \mathbf{N}}$ converge uniformément vers $D^\alpha u$ pour tout multi-indice α de longueur au plus $m - n$ (lemme 3), le théorème est une conséquence immédiate de la proposition 1.

COROLLAIRE. Pour toute variété différentielle X et tout fibré vectoriel complexe π sur X , on a

$$\mathcal{C}^\infty(X, \pi) = \bigcap_{m \in \mathbf{N}} H_{\text{loc}}^m(X, \pi) \quad \text{et} \quad \mathcal{C}_c^\infty(X, \pi) = \bigcap_{m \in \mathbf{N}} H_c^m(X, \pi).$$

LEMME 4. Il existe des fonctions ϕ_0, \dots, ϕ_n de $L_c^1(\mathbf{R}^n, \mathbf{R})$ telles que

$$u = \phi_0 * u + \sum_{1 \leq j \leq n} \phi_j * \frac{\partial u}{\partial x_j}$$

pour toute fonction u de $H_{\text{loc}}^1(\mathbf{R}^n, \mathbf{C})$.

On désigne par ϕ_0 une fonction marteau sur \mathbf{R}^n et l'on pose pour tout entier j compris entre 1 et n et pour tout point x de \mathbf{R}^n ,

$$\phi_j(x) = \int_0^1 x_j \phi\left(\frac{x}{t}\right) \frac{dt}{t^{n+1}}.$$

Montrons tout d'abord que ϕ_j appartient à $L_c^1(\mathbf{R}^n, \mathbf{R})$. Pour tout point x de $\mathbf{R}^n \setminus 0$, on a

$$\phi_j(x) = \int_{|x|}^1 x_j \phi\left(\frac{x}{t}\right) \frac{dt}{t^{n+1}}$$

ce qui prouve déjà que ϕ_j est continue sur $\mathbf{R}^n \setminus 0$, nulle en dehors de la boule unité. D'autre part, on a

$$|\phi_j(x)| \leq |x_j| \left(\frac{1}{n|x|^n} - \frac{1}{n} \right) \leq \frac{1}{n|x|^{n-1}}$$

ce qui démontre l'assertion.

Pour vérifier l'égalité de l'énoncé, on peut supposer que u appartient à $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbf{R}^n, \mathbf{C})$. Pour tout couple (x, y) de points de \mathbf{R}^n , il résulte de la formule de Taylor que l'on a

$$u(x) = u(y) + \sum_{1 \leq j \leq n} (x_j - y_j) \int_0^1 \frac{\partial u}{\partial x_j}(ty + (1-t)x) dt.$$

On multiplie les deux membres de cette égalité par $\phi_0(x-y)$ et l'on intègre par rapport à y . Il vient

$$u(x) = (\phi_0 * u)(x) + \sum_{1 \leq j \leq n} \int_{\mathbf{R}^n} \int_0^1 \frac{\partial u}{\partial x_j}(ty + (1-t)x) (x_j - y_j) \phi_0(x-y) d\mu(y) dt.$$

Si l'on remplace $x + t(y-x)$ par y , chacune des intégrales du membre de droite s'écrit

$$\int_{\mathbf{R}^n} \left(\int_0^1 (x_j - y_j) \phi_0\left(\frac{x-y}{t}\right) \frac{dt}{t^{n+1}} \right) \frac{\partial u}{\partial x_j}(y) d\mu(y) = \left(\phi_j * \frac{\partial u}{\partial x_j} \right)(x)$$

ce qui démontre le lemme.

THÉORÈME 2 (Rellich). *Soit X une variété différentielle et soit π un fibré vectoriel complexe sur X . Pour tout ensemble compact K de X et tout entier naturel m , l'injection canonique de $H_K^{m+1}(X, \pi)$ dans $H_K^m(X, \pi)$ est un opérateur compact.*

On se ramène aisément au cas où K est un ensemble compact de \mathbf{R}^n et π le fibré produit $\mathbf{C}_{\mathbf{R}^n}$.

Conservons les notations du lemme 4 et désignons par K' un ensemble compact de \mathbf{R}^n contenant l'ensemble

$$K + \bigcup_{0 \leq j \leq n} \text{supp}(\phi_j).$$

Il résulte du corollaire 3 de la proposition 1 que les opérateurs

$$\phi_0^* : H_K^{m+1}(\mathbf{R}^n, \mathbf{C}) \rightarrow H_{K'}^m(\mathbf{R}^n, \mathbf{C})$$

et

$$\phi_j^* \frac{\partial}{\partial x_j} : H_K^{m+1}(\mathbf{R}^n, \mathbf{C}) \rightarrow H_{K'}^m(\mathbf{R}^n, \mathbf{C})$$

sont compacts. Il en est donc de même de l'injection canonique de $H_K^{m+1}(\mathbf{R}^n, \mathbf{C})$ dans $H_{K'}^m(\mathbf{R}^n, \mathbf{C})$ et l'on conclut en remarquant que $H_K^m(\mathbf{R}^n, \mathbf{C})$ est fermé dans $H_{K'}^m(\mathbf{R}^n, \mathbf{C})$.