

Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique
Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique
Band: 22 (1976)
Heft: 1-2: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: SUPERDIAGONALIZATION AND REAL NORMAL OPERATORS
Autor: Geissinger, Ladnor

Bibliographie
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-48179>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 05.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

2-dimensional S -stable subspace W_1 of V , and by the preceding argument W_1^\perp is also S -stable. Thus V is the orthogonal sum of 2-dimensional S -stable subspaces W_1, \dots, W_r . Let y_i, z_i be an orthonormal basis for W_i , then relative to the basis $y_1, z_1, \dots, y_r, z_r$ the matrix of each A in S is block diagonal and the blocks are positive multiples of 2×2 rotation matrices. Thus we have determined the structure of real normal operators.

Finally, return to Proposition 2 and suppose that y_1, \dots, y_n is a fan (flag) basis for an S -stable fan (flag) and that E has an inner product. The Gram-Schmidt process applied to this basis yields an orthonormal fan (flag) basis z_1, \dots, z_n for the same S -stable fan (flag). Thus the matrix P in the Corollary can be taken to be unitary or real orthogonal. Moreover, if S contains A and A^* for some A (hence A is normal) we get directly that the matrices of A and A^* relative to the basis z_1, \dots, z_n are both (nearly) super-diagonal, and since one is the adjoint of the other, they are both diagonal (block diagonal with blocks at most 2×2 in size). This observation could be used to give another proof for Proposition 4 and the structure of real normal operators. In either case, the argument can be simplified a bit if S is assumed to be $*$ -closed.

REFERENCES

- FLANDERS, H. Methods of Proof in Linear Algebra. *American Mathematical Monthly*, January 1956, pp. 1-15.
HOFFMAN, K. and R. KUNZE. *Linear Algebra*. Second edition, Prentice-Hall, 1971.

(Reçu le 16 octobre 1975)

Ladnor Geissinger

Mathematics Department
University of North Carolina
Chapel Hill, North Carolina 27514

Vide-leer-empty