

# **§1. (1/2)-TRAPEZOIDS AND THEIR FOUR DESCENDANTS**

Objekttyp: **Chapter**

Zeitschrift: **L'Enseignement Mathématique**

Band (Jahr): **22 (1976)**

Heft 1-2: **L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE**

PDF erstellt am: **28.04.2024**

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*

ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, [www.library.ethz.ch](http://www.library.ethz.ch)

<http://www.e-periodica.ch>

# A DIRECTIONAL CLUSTER SET EXAMPLE

by C. L. BELNA, M. J. EVANS and P. D. HUMKE

## §0. INTRODUCTION

Let  $f$  be a mapping from the open upper half plane  $H$  into the Riemann sphere  $W$ . For each point  $x$  on the real line  $R$ , let  $C(f, x)$  and  $C(f, x, \theta)$  denote respectively the total cluster set of  $f$  at  $x$  and the cluster set of  $f$  at  $x$  in the direction  $\theta$  ( $0 < \theta < \pi$ ); then let  $\Theta(x)$  denote the set of directions  $\theta$  for which  $C(f, x, \theta) = C(f, x)$ . E. F. Collingwood [3, Theorem 2 combined with Theorem 3] established the following result.

**THEOREM C.** *Let  $f: H \rightarrow W$  be continuous. Then the set  $\Theta(x)$  is residual at each point  $x$  of a residual subset  $S$  of  $R$ .*

A. M. Bruckner and Casper Goffman [2, p. 510] raised the question as to whether or not there exists a residual set of directions  $\Theta$  such that  $\Theta \subset \Theta(x)$  for each  $x \in S$ . Here we prove

**THEOREM 1.** *There exists a continuous  $f: H \rightarrow W$  such that  $\bigcap_{x \in Q} \Theta(x)$  is a first category set of directions for each residual subset  $Q$  of  $R$ .*

To construct this function (§3), we use certain sets of J.-P. Kahane [5] as building blocks<sup>1)</sup>. Two important properties of these sets are established in §2, and the necessary technical preliminaries are presented in §1. Finally, in §4 we present an example concerning essential directional cluster sets.

## §1. (1/2)-TRAPEZOIDS AND THEIR FOUR DESCENDANTS

By a (1/2)-trapezoid we mean any closed trapezoid  $T$  having bases  $L$  and  $L'$  which lie respectively on the lines  $y = 0$  and  $y = 1$  and for which  $|L| = 2|L'|$ . (Here and throughout this paper, we use  $|\tau|$  to denote the length of the line segment  $\tau$ .) For each (1/2)-trapezoid  $T$ , we set

$$T(1/2) = \{ z \in T : \operatorname{Im}(z) = 1/2 \}.$$

<sup>1)</sup> The authors wish to thank Professor John R. Kinney for bringing this paper of J.-P. Kahane to their attention.

For real numbers  $p$  and  $p'$ , let  $\tau_{pp'}$  denote the line segment joining the points  $(p, 0)$  and  $(p', 1)$ . Then the *projection of the segment*  $\tau_{pp'}$  is given by

$$\text{proj}[\tau_{pp'}] = p' - p,$$

and the *projection set of the  $(1/2)$ -trapezoid*  $T$  is given by

$$\text{proj}[T] = \{ \text{proj}[\tau_{pp'}] : (p, 0) \in L \text{ and } (p', 1) \in L' \}.$$

For the remainder of this section, suppose  $T$  is a  $(1/2)$ -trapezoid with bases  $L$  and  $L'$ , and let  $L_1$  and  $L_2$  (resp.,  $L'_1$  and  $L'_2$ ) denote the two line segments that remain when the open middle half of  $L$  (resp.,  $L'$ ) is removed with  $L_1$  (resp.,  $L'_1$ ) lying to the left of  $L_2$  (resp.,  $L'_2$ ). Then the *four descendants* of  $T$  are the  $(1/2)$ -trapezoids  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$ , and  $T_4$  having respective bases  $L_1$  and  $L'_1$ ,  $L_1$  and  $L'_2$ ,  $L_2$  and  $L'_1$ , and  $L_2$  and  $L'_2$ .

Now let  $a$  and  $a'$  denote the respective  $x$ -coordinates of the left endpoints of  $L$  and  $L'$ , and set  $l = |L|$ . Then the following list of facts concerning  $T$  and its descendants can easily be established:

(A) If  $\hat{a} = (a + a')/2$ , then

$$T(1/2) = \{ (x, 1/2) : \hat{a} \leqslant x \leqslant \hat{a} + 3l/4 \}$$

and, for each  $k = 1, 2, 3$ , and  $4$ , we have

$$T_k(1/2) = \{ (x, 1/2) : \hat{a} + 3(k-1)l/16 \leqslant x \leqslant \hat{a} + 3kl/16 \}.$$

That is, the segments  $T_k(1/2)$  ( $k=1, 2, 3, 4$ ) partition the segment  $T(1/2)$  into four equal subsegments.

(B) If  $\hat{v} = a' - a$ , then

$$\text{proj}[T] = \{ v : \hat{v} - l \leqslant v \leqslant \hat{v} + l/2 \},$$

$$\text{proj}[T_3] = \{ v : \hat{v} - l \leqslant v \leqslant \hat{v} - 5l/8 \},$$

$$\text{proj}[T_4] = \{ v : \hat{v} - 5l/8 \leqslant v \leqslant \hat{v} - 2l/8 \},$$

$$\text{proj}[T_1] = \{ v : \hat{v} - 2l/8 \leqslant v \leqslant \hat{v} + l/8 \},$$

and

$$\text{proj}[T_2] = \{ v : \hat{v} + l/8 \leqslant v \leqslant \hat{v} + 4l/8 \}.$$

That is, the intervals  $\text{proj}[T_k]$  ( $k=1, 2, 3, 4$ ) partition the interval  $\text{proj}[T]$  into four equal subintervals.