Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

Band: 25 (1979)

Heft: 1-2: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: SUR LES OUVERTS AFFINES D'UN SCHÉMA AFFINE

Autor: Arezzo, Domenico / Ramella, Luciana

Kapitel: 1. GÉNÉRALITÉS SUR LE TRANSFORMÉ D'UN IDÉAL

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-50386

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 01.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

classe d'exemples d'anneaux ayant localement la propriété (β) mais non intégralement clos.

Dans tout le travail, nous noterons par D un anneau commutatif à élément unité intègre et par K son corps des fractions.

1. Généralités sur le transformé d'un idéal

Dans cette section nous rappelons la définition et les principales propriétés du transformé d'un idéal a de D, que nous utiliserons par la suite; pour des indications plus complètes sur les propriétés du transformé, voir [4], [9] ou [10].

Définition 1.1. Le transformé d'un idéal a de D est l'overring de $D^{(1)}$ défini par

$$T(\mathfrak{a}) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (D : \mathfrak{a}^n) = \{ x \in K \mid \text{il existe } n \in \mathbb{N} \text{ avec } x\mathfrak{a}^n \subseteq D \}.$$

Proposition 1.2. On a les faits suivants:

- a) $T(a) = D_a$ si $a \neq 0$ (en particulier T(D) = D); T(0) = K.
- b) Si il existe $n \in \mathbb{N}$ avec $a^n \subseteq b$, $T(a) \supseteq T(b)$.
- c) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $T(\mathfrak{a}) = T(\mathfrak{a}^n)$.
- d) Si \sqrt{a} est de type fini, $T(a) = T(\sqrt{a})$.
- e) Si $\sqrt{\alpha}$ est de type fini et si il existe $c \in D$ avec $\sqrt{\alpha} = \sqrt{(c)}$, alors $\alpha T(\alpha) = T(\alpha)$.
- f) $T(\mathfrak{ab}) = T(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}) \supseteq T(\mathfrak{a}) + T(\mathfrak{b}) \supseteq T(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}) = T(\mathfrak{a}) \cap T(\mathfrak{b}).$
- g) $Si \ a = (a_1, ..., a_n), T(a) = \bigcap_{i=1}^n D_{a_i}.$
- h) $Si \ T(\mathfrak{b}) = D \ ou \ T(\mathfrak{b}) = K, T(\mathfrak{ab}) = T(\mathfrak{a}) + T(\mathfrak{b}).$

Preuve. Chaque affirmation est conséquence immédiate de la définition et des affirmations précédents.

Théorème 1.3. Soient a un idéal et D' un overring de D avec $D \subseteq D'$ $\subseteq T(\mathfrak{a})$. Alors l'application canonique $\operatorname{Spec} D' \to \operatorname{Spec} D$ induit un

¹⁾ Un overring de D est un anneau contenant D et contenu dans K.

isomorphisme φ (pour la relation d'inclusion) de l'ensemble des idéaux premiers de D' ne contenant pas $\alpha D'$ sur l'ensemble des idéaux premiers de D ne contenant pas α . En outre, si $\mathfrak{p} = \varphi(\mathfrak{p}')$, on a $D'_{\mathfrak{p}'} = D_{\mathfrak{p}}$.

Preuve. Cfr. [8] ou [9].

PROPOSITION 1.4. Soit $\{\mathfrak{p}_{\alpha}\}$ la famille des idéaux premiers de D ne contenant pas \mathfrak{a} . Alors $T(\mathfrak{a}) \subseteq \bigcap_{\alpha} D_{\mathfrak{p}}$; en outre, si \mathfrak{a} est de type fini, on a l'égalité.

Preuve. Si $\mathfrak{p} \not\supseteq \mathfrak{a}$, soit $x \in \mathfrak{a}$ et $x \notin \mathfrak{p}$; on a alors $T(\mathfrak{a}) \subseteq T((x)) = D_x$ $\subseteq D_{\mathfrak{p}}$, d'où la première affirmation. La seconde est évident si \mathfrak{a} est principal et ainsi elle découle de la prop. 1.2. g).

REMARQUE 1.5. Si l'idéal a n'est pas de type fini, on peut avoir $T(\mathfrak{a}) \neq \bigcap_{\mathfrak{p}} D_{\mathfrak{p}}$; soit pour exemple V un anneau de valuation non discrète de rang 1 du type $V = k + \mathfrak{m}$ avec k corps et \mathfrak{m} idéal maximal de V; soit en outre $D = F + \mathfrak{m}$ où F est un sous-corps propre de k. On a alors $T(\mathfrak{m}) = V$ (cfr. [1], cor. 3.8.), qui ne peut pas être intersection de localisations de D, les uniques localisations de D étant D et K.

La proposition suivante permet une interprétation géométrique du transformé d'un idéal.

PROPOSITION 1.6. Soient $\mathfrak a$ un idéal de type fini de $D, X = \operatorname{Spec} D$ et U l'ouvert de X défini par $\mathfrak a$. Alors $T(\mathfrak a) = \Gamma(U, \mathscr O_X)$.

Preuve. Comme D est intègre, on a $\Gamma(U, \mathcal{O}_X) = \bigcap_{\mathfrak{p}} D_{\mathfrak{p}}$ (cfr. [5], $\mathfrak{p} \not\supseteq \mathfrak{a}$ I.8.5.1.); la proposition résulte donc de la prop. 1.4.

Une autre propriété géométrique du transformé est exprimée par la

PROPOSITION 1.7. Si D est noethérien, alors $T(\mathfrak{a}) = D$ pour tout idéal \mathfrak{a} de hauteur $\geqslant 2$ si et seulement si D a la propriété S_2 .

Preuve. Si pour tout idéal \mathfrak{a} de hauteur $\geqslant 2$ on a $T(\mathfrak{a}) = D$, l'homomorphisme $D = \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \to \Gamma(U, \mathcal{O}_X) = T(\mathfrak{a})$, où $X = \operatorname{Spec} D$ et U

est l'ouvert de X défini par \mathfrak{a} , est bijectif, c'est-à-dire D a la propriété S_2 (cfr. [6], 21.13.4.). Réciproquement, si D a la propriété S_2 et $h(\mathfrak{a}) \geq 2$, on a $T(\mathfrak{a}) \subseteq \bigcap_{h(\mathfrak{p})=1} D_{\mathfrak{p}} = D$.

2. Sur la condition aT(a) = T(a)

Dans cette section on étudie la condition aT(a) = T(a). En particulier, on prouve que pour les idéaux de type fini elle est une propriété locale (prop. 2.3.) et que les idéaux qui la vérifient sont exactement ceux qui définissent dans $X = \operatorname{Spec} D$ les ouverts affines (théor. 2.6.), ce qui met en évidence l'aspect géométrique de la condition même. On retrouve ainsi, comme corollaire, le fait bien connu que les ouverts d'une courbe affine sont tous affines (rém. 2.9.). La section termine avec la démonstration que, si la clôture intégrale D^* de D est noethérienne, la condition aT(a) = T(a) peut être vérifiée seulement par les idéaux pseudopurs 10 de hauteur 1 (prop. 2.11).

Rappelons d'abord un résultat dû à M. Nagata (cfr. [9]).

LEMME 2.1. Soient α un idéal de type fini et J un overring plat de D. Alors on a $T(\alpha J) = T(\alpha) J$.

REMARQUE 2.2. R. Gilmer et J. Huckaba, dans [4], ont montré avec un exemple que l'hypothèse que l'idéal a soit de type fini est essentiel dans le lemme 2.1.

Proposition 2.3. Si α est un idéal de type fini de D, les propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) aT(a) = T(a);
- b) aT(aJ) = T(aJ) pour tout overring plat J de D;
- c) $aT(aD_m) = T(aD_m)$ pour tout idéal maximal m de D.

¹) Un idéal α est dit *pseudopur* si les idéaux premiers minimaux de α ont tous la même hauteur.