

Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique
Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique
Band: 26 (1980)
Heft: 1-2: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: OPÉRATIONS D'ADAMS ET REPRÉSENTATIONS DE GROUPES
Autor: Kratzer, Ch.
Kapitel: 1. L'Anneau $R_A(G)$
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-51063>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 16.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

OPÉRATIONS D'ADAMS ET REPRÉSENTATIONS DE GROUPES

par Ch. KRATZER

Si A est un anneau commutatif, on connaît une certaine famille d'opérations ψ^k , k entier, agissant sur l'anneau $R_A(G)$ des représentations A -linéaires d'un groupe G quelconque, analogues aux opérations introduites par F. Adams en K -théorie topologique. Dans le cadre des représentations de groupes, ces opérations ont été introduites par R. Swan [10]; la technique (« splitting principle ») utilisée par ce dernier comme par d'autres [3], [8], est inspirée de la topologie et adaptée au cadre des représentations par le biais de la géométrie algébrique. Nous la présentons ici du point de vue universel en étudiant les représentations polynomiales de GL_n , ce qui permet d'établir en particulier un « splitting principle », de manière très directe à partir de [9]. L'apport de géométrie algébrique est alors la « connaissance » des représentations du groupe algébrique $GL_n(K)$ sur un corps K algébriquement clos.

On peut enfin remarquer que lorsque A est un corps et G un groupe fini, M. Kervaire [7] a obtenu des propriétés supplémentaires concernant les opérations ψ^k par des techniques élémentaires, notamment l'extension de corps et la restriction aux sous-groupes.

1. L'ANNEAU $R_A(G)$

Soient A un anneau commutatif avec unité et G un groupe quelconque (non nécessairement fini). On désigne par AG l'*algèbre du groupe* G , c'est-à-dire le A -module libre de base G , muni de la multiplication induite par celle de G . Une *représentation* de G sur A est une classe d'isomorphisme de AG -modules (à gauche), A -libres de type fini. Le choix d'une A -base de V permet d'associer à la classe d'isomorphisme $\{V\}$ un homomorphisme $\rho : G \rightarrow GL_n(A)$ unique à conjugaison près. On dit que ρ est la *forme matricielle* de la représentation. Il est utile de généraliser un peu le concept de représentation et de considérer la sous-catégorie pleine \mathcal{P}_A^G de la catégorie abélienne des AG -modules formée des modules qui sont *projectifs de type fini en tant que A -modules*. On notera $R_A(G)$ le *groupe de Grothendieck* de \mathcal{P}_A^G .

dieck de \mathcal{P}_A^G défini comme le quotient du groupe abélien libre L sur les classes d'isomorphisme $\{V\}$ d'objets de \mathcal{P}_A^G par les relations $\{V\} = \{V'\} + \{V''\}$ associées aux suites exactes $0 \rightarrow V' \rightarrow V \rightarrow V'' \rightarrow 0$. On remarque que le produit tensoriel sur $A : (V, V') \rightarrow V \otimes_A V'$, muni de l'action diagonale du groupe G préserve les suites exactes de A -modules projectifs et induit par conséquent une structure d'*anneau commutatif avec unité* sur $R_A(G)$.

Si $\rho : G \rightarrow G'$ est un homomorphisme de groupes, ρ s'étend en un homomorphisme d'algèbre $\rho : AG \rightarrow AG'$, et tout AG' -module V devient un AG -module par $\lambda \cdot v = \rho(\lambda) \cdot v$. On en déduit un homomorphisme d'anneaux:

$$\rho^* : R_A(G') \rightarrow R_A(G)$$

dit de *restriction*. De même, si $f : A \rightarrow A'$ est un homomorphisme d'anneaux, tout AG -module V fournit un $A'G$ -module $A' \otimes_A V$. On obtient ainsi un homomorphisme d'anneaux:

$$f_* : R_A(G) \rightarrow R_{A'}(G)$$

dit d'*extension des scalaires*. En d'autres termes, $R_A(G)$ est un foncteur contravariant en G et covariant en A .

On définit encore $IR_A(G)$ l'*idéal d'augmentation* de $R_A(G)$, comme le noyau de l'homomorphisme de restriction $R_A(G) \rightarrow R_A(1) = K_0(A)$ (scindé par l'homomorphisme de restriction $\varepsilon : R_A(1) \rightarrow R_A(G)$). $IR_A(G)$ est muni d'une structure de $K_0(A)$ -algèbre via ε .

Remarques. (1) Si $R'_A(G)$ désigne le groupe de Grothendieck de la catégorie \mathcal{L}_A^G des AG -modules A -libres de type fini, l'inclusion de catégories $\mathcal{L}_A^G \hookrightarrow \mathcal{P}_A^G$ induit un monomorphisme sur les groupes de Grothendieck

$$i : R'_A(G) \rightarrow R_A(G)$$

(Comme les modules projectifs sont facteurs directs des modules libres, l'assertion suit du critère [6, lemma 1]):

$[M] = [N]$ dans $R_A(G)$ (resp. $R'_A(G)$) \Leftrightarrow il existe $U, V, W \in \mathcal{P}_A^G$ (resp. \mathcal{L}_A^G) et deux suites exactes

$$0 \rightarrow U \rightarrow M \oplus W \rightarrow V \rightarrow 0 \quad \text{et} \quad 0 \rightarrow U \rightarrow N \oplus W \rightarrow V \rightarrow 0.$$

On vérifie ensuite aisément que i induit un isomorphisme sur les idéaux d'augmentation

$$i : IR'_A(G) \xrightarrow{\sim} IR_A(G).$$

Ainsi, la généralisation des modules libres aux modules projectifs se traduit par une structure supplémentaire: l'action de $K_0(A)$ sur l'idéal d'augmentation.

(2) Si V est une représentation de G sur A de forme matricielle $\rho : G \rightarrow GL_n(A)$, on peut considérer $\rho^* : R_A(GL_n(A)) \rightarrow R_A(G)$ et alors

$$[V] = \rho^* [A_{id}^n]$$

où $[A_{id}^n]$ est la classe de la représentation $id : GL_n(A) \rightarrow GL_n(A)$. De ce point de vue, les groupes $GL_n(A)$ jouent un rôle universel pour les représentations. Nous allons donc étudier maintenant un type particulier de représentations de $GL_n(A)$.

2. REPRÉSENTATIONS POLYNOMIALES DE GL_n

Soit A un anneau commutatif avec unité. On considère le foncteur

$$GL_n : \mathcal{Alg}_A \rightarrow \mathcal{Gr} ; A' \mapsto GL_n(A')$$

de la catégorie des A -algèbres commutatives avec unité dans celle des groupes. Une *représentation polynomiale* de GL_n sur l'anneau A est une transformation naturelle de foncteurs

$$\rho : GL_n \rightarrow GL_m$$

déterminée par une famille de polynômes $\rho_{ij}(X_{11}, \dots, X_{nn}, \det(X)^{-1})$ ($1 \leq i, j \leq m$) à coefficients dans A comme suit:

$$\rho_{A'} : GL_n(A') \rightarrow GL_m(A')$$

est définie par les fonctions polynomiales ρ_{ij} sur A' .

Exemple. La puissance extérieure $\lambda^2 : GL_2 \rightarrow GL_1$ est une représentation polynomiale sur \mathbf{Z} définie par la fonction polynomiale

$$\rho(X_{11}, X_{12}, X_{21}, X_{22}) = X_{11}X_{22} - X_{12}X_{21}.$$

Comme $GL_n(A)$ est un groupe algébrique affine, son algèbre affine

$$A(GL_n) = A[X_{11}, \dots, X_{nn}, \det(X)^{-1}]$$

(algèbre des fonctions polynomiales sur GL_n) est une *algèbre de Hopf* (la multiplication $GL_n \times GL_n \rightarrow GL_n$ induit la comultiplication

$$A(GL_n) \rightarrow A(GL_n \times GL_n) = A(GL_n) \otimes A(GL_n).$$