Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

Band: 31 (1985)

Heft: 1-2: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: MÉTHODE DU CERCLE ADÉLIQUE ET PRINCIPE DE HASSE FIN

POUR CERTAINS SYSTÈMES DE FORMES

Autor: Danset, Renaud

Kapitel: D) MÉTHODE DU CERCLE ADÉLIQUE

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-54555

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 10.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Si $f(x) \neq v$, le caractère $\xi \mapsto \psi(\langle \xi, f(x) - v \rangle)$ n'est pas trivial sur le groupe $(\mathbf{A}/\mathbf{Q})^r$ et son intégrale est nulle.

Si f(x) = v, ce caractère est trivial et comme $\int_{(\mathbf{A}/\mathbf{Q})^r} d\xi = 1$, puisque les mesures de Haar sur \mathbf{A}^r et $(\mathbf{A}/\mathbf{Q})^r$ sont choisies pour qu'il en soit ainsi! On obtient l'importante égalité

$$\int_{(\mathbf{A}/\mathbf{Q})^r} H(\xi) \psi(\langle \xi, -\nu \rangle) d\xi = \sum_{\substack{x \in \mathbf{Z}^n \\ f(x) = \nu}} \varphi_{\infty}(x)$$

(la somme \sum du second membre ne porte que sur les $x \in \mathbb{Z}^n$ car $\varphi_p = 1_{\mathbb{Z}_p^n}$ pour tout p, de plus cette somme représente à peu près le nombre de solutions entières du système f = v, présentes dans la boîte $P\mathscr{B} \subset \mathbb{R}^n$).

On cherche principalement, dans le présent travail, à comparer la somme $H(\xi)$ avec l'intégrale de même forme, appelée transformée de Gauss globale (en fait associée au système f, au caractère ψ et à la fonction φ)

$$F^*(\xi) = \int_{\mathbf{A}^n} \varphi(x) \psi(\langle \xi, f(x) \rangle) dx.$$

On veut obtenir la formule asymptotique suivante: il existe $\delta > 0$, tel que

$$\int_{(\mathbf{A}/\mathbf{Q})^r} H(\xi) \psi(<\xi, -\nu>) d\xi = \int_{\mathbf{A}^r} F^*(\xi) \psi(<\xi, -\nu>) d\xi + O(P^{n-rd-\delta})$$

Remarque. L'intégrale portant sur F^* est la seule raisonnable car cette fonction n'est pas en général constante sur les classes modulo Q. De plus cette intégrale n'est autre, selon les notations d'Igusa (cf. bibliographie) que $\widehat{F}^*(-v) = F(v)$ appelée série singulière globale (cf. le paragraphe 5F). Le chapeau $\widehat{}$ désigne la transformée de Fourier associée au caractère de Tate (cf. Godement...).

D) MÉTHODE DU CERCLE ADÉLIQUE

Soit $\xi \in \mathbf{A}^r$; on utilisera désormais les notations suivantes

$$|\xi_{\infty}| = \max_{1 \leq i \leq r} |\xi_{i,\infty}|$$
 et, pour tout p , $|\xi_p|_p = \max_{1 \leq i \leq r} |\xi_{i,p}|_p$;

on définit aussi la fonction

$$Q(\xi) = \prod_{p} \operatorname{Max}(1, |\xi_{p}|_{p})$$

qui jouera un rôle important et dont on peut remarquer qu'elle ne dépend que des places finies p de ξ mais pas de ξ_{∞} .

Enfin on définit, pour chaque $\Delta > 0$, un arc majeur (noter l'emploi du singulier)

$$M(\Delta) = \{ \xi \in \mathbf{A}^r / |\xi_{\infty}| \leqslant P^{-d+\Delta} \quad \text{et} \quad Q(\xi) \leqslant P^{\Delta} \}.$$

Remarque.

- a) Pour Δ suffisamment petit (ceci sera précisé en temps voulu) l'application canonique $\mathbf{A}^r \to (\mathbf{A}/\mathbf{Q})^r$, que nous désignerons désormais par la lettre π , est injective sur $M(\Delta)$. Dans ces conditions, on notera de la même façon $M(\Delta)$ et $\pi(M(\Delta))$ en remarquant que les mesures de Haar sur \mathbf{A}^r et sur $(\mathbf{A}/\mathbf{Q})^r$ attribuent respectivement la même valeur aux ensembles $M(\Delta)$ et $\pi(M(\Delta))$.
- b) Ainsi le cercle \mathbf{R}/\mathbf{Z} de la méthode classique a pour analogue adélique le quotient compact \mathbf{A}/\mathbf{Q} et les nombreux arcs majeurs classiques associés à un même $\Delta>0$, trouvent leur analogue adélique dans un unique ensemble $M(\Delta)$ (ou $\pi(M(\Delta))$) si on préfère). Cette présentation de l'arc majeur adélique est due à Lachaud (cf. bibliographie).

Au paragraphe 1, au moyen d'une formule de Poisson, on compare, pour $\xi \in M(\Delta)$, la somme $H(\xi)$ et l'intégrale $F^*(\xi)$. On obtient ainsi le

Théorème 1. Pour Δ suffisamment petit, il existe $\delta_1 > 0$ tel que

$$\int_{M(\Delta)} (H(\xi) - F^*(\xi)) \psi(\langle \xi, -\nu \rangle) d\xi = O(P^{n-rd-\delta_1}).$$

Au paragraphe 2, on majore la somme $H(\xi)$ sur l'arc mineur adélique $(\mathbf{A}/\mathbf{Q})^r - \pi(M(\Delta))$, obtenant le

Théorème 2. Sous les hypothèses (H1) et (H2) et pour \mathcal{B} et P convenablement choisis, il existe $\delta_2>0$ tel que

$$\int_{(\mathbf{A}/\mathbf{Q})^r - \pi(M(\Delta))} H(\xi) \psi(\langle \xi, -\nu \rangle) d\xi = O(P^{n-rd-\delta_2}).$$

Au paragraphe 3, on majore l'intégrale $F^*(\xi)$ sur $\mathbf{A}^r - M(\Delta)$ pour démontrer le

Théorème 3. Sous les hypothèses (H1) et (H2), il existe $\delta_3>0$ tel que

$$\int_{\mathbf{A}^r - M(\Delta)} F^*(\xi) \psi(\langle \xi, -\nu \rangle) d\xi = O(P^{n-rd-\delta_3}).$$

Remarque. Une conséquence du théorème 3 est que $F^* \in L^1(\mathbf{A}^r)$.

Ces trois théorèmes permettent d'obtenir la formule asymptotique désirée.

Proposition 4.1. Sous les hypothèses (H1) et (H2), pour \mathscr{B} et P convenablement choisis, pour tout $v \in \mathbb{Z}^r$, il existe $\delta > 0$ tel que

$$\sum_{\substack{x \in \mathbb{Z}^n \\ f(x) = v}} \varphi_{\infty}(x) = \widehat{F^*}(-v) + O(P^{n-rd-\delta}).$$

Au paragraphe 4, on utilise les hypothèses (H3) et (H4) pour rendre effective la formule asymptotique précédente. On démontre ainsi le

Théorème 4. Sous les hypothèses (H1), (H2), (H3) et (H4), pour \mathscr{B} et P convenablement choisis, on a

$$\widehat{F}^*(-v) \gg P^{n-rd}$$
.

Il résulte de tout ceci le

Théorème Principal. Sous les hypothèses (H1), (H2), (H3) et (H4) le système diophantien f = v admet une infinité de solutions entières.

Un corollaire évident de ce Théorème Principal, pour v = 0, énonce qu'un système f répondant aux hypothèses (H1) et (H2) observe le Principe de Hasse fin.

Enfin le paragraphe 5, on l'a déjà compris, est consacré à des explications complémentaires et à des exemples suivant les travaux de Birch, Davenport et W. M. Schmidt; mais on ne trouvera dans ce paragraphe aucune démonstration à l'opposé des paragraphes 1 à 4 où on s'est efforcé d'être le plus complet possible.

§ 1. ARC MAJEUR

Le but de ce paragraphe est une bonne majoration de la différence entre la somme $H(\xi)$ et l'intégrale $F^*(\xi)$ lorsque ξ appartient à un arc majeur $M(\Delta)$.