Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

**Band:** 31 (1985)

**Heft:** 1-2: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: SÉRIES D'EISENSTEIN, INTÉGRALES TOROÏDALES ET UNE

FORMULE DE HECKE

**Autor:** Wielonsky, Franck

**Kapitel:** 2. La formule intégrale de Hecke

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-54560

## Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 10.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# 2. La formule intégrale de Hecke

On suppose toujours que E un corps de nombres sur  $\mathbf{Q}$ . En choisissant pour g la matrice identité, la formule adélique donnée dans le théorème 1 du chapitre précédent devient

$$\int_{T(\mathbf{Q})Z(\mathbf{A})\backslash T(\mathbf{A})} E(\varphi, x, \omega) d\mu_{Z\backslash T}(x) = \zeta(\varphi, \omega \circ N_{E/\mathbf{Q}}).$$

On définit le quasi-caractère  $\omega$  de  $\mathbf{A}^{\times}/\mathbf{Q}^{\times}$  de la manière suivante :

$$\omega(t) = |t|_{\mathbf{A}}^{s}, \quad t \in \mathbf{A}^{\times},$$

avec  $s \in \mathbb{C}$  et  $\sigma = \text{Res} > 1$ .

Ainsi

$$\omega \circ N_{E/\mathbf{Q}}(t) \, = \, \mid t \mid_{\mathbf{A}_E}^s \, , \quad t \in \mathbf{A}_E^\times \, .$$

On définit la fonction  $\varphi$  de  $\mathcal{S}(V(\mathbf{A}))$  par

$$\varphi = \prod \varphi_p$$

avec, pour les places finies,

$$\varphi_p(t_p) = \chi_{L_p}(t_p), \quad t_p \in E \otimes \mathbf{Q}_p,$$

où  $\chi_{L_p}$  est la fonction caractéristique du réseau  $L_p$  engendré dans  $E \otimes \mathbf{Q}_p$  par la base fondamentale  $(\omega_1, ..., \omega_n)$  de E sur  $\mathbf{Q}$ .

On note  $\mu_p$  comme au chapitre II, l'isomorphisme de  $E \otimes \mathbf{Q}_p$  sur  $\prod_{p \mid p} E$ ; le réseau  $L_p$  étant engendré par une base fondamentale, on a

$$\mu_p(L_p) = \prod_{n \mid p} r_n,$$

de sorte que

$$\varphi_p \circ \mu_p^{-1} = \prod_{\not |p} \chi r_{\not n}.$$

Pour la place infinie, on pose

$$\varphi_{\infty}(t) = e^{-\pi F(t)}, \quad t \in E \otimes \mathbf{R},$$

avec la fonction F définie par

$$F(t) = \sum_{i=1}^{r_1} \sigma_i(t)^2 + 2 \sum_{i=r_1+1}^{r_1+r_2} |\sigma_i(t)|^2,$$

où  $(\sigma_i)_{1 \le i \le r_1}$  désignent les  $r_1$  plongements de E dans  $\mathbf{R}$ ,  $(\sigma_i)_{r_1+1 \le i \le r_1+r_2}$ 

les  $r_2$  plongements de E dans C non conjugués deux à deux et

$$\sigma_{r_1+r_2+i} = \overline{\sigma_{r_1+i}}$$
 pour  $1 \leqslant i \leqslant r_2$ .

La fonction F peut également s'exprimer pour un élément  $t = t_1\omega_1 + ... + t_n\omega_n$  de  $E \otimes \mathbf{R}$  de la manière suivante:

$$F(t_{1}\omega_{1} + ... + t_{n}\omega_{n}) = \sum_{i=1}^{r_{1}} (t_{1}\omega_{1}^{(i)} + ... + t_{n}\omega_{n}^{(i)})^{2}$$

$$+ 2 \sum_{i=r_{1}+1}^{r_{1}+r_{2}} |t_{1}\omega_{1}^{(i)} + ... + t_{n}\omega_{n}^{(i)}|^{2} = (t_{1}, ..., t_{n})\Delta \cdot {}^{t}\overline{\Delta} \begin{pmatrix} t_{1} \\ \vdots \\ t_{n} \end{pmatrix} ,$$

où on a noté  $\omega_j^{(i)} = \sigma_i(\omega_j)$  et  $\Delta$  la matrice

$$\left(\begin{array}{ccc} \omega_1^{(1)} & \cdots & \omega_1^{(n)} \\ \vdots & & \vdots \\ \omega_n^{(1)} & \cdots & \omega_n^{(n)} \end{array}\right)$$

Enfin, on note comme au chapitre V:

 $\mu_E$  la mesure de Haar sur  $\mathbf{A}_E^{\times}$  obtenue en prenant  $\mu_E = \prod \mu_{\not h}$  avec  $\mu_{\not h}(r_{\not h}^{\times}) = 1$  pour toute place finie  $\not h$  de E,  $d\mu_{\not h}(x) = \frac{dx}{|x|}$  pour les places réelles de E et  $d\mu_{\not h}(x) = |x|^{-2} \cdot |dx \wedge d\bar{x}|$  pour les places complexes de E,  $\mu_T$  la mesure de Haar sur  $T(\mathbf{A})$  et  $T(\mathbf{Q}) \setminus T(\mathbf{A})$ ,  $\mu$  la mesure de Haar sur  $\mathbf{A}^{\times}$ ,  $\mathbf{Q}^{\times} \setminus \mathbf{A}^{\times}$  et  $Z(\mathbf{Q}) \setminus Z(\mathbf{A})$ ,  $\mu_{Z \setminus T}$  la mesure de Haar sur  $T(\mathbf{Q})Z(\mathbf{A}) \setminus T(\mathbf{A})$ .

A) Calcul de  $\zeta(\varphi, \omega \circ N_{E/\mathbb{Q}})$ 

Pour  $\sigma > 1$ , on a les égalités suivantes:

$$\zeta(\varphi, \omega \circ N_{E/\mathbf{Q}}) = \int_{\mathbf{A}_{E}^{\times}} \varphi(t) \cdot |t|_{\mathbf{A}_{E}}^{s} d\mu_{E}(t) = \prod_{n} \int_{E_{n}^{\times}} \varphi_{n} |t_{n}| \cdot |t_{n}|^{s} d\mu_{n}(t_{n})$$

(cf. [6], Prop. 10, p. 119).

Alors en utilisant [6], Prop. 11, p. 120 et lemme 8, p. 127, on obtien

$$\zeta(\varphi,\,\omega\circ N_{E/\mathbf{Q}}) \;=\; \pi^{-r_1\,s/2} \;\; \Gamma\!\!\left(\frac{s}{2}\right)^{r_1} (2\pi)^{r_2(1\,-\,2)} \Gamma(s)^{r_2} \cdot \prod_{\not\approx \text{ fini}} (1-|\pi_{\not\approx}|^s)^{-\,1} \;,$$

où  $\pi_{n}$  désigne une uniformisante de  $E_{n}$ . Notons

$$G_{\infty}(s) = \pi^{-r_1 s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right)^{r_1} \cdot (2\pi)^{r_2(1-s)} \cdot \Gamma(s)^{r_2};$$

alors

$$\zeta(\varphi, \omega \circ N_{E/\mathbf{Q}}) = G_{\infty}(s) \cdot \zeta_{E}(s),$$

où  $\zeta_E$  désigne la fonction zeta de Dedekind de l'extension E.

B) Calcul de l'intégrale toroïdale

Dans la suite, on notera I l'intégrale toroïdale:

$$I = \int_{T(\mathbf{Q})Z(\mathbf{A})\backslash T(\mathbf{A})} E(\varphi, x, \omega) d\mu_{Z\backslash T}(x) .$$

On a vu que l'image par  $\pi_1$  du quotient  $(T(\mathbf{Q})Z(\mathbf{A}) \setminus T(\mathbf{A}))$  est

$$Z_{\infty}T(\mathbf{Q})\backslash T(\mathbf{A})/T(\mathbf{\hat{Z}})$$

Mais ce groupe est isomorphe au quotient suivant:

$$(T(\mathbf{Q})Z(\mathbf{A})\backslash T(\mathbf{A}))/(T(\widehat{\mathbf{Z}})/Z(\widehat{\mathbf{Z}}))$$

LEMME. Soit  $\xi$  un élément de  $G(\widehat{\mathbf{Z}})$ ; alors

$$E(\varphi, x\xi, \omega) = E(\varphi, x, \omega)$$
.

Démonstration. On a

$$E(\varphi, x, \omega) = \sum_{\gamma \in P(\mathbf{Q}) \setminus G(\mathbf{Q})} M(\varphi, \gamma x, \omega)$$

et

$$M(\varphi, x, \omega) = |\det x|_{\mathbf{A}}^{s} \cdot \int_{\mathbf{A}^{\times}} \varphi(\operatorname{et} x) \cdot |t|_{\mathbf{A}}^{ns} d\mu(t).$$

Il suffit de montrer

$$M(\varphi, x, \omega) = M(\varphi, x\xi, \omega)$$
.

Mais  $\xi \in G(\widehat{\mathbf{Z}})$  donc  $|\det \xi|_{\mathbf{A}} = 1$ ; de plus en chaque place finie p,  $\xi_p \in G(\mathbf{Z}_p)$  donc  $et_p x_p \in L_p$  si et seulement si  $et_p x_p \xi_p \in L_p$ , ce qui prouve le lemme.

Le groupe  $T(\widehat{\mathbf{Z}})/Z(\widehat{\mathbf{Z}})$  étant compact, on choisit une mesure de Haar sur celui-ci de manière à ce qu'il soit de mesure 1. Si on prend sur le

groupe  $Z_{\infty}T(\mathbf{Q})\backslash T(\mathbf{A})/T(\mathbf{\hat{Z}})$  la mesure quotient notée  $\dot{\mu}_{Z\backslash T}$ , on obtient comme nouvelle expression de l'intégrale I

$$I = \int_{Z_{\infty}T(\mathbf{Q})\backslash T(\mathbf{A})/T(\hat{\mathbf{Z}})} E(\varphi, x, \omega) d\dot{\mu}_{Z\backslash T}(x),$$

puisque la série E est invariante par l'action de  $T(\widehat{\mathbf{Z}})$ .

On a vu que le quotient  $Z_{\infty}T(\mathbf{Q})\backslash T(\mathbf{A})/T(\mathbf{\hat{Z}})$  s'écrit comme une réunion disjointe

$$\bigcup_{j=1}^h H_j(Z(\mathbf{R})T(\mathbf{Z})\backslash T(\mathbf{R})).$$

Notons  $\mu_{T_{\infty}}$  la mesure induite par  $\mu_{Z\setminus T}$  sur le quotient  $Z(\mathbf{R})T(\mathbf{Z})\setminus T(\mathbf{R})$ ; alors

$$I = \int_{Z(\mathbf{R})T(\mathbf{Z})\backslash T(\mathbf{R})} \sum_{j=1}^{h} E(\varphi, H_{j}x, \omega) d\mu_{T_{\infty}}(x) .$$

Pour chaque indice j de 1 à h, les matrices  $H_j$  et  $(h_j, 1, ..., 1, ...)$  =  $(P_j^{-1}, 1, ..., 1, ...)$  sont dans une même classe de  $G(\mathbf{Q}) \setminus G(\mathbf{A}) / G(\mathbf{\hat{Z}})$ . (Cf. la remarque au-dessus de la proposition 11).

Comme les séries E sont invariantes par l'action de  $G(\mathbf{Q})$  à gauche et de  $G(\mathbf{\hat{Z}})$  à droite, on obtient

$$I = \int_{Z(\mathbf{R})T(\mathbf{Z})\backslash T(\mathbf{R})} \sum_{j=1}^{h} E(\varphi, h_{j}x, \omega) d\mu_{T_{\infty}}(x).$$

On calcule à présent les séries  $E(\varphi, x, \omega)$  dans le cas particulier où  $x = (x_{\infty}, 1, ..., 1)$ . Alors

$$E(\varphi_{1}(x_{\infty}, 1, ..., 1, ...), \omega) = |\det x_{\infty}|^{s} \cdot \int_{\mathbf{Q}^{\times} \backslash \mathbf{A}^{\times}} |t|^{ns} \cdot \sum_{\xi \in V(\mathbf{Q}) - \{0\}} \varphi(\xi t x) d\mu(t)$$

$$= |\det x_{\infty}|^{s} \cdot \sum_{\xi \in V(\mathbf{Q}) - \{0\}} \int_{\mathbf{R}^{\times} + \prod_{p} \mathbf{Z}^{\times}_{p}} |t|^{ns} \cdot \varphi(\xi t x) d\mu(t)$$

$$= |\det x_{\infty}|^{s} \cdot \sum_{\xi \in V(\mathbf{Q}) - \{0\}} \left( \int_{0}^{+\infty} t^{ns} \varphi_{\infty}(\xi t x_{\infty}) \frac{dt}{t} \cdot \prod_{p} \int_{\mathbf{Z}^{\times}_{p}} \varphi_{p}(\xi t) d\mu_{p}(t) \right).$$

Soit  $\xi$  un élément de  $V(\mathbf{Q}) - \{0\}$ , de coordonnées  $(\xi_1, ..., \xi_n)$ ; alors l'intégrale  $\int_{\mathbf{Z}_p^{\times}} \varphi_p(\xi t) d\mu_p(t) \text{ est non nulle lorsque}$ 

$$Max(|\xi_1|_p, ..., |\xi_n|_p) \leq 1$$
.

Pour que le produit sur l'ensemble des nombres premiers des intégrales précédentes soit non nul, il faut donc choisir  $\xi$  de coordonnées  $(\xi_i)_{1 \text{ à } n}$  vérifiant:

$$\xi_i \in \bigcap_p (\mathbf{Q} \cap \mathbf{Z}_p)$$
;

donc  $\xi_i$  doit être un élément de Z. Par conséquent

$$E(\varphi, (x_{\infty}, 1, ..., 1, ...), \omega) = |\det x_{\infty}|^{s} \cdot \sum_{\xi \in V(k) - \{0\}} \int_{0}^{+\infty} t^{ns-1} \cdot \varphi_{\infty}(\xi t x_{\infty}) dt.$$

D'autre part on a

$$\int_0^{+\infty} t^{ns-1} \cdot \varphi_{\infty}(\xi t x_{\infty}) dt = \int_0^{+\infty} t^{ns-1} \cdot e^{-\pi t^2 F(\xi x_{\infty})} dt.$$

Faisons le changement de variables

$$u = \pi t^2 \cdot F(\xi x_{\infty});$$

l'intégrale ci-dessus devient

$$\frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{ns}{2}\right) \cdot \pi^{-\frac{ns}{2}} \cdot F(\xi x_{\infty})^{-\frac{ns}{2}}$$

et puisque

$$F(t_1\omega_1 + ... + t_n\omega_n) = (t_1, ..., t_n)\Delta \cdot {}^t\overline{\Delta} \begin{pmatrix} t_1 \\ \vdots \\ t_n \end{pmatrix},$$

on a

(\*) 
$$E(\varphi, (x_{\infty}, 1, ..., 1, ...), \omega)$$

$$= \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{ns}{2}\right) \pi^{-\frac{ns}{2}} \cdot |\det x_{\infty}|^{s} \cdot \sum_{q \in \mathbf{Z}^{n} - \{0\}} (qx_{\infty} \Delta \cdot {}^{t} \overline{\Delta}{}^{t} \overline{x_{\infty}} {}^{t} q)^{-\frac{ns}{2}}.$$

Dans le cas qui nous intéresse, les matrices  $x_{\infty}$  ont pour valeurs

$$x_{\infty} = P_j^{-1} x, \quad x \in Z(\mathbf{R}) T(\mathbf{Z}) \setminus T(\mathbf{R}).$$

On rappelle que l'on a un isomorphisme

$$\pi: (E \otimes \mathbf{R})^{\times} \to T(\mathbf{R})$$
$$y \mapsto \pi(y) .$$

De plus, on vérifie facilement que l'on a le

LEMME. Soit y un élément de  $(E \otimes \mathbf{R})^{\times}$ ;

$$\pi(y) = \Delta D(y) \Delta^{-1},$$

où D(y) est la matrice diagonale  $(y^{(1)}, ..., y^{(n)})$ .

Soit v l'isomorphisme défini au chapitre II, en prenant pour v la place infinie, on voit que v applique  $T(\mathbf{R})$  sur  $(\mathbf{R}^+)^{r_1} \times (\mathbf{C}^\times)^{r_2}$  et que

$$v \circ \pi(y) = (y^{(1)}, ..., y^{(r_1 + r_2)}).$$

Pour  $y = (y^{(1)}, ..., y^{(r_1+r_2)})$  un élément de  $(\mathbf{R}^{\times})^{r_1} \times (\mathbf{C}^{\times})^{r_2}$ , on note

$$Ny = \prod_{i=1}^{r_1+r_2} |y_i|^{e_i}$$
 et  $\frac{dy}{y} = \prod_{i=1}^{r_1+r_2} \frac{dy_i}{|y_i|^{e_i}}$ ,

avec

$$e_i = 1$$
 pour  $1 \le i \le r_1$ 

et

$$e_i = 2 \quad \text{pour} \quad r_1 + 1 \leqslant i \leqslant r_1 + r_2.$$

Définition 2. Soit P une matrice d'ordre n réelle, symétrique, définie positive; on définit la série d'Epstein Z(P, s) où s est un nombre complexe vérifiant  $\operatorname{Re} s > \frac{n}{2}$ :

$$Z(P, s) = \frac{1}{2} \sum_{q \in \mathbb{Z}^{n} - \{0\}} (q P^{t}q)^{-s}.$$

Avec cette définition et en utilisant la relation (\*), l'intégrale I se réécrit à présent

$$I = \Gamma\left(\frac{ns}{2}\right) \cdot \pi^{-\frac{ns}{2}} \cdot J,$$

où J est définie par

$$J = \sum_{j=1}^{h} \int_{y=(y_1,\dots,y_{r_1+r_2})\in\mathscr{D}} (Ny)^s \cdot Z\left(P_j^{-1}\Delta D(y) \overline{D(y)} \, {}^t\overline{\Delta} \, {}^t\overline{P_j^{-1}}, \frac{ns}{2}\right) \frac{dy}{y}$$

et  $\mathscr{D}$  est un domaine fondamental dans  $(\mathbf{R}^{\times})^{r_1} \times (\mathbf{C}^{\times})^{r_2}$  correspondant par l'isomorphisme v à un domaine fondamental de  $Z(\mathbf{R})T(\mathbf{Z}) \setminus T(\mathbf{R})$ .

Posons comme nouvelles variables

$$\tau_1 = |y_1|^2; ...; \tau_{r_1+r_2} = |y_{r_1+r_2}|^2$$

et pour toute matrice P de  $G(\mathbf{R})$ , écrivons

$$P^0 = (\det P)^{-1/n} \cdot P ;$$

il vient

$$J = 2^{r_1-1} (4\pi)^{r_1} \cdot 2^{-(r_1+r_2)} \cdot |d_E|^{-s/2} \cdot K,$$

avec

$$K = \sum_{j=1}^{h} \int Z \left( (P_{j}^{0})^{-1} \Delta^{0} D(\tau)^{t} \overline{\Delta^{0}}^{t} (\overline{P_{j}^{0}})^{-1}, \frac{ns}{2} \right) \prod_{i=1}^{r_{1}+r_{2}} \frac{d\tau_{i}}{\tau_{i}},$$

où l'intégrale porte sur les  $\tau = (\tau_1, ..., \tau_{r_1+r_2}) \in U/H$  et où  $d_E = \det(\Delta)^2$  désigne le discriminant de  $E, D(\tau)$  la matrice diagonale

$$(\tau_1, ..., \tau_{r_1+1}, ..., \tau_{r_1+r_2}, \tau_{r_1+1}, ..., \tau_{r_1+r_2}),$$

H le sous-espace de  $(\mathbf{R}_{+}^{\times})^{r_1+r_2}$  défini par l'équation

$$\prod_{i=1}^{r_1+r_2} \tau_i^{e_i} = 1$$

et U l'image dans H des unités du corps de nombres E.

On fait encore le changement de variables suivant:

$$\mathbf{R}_{+}^{r_{1}+r_{2}} \to \mathbf{R}_{+} \times \mathbf{R}^{r}$$
  
 $(\tau_{1}, ..., \tau_{r_{1}+r_{2}}) \mapsto (u, x_{1}, ..., x_{r})$ 

où  $r = r_1 + r_2 - 1$  et

$$\tau_j = u \cdot \prod_{i=1}^r |\varepsilon_i^{(j)}|^{2x_i} \quad \text{pour} \quad 1 \leqslant j \leqslant r_1 + r_2,$$

où  $(\varepsilon_1, ..., \varepsilon_r)$  est un système d'unités fondamentales de E.

Le Jacobien de ce changement de variables est

$$\left(\prod_{i=1}^{r_1+r_2}\tau_i\right)u^{-1}\cdot 2^{r_1-1}\cdot n\ R\ ,$$

où R désigne le régulateur de E défini par

$$R = \frac{1}{n} \cdot 2^{r_2}$$

$$\vdots$$

$$1 \qquad \varepsilon_1^{(1)} \qquad \cdots \qquad \varepsilon_r^{(1)}$$

$$\vdots$$

$$1 \qquad \varepsilon_1^{(r+1)} \qquad \cdots \qquad \varepsilon_r^{(r+1)}$$

D'autre part, les unités de E ont pour image le réseau  $\mathbb{Z}^r$  dans  $\mathbb{R}^r$  et les racines de l'unité contenues dans E ont pour image le vecteur nul. Si on note w le nombre de ces racines alors le cardinal de U est  $\frac{w}{2}$ .

Finalement l'expression K devient

$$K = 2^{r_1} \cdot w^{-1} n R \sum_{j=1}^{h} \int_{x \in [0,1]^r} Z\left(P_{j,x}^0, \frac{ns}{2}\right) dx,$$

où on a noté  $P_{i,x}$  la matrice

$$P_{j,x} = P_j^{-1} \Delta D(\tau)^{t} \overline{\Delta}^{t} (\overline{P_j^{-1}}).$$

Réécrivons à présent l'égalité du théorème 1 avec les expressions qui viennent d'être calculées.

Proposition 12 (Formule de Hecke). Soit

$$\Lambda_{E}(s) = (2^{r_{2}} \pi^{n/2} |d_{E}|^{\frac{1}{2}})^{-s} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right)^{r_{1}} \Gamma(s)^{r_{2}} \zeta_{E}(s)$$

et pour une matrice P réelle, symétrique, définie positive, posons

$$\Lambda(P, s) = \pi^{-s}\Gamma(s) Z(P, s).$$

Alors

$$w \cdot \Lambda_{E}(s) = 2^{r_{1}-1} \cdot n R \sum_{j=1}^{h} \int_{x \in [0,1]^{r}} \Lambda\left(P_{j,x}^{0}, \frac{ns}{2}\right) dx$$

Remarque. Il serait intéressant de faire le calcul précédent dans un cap plus général où l'on considère un quasi-caractère  $\omega$  de  $\mathbf{A}^{\times}$  quelconque. Ainsi  $\omega \circ N_{E/\mathbf{Q}}$  correspond à un caractère de Hecke sur le groupe des idéau de E (cf. [4], chap. 8, § 3, p. 156) et la difficulté est alors de calculer l'intégrale toroïdale aux places finies sur lesquelles le quasi-caractère  $\omega \circ N_{E/\mathbf{Q}}$  se ramifie.

## **BIBLIOGRAPHIE**

- [1] BOREL, A. Linear algebraic groups. Benjamin (1969).
- [2] Borevitch, Z. I. et I. R. Chafarevitch. Théorie des Nombres. Gauthiers Villars (1967).
- [3] BOURBAKI, N. Algèbre, chapitres V, VII. Masson (1981).
- [4] GOLDSTEIN, L. J. Analytic number theory. Prentice Hall (1971).