

**Zeitschrift:** L'Enseignement Mathématique  
**Herausgeber:** Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique  
**Band:** 32 (1986)  
**Heft:** 1-2: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

**Artikel:** REPRÉSENTATION DE GELFAND-GRAEV ET IDENTITÉS DE BARNES LE CAS DE  $GL_2$  D'UN CORPS FINI  
**Autor:** Helversen-Pasotto, Anna  
**Kapitel:** §4. Rappel de la table des caractères de  $G$  CALCUL DES VALEURS DES CARACTÈRES DE  $G$  SUR LES GÉNÉRATEURS DE  $\mathbb{F}_q^\times$   
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-55078>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 27.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

THÉORÈME 1. L'unité et les éléments  $b(\gamma)$ , avec  $\gamma \in X$ , forment une base de l'espace vectoriel sous-jacent à l'algèbre  $A_x$ . La structure d'algèbre s'exprime par la relation suivante :

$$(5) \quad b(\gamma_1) b(\gamma_2) = q^{-1}(q-1)^{-1} \delta(\alpha\gamma_1 \gamma_2) \\ + q^{-1}(q-1)^{-2} (\alpha\gamma_1\gamma_2) (-1) g(\alpha\gamma_1\gamma_2) \sum_{\gamma} \gamma(-1) g(\gamma_1\gamma^{-1})g(\gamma_2\gamma^{-1})b(\gamma)$$

pour  $\gamma_1, \gamma_2 \in X$ ; on somme sur  $\gamma \in X$ .

#### § 4. RAPPEL DE LA TABLE DES CARACTÈRES DE $G$

CALCUL DES VALEURS DES CARACTÈRES DE  $G$  SUR LES GÉNÉRATEURS DE  $A_x$

Les caractères sont en « dualité » avec les classes de conjugaison. Correspondant aux quatre « types » de telles classes, il y a quatre « séries » de caractères. Toute la situation se résume dans le tableau suivant :

classes de conjugaison		caractères	$\chi_{\mu}^1$	$\chi_{\mu}^q$	$\chi_{\mu, \nu}$	$\chi_{\Lambda}$
représentant	diviseurs élémentaires	paramètres	$\mu \in X$	$\mu \in X$	$\mu, \nu \in X$ $\mu \neq \nu$ modulo $(\mu, \nu) \sim (\nu, \mu)$	$\Lambda \in Y$ modulo $\Lambda \sim \Lambda^q$
$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$	$X-a$ $X-a$	$a \in F^{\times}$	$\mu^2(a)$	$q \mu^2(a)$	$(q+1) \mu\nu(a)$	$(q-1) \Lambda(a)$
$\begin{pmatrix} a & a \\ 0 & a \end{pmatrix}$	$1$ $(X-a)^2$	$a \in F^{\times}$	$\mu^2(a)$	$0$	$\mu\nu(a)$	$-\Lambda(a)$
$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix}$	$1$ $(X-a)(X-d)$	$a, d \in F^{\times}$ $a \neq d$ modulo $(a, d) \sim (d, a)$	$\mu(ad)$	$\mu(ad)$	$\mu(a) \nu(d)$ $+ \mu(d) \nu(a)$	$0$
$\begin{pmatrix} 0 & N(x) \\ -1 & \text{Tr}(x) \end{pmatrix}$	$1$ $X^2 - \text{Tr}(x)X + N(x)$	$x \in E^{\times}$ $x \notin F^{\times}$ modulo $x \sim x^q$	$\mu(N(x))$	$-\mu(N(x))$	$0$	$-(\Lambda + \Lambda^q)(x)$

Ici  $E$  désigne le corps fini à  $q^2$  éléments,  $\text{Tr}$  (resp.  $N$ ) dénote la trace (resp. norme) de  $E$  sur  $F$ , i.e. pour  $x \in E$ , on a

$$\text{Tr}(x) = x + x^q \quad \text{et} \quad N(x) = x x^q,$$

$Y$  désigne le groupe des caractères de  $E^\times$ .

Une des nombreuses références pour le calcul des caractères de  $G$  est [9].

Pour tout caractère  $\chi$  de  $G$ , nous désignons aussi par  $\chi$  l'extension par linéarité de  $\chi$  à  $\mathbb{C}[G]$  et nous nous proposons d'en calculer la restriction à la sous-algèbre  $A_\alpha$ . Pour l'unité  $e$  de  $A_\alpha$ , on obtient

$$\chi(e) = \chi(e_\theta) = \frac{1}{|H|} \sum_{h \in H} \theta(h^{-1}) \chi(h) = \langle \theta, \text{Res}_H^G \chi \rangle = \langle \text{Ind}_H^G \theta, \chi \rangle$$

et d'une manière explicite :

$$\chi(e) = q^{-1}(q-1)^{-1} \sum_{a,b} \bar{\alpha}(a) \bar{\psi}(b) \chi(c(a) u(b)), \quad a \in F^\times, b \in F^+;$$

or la suite des diviseurs élémentaires de  $c(a) u(b)$  est 1,  $(X-a)^2$ , si  $b \neq 0$ , et  $X-a$ ,  $X-a$ , si  $b = 0$ , pour  $a \in F^\times, b \in F^+$ , d'où :

$$\chi(e) = q^{-1}(q-1)^{-1} \sum_{a,b \neq 0} \bar{\alpha}(a) \bar{\psi}(b) \chi(1, (X-a)^2) + \sum_a \bar{\alpha}(a) \chi(X-a, X-a)$$

$a, b \in F$ ; mais  $\psi$  étant un caractère non-trivial de  $F^+$ , on a

$$\sum_{b \neq 0} \psi(b) = -1, \quad b \in F, \quad \text{d'où}$$

$$\chi(e) = q^{-1}(q-1)^{-1} \sum_a \bar{\alpha}(a) [\chi(X-a, X-a) - \chi(1, (X-a)^2)], \quad a \in F^\times.$$

En utilisant la table des caractères, on obtient, pour  $\mu, \nu \in X$ ,

$$\chi_\mu^1(e) = 0, \chi_\mu^q(e) = \delta(\alpha^{-1} \mu^2), \chi_{\mu, \nu}(e) = \delta(\alpha^{-1} \mu \nu)$$

et  $\chi_\Lambda(e) = \delta(\alpha^{-1} \lambda)$ , où  $\lambda$  dénote la restriction de  $\Lambda$  à  $F^\times$ , pour  $\Lambda \in Y$ .

D'après [2], Corollaire 1.2, les homomorphismes d'algèbres de  $A_\alpha$  dans  $\mathbb{C}$  sont donnés par les caractères  $\chi$  de  $G$ , tels que  $\chi(e) = 1$ . Nous calculons, dans la suite, leurs valeurs sur les générateurs  $b(\gamma)$  de  $A_\alpha$  avec  $\gamma \in X$ .

LEMME 1. Soit  $\chi$  un caractère de  $G$  et  $\gamma \in X$ ; on a

$$\begin{aligned} & \chi(b(\gamma)) \\ &= q^{-1}(q-1)^{-2} \gamma(-1) \sum_{\substack{a, c \in F^\times \\ b \in F^+}} (\alpha^{-1} \gamma^{-2})(a) \gamma(c) \bar{\psi}(a^{-1}b) \chi(1, X^2 - bX + c), \end{aligned}$$

ici  $\alpha$  dénote le caractère central fixé.

En effet, on a  $\chi(b(\gamma)) = (q-1)^{-1} \sum_a \gamma(a)\chi(a)$ ,  $a \in F^\times$ .

Or

$$\begin{aligned} b(a) &= ed(a)ze = q^{-2}(q-1)^{-2} \sum_{a_1, a_2, b_1, b_2} \alpha(a_1 a_2) \psi(b_1 + b_2) c(a_1) u(b_1) d(a) z c(a_2) u(b_2) \\ &= q^{-2}(q-1)^{-1} \sum_{a_1, b_1, b_2} \bar{\alpha}(a_1) \bar{\psi}(b_1 + b_2) c(a_1) u(b_1) d(a) z u(b_2), \quad a_1, a_2 \in F^\times, b_1, b_2 \in F^+ \end{aligned}$$

La suite des diviseurs élémentaires de  $c(a_1) u(b_1) d(a) z u(b_2)$  est égale à  $1, X^2 - a_1(b_1 + b_2)X - a_1^2 a$ , pour  $a_1, a \in F^\times, b_1, b_2 \in F^+$ , d'où

$$\begin{aligned} \chi(b(a)) &= q^{-1}(q-1)^{-1} \sum_{a_1, b} \bar{\alpha}(a_1) \bar{\psi}(b) \chi(1, X^2 - a_1 b X - a_1^2 a), \quad a_1 \in F^\times, b \in F^+ \\ &= q^{-1}(q-1)^{-1} \sum_{a_1, b} \bar{\alpha}(a_1) \bar{\psi}(a_1^{-1} b) \chi(1, X^2 - b X - a_1^2 a), \quad a_1 \in F^\times, b \in F^+ \end{aligned}$$

On obtient donc

$$\begin{aligned} \chi(b(\gamma)) &= q^{-1}(q-1)^{-2} \sum_{a, a_1, b} \alpha(a_1^{-1}) \gamma(a) \bar{\psi}(a_1^{-1} b) \chi(1, X^2 - b X - a_1^2 a), \quad a, a_1 \in F^\times, b \in F^+ \\ &= q^{-1}(q-1)^{-2} \sum_{a_1, c, b} \alpha(a_1^{-1}) \gamma(-a_1^{-2} c) \bar{\psi}(a_1^{-1} b) \chi(1, X^2 - b X + c) \\ &= q^{-1}(q-1)^{-2} \gamma(-1) \sum_{a, c, b} (\alpha^{-1} \gamma^{-2})(a) \gamma(c) \bar{\psi}(a^{-1} b) \chi(1, X^2 - b X + c), \end{aligned}$$

ce qui prouve le lemme 1.

**PROPOSITION 2.** *Les valeurs des caractères de  $G$  sur les générateurs de  $A$  sont données par :*

$$\chi_\mu^1(e) = \chi_\mu^1(b(\gamma)) = 0,$$

$$\chi_\mu^q(e) = \delta(\alpha^{-1} \mu^2), \quad \chi_\mu^q(b(\gamma)) = q^{-1}(q-1)^{-1} \delta(\alpha^{-1} \mu^2) \gamma(-1) g(\gamma \mu)^2,$$

$$\chi_{\mu, \nu}(e) = \delta(\alpha^{-1} \mu \nu), \quad \chi_{\mu, \nu}(b(\gamma)) = q^{-1}(q-1)^{-1} \delta(\alpha^{-1} \mu \nu) (\alpha \gamma) (-1) g(\gamma \mu) g(\gamma \nu),$$

$$\chi_\Lambda(e) = \delta(\alpha^{-1} \lambda), \quad \chi_\Lambda(b(\gamma)) = -q^{-1}(q-1)^{-1} \delta(\alpha^{-1} \lambda) (\alpha \gamma) (-1) G(\gamma^* \Lambda);$$

ici  $\mu, \nu, \gamma \in X$ ,  $\alpha$  caractère central fixé,  $\Lambda \in Y$ ;  $\lambda$  dénote la restriction de  $\Lambda$  à  $F^\times$  et  $\gamma^*$  dénote le composé de  $\gamma$  avec la norme de  $E^\times$  sur  $F^\times$ ; la somme de Gauss  $G(\Lambda \gamma^*)$  est définie par

$$G(\Lambda \gamma^*) = \sum_{x \in E^\times} (\Lambda \gamma^*)(x) \psi(\text{Tr}(x)).$$

*Démonstration.* Les valeurs sur l'unité  $e$  ont déjà été calculées au début du paragraphe. De  $\chi_\mu^1(1, X^2 - bX + c) = \mu(c)$ , pour tout  $b \in F^+, c \in F^\times$ ,  $\mu \in X$  on déduit que  $\chi_\mu^1(b(\gamma)) = 0$ , pour tout  $\gamma \in X$ .

D'après le lemme 1, on obtient

$$\chi_{\mu}^q(b(\gamma)) = q^{-1}(q-1)^{-2} \gamma(-1) \sum_{a,c,b} (\alpha^{-1} \gamma^{-2})(a) \gamma(c) \bar{\psi}(a^{-1}b) \chi_{\mu}^q(1, X^2 - bX + c);$$

d'après la table des caractères, on a

$$\chi_{\mu}^q(1, X^2 - bX + c) = \begin{cases} 0 & \\ \mu(a_1 a_2) & \text{si } X^2 - bX + c \\ -\mu(N(x)) & \end{cases}$$

$$= \begin{cases} (X-a)^2 & \text{avec } a \in F^{\times} \\ (X-a_1(X-a_2)) & \text{avec } a_1, a_2 \in F^{\times}, a_1 \neq a_2 \\ (X-x)(X-x^q) & \text{avec } x \in E^{\times} - F^{\times} \end{cases}$$

d'où

$$\chi_{\mu}^q(b(\gamma)) = q^{-1}(q-1)^{-2} \gamma(-1) \frac{1}{2} \sum_{\substack{a \\ a_1 \neq a_2}} (\alpha^{-1} \gamma^{-2}(a)) \gamma(a_1 a_2) \bar{\psi}(a^{-1}(a_1 + a_2)) \mu(a_1 a_2) \\ - q^{-1}(q-1)^{-2} \gamma(-1) \frac{1}{2} \sum_{\substack{a \\ x \neq x^q}} (\alpha^{-1} \gamma^{-2})(a) \gamma(N(x)) \bar{\psi}(a^{-1} \text{Tr}(x)) \mu(N(x)),$$

ici l'on somme sur  $a, a_1, a_2 \in F^{\times}$  et  $x \in E^{\times}$ . On ne change rien à la valeur de  $\chi_{\mu}^q(b(\gamma))$  si dans les sommations on enlève la restriction  $a_1 \neq a_2$  et  $x \neq x^q$ . Après un changement d'indices de sommation, l'on obtient

$$\chi_{\mu}^q(b(\gamma)) = q^{-1}(q-1)^{-2} \gamma(-1) \frac{1}{2} \left( \sum_{a, a_1, a_2} (\alpha^{-1} \mu^2)(a) \gamma(a_1 a_2) \psi(a_1 + a_2) \mu(a_1 a_2) \right. \\ \left. - \sum_{a, x} (\alpha^{-1} \mu^2)(a) \gamma(N(x)) \psi(\text{Tr}(x)) \mu(N(x)) \right), a, a_1, a_2 \in F^{\times}, x \in E^{\times}, \\ = q^{-1}(q-1)^{-1} \gamma(-1) \delta(\alpha^{-1} \mu^2) \frac{1}{2} [g(\gamma\mu)^2 - G((\gamma\mu)^*)],$$

où  $G((\gamma\mu)^*) = \sum_{x \in E^{\times}} (\gamma\mu)(N(x)) \psi(\text{Tr}(x))$ . D'après le théorème de Davenport et Hasse [3], on a  $G((\gamma\mu)^*) = -g(\gamma\mu)^2$ , d'où

$$\chi_{\mu}^q(b(\gamma)) = q^{-1}(q-1)^{-1} \gamma(-1) \delta(\alpha^{-1} \mu^2) g(\gamma\mu)^2.$$

Le calcul de  $\chi_{\mu, \nu}(b(\gamma))$  est plus facile, on obtient, d'après le lemme 1 et la table des caractères

$$\begin{aligned}
\chi_{\mu, \nu}(b(\gamma)) &= q^{-1}(q-1)^{-2} \gamma(-1) \sum_{a, a_1, a_2} (\alpha^{-1} \gamma^{-2})(a) \gamma(a_1 a_2) \bar{\psi}(a^{-1}(a_1 + a_2)) \mu(a_1) \nu(a_2) \\
&\quad a, a_1, a_2 \in F^\times, \\
&= q^{-1}(q-1)^{-2} (\gamma \mu \nu) (-1) \sum_{a, c_1, c_2} (\alpha^{-1} \mu \nu)(a) (\gamma \mu)(c_1) (\gamma \nu)(c_2) \psi(c_1 + c_2), \\
&\quad a, c_1, c_2 \in F^\times, \\
&= q^{-1}(q-1)^{-1} (\alpha \gamma) (-1) \delta(\alpha^{-1} \mu \nu) g(\gamma \mu) g(\gamma \nu);
\end{aligned}$$

le calcul de  $\chi_\Lambda(b(\gamma))$  est analogue et est laissé au lecteur. La démonstration de la proposition 2 est ainsi terminée.

*Remarque 1.* Soit  $\chi$  un caractère de  $G$  tel que  $\chi(e) = 1$ . Un tel caractère définit un homomorphisme d'algèbres de  $A_\alpha$  dans  $\mathbf{C}$ , comme on l'a déjà remarqué, c.f. [2]. On a donc

$$\chi(b(\gamma_1)) \chi(b(\gamma_2)) = \chi(b(\gamma_1) b(\gamma_2)),$$

pour  $\gamma_1, \gamma_2 \in X$ , et la relation (5) du théorème 1 donne ainsi lieu à l'identité suivante:

$$\begin{aligned}
(5)^x \quad \chi(b(\gamma_1)) \chi(b(\gamma_2)) &= q^{-1}(q-1)^{-1} \delta(\alpha \gamma_1 \gamma_2) \\
&+ q^{-1}(q-1)^{-2} (\alpha \gamma_1 \gamma_2) (-1) g(\alpha \gamma_1 \gamma_2) \sum_{\gamma} \gamma(-1) g(\gamma_1 \gamma^{-1}) g(\gamma_2 \gamma^{-1}) \chi(b(\gamma))
\end{aligned}$$

pour  $\gamma_1, \gamma_2 \in X$ , sommation sur  $\gamma \in X$ .

*Remarque 2.* En spécialisant la remarque 1, pour  $\chi = \chi_\mu^q$  (resp.  $\chi = \chi_{\mu, \nu}$ , resp.  $\chi = \chi_\Lambda$ ) avec  $\mu \in X$  tel que  $\mu^2 = \alpha$  (resp. avec  $\mu, \nu \in X$  tels que  $\mu \neq \nu$  et  $\mu\nu = \alpha$ , resp. avec  $\Lambda \in Y$  tel que  $\Lambda \neq \Lambda^q$  et  $\lambda = \alpha$ ) et en appliquant la proposition 2, on obtient les identités suivantes:

$$\begin{aligned}
(5)_\mu^q \quad g(\gamma_1 \mu)^2 g(\gamma_2 \mu)^2 &= q(q-1) \delta(\gamma_1 \gamma_2 \mu^2) \\
&+ (q-1)^{-1} g(\gamma_1 \gamma_2 \mu^2) \sum_{\gamma} g(\gamma_1 \gamma^{-1}) g(\gamma_2 \gamma^{-1}) g(\mu \gamma)^2, \dots
\end{aligned}$$

resp.

$$\begin{aligned}
(5)_{\mu, \nu} \quad g(\gamma_1 \mu) g(\gamma_1 \nu) g(\gamma_2 \mu) g(\gamma_2 \nu) &= q(q-1) \delta(\gamma_1 \gamma_2 \mu \nu) (\mu \nu) (-1) \\
&+ (q-1)^{-1} g(\gamma_1 \gamma_2 \mu \nu) \sum_{\gamma} g(\gamma_1 \gamma^{-1}) g(\gamma_2 \gamma^{-1}) g(\mu \gamma) g(\nu \gamma),
\end{aligned}$$

resp.

$$\begin{aligned}
(5)_\Lambda \quad G(\gamma_1^* \Lambda) G(\gamma_2^* \Lambda) &= q(q-1) \delta(\gamma_1 \gamma_2 \lambda) \lambda(-1) \\
&- (q-1)^{-1} g(\gamma_1 \gamma_2 \lambda) \sum_{\gamma} g(\gamma_1 \gamma^{-1}) g(\gamma_2 \gamma^{-1}) G(\gamma^* \Lambda),
\end{aligned}$$

pour  $\gamma_1, \gamma_2 \in X$ , sommation sur  $\gamma \in X$ .

*Remarque 3.* On observe que les identités  $(5)_{\mu, \nu}$  [resp.  $(5)_{\Lambda}$ ] considérées pour tous les  $\mu, \nu \in X$  [resp.  $\Lambda \in Y$ ] contiennent l'identité  $(5)_{\mu}^q$  comme cas particulier « dégénéré », correspondant à  $\mu = \nu$  [resp.  $\Lambda = \Lambda^q, \Lambda = \mu \circ N$ ].

*Remarque 4.* Pour tout  $\beta \in X$ , on a  $\delta(\beta) g(\beta) = -1$ . Les identités peuvent donc s'énoncer sous la forme suivante :

$$(5)_{\mu, \nu} \quad (q-1)^{-1} \sum_{\gamma} g(\gamma_1 \gamma^{-1}) g(\gamma_2 \gamma^{-1}) g(\mu \gamma) g(\nu \gamma) \\ = \frac{g(\gamma_1 \mu) g(\gamma_1 \nu) g(\gamma_2 \mu) g(\gamma_2 \nu)}{g(\gamma_1 \gamma_2 \mu \nu)} + q(q-1) \delta(\gamma_1 \gamma_2 \mu \nu) (\mu \nu) (-1),$$

pour tous  $\gamma_1, \gamma_2, \mu, \nu \in X$ , sommation sur  $\gamma \in X$ , et

$$(5)_{\Lambda} \quad - (q-1)^{-1} \sum_{\gamma} g(\gamma_1 \gamma^{-1}) g(\gamma_2 \gamma^{-1}) G(\gamma^* \Lambda) \\ = \frac{G(\gamma_1^* \Lambda) G(\gamma_2^* \Lambda)}{g(\gamma_1 \gamma_2 \lambda)} + q(q-1) \delta(\gamma_1 \gamma_2 \lambda) \lambda(-1),$$

pour tous  $\gamma_1, \gamma_2 \in X, \Lambda \in Y$ , sommation sur  $\gamma \in X$ ,  $\lambda$  dénote la restriction de  $\Lambda$  à  $F^{\times}$ .

Nous reconnaissons ainsi les identités (i) et (iv) du théorème 1 de notre publication [4], dont nous rappelons l'énoncé ci-dessous, et nous voyons bien comment la série principale (resp. discrète) de caractères  $\chi_{\mu, \nu}$  (resp.  $\chi_{\Lambda}$ ) amène aux identités de Barnes (i) (resp. (iv)). Ceci termine la première partie de cet article.

**RAPPEL DU THÉORÈME 1 DE [4].** Soit  $F$  (resp.  $F_2$ , resp.  $F_4$ ) le corps fini à  $q$  (resp.  $q^2$ , resp.  $q^4$ ) éléments; on note  $F_2^{\times}$  (resp.  $F_4^{\times}$ ) le groupe multiplicatif de  $F_2$  (resp.  $F_4$ ), et on se fixe un caractère non-trivial  $\exp$  du groupe additif  $F^+$ . Pour un caractère  $\alpha$  de  $F^{\times}$ , on pose

$$G_1(\alpha) = g(\alpha) = \sum_a \alpha(a) \exp(a),$$

où l'on somme sur tous les  $a \in F^{\times}$ . On note  $\text{Tr}_2$  (resp.  $\text{Tr}_4$ ) la trace de  $F_2$  (resp.  $F_4$ ) sur  $F$ , et l'on note  $N$  (resp.  $N_{4/2}$ ) la norme de  $F_2$  sur  $F$  (resp.  $F_4$  sur  $F_2$ ). Pour un caractère  $\Lambda$  de  $F_2^{\times}$ , on note  $G_2(\Lambda)$  la somme de Gauss suivante

$$G_2(\Lambda) = \sum_x \Lambda(x) \exp(\text{Tr}_2(x)),$$

où l'on somme sur tous les  $x \in F_2^\times$ . De manière analogue, pour un caractère  $\Phi$  de  $F_4^\times$ , on pose

$$G_4(\Phi) = \sum_z \Phi(z) \exp(\text{Tr}_4(z)),$$

où l'on somme sur tous les  $z \in F_4^\times$ . On a les cinq identités suivantes:

(i) Pour quatre caractères  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  de  $F^\times$ , on a

$$\begin{aligned} & (q-1)^{-1} \sum_{\alpha} g(\alpha_1 \alpha) g(\alpha_2 \alpha^{-1}) g(\alpha_3 \alpha) g(\alpha_4 \alpha^{-1}) \\ &= \frac{g(\alpha_1 \alpha_2) g(\alpha_2 \alpha_3) g(\alpha_3 \alpha_4) g(\alpha_4 \alpha_1)}{g(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4)} + q(q-1) \delta(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4) (\alpha_1 \alpha_3) (-1), \end{aligned}$$

ici l'on somme sur les caractères  $\alpha$  de  $F^\times$ ;

(ii) pour un caractère  $\Phi$  de  $F_4^\times$ , on a

$$- (q+1)^{-1} \sum_{\Lambda} G_4(\Phi(\Lambda \circ N_{4/2})) = \frac{G_4(\Phi^{q+1})}{g(\varphi)} + q(q-1) \delta(\varphi) \Phi(\varepsilon_0),$$

ici l'on somme sur les caractères  $\Lambda$  de  $F_2^\times$  dont la restriction à  $F^\times$  soit triviale,  $\varepsilon_0$  dénote un élément de  $F_2$  tel que  $\varepsilon_0^{q-1} = -1$ ;  $\varphi$  dénote la restriction de  $\Phi$  à  $F^\times$ ;

(iii) pour  $\Lambda_1, \Lambda_2$  caractères de  $F_2^\times$ , on a

$$\begin{aligned} & (q-1)^{-1} \sum_{\alpha} G_2(\Lambda_1(\alpha \circ N)) G_2(\Lambda_2(\alpha \circ N)^{-1}) \\ &= \frac{G_2(\Lambda_1 \Lambda_2) G_2(\Lambda_1 \Lambda_2^q)}{g(\lambda_1 \lambda_2)} + q(q-1) \delta(\lambda_1 \lambda_2) \lambda_1 (-1), \end{aligned}$$

ici  $\lambda_1$  (resp.  $\lambda_2$ ) désigne la restriction de  $\Lambda_1$  (resp.  $\Lambda_2$ ) à  $F^\times$ ; l'on somme sur tous les caractères  $\alpha$  de  $F^\times$ ;

(iv) pour  $\alpha_1, \alpha_2$  caractères de  $F^\times$ ,  $\Lambda$  caractère de  $F_2^\times$ , on a

$$\begin{aligned} & - (q-1)^{-1} \sum_{\alpha} g(\alpha_1 \alpha) g(\alpha_2 \alpha) G_2(\Lambda(\alpha \circ N)^{-1}) \\ &= \frac{G_2(\Lambda(\alpha_1 \circ N)) G_2(\Lambda(\alpha_2 \circ N))}{g(\alpha_1 \alpha_2 \lambda)} + q(q-1) \delta(\alpha_1 \alpha_2 \lambda) \lambda (-1), \end{aligned}$$

ici  $\lambda$  désigne la restriction de  $\Lambda$  à  $F^\times$ , l'on somme sur tous les caractères  $\alpha$  de  $F^\times$ ;

(v) pour  $\Lambda_1, \Lambda_2$  caractères de  $F_2^\times$ , on a

$$(q+1)^{-1} \sum_{\Lambda} G_2(\Lambda_1 \Lambda) G_2(\Lambda_2 \Lambda) \\ = \frac{g(\lambda_1) g(\lambda_2) G_2(\Lambda_1 \Lambda_2)}{g(\lambda_1 \lambda_2)} + q(q-1) \delta(\lambda_1 \lambda_2) \lambda_1(-1) (\Lambda_1 \Lambda_2) (\varepsilon_0),$$

ici  $\lambda_1$  (resp.  $\lambda_2$ ) dénote la restriction de  $\Lambda_1$  (resp.  $\Lambda_2$ ) à  $F^\times$ , l'on somme sur les caractères  $\Lambda$  de  $F_2^\times$  dont la restriction à  $F^\times$  soit triviale,  $\varepsilon_0$  désigne un élément de  $F_2^\times$  tel que  $\varepsilon_0^{q-1} = -1$ .

Les cinq identités sont des cas particuliers d'une identité plus générale qui fait l'objet du théorème 2 de notre publication [4]. La démonstration se base sur l'étude de certaines algèbres commutatives de degré 4 sur  $F$  et fait intervenir le groupe symétrique des permutations de quatre éléments ainsi que le groupe diédral  $D_4$  du carré. L'identité générale s'énonce pour chaque  $\sigma \in D_4$ , mais elle ne dépend que de la classe de conjugaison de  $\sigma$ . Les cinq classes de conjugaison de  $D_4$  fournissent les cinq identités de Barnes.

Dans la suite de cet article nous calculons la trace de l'algèbre  $A_\alpha$  (§ 5) et nous utilisons les identités de Barnes (i) et (iv) pour exhiber les homomorphismes d'algèbres de  $A_\alpha$  dans  $\mathbf{C}$  indépendamment de la table des caractères (§ 6). La comparaison de leur somme avec la trace montre que la liste des homomorphismes est complète et sans répétitions.

### § 5. CALCUL DE LA TRACE DE L'ALGÈBRE $A_\alpha$

On note  $T_\alpha$  la trace de l'algèbre  $A_\alpha$ ,  $\alpha \in X$  fixé. Soit  $B$  la base de  $A_\alpha$  formée par l'unité et les  $b(\gamma)$ , avec  $\gamma \in X$ ; pour  $b \in B$  et  $a \in A_\alpha$ , on définit le coefficient  $\langle b' | a \rangle$  dans  $\mathbf{C}$  par la condition suivante:

$$a = \sum_{b \in B} \langle b' | a \rangle b;$$

on a, pour tout  $a \in A_\alpha$ ,

$$T_\alpha(a) = \sum_{b \in B} \langle b' | ab \rangle.$$

On obtient

$$T_\alpha(1) = \dim_{\mathbf{C}}(A_\alpha) = q$$