Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

**Band:** 33 (1987)

**Heft:** 1-2: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: FORMULES POUR LES TRISÉCANTES DES SURFACES

**ALGÉBRIQUES** 

Autor: Barz, Patrick

Kapitel: IV) Trisécantes dans \$P^5\$

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-87886

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF: 27.11.2025** 

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# Deuxième partie: P<sup>5</sup>, P<sup>6</sup>, P<sup>7</sup>

## IV) TRISÉCANTES DANS P<sup>5</sup>

Soit V une surface non-singulière de  $\mathbf{P}^5$ . Outre les invariants n, d, t de V comme dans  $\mathbf{P}^4$ , soit  $\delta$  le nombre de points-doubles impropres apparents de V, i.e. le nombre de points-doubles impropres de la projection V' de V sur un  $\mathbf{P}^4$  générique de  $\mathbf{P}^5$ .

Nous allons voir au paragraphe 1 que toute formule trisécante pour V dans  $\mathbf{P}^5$  est de la même forme que pour V' dans  $\mathbf{P}^4$ , avec un terme supplémentaire  $\delta(un+v)$  où u et v sont des constantes.

On en déduira au paragraphe 2 trois formules trisécantes dans  $P^5$ : les tangentes d'inflexion de V, les tangentes à V recoupant V ainsi qu'un  $P^3$  fixé, les trisécantes à V coupant un  $P^2$  fixé.

## 1°) RETOUR À $P^4$

a) Soit V une surface non-singulière de  $\mathbf{P}^5$  et projetons-la génériquement en V' sur un hyperplan H. Par le procédé de construction de I.3.a, on voit qu'il existe un schéma relatif  $\Phi/\mathbf{C}$  avec fibres

$$\Phi_1 \ = \ V \qquad {\rm et} \qquad (\Phi_0)_{\rm red} \ = \ V' \ . \label{eq:phi1}$$

On peut énoncer les deux propositions suivantes, dont les démonstrations sont analogues — mais plus simples — à celles des propositions 3 et 4, en ce sens qu'il suffit de se ramener à un modèle local, comme dans l'Annexe 3. (Ce modèle local correspond à V formé de deux plans disjoints dans  $\mathbf{P}^5$ , soit V' formé de deux plans transverses dans H.) Nous laissons les détails au lecteur; on peut aussi consulter [23] où la situation est tout à fait analogue.

On désignera les points singuliers de V' par  $N_1, N_2, ..., N_{\delta}$ .

Proposition 8. Avec les notations précédentes, on a l'égalité de sousschémas de  $\mathbf{P}^5$ :

$$\Phi_0 = V' \cup N_1^{(1)} \cup ... \cup N_{\delta}^{(1)}$$

où  $N_i^{(1)}$  désigne le premier voisinage infinitésimal de  $N_i$  dans  ${\bf P}^5$ . De plus,  $V'=(\Phi_0)_{\rm red}=\Phi_0\cap H$ .

Proposition 9. Soit  $\Phi/\mathbb{C}$  le schéma relatif associé à V comme ci-dessus. Alors

- i) Pour  $k\geqslant 3$  tout k-uplet curviligne dans  $\Phi_0$  de support un des points singuliers  $\{N\}$  de V' est limite de k-uplets doubles dans  $\Phi_0$  (notations de la définition 2).
- ii) Tout k-uplet curviligne dans  $\Phi_0$  est limite de k-uplets curvilignes dans des fibres  $\Phi_{\lambda}$  de  $\Phi/\mathbb{C}$  avec  $\lambda \neq 0$ .
- iii)  $\operatorname{Hilb^2}\Phi_0$  est réduit au voisinage d'un doublet d de support un point singulier  $\{N\}$  lorsque  $d \neq V'$ .

Ceci étant, afin d'étudier les composantes irréductibles de  $\mathrm{Hilb}_c^3 \, \Phi_0$ , nous donnons la

Définition 3. Pour  $j=1,2,...,\delta$  notons  $\overline{U_j}$  l'adhérence dans  $\mathrm{Hilb}_c^3 \mathbf{P}^5$  de la partie  $U_j$  formée des triplets  $d \cup m$  où

d est un doublet de  $P^5$  de support  $\{N_j\}$ ,

m est un point simple de  $V' - \{N_j\}$ .

Bien entendu,  $\overline{U_j}$  est dans (Hilb<sub>c</sub><sup>3</sup>  $\Phi_0$ )<sub>red</sub>, d'après la structure nilpotente de  $\Phi_0$  donnée par la proposition 8. On a alors la

Proposition 10.

- i)  $(\mathrm{Hilb}_c^3 \Phi_0)_{\mathrm{red}}$  est réunion des  $\overline{U_j}$  et de  $(\mathrm{Hilb}_c^3 V')_{\mathrm{red}}$ ;
- ii)  $\operatorname{Hilb}_{c}^{3}\Phi_{0}$  est génériquement réduit le long des  $\overline{U_{j}}$  et  $\operatorname{Hilb}_{c}^{3}V'$ .

Preuve.

- i) Soit t un triplet curviligne contenu dans  $\Phi_0$ . Si t est dans H, comme  $\Phi_0 \cap H = V'$ , on a  $t \in (\operatorname{Hilb}_c^3 V')_{\operatorname{red}}$ . Si maintenant t n'est pas dans H, le support de t ne peut être formé de trois points distincts; il contient forcément un des points  $N_j$ , car en dehors de ces points, on a  $\mathcal{O}_{\Phi_0}$  égal à  $\mathcal{O}_{V'}$ . D'autre part, toujours puisque  $t \not \in H$ , la multiplicité de t en l'un des  $N_j$  est strictement plus grande que 1. Si le support de t est réduit à  $\{N_j\}$ , d'après la proposition 9 i), on a  $t \in \overline{U_j}$ . Sinon, Supp  $t = \{N_j, m\}$  où  $m \in V' \{N_j\}$ . Les multiplicités de t en  $N_j$  et m sont 2 et 1; ainsi  $t \in U_j$ .
- ii)  $\operatorname{Hilb}_c^3 V'$  est en fait réduit d'après l'Annexe 1. Si maintenant  $d \cup m \in U_j$  est générique, on a  $d \notin H$ , d'où  $\operatorname{Hilb}^2 \Phi_0$  réduit au voisinage de d (proposition 9 iii); par suite  $U_j$  est réduit au voisinage de  $d \cup m$ . La proposition 10 est ainsi prouvée.

Rappelons alors le diagramme

(11) 
$$Al^3 \mathbf{P}^5$$
  $\stackrel{i}{\hookrightarrow}$   $Hilb_c^3 \mathbf{P}^5$  (15) 
$$\uparrow$$
  $Hilb_c^3 V$  (6)

où les dimensions sont indiquées entre parenthèses.

Une formule trisécante pour V dans  $P^5$  exprime le degré du 0-cycle

$$Z.i^*$$
 [Hilb<sup>3</sup><sub>c</sub> V]

où Z est un cycle de  $A^2(Al^3 \mathbf{P}^5)$  fixé. Nous allons voir en d) qu'il suffit d'évaluer le degré de Z.  $i^*$  [Hilb $_c^3 \Phi_0$ ], soit d'après la proposition qui précède:

$$Z.i^*$$
 [Hilb<sub>c</sub><sup>3</sup>  $V'$ ] +  $\sum_{1 \leq j \leq \delta} Z.i^*$  [ $\overline{U_j}$ ].

# b) Evaluation de $Z.i^*$ [Hilb<sub>c</sub><sup>3</sup> V']

Cette évaluation est analogue à celle effectuée en II.2.a. Comme V' est contenu dans  $\mathbf{P}^4$ , regardons le diagramme commutatif

(11) 
$$Al^3 \mathbf{P}^5$$
  $\stackrel{i}{\hookrightarrow}$   $Hilb_c^3 \mathbf{P}^5$  (15)
$$\uparrow \qquad \qquad \uparrow \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad$$

où les flèches sont les injections canoniques. Par l'Annexe 7,  $Al^3 \mathbf{P}^4$  est intersection schématique de  $Al^3 \mathbf{P}^5$  et  $Hilb_c^3 \mathbf{P}^4$ .

Or Hilb<sub>c</sub><sup>3</sup> V' peut être considéré comme sous-variété de Hilb<sub>c</sub><sup>3</sup>  $\mathbf{P}^4$ ; appliquons alors la formule de Fulton-MacPherson (II.2) à  $\alpha = [\mathrm{Hilb}_c^3 V']$  dans A (Hilb<sub>c</sub><sup>3</sup>  $\mathbf{P}^4$ ). On obtient

$$i^*u_*\alpha = i^* [Hilb_c^3 V'] = j_*C$$

où  $C = \hat{i}^*$  [Hilb<sub>c</sub><sup>3</sup> V'].  $c_1$  avec  $c_1$  dans  $A^1(Al^3 \mathbf{P}^4)$ . Par suite, par la formule des projections, on a dans  $A^*(Al^3 \mathbf{P}^5)$ :

$$Z \cdot i^* [\operatorname{Hilb}_c^3 V'] = j_*(j^* Z \cdot c_1 \cdot \hat{i}^* [\operatorname{Hilb}_c^3 V']).$$

Mais  $j^*Z \cdot c_1$  est un cycle fixé dans  $A^3(Al^3 \mathbf{P}^4)$  et donc

$$\deg j^*Z \cdot c_1 \cdot i^* [\operatorname{Hilb}_c^3 V']$$

représente une formule trisécante pour la surface V' de  ${\bf P}^4$ . Ce nombre est donc (proposition 5) de la forme

$$a_1n + a_2 \binom{n}{2} + a_3 \binom{n}{3} + \alpha t + d(\beta n + \gamma)$$

où n, t et d sont les invariants de V (donc de V') et  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ ,  $\alpha$ ,  $\beta$  et  $\gamma$  des constantes.

# c) Evaluation de $Z.i^*[\overline{U_j}]$

Pour cela, fixons j entre 1 et  $\delta$  et soit  $N=N_j$ ,  $\overline{U}=\overline{U_j}$ . Soit I l'intersection  $\overline{U}\cap Al^3$   $\mathbf{P}^5$  dans Hilb<sup>3</sup><sub>c</sub>  $\mathbf{P}^5$ . La sous-variété I, de dimension 2, est formée des triplets alignés de  $\mathbf{P}^5$  dont l'axe passe par N, doubles en N et avec un troisième point sur V'.

Lemme 8. L'intersection  $\overline{U} \cap Al^3 \mathbf{P}^5$  est génériquement transverse dans  $Hilb_c^3 \mathbf{P}^5$ .

Preuve. C'est un simple calcul en coordonnées; voir l'Annexe 4.

Le lemme montre ainsi l'égalité  $i^*[\overline{U}] = [I]$  dans  $A^9(Al^3 \mathbf{P}^5)$ . Maintenant, pour connaître  $i^*[\overline{U}]$ . Z, il suffit évidemment d'évaluer [I]. Z pour Z décrivant une base de  $A^2_{\mathbf{Q}}(Al^3 \mathbf{P}^5)$ . Or la proposition 7 en donne une explicitement. Soit  $\mathcal{H}_1$  et  $\mathcal{H}_2$  deux hyperplans de  $\mathbf{P}^5$  et soit  $[H_1]$  et  $[H_2]$  les cycles associés dans  $A^1(Al^3 \mathbf{P}^5)$  et  $A^2(Al^3 \mathbf{P}^5)$ . On a l'égalité des espaces vectoriels:

 $A_{\mathbf{Q}}^{2}(Al^{3} \mathbf{P}^{5}) = \operatorname{Axe}^{*}A_{\mathbf{Q}}^{2}(G) \oplus \operatorname{Axe}^{*}A_{\mathbf{Q}}^{1}(G) \cdot [H_{1}] \oplus \operatorname{Axe}^{*}A_{\mathbf{Q}}^{0}(G) \cdot [H_{2}]$ où G = G(1, 5). Distinguons alors trois cas.

i)  $Z \in \operatorname{Axe}^* A_0^2(G)$ 

Une base de  $A^2(G)$  est formée des cycles de Schubert (notations de [21]):

- (3, 4): droites contenues dans un hyperplan fixé de P<sup>5</sup>,
- (2, 5): droites coupant un plan fixé P de  $\mathbf{P}^5$ .

On a alors  $Axe^*(2, 5)$ .  $[I] = \varepsilon(n-2)$  où  $\varepsilon$  est un entier > 0. En effet,  $P \cap \mathbf{P}^4$  est une droite  $\Delta$  de  $\mathbf{P}^4$  et N et  $\Delta$  engendrent un plan  $\pi$  passant

par N. Ce plan recoupe V' en n-2 autres points. (Le plan  $\pi$  coupe bien V' au voisinage de N en un triplet, premier voisinage infinitésimal de N dans  $\pi$ ; mais un plan voisin générique ne le coupe qu'en un doublet. Le plan  $\pi$  recoupe donc V' en n-2 points et non pas n-3). La multiplicité éventuelle  $\varepsilon$  est en fait 1, comme il résultera de 2.a).

Par contre, on a  $Axe^*(3, 4)$ . [I] = 0 car l'axe de tout triplet de I passe par N, qui n'est pas dans l'hyperplan fixé.

ii) 
$$Z \in \operatorname{Axe}^* A_0^1(G) \cdot \lceil H_1 \rceil$$

Le cycle (3, 5) des droites coupant un solide fixé de  ${\bf P}^5$  engendre  $A^1_{\bf 0}(G)$ . On a

$$Axe^*(3, 5) . [H_1] . [I] = \varepsilon n .$$

En effet, le solide coupe  $\mathbf{P}^4$  en un plan P; N et P engendrent donc un  $\mathbf{P}^3$  dans  $\mathbf{P}^4$ . Dans ce  $\mathbf{P}^3$ , il y a la courbe  $C = V' \cap \mathbf{P}^3$  et le plan  $\mathcal{H}'_1 = \mathcal{H}_1 \cap \mathbf{P}^3$ . Bien sûr, N n'étant pas sur  $\mathcal{H}_1$ , n'est pas sur  $\mathcal{H}'_1$ . On cherche donc les triplets doubles en N, le troisième point étant sur  $\mathcal{H}'_1 \cap C$ . Il y en a donc n, avec une multiplicité éventuelle.

iii) 
$$Z \in \operatorname{Axe}^* A_{\mathbf{0}}^0(G) \cdot [H_2]$$

Le triplet double en N devant avoir deux points sur  $\mathcal{H}_1$  et  $\mathcal{H}_2$  (par définition de  $[H_2]$ ), on a

$$1 \cdot \lceil H_2 \rceil \cdot \lceil I \rceil = 0$$

puisque N n'appartient ni à  $\mathcal{H}_1$  ni à  $\mathcal{H}_2$ .

Ceci prouve que pour tout Z dans  $A_{\mathbf{Q}}^2(Al^3 \mathbf{P}^5)$ , le degré du 0-cycle  $i^*[\overline{U_j}]$ . Z est de la forme un + v où u et v sont des constantes ne dépendant que de Z.

d) Conclusion. Soit V une surface non-singulière de  $\mathbf{P}^5$  et  $\Phi/\mathbf{C}$  le schéma relatif associé (IV.1.a). Si on pose  $\overline{U} = \mathbf{C}$  et  $U = \mathbf{C}^*$ , les hypothèses de la proposition 1 sont vérifiées pour  $\Phi/\mathbf{C}$ . Pour a) cela résulte de la proposition 9 ii). Pour b), de la proposition 10 ii). Enfin  $\Phi/\mathbf{C}^*$  est k-plat, car isomorphe au produit  $V \times \mathbf{C}^*$  (voir remarque 1). On peut ainsi appliquer la proposition 1.

On a donc l'équivalence rationnelle dans  $Hilb_c^3 P^5$ :

$$[\mathrm{Hilb}_c^3 \ V] \sim [(\mathrm{Hilb}_c^3 \ \Phi_0)_{\mathrm{red}}] = [\mathrm{Hilb}_c^3 \ \Phi_0].$$

D'où, par la proposition 10, l'équivalence rationnelle

$$[\operatorname{Hilb}_c^3 V] \sim [\operatorname{Hilb}_c^3 V'] + \sum_{j=1}^{\delta} [\overline{U_j}].$$

En regardant alors les évaluations faites en b) et c), il vient la

PROPOSITION 11. Soit V une surface non-singulière de  ${\bf P}^5$ , d'invariants  $(n,d,t,\delta)$ . Pour tout cycle  ${\bf Z}$  de  $A^2(Al^3\,{\bf P}^5)$ , la formule trisécante donnant le degré du 0-cycle

$$Z.i^*$$
 [Hilb<sup>3</sup><sub>c</sub>  $V$ ]

est de la forme

$$T(V) = a_1 n + a_2 \binom{n}{2} + a_3 \binom{n}{3} + \alpha t + d(\beta n + \gamma) + \delta(un + v)$$

 $où a_1, a_2, ..., v$  sont des constantes ne dépendant que de Z.

### 2°) Trois formules

a) Pour une surface V de  $\mathbf{P}^5$ , commençons par regarder le nombre de trisécantes à V rencontrant un plan  $\pi$  fixé. Par définition, ce nombre T(V) est le degré du 0-cycle  $\mathrm{Axe}^*\sigma_2$ .  $i^*$  [Hilb $_c^3V$ ] où comme toujours

$$i: Al^3 \mathbf{P}^5 \hookrightarrow Hilb_c^3 \mathbf{P}^5$$

est l'injection canonique et  $\sigma_2 \in A^2(G(1, 5))$ , le cycle des droites coupant un plan fixe.

Vu la proposition 11, ce nombre est de la forme

$$T(V) = a_1 n + a_2 \binom{n}{2} + a_3 \binom{n}{3} + \alpha t + d(\beta n + \gamma) + \delta(un + v)$$

où n, d, t,  $\delta$  sont les invariants de V.

Soit alors  $\tilde{V}$  la réunion de V et d'un plan P disjoint. On constate que  $\operatorname{Hilb}_c^3 \tilde{V}$  est formé de quatre « composantes » disjointes, avec des notations évidentes :

$$\mathrm{Hilb}^3_c\ V$$
,  $\mathrm{Hilb}^2\ V \times P$ ,  $V \times \mathrm{Hilb}^2\ P$ ,  $\mathrm{Hilb}^3_c\ P$ .

Quelle va être la contribution de chacune de ces composantes dans  $T(\tilde{V})$ ? Pour la première et la dernière, c'est clair: c'est respectivement T(V) et  $T(P) = a_1$  (car pour P, n = 1,  $d = t = \delta = 0$ ). La troisième composante n'apporte aucune contribution puisqu'elle est disjointe de  $Al^3$   $\mathbf{P}^5$ : un triplet aligné ayant deux points dans P est dans P puisque  $P \cap V = \emptyset$ .

Reste à trouver la contribution de la deuxième composante. C'est le nombre de sécantes à V coupant à la fois les plans P et  $\pi$ . Mais si  $\sigma_2 = (2, 5)$  est le cycle dans A'(G(1, 5)) des droites coupant un plan fixe, la formule de Pieri donne

$$\sigma_2^2 = (0, 5) + (1, 4) + (2, 3)$$
.

On obtient donc  $Axe^*\sigma_2$ .  $i^*$  [Hilb<sup>2</sup>  $V \times P$ ] comme somme du

- i) nombre de sécantes à V passant par un point fixe de  ${\bf P}^5$ ,
- ii) nombre de sécantes à V contenues dans un  $\mathbf{P}^4$  et coupant une droite de ce  $\mathbf{P}^4$ ,
- $oxed{iii}$ ) nombre de sécantes à V contenues dans un  ${f P}^3$ .

Ces trois nombres sont respectivement:

- i)  $\delta$ , car c'est le nombre de points-doubles impropres de la projection de V sur un  $\mathbf{P}^4$ ,
- ii) d, car c'est le nombre de points-doubles de la courbe  $V \cap \mathbf{P}^4$  projetée sur un  $\mathbf{P}^2$  par une droite de  $\mathbf{P}^4$  (et le lieu double  $\Gamma$  de V projeté sur un  $\mathbf{P}^3$  par une droite de  $\mathbf{P}^5$  est de degré d),
- iii)  $\binom{n}{2}$ , car il s'agit de trouver une droite passant par deux des n points de  $V \cap \mathbf{P}^3$ .

Les multiplicités sont toutes 1 car P est choisi générique. Ainsi on a  $T(\tilde{V}) = T(V) + a_1 + \delta + d + \binom{n}{2}$ , soit encore, puisque les invariants de  $\tilde{V}$  sont (lemme 13, Annexe 5)

$$\tilde{n} = n + 1$$
,  $\tilde{d} = d + n$ ,  $\tilde{t} = t + d$ ,  $\tilde{\delta} = \delta + n$ ,

la relation

$$a_{1}(n+1) + a_{2} \binom{n+1}{2} + a_{3} \binom{n+1}{3} + \alpha(t+d) + (d+n) (\beta(n+1) + \gamma)$$

$$+ (\delta+n) (u(n+1)+v) = a_{1}n + a_{2} \binom{n}{2} + a_{3} \binom{n}{3} + \alpha t + d(\beta n + \gamma)$$

$$+ \delta(un+v) + a_{1} + \delta + d + \binom{n}{2}.$$

Mais l'Annexe 5 permet d'identifier et on obtient donc par

- identification de  $\delta$ : u = 1,
- identification de  $d: \alpha + \beta = 1$ .
- identification de n:  $\begin{cases} -\gamma v = a_2 a_3 + 1 & (n = -1) \\ a_2 + 2\beta + \gamma + 2u + v = 0 & (n = 1) \end{cases}$

Il reste alors à trouver quatre autres équations. On remarque d'abord que ni un plan ni une quadrique de  $\mathbf{P}^3$  (plongée dans  $\mathbf{P}^5$ ) n'ont de trisécante coupant un plan fixe, d'où T=0 pour ces deux surfaces. Par suite,  $a_1=2a_1+a_2=0$ .

Maintenant, soit  $S(2, 2) \subset \mathbf{P}^4$  l'intersection complète de deux quadriques et considérons-la comme plongée dans  $\mathbf{P}^5$ . On a T=0 pour cette surface car pour raison de degré, une trisécante est l'une des 16 droites qu'elle contient et aucune ne coupe le plan  $\pi$  fixé. De même la surface de Veronese (plongement de  $\mathbf{P}^2$  dans  $\mathbf{P}^5$  par  $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^2}(2)$ ) est intersection de quadriques et ne contient pas de droite. On a donc aussi T=0 pour cette surface. Leurs invariants  $(n, d, t, \delta)$  étant respectivement (4, 2, 0, 0) et (4, 3, 1, 0) (cf. Annexe 6), on obtient les deux équations

$$\begin{cases} 4a_1 + 6a_2 + 4a_3 + 8\beta + 2\gamma = 0 \\ 4a_1 + 6a_2 + 4a_3 + \alpha + 12\beta + 3\gamma = 0 \end{cases}.$$

Jointes aux équations précédentes, on obtient un système inversible dont la solution est

$$\begin{cases} a_1 = 0 & a_2 = 0 \\ \beta = -1 & \gamma = 2 \end{cases} \qquad \begin{array}{l} a_3 = 1 \\ u = 1 \end{array} \qquad \begin{array}{l} \alpha = 2 \\ v = -2 \end{array}.$$

On a donc montré le

Théorème 3. Soit V une surface de  ${\bf P}^5$  d'invariants  $(n,d,t,\delta)$ . Alors le degré du 0-cycle  ${\bf Axe}^*\sigma_2$ .  $i^*$  [Hilb $_c^3$  V] de  $Al^3$   ${\bf P}^5$  (nombre de trisécantes à V coupant un plan fixe) est

$$\binom{n}{3} + 2t + (n-2)(\delta - d).$$

Remarque. On trouve ainsi, par exemple, 0 pour la surface intersection complète de trois quadriques, ce qui est évident.

b) Cherchons maintenant le nombre de tangentes à V recoupant V et un  ${\bf P}^3$  fixé de  ${\bf P}^5$ . C'est le degré T(V) du 0-cycle

$$[\mathscr{D}]$$
. Axe\* $\sigma_1$ .  $i^*$  [Hilb<sub>c</sub><sup>3</sup>  $V$ ]

où  $\sigma_1 \in A^1(G(1, 5))$  est le cycle des droites coupant un  $\mathbf{P}^3$  fixé et  $\mathcal{D}$  l'hypersurface de  $Al^3$   $\mathbf{P}^5$  formée des triplets non simples.

Toujours d'après la proposition 11, ce nombre est de la forme

$$a_1n + a_2 \binom{n}{2} + a_3 \binom{n}{3} + \alpha t + d(\beta n + \gamma) + \delta(un + v)$$
.

Comme en a), soit  $\tilde{V}$  la réunion de V et P où P est un plan disjoint de V. On a Hilb $_c^3$   $\tilde{V}$  comme réunion disjointe de

$$\operatorname{Hilb}_{c}^{3} V$$
,  $\operatorname{Hilb}^{2} V \times P$ ,  $V \times \operatorname{Hilb}^{2} P$ ,  $\operatorname{Hilb}_{c}^{3} P$ .

Les contributions des première, troisième et quatrième composantes dans T(V) sont, comme en a), respectivement: T(V), 0 et  $T(P) = a_1$ .

Reste à trouver la contribution de la deuxième composante. Ce sont les tangentes à V coupant à la fois P et le  $\mathbf{P}^3$  fixé. Mais dans A'(G(1, 5)), par la formule de Pieri, on a

$$\sigma_1 \cdot \sigma_2 = (1, 5) + (2, 4)$$
.

De sorte que cette contribution se décompose en

- les tangentes à V coupant une droite de  $\mathbf{P}^5$ : c'est le nombre  $\nu$  de points-pince d'une projection sur un  $\mathbf{P}^3$  par une droite de  $\mathbf{P}^5$ ,
- les tangentes à la courbe  $V \cap \mathbf{P}^4$  rencontrant un  $\mathbf{P}^2$  fixé de ce  $\mathbf{P}^4$ : c'est la classe de cette courbe, donnée par n(n-1)-2d ([34], p. 190).

Les multiplicités sont 1 car P est choisi générique. Comme on a  $v=2d-2\delta$  (Annexe 6), on trouve donc finalement la relation

$$T(\widetilde{V}) = T(V) + a_1 + n(n-1) - 2\delta.$$

En l'écrivant explicitement, vu que (Annexe 5)  $\tilde{n} = n + 1$ ,  $\tilde{d} = d + n$ ,  $\tilde{t} = t + d$ ,  $\tilde{\delta} = \delta + n$ , on obtient en identifiant les termes

— en 
$$\delta$$
:  $u = -2$ ,

— en 
$$d: \alpha + \beta = 0$$
,

- en 
$$n$$
: 
$$\begin{cases} -\gamma - v = a_2 - a_3 + 2 & (n = -1) \\ a_2 + 2\beta + \gamma + 2u + v = 0 & (n = 1) \end{cases}$$

Il reste donc à trouver quatre autres équations. Soit S(a, b, c) l'intersection complète de trois hypersurfaces de degrés a, b, c. Les quatre surfaces suivantes de  $\mathbf{P}^5$  n'ont pas de trisécante rencontrant un  $\mathbf{P}^3$  fixé: S(2, 2, 1), S(2, 2, 2), la surface de Veronese et enfin la surface de del Pezzo  $S_5$ : c'est l'éclaté de  $\mathbf{P}^2$ 

en quatre points, plongé dans  $P^5$  par le système linéaire des cubiques passant par ces quatre points;  $S_5$  est intersection de quadriques et contient 10 droites de self-intersection -1.

Pour raison de degré, on a T=0 pour ces quatre surfaces. D'où (par l'Annexe 6) quatre nouvelles équations.

Jointes aux quatre équations précédentes, on obtient un système inversible dont la solution est:

$$\begin{cases} a_1 = 6 & a_2 = 4 & a_3 = -18 & \alpha = -12 \\ \beta = 12 & \gamma = -36 & u = -2 & v = 12 \end{cases}.$$

On a donc montré le

Théorème 4. Soit V une surface de  ${\bf P}^5$  d'invariants  $(n,d,t,\delta)$ . Alors le degré du 0-cycle

$$[\mathscr{D}]$$
. Axe\* $\sigma_1$ .  $i^*$  [Hilb<sub>c</sub><sup>3</sup>  $V$ ]

(nombre de tangentes à V recoupant V et un  $\mathbf{P}^3$  fixé) est

$$-n(3n^2-11n+2) + 12(d(n-3)-t) - 2\delta(n-6).$$

c) Enfin, cherchons pour V dans  $\mathbf{P}^5$  le nombre de tangentes d'inflexion de V. Pour définir précisément ce nombre, notons que dans  $\mathrm{Hilb^3}\,\mathbf{P}^1\simeq\mathbf{P}^3$ , les triplets de support un point forment une cubique gauche  $\mathcal{F}_0$ . (C'est le plongement de Veronese  $I\mapsto I^3$  de  $\mathrm{Hilb^1}\,\mathbf{P}^1$  dans  $\mathrm{Hilb^3}\,\mathbf{P}^1$ ). On a donc une sous-fibration  $\mathcal{F}$  de  $Al^3\,\mathbf{P}^5$  de fibre  $\mathcal{F}_0$  et donc  $[\mathcal{F}]$  est dans  $A^2(G(1,5))$ .

On définit le nombre de tangentes d'inflexion de V comme le degré T(V) du 0-cycle  $[\mathcal{T}]$ .  $i^*$  [Hilb $_c^3$  V] où comme d'habitude i:  $Al^3$   $\mathbf{P}^5 \hookrightarrow \text{Hilb}_c^3$   $\mathbf{P}^5$  est l'injection canonique. D'après la proposition 11, T(V) est de la forme

$$a_1n + a_2 \binom{n}{2} + a_3 \binom{n}{3} + \alpha t + d(\beta n + \gamma) + \delta(un + v)$$
.

Comme précédemment, on regarde la surface  $\tilde{V} = V \cup P$  où P est un plan disjoint. Un triplet de support un point est dans  $\tilde{V}$  si et seulement si il est dans V ou dans P. Donc

$$T(\tilde{V}) = T(V) + a_1$$

car  $T(P) = a_1$ . En identifiant, comme en a) et b), il vient

$$\begin{cases} u = 0 & \begin{cases} a_2 + 2\beta + \gamma + 2u + v = 0 & (n=1) \\ -\gamma - v = a_2 - a_3 & (n=-1) \end{cases}.$$

Reste à trouver quatre autres équations. Or on a démontré ([26], 4.d) qu'une droite isolée de V contribue dans T(V) de -3(2+l) où  $l \in \mathbb{Z}$  est sa self-intersection. Les quatre surfaces S(2, 2, 1), S(2, 2, 2), Veronese et del Pezzo  $S_5$  (vues en b) contiennent respectivement 16, 0, 0, 10 droites et elles sont de self-intersection -1. Comme ces quatre surfaces sont des intersections de quadriques dans  $\mathbf{P}^5$ , elles n'ont pas d'autre trisécante que les droites qu'elles contiennent; ainsi pour ces surfaces, T est égal respectivement à -48, 0, 0, -30. On obtient donc comme en b) quatre nouvelles équations. Jointes aux quatre précédentes, on obtient un système inversible dont la solution est

$$\begin{cases} a_1 = 18 & a_2 = -48 & a_3 = 24 & \alpha = 12 \\ \beta = -12 & \gamma = 84 & u = 0 & v = -12 \end{cases}.$$

On a donc démontré le

Théorème 5. Soit V une surface de  $\mathbf{P}^5$  d'invariants  $(n, d, t, \delta)$ . Alors le degré du 0-cycle  $[\mathcal{F}]$ .  $i^*$  [Hilb $_c^3$  V] (nombre de tangentes d'inflexion de V) est

$$2n(2n^2-18n+25) + 12(t-\delta-d(n-7))$$
.

De plus, si V contient un nombre fini de droites, la « contribution » d'une droite de self-intersection l dans ce nombre est -3(2+l).

V) Trisécantes dans 
$$\mathbf{P}^N$$
,  $N > 5$ 

Naturellement, seuls les cas N=6 et N=7 vont nous intéresser car au-delà, il n'y a génériquement plus de trisécante à une surface.

## 1°) RETOUR À $P^5$

Nous allons voir qu'une formule trisécante pour une surface de  $\mathbf{P}^N$ , N > 5, est de la même forme qu'une formule trisécante pour une surface de  $\mathbf{P}^5$ . Précisément, on a la

PROPOSITION 12. Soit N=6 ou N=7. Soit V une surface non-singulière de  ${\bf P}^N$ , n son degré,  $\delta$  le nombre de points-doubles impropres apparents au-dessus d'un  ${\bf P}^4$ , d le degré de la courbe double apparente au-dessus d'un  ${\bf P}^3$  et t son nombre de points-triples.