

Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique
Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique
Band: 34 (1988)
Heft: 1-2: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: LES ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES ONT 350 ANS
Autor: Wanner, G.
Kapitel: Euler et Lagrange
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-56604>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 18.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Johann, devenu trop sûr de lui, envoie immédiatement sa solution, «trouvée en trois minutes», à Leibniz et au Journal. Comme la solution de Johann est fautive, Jacob fait passer dans le «Journal des Savans» une série de polémiques contre son frère qui paraissent en alternance avec les réponses non moins agressives de ce dernier (cf. citations).

EULER ET LAGRANGE

La guerre impitoyable des frères ennemis ne prend fin qu'après la mort de Jacob en 1705. Johann devient alors son successeur à Bâle; excellent pédagogue, il trouve des élèves extraordinaires: ses trois fils et, surtout, Leonhard Euler. Euler explore systématiquement la solution des équations différentielles et attaque, indépendamment de Riccati, les premières équations d'ordre supérieur. Toutes ces recherches sont rassemblées dans les volumes XXII et XXIII des Opera Omnia (cf. aussi Sections I.3, I.4 et I.5 de [13]). Lagrange est le premier à traiter les *systèmes* d'équations différentielles dans son travail sur la théorie du son [15] et, surtout, dans sa célèbre *mécanique analytique* [16] de 1788 (deux cents ans de mécanique de Lagrange!).

Il reste finalement à mentionner qu'Euler, en 1744, révolutionne le Calcul variationnel (cf. [11], «...eines der schönsten mathematischen Werke, die je geschrieben worden sind» (C. Carathéodory)) en trouvant pour le problème variationnel général

$$(19) \quad \int_a^b F(x, y, y') dx = \min!$$

l'équation différentielle

$$(20) \quad \frac{d}{dx} (F_{y'}) - F_y \equiv F_{y'y''} + F_{y'y'} + F_{y'x} - F_y = 0.$$

Cette dernière, au cas où F est indépendant de x , peut encore être simplifiée en

$$(21) \quad y' F_{y'} - F = K$$

comme on le vérifie facilement en dérivant (21) par rapport à x . En 1755, âgé de 19 ans, Lagrange trouve une nouvelle démonstration des équations d'Euler [20] et donne toute son élégance à la théorie. De plus, pour des problèmes du type

$$(22) \quad \int_a^b F(x, y, y') dx = \min! \quad \text{sous condition} \quad \int_a^b G(x, y, y') dx = 0$$

il introduit l'idée du «multiplicateur de Lagrange» (voir [16], première partie, Section IV, §1) en remplaçant (22) par

$$(23) \quad \int_a^b \mathcal{L}(\lambda, x, y, y') dx = \min! \text{ (vel max!)}$$

où \mathcal{L} est «la fonction de Lagrange»

$$\mathcal{L}(\lambda, x, y, y') = F(x, y, y') - \lambda G(x, y, y').$$

PROBLÈMES ISOPÉRIMÉTRIQUES, SUITE

Avec ces formules, introduites dans (21), le problème isopérimétrique de Jacob Bernoulli devient

$$(24) \quad y' = \pm \sqrt{\frac{\lambda}{(K + y^m)^2} - 1}.$$

La solution est donc décrite par quadratures

$$(25) \quad \int \frac{(K + y^m) dy}{\sqrt{\lambda - (K + y^m)^2}} = x + C.$$

Les constantes C , K et λ sont à ajuster aux conditions aux bords et à la longueur L . Ce n'est que pour $m = 1$ que cette intégrale est résoluble avec efforts raisonnables (voir Euler [11], Caput V, Exemplum II; «*quae est aequatio generalis pro Circulo*»).

Pour $m > 1$ il s'agit d'intégrales «elliptiques» ou «hyperelliptiques» et on a besoin de méthodes numériques. Par exemple, si on pose $A = 0$, $B = 1$ et $L = 4$, les constantes K et λ dans (25) doivent satisfaire (puisque la courbe est symétrique il suffit de ne considérer que sa moitié ascendante)

$$(26) \quad \int_0^{y_{max}} \frac{(K + y^m) dy}{\sqrt{\lambda - (K + y^m)^2}} = 0.5, \quad \text{et} \quad \int_0^{y_{max}} \frac{\sqrt{\lambda} dy}{\sqrt{\lambda - (K + y^m)^2}} = 2.$$

où

$$y_{max} = (\sqrt{\lambda} - K)^{1/m}$$

est la valeur de y pour laquelle le dénominateur devient zéro. Un processus itératif (méthode de Newton) combiné avec le calcul numérique des intégrales