**Zeitschrift:** L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

**Band:** 37 (1991)

**Heft:** 3-4: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: LE PROBLÈME FACILE DE WARING

Autor: Revoy, Philippe

**Kapitel:** 5. Retour sur le problème de Tarry-Escott

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-58740

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 03.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Le coefficient de x de second membre est  $A = 18u^8v^8w^8(w^{18} - v^{18})Q(v, w)$  où Q est le polynôme

$$Q(x,y) = x^{54} + y^{54} - x^{54}y^{54} + x^{36} + y^{36} + x^{18}y^{18} + x^{36}y^{18} + x^{18}y^{36}.$$

La longueur de l'identité est 24 ce qui la rend pratiquement inutile.

# 5. Retour sur le problème de Tarry-Escott

En degré k suffisamment petit, beaucoup d'identités et donc de majoration de  $v_*(k)$  proviennent de s-uples  $(a_1, ..., a_s)$  et  $(b_1, ..., b_s)$  dont les k-2 premières fonctions symétriques élémentaires coïncident. On écrira alors suivant une notation classique dans cette question  $[a_1, ..., a_s]_{k-2} = [b_1, b_2, ..., b_s]_{k-2}$ . La recherche systématique de tels s-uples se fait en général inductivement, à l'aide des deux opérations suivantes ([4], [6]).

LEMME. Si 
$$[a_1,...,a_r]_k = [b_1,...,b_r]_k$$
, alors quel que soit  $x$   
1) 
$$[a_1,...,a_r,b_1+x,b_2+x,...,b_{r+x}]_{k+1}$$

$$= [a_1+x,a_2+x,...,a_r+x,b_1,b_2,...,b_r]_{k+1}.$$
2) 
$$[a_1,...,a_r,a_1+x,...,a_r+x]_k = [b_1,...,b_r,b_1+x,...,b_r+x]_k.$$

Naturellement la longueur des s-uples déduit par le procédé récurrent est le double des s-uples de départ mais un choix judicieux peut permettre de réduire cette longueur: en effet chaque fois que l'on a  $a_i + x = a_j$  (resp.  $b_u + x = b_v$ ) on pourra supprimer dans l'égalité des deux crochets, les termes égaux, aussi pour appliquer la règle en question on calcule  $\{a_i - a_j / i > j\}$  et  $\{b_i - b_j / i > j\}$  et on choisit pour x l'un des entiers qui est le plus souvent une différence de deux  $a_i$  et de deux  $b_i$ . Ainsi partant de  $[0,3]_1 = [1,2]_1$  en ajoutant 3 puis 5 puis 7, on trouve  $[0,4,5]_2 = [1,2,6]_2$ ,  $[0,4,7,11]_3 = [1,2,9,10]_3$  et  $[0,4,8,16,17]_4 = [1,2,10,14,18]_4$  ce qui montre que p(k) = k + 1 pour  $k \le 4$  et que  $v_*(k) = 2(k-1)$  pour  $k \le 6$ . On peut développer cette technique et s'essayer à trouver de nombreux exemples de s-uples vérifiant  $[a_1, ..., a_s]_h = [b_1, ..., b_s]_h$  mais il n'est pas évident de minimaliser s par rapport à h.

On peut aussi opérer littéralement en partant de  $[a, b]_1 = [c, a + b - c]_1$  en prenant x dans le **Z**-module libre de base (a, b, c). On prend x = b - a d'où  $[a, b + c - a, 2b - c]_2 = [c, a + b - c, 2b - a]_2$ ; ensuite on peut prendre y = a - 2b + c d'où

$$[b+c-a, 2b-c, a-2b+2c, 2a-b]_3$$
  
=  $[2b-a, a+b-c, 2a-2b+c, -b+2c]_3$ 

ce qui fournit une famille d'identités

$$\sum_{i=1}^{4} (x + a_i)^5 - (x + b_i)^5 = Ax + B$$

où A est un polynôme homogène de degré 4. L'identité (3) en est un cas particulier provenant de  $[0,3,4,7]_3 = [1,1,6,6]_3$  qu'on peut obtenir à partir de  $[0,4,5]_2 = [1,2,6]_2$  en ajoutant 1 (au lieu de 7). L'existence de plusieurs choix possibles pour x rajoute à la difficulté d'une étude systématique qui pour l'instant n'a fourni ainsi que des exemples. On trouvera dans [9] des références bibliographiques ainsi que des majorations explicites pour p(k) et M(k) définis dans la partie précédente.

## RÉFÉRENCES

- [1] Ellison, W. J. Waring's problem. Amer. math. monthly 78 (1971), 10-36.
- [2] HARDY, G.H. and E.M. WRIGHT. An introduction to the Theory of Numbers. 4e édition, Clarendon Press, Oxford (1960).
- [3] HUNTER, W. The representation of numbers by sums of fourth powers. J. Lon. Math. Soc. 16 (1941), 143-145.
- [4] MEHROTRA, S. N. On sums of powers. *Mathematics Student 35* (1967), 73-77, 37 (1969), 204-205.
- [5] MORDELL, L. J. *Diophantine equations*. Academic Press, London and New York (1968).
- [6] RAI, T. Easier Waring problem. J. Sci. Res. Benares Hindu Univ. 1 (1951), 5-19.
- [7] REVOY, Ph. Sur les sommes de quatre cubes. L'Enseignement Math. 29 (1983), 209-220.
- [8] VASERSTEIN, L.N. Every integer is a sum or difference of 28 integral eighth powers. J. of Numb. Th. 28 (1988), 66-68.
- [9] WRIGHT, E. M. Equal sums of like powers. Cand. Math. Bull. 8 (1965), 193-202.

(Reçu le 27 décembre 1990)

## Philippe Revoy

Département des Sciences Mathématiques Université Montpellier II Plage Eugène-Bataillon F-34095 Montpellier Cedex 5 (France)