Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

Band: 38 (1992)

Heft: 3-4: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: POLYNÔMES HOMOGÈNES RÉELS AVEC GRADIENT À

SINGULARITÉ ISOLÉE

Autor: Maire, H.-M.

Bibliographie

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-59491

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

$$\frac{\partial Q_{\varepsilon}}{\partial x_{1}}(1, 0, ..., 0, x_{n}) = \frac{\partial A_{\varepsilon}}{\partial x_{1}}(1, 0, ..., 0) + 4\varepsilon x_{n}^{2},
\frac{\partial Q_{\varepsilon}}{\partial x_{j}}(1, 0, ..., 0, x_{n}) = \frac{\partial A_{\varepsilon}}{\partial x_{j}}(1, 0, ..., 0), \quad 2 \leq j \leq n - 1,
\frac{\partial Q_{\varepsilon}}{\partial x_{n}}(1, 0, ..., 0, x_{n}) = 4\varepsilon x_{n} - 4(1 - \varepsilon)x_{n}^{3}.$$

Par suite,

$$(Q_{\varepsilon})'(1,0,...,0,-\sqrt{\varepsilon/(1-\varepsilon)}) = (Q_{\varepsilon})'(1,0,...,0,+\sqrt{\varepsilon/(1-\varepsilon)}).$$

On est de nouveau en contradiction avec l'injectivité de $(Q_{\varepsilon})'$.

d) L'exemple (2.7) montre que $H_{p,q}^{(m)}$ est non vide pour m pair supérieur ou égal à 6. \square

Preuve de l'application (3.2). Il suffit de prendre $P \in H_{p,q}^{(m)}$ et M de la forme

$$\{(x, P(x)) \mid x \in \mathbf{R}^n\} .$$

En effet, la courbure de Gauss-Kronecker est un multiple positif du déterminant hessien de P (cf. [10], p. 93).

Réciproquement, si M est une hypersurface régulière de \mathbb{R}^{n+1} avec (i) et (ii), alors M est localement le graphe de $f: U \to \mathbb{R}$ avec U ouvert de \mathbb{R}^n contenant 0. On peut supposer f(0) = 0 et f'(0) = 0 sans changer la courbure. Développons f en parties homogènes:

$$f(x) = P(x) + O(|x|^{j+1}), \quad x \to 0,$$

où P est un polynôme homogène de degré $j \geqslant 2$. On a:

$$K((x, f(x)) = h(x) \det P''(x) + O(|x|^{n(j-1)}), \quad x \to 0,$$

avec h(0) > 0. La condition (i) entraı̂ne j = m et $\det P''(x) \neq 0$ pour $x \neq 0$ (on a utilisé $|(x, f(x))| \sim |x|$). Donc $P \in H_n^{(m)}$ et (ii) donne $P \in H_{p,q}^{(m)}$. D'après le théorème (3.1), ceci n'est pas possible si m = 4 et $p \neq 0$ et n.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Andreatta, A. Superficie algebriche di S₃ reali e con hessiana priva di punti reali. *Boll. U. Mat. It. 15* (1960), 424-430.
- [2] Communication personnelle.
- [3] Franklin, J.N. Matrix Theory. Prentice-Hall, 1968.
- [4] GALAFASSI, V.E. Forme reali armoniche. *Instituto Lombardo 90* (1956), 383-412.

- [5] HELFFER, B. et J. NOURRIGAT. Hypoellipticité maximale pour des Opérateurs Polynômes de Champs de Vecteurs. Progress in Math., Birkhäuser, 1985.
- [6] LEWY, H. A property of spherical harmonics. American Journal of Math. 69 (1938), 555-560.
- [7] MAIRE, H.-M. Necessary and sufficient condition for maximal hypoellipticity of $\bar{\partial}_b$. In Springer Lecture Notes 1324, Berlin 1988, 178-185.
- [8] MAWHIN, J. and M. WILLEM. Critical Point Theory and Hamiltonian Systems. Springer, 1989.
- [9] SEGRE, B. Questioni di realtà sulle forme armoniche e sulle loro hessiane. Rend. Acc. Lincei 15 (1953), 237-242, 344-399.
- [10] THORPE, J.A. Elementary Topics in Differential Geometry. Springer, 1979.

(Reçu le 25 juin 1991)

Henri-Michel Maire

Section de Mathématiques 2-4, rue du Lièvre Case postale 240 CH-1211 Genève 24