Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

Band: 38 (1992)

Heft: 3-4: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: NOTES SUR L'INVARIANT DE CASSON DES SPHÈRES

D'HOMOLOGIE DE DIMENSION TROIS

Autor: Guillou, L. / Marin, A.

Kapitel: II. Un ouvert de représentations irréductibles DU GROUPE

FONDAMENTAL D'UNE SURFACE DE GENRE 2

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-59492

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 04.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

L'élément qui conjugue ρ à une telle représentation de l'image de σ est unique au signe près et (on peut le calculer explicitement) son image dans SO(3) dépend différentiablement de ρ . Donc $\pi \circ \sigma$ est un difféomorphisme.

B.4. Remarque. Il est facile de continuer les calculs précédents pour voir que si l'on oriente l'image de σ en transportant l'orientation de $D \times]0, \pi[\in \mathbf{R}^3$ par $D\sigma$ alors: d'une part $D\partial_{\sigma(0,\pi/2)}: T_{\sigma(0,\pi/2)} \mathrm{Im}(\sigma) \to \mathscr{L} = T_1 S^3$ renverse l'orientation et d'autre part si l'orbite par SO(3) de $\sigma(0,\pi/2)$ est orientée comme SO(3) alors $T_{\sigma(0,\pi/2)}\mathrm{Im}(\sigma) \oplus T_{\sigma(0,\pi/2)}\sigma(0,\pi/2)$. SO(3) a une orientation opposée à celle de $\mathscr{L} \oplus \mathscr{L}$ et donc $D\pi_{\sigma(0,\pi/2)}: T_{\sigma(0,\pi/2)}\mathrm{Im}(\sigma) \to T_{\widehat{\sigma}(0,\pi/2)} \widehat{R}(L_2)$ renverse l'orientation. En définitive, on voit que l'ensemble Σ (du lemme B2) a la même orientation qu'il soit vu comme fibre de π ou comme fibre de ∂ 0. Nous verrons cependant que nous n'avons pas besoin de ce calcul, la différence ∂ 1 (éventuelle) d'orientation intervenant deux fois!

II. Un ouvert de représentations irréductibles du groupe fondamental d'une surface de genre 2

Soit $F = F_- \cup F_+$ une surface de genre 2, union de deux exemplaires F_- et F_+ d'une surface à bord F_0 de genre 1. Choisissons des bases (e_1^-, e_2^-) de $\pi_1(F_-)$ et (e_1^+, e_2^+) de $\pi_1(F_+)$ de sorte que $\delta_- = [e_1^-, e_2^-] = [\partial F_-]$ dans $\pi_1(F_-)$ et $\delta_+ = [\partial F_+]$ dans $\pi_1(F_+)$. Ces bases identifient $\pi_1(F_-)$ et $\pi_1(F_+)$ à des groupes libres sur deux générateurs et $R_- = R(\pi_1(F_-))$ comme $R_+ = R(\pi_1(F_+))$ à $S^3 \times S^3$. On note $\partial_-: R_- \to S^3$ et $\partial_+: R_+ \to S^3$ les flèches d'évaluation sur δ_- et δ_+ respectivement. On a comme en I des applications $\sigma_-: D \times]0, \pi[\to R_-$ et $\sigma_+: D \times]0, \pi[\to R_+$. On oriente R_* grâce à la base $e_1^-, e_2^-, e_1^+, e_2^+$ de F_* . Alors $R_* = R_- \times R_+$ et l'espace des représentations de $\pi_1(F)$ est

$$R = \{ (\rho_{-}, \rho_{+}) \in R_{-} \times R_{+} \mid (\partial_{-}(\rho_{-}))^{-1} = \partial_{+}(\rho_{+}) \}.$$

Désignons par \mathscr{U} l'ouvert de \widetilde{R} formé des représentations $\rho = (\rho_-, \rho_+)$ de R telles que $\partial_+(\rho_+) \neq 1$.

D'après le lemme B3 dans la classe de conjugaison de tout élément ρ de \mathscr{U} il existe un unique élément de la forme $(\sigma_{-}(\alpha, t), \rho_{+})$. Ce ρ_{+} est dans \tilde{R}_{+} et on définit ainsi un difféomorphisme

$$f: \hat{\mathscr{U}} \to \tilde{R}_+$$

dont l'inverse associe à $\rho_+ \in \tilde{R}_+$ la classe de conjugaison de $(\sigma_-(\alpha, t), \rho_+)$ où $\sigma_-(\alpha, t)$ est choisi de sorte que $\partial_-\sigma_-(\alpha, t) = (\partial_+\rho_+)^{-1}$.

B.5. Lemme. Le difféomorphisme f préserve ou renverse l'orientation selon que le signe ϵ de la remarque B4 vaut +1 ou -1.

Démonstration de B.5. On a d'abord des difféomorphismes:

$$\tilde{R}_{-} \times \tilde{R}_{+} \leftarrow (D \times]0, \pi[) \times SO(3) \times \tilde{R}_{+} \rightarrow (S^{3} - \{1\}) \times SO(3) \times \tilde{R}_{+}$$

$$(\sigma_{-}(\alpha, t), g, \rho_{+}) \leftarrow ((\alpha, t), g, \rho_{+}) \mapsto (\partial_{-}\sigma_{-}(\alpha, t), g, g, \rho_{+})$$

D'où un difféomorphisme $\varphi: \tilde{R}_- \times \tilde{R}_+ \to (S^3 - \{1\}) \times SO(3) \times \tilde{R}_+$ qui préserve ou renverse l'orientation selon que ε vaut 1 ou -1. On a aussi un difféomorphisme

$$\psi: S^3 \times SO(3) \times \tilde{R}_+ \to S^3 \times \tilde{R}_+ \times SO(3), (x, g, \rho_+) \mapsto (x \cdot \partial_+ \rho_+, \rho_+, g^{-1}, g)$$
 qui préserve l'orientation.

Enfin le point $(\sigma_{-}(0, \pi/2), \rho_{+}^{0})$ de $\tilde{R}_{-} \times \tilde{R}_{+}$ où $\partial_{+} \rho_{+}^{0} = -1$ $= \partial_{-} \sigma_{-}(0, \pi/2)$ admet un voisinage dans $R_{*} \supset \tilde{R}_{-} \times \tilde{R}_{+}$ qui est positivement difféomorphe à $A \times B \times C$ où A est un voisinage de 1 dans S^{3} , B un voisinage de la classe de $(\sigma_{-}(0, \pi/2), \rho_{+}^{0})$ dans \hat{W} et C un voisinage de 1 dans SO(3). Par composition on obtient un plongement ouvert

$$A \times B \times C \rightarrow S^{3} \times \tilde{R}_{+} \times SO(3)$$

$$\downarrow \qquad \qquad \downarrow$$

$$A \times C \rightarrow S^{3} \times SO(3)$$

faisant commuter le diagramme (car si $\psi \circ \varphi(\rho_-, \rho_+) = ((\partial_- \rho_-) \cdot (\partial_+ \rho_+), \rho_+ \cdot g^{-1}, g)$ alors

$$\psi \circ \phi((\rho_-, \rho_+).g') = ((\partial_-\rho_-).(\partial_+\rho_+), \rho_+.g^{-1}, g.g'))$$

et tel que $1 \times B \times 1$ s'envoie sur $1 \times O \times 1$ où O est un voisinage de ρ_+^0 dans \tilde{R}_+ . Donc $f: \hat{\mathcal{U}} \to \tilde{R}_+$ préserve ou renverse l'orientation selon que ϵ vaut 1 ou -1.