Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

Band: 41 (1995)

Heft: 3-4: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: BIRAPPORT ET GROUPOÏDES

Autor: Cathelineau, Jean-Louis

Kapitel: 4.1 GROUPOÏDES ET n-RAPPORTS

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-61827

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 10.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

4. MULTIRAPPORTS

4.1 GROUPOÏDES ET *n*-RAPPORTS

Dans ce paragraphe, on fait quelques remarques sur des invariants liés au groupoïde \mathcal{G}_m associé à l'espace projectif $\mathbf{P}^m(F)$. Notons $\check{\mathbf{P}}^m(F)$ le dual projectif de $\mathbf{P}^m(F)$. Si $(x_1, ..., x_n; \varphi_1, ..., \varphi_n)$ est un élément de $(\mathbf{P}^m(F))^n \times (\check{\mathbf{P}}^m(F))^n$ tel que $\check{\varphi}_i(\vec{x}_j) \neq 0$, où $(\check{})$ désigne un représentant vectoriel, on considère l'élément de F^\times

$$[x_1, ..., x_n; \varphi_1, ..., \varphi_n] = \frac{\vec{\varphi}_1(\vec{x}_1) \vec{\varphi}_2(\vec{x}_2) ... \vec{\varphi}_n(\vec{x}_n)}{\vec{\varphi}_1(\vec{x}_2) \vec{\varphi}_2(\vec{x}_3) ... \vec{\varphi}_n(\vec{x}_1)}.$$

C'est un invariant projectif de la configuration constituée des n points x_i et des n hyperplans H_i associés aux φ_i . Remarquer que

$$[x_{\sigma(1)},...,x_{\sigma(n)};\varphi_{\sigma(1)},...,\varphi_{\sigma(n)}] = [x_1,...,x_n;\varphi_1,...,\varphi_n],$$

pour tout élément σ du groupe engendré par le cycle (12...n).

On appelle $[x_1, ..., x_n; \varphi_1, ..., \varphi_n]$ le *n*-rapport de cette configuration; on le note aussi $[x_1, ..., x_n; H_1, ..., H_n]$. Si m = 1 et n = 2, on a exactement

$$[x_1, x_2; y_1, y_2] = r(x_1, x_2; y_1, y_2)$$
.

Pour $x_1, ..., x_n; \varphi_1, ..., \varphi_n$ comme ci-dessus, posons $a_i = \langle x_i, x_{i+1} \rangle$ $\cap H_i$ pour $i \neq n$ et $a_n = \langle x_1, x_n \rangle \cap H_n$.

PROPOSITION 4. On a dans le groupoïde \mathcal{G}_m l'interprétation géométrique suivante du n-rapport

$$[x_1, ..., x_n; \varphi_1, ..., \varphi_n] = f_n \circ f_{n-1} \circ ... \circ f_1,$$

$$où \quad f_i = x_i \stackrel{a_i}{\to} x_{i+1} \quad pour \quad i \neq n \quad et \quad f_n = x_{n+1} \stackrel{a_n}{\to} x_1.$$

Preuve. Il suffit de remarquer que l'application linéaire $p^{-1}(x_i) \to p^{-1}(x_{i+1})$ dont le graphe est conjugué harmonique de $p^{-1}(a_i)$ par rapport à $p^{-1}(x_i)$ et $p^{-1}(x_{i+1})$ associe à \vec{x}_i le vecteur $\frac{\vec{\varphi}_i(\vec{x}_i)}{\vec{\varphi}_{i+1}(\vec{x}_{i+1})}$ \vec{x}_{i+1} .

Montrons sur un exemple comment les n-rapports apparaissent naturellement dans certains invariants projectifs. Soit V un F-espace vectoriel de dimension finie et V^* son dual, si $\sigma \in S_n$ est une permutation, l'application multilinéaire

$$I_{\sigma} \colon V^{n} \times (V^{*})^{n} \to F$$

$$(\vec{x}_{1}, ..., \vec{x}_{n}; \vec{\varphi}_{1}, ..., \vec{\varphi}_{n}) \mapsto \prod_{i=1}^{n} \vec{\varphi}_{i}(\vec{x}_{\sigma(i)})$$

est invariante sous l'action diagonale de GL(V) dans $V^n \times (V^*)^n$ (il est bien connu [14] que ces fonctions jouent un rôle en théorie des invariants). Par suite, si $(x_1, ..., x_n; \varphi_1, ..., \varphi_n)$ sont comme précédemment et si $\sigma, \mu \in S_n$, on obtient un invariant projectif $J_{\sigma, \mu}$ à valeurs dans F^{\times} en posant

$$J_{\sigma,\mu}(x_1,...,x_n;\varphi_1,...,\varphi_n) = \frac{I_{\sigma}(\vec{x}_1,...,\vec{x}_n;\vec{\varphi}_1,...,\vec{\varphi}_n)}{I_{\mu}(\vec{x}_1,...,\vec{x}_n;\vec{\varphi}_1,...,\vec{\varphi}_n)}$$

Soit alors

$$(i_1, i_2, \dots, i_k) (j_1, j_2, \dots, j_l) \dots (t_1, t_2, \dots, t_s)$$

la décomposition en cycles de la permutation $\sigma^{-1}\mu$, on vérifie facilement la relation

$$J_{\sigma,\mu}(x_1,...,x_n;\varphi_1,...,\varphi_n) = [x_{\sigma(i_1)},...,x_{\sigma(i_k)};\varphi_{i_1},...,\varphi_{i_k}].$$

$$[x_{\sigma(j_1)},...,x_{\sigma(j_l)};\varphi_{j_1},...,\varphi_{j_l}] \cdots [x_{\sigma(t_1)},...,x_{\sigma(t_s)};\varphi_{t_1},...,\varphi_{t_s}].$$

4.2 Remarques sur un invariant de Goncharov

Considérons $x_1, ..., x_n, y_1, ..., y_n, 2n$ points en position générale de $\mathbf{P}^{n-1}(F)$ et posons

$$[[x_1,...,x_n;y_1,...,y_n]] = [x_1,...,x_n;H_1,...,H_n],$$

où H_i est l'hyperplan $\langle y_1, ..., \hat{y}_i, ..., y_n \rangle$; on obtient un invariant projectif qui vérifie en particulier

$$[[x_1,x_2;y_1,y_2]] = (r(x_1,x_2;y_1,y_2))^{-1}.$$

Soit «dét» le déterminant dans une base arbitraire de F^{n+1} , d'après la définition du n-rapport, on peut écrire

$$[[x_1,...,x_n;y_1,...,y_n]] = \frac{\prod_{i=1}^n d\acute{e}t(\vec{y}_1,...,\hat{\vec{y}}_i,...,\vec{x}_n,\vec{x}_i)}{\prod_{i=1}^n d\acute{e}t(\vec{y}_1,...,\hat{\vec{y}}_i,...,\vec{x}_n,\vec{x}_{\tau(i)})},$$

où τ est la permutation cyclique (12...n); en particulier si on prend comme coordonnées homogènes de $x_1, ..., x_n, y_1, ..., y_n$

on a l'expression

$$[[x_1,...,x_n;y_1,...,y_n]] = \frac{a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}}{a_{12}a_{23}\cdots a_{n1}}.$$