Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

Band: 41 (1995)

Heft: 1-2: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: FORMES QUADRATIQUES DEVENANT ISOTROPES SUR UNE

EXTENSION

Autor: Bayer-Fluckiger, Eva

Kapitel: 6. Corps de fonctions d'une quadrique

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-61819

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 10.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Théorème 6. Pour toute forme quadratique q sur k anisotrope et représentant 1, et tout polynôme irréductible et unitaire $f \in k[X]$, on a:

$$q_{k(f)}$$
 est hyperbolique \Rightarrow $f \in G(q_{k(X)})$.

Théorème 7 (théorème de la norme de Scharlau). Pour toute forme quadratique q sur k anisotrope et représentant 1, et toute extension finie E de k, on a:

$$N_{E/k}(G(q_E)) \subset G(q)$$
.

Théorème 8. Pour toute forme quadratique q sur k anisotrope et représentant 1, G(q) contient le groupe $\langle N_{E/k}(E^*) \rangle$ engendré par les normes des extensions finies E de k telles que q_E soit hyperbolique.

Remarque. Gille [2] et Merkurjev [5], [6] ont généralisé certains des énoncés étudiés dans ce §.

6. Corps de fonctions d'une quadrique

Supposons f homogène de degré 2. Alors f est aussi une forme quadratique. On suppose que m > 2 ou m = 2 et f anisotrope, ce qui implique que le polynôme $f \in k[X_1, ..., X_m]$ est irréductible. Le corps k(f) est appelé le corps de zéros générique de la forme quadratique f. C'est aussi le corps des fonctions de la quadrique (affine) correspondante.

Soit q une forme quadratique anisotrope et représentant 1 sur k. Remarquons que l'on a les inclusions suivantes:

$$G_m(q) \subset D_m(q) \subset < D_m(q) > .$$

Théorème 9. Supposons que la forme quadratique f représente 1. Alors on a:

- a) $q_{k(f)}$ est hyperbolique si et seulement si $f \in G_m(q)$;
- b) q contient f si et seulement si $f \in D_m(q)$;
- c) $q_{k(f)}$ est isotrope si et seulement si $f \in \langle D_m(q) \rangle$.
- a) est un cas particulier du corollaire du théorème 2 (voir aussi [4], 4.5.3), b) est le «théorème de la sous-forme» de Pfister (cf. [4], th. 9.2.8), et c) est un cas particulier du corollaire du théorème 1.

Voici une autre démonstration de c). On montre ici que si $q_{k(f)}$ est isotrope, alors $f \in \langle D_m(q) \rangle$, l'autre implication étant facile. Ecrivons la

forme quadratique f comme $f \approx \langle 1 \rangle \oplus f'$. Alors $k(f) = F(\sqrt{-f'(X')})$, où $X' = (X_2, ..., X_m)$ et F = k(X'). Supposons $q_{k(f)}$ isotrope. Alors par [4], 2.5.1, on a:

$$q_F \simeq a < 1, f'(X') > \bigoplus q' \simeq \langle a > \bigoplus q''$$
.

Donc $a \in D(q_F) \subset D_m(q)$.

D'autre part, <1, f'(X')> représente f sur $F(X_1)=k(X_1,...,X_m)$. Donc a<1, f'(X')> représente af sur $k(X_1,...,X_m)$. On en déduit que $af \in D_m(q)$. Comme $a \in D_m(q)$, on a $f \in <D_m(q)>$.

7. APPLICATIONS

Voici quelques applications du théorème 1:

SOMMES DE CARRÉS

COROLLAIRE 1. Soit s un entier positif. Si un polynôme $f \in k[X_1, ..., X_m]$ est une somme de 2^s carrés dans $k(X_1, ..., X_m)$, alors tout polynôme irréductible et unitaire divisant f avec un exposant impair est une somme de 2^s carrés dans $k(X_1, ..., X_m)$.

Soit q la forme quadratique somme de 2^s carrés. Alors q est une forme de Pfister, donc $D(q) = \langle D(q) \rangle$ (cf. [4], chap. 2, §10 ou [3], chap. 10, cor. 1.7). Le corollaire découle de l'implication $a \rangle \Rightarrow b$ du théorème 1, appliqué au produit des polynômes irréductibles divisant f avec un exposant impair.

Le cas m = 1 de ce corollaire est dû à Kaplansky (cf. [4], chap. 10, cor. 2.10).

PRINCIPE DE HASSE

Soit k un corps de nombres. On note v une place (finie ou infinie) de k, et k_v le complété de k en v. Soit q une forme quadratique anisotrope sur k.

COROLLAIRE 2. Soit $f \in k[X]$. Alors

 $f \in \langle D(q_{k_v(X)}) \rangle$ pour toute place v de $k \Leftrightarrow f \in \langle D(q_{k(X)}) \rangle$.

Il est clair que $f \in \langle D(q_{k(X)}) \rangle \Rightarrow f \in \langle D(q_{k_v(X)}) \rangle$ pour toute place v de k.