

<b>Zeitschrift:</b>	L'Enseignement Mathématique
<b>Herausgeber:</b>	Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique
<b>Band:</b>	42 (1996)
<b>Heft:</b>	1-2: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE
 <b>Artikel:</b>	MOYENNES SUR CERTAINS ENSEMBLES DE DIVISEURS D'UN ENTIER
<b>Autor:</b>	De Koninck, Jean-Marie / Grah, Jacques
<b>Kapitel:</b>	5. GÉNÉRALISATIONS ET EXEMPLES
<b>DOI:</b>	<a href="https://doi.org/10.5169/seals-87873">https://doi.org/10.5169/seals-87873</a>

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 26.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## REMARQUES

1) Il découle du corollaire 4.2 que si  $f$  est totalement additive, l'écart entre  $f(n)$  et  $\hat{f}(n)$  est plus petit qu'entre  $f(n)$  et  $\bar{f}(n)$ , alors que si  $f$  est fortement additive, c'est le contraire qui se produit.

2) A partir des définitions de  $\bar{\Delta}f$ ,  $\hat{\Delta}f$ ,  $\tilde{\Delta}f$  et des égalités (4.1), (4.2) et (4.3), il est intéressant de souligner que, pour toute fonction arithmétique  $f$ , on a les inégalités  $\bar{f}^2 \geq \bar{f}^2$ ,  $\tilde{f}^2 \geq \tilde{f}^2$  et  $\hat{f}^2 \geq \hat{f}^2$ , et qu'en particulier sur les entiers libres de carrés, on a  $\bar{\Delta}f(n) = \hat{\Delta}f(n) = \tilde{\Delta}f(n)$ .

## 5. GÉNÉRALISATIONS ET EXEMPLES

Les fonctions  $\bar{f}$ ,  $\hat{f}$  et  $\tilde{f}$  définies par les égalités (1.3), représentent essentiellement trois moyennes de  $f$  évaluées respectivement sur les diviseurs, les diviseurs libres de carrés et les diviseurs unitaires d'un entier. Nous allons maintenant montrer comment certaines propriétés satisfaites par ces trois fonctions demeurent valables lorsque les moyennes sont évaluées sur d'autres classes de diviseurs d'un entier.

Etant donné un entier naturel  $n$ , on désigne par  $D_n$  l'ensemble des diviseurs (positifs) de  $n$ . Soit alors  $A$  une famille d'ensembles  $A_n$  tels que  $A_n \subset D_n$  pour chaque  $n \in \mathbf{N}$ . Par exemple, en désignant par  $I_n$  l'ensemble des diviseurs impairs de l'entier positif  $n$ , la famille  $A$  constituée de tous les ensembles  $I_n$  est un exemple typique.

Etant donné une famille  $A := \{A_n : n \in \mathbf{N}\}$ , alors à chaque ensemble  $A_n$ , on associe son cardinal soit la fonction  $\tau_A(n)$  définie par

$$\tau_A(n) := \sum_{\substack{d|n \\ d \in A_n}} 1$$

qu'on peut aussi écrire  $(1 *_A 1)(n)$ , avec  $*_A$  pour signifier que seuls les diviseurs  $d$  de  $n$  qui appartiennent à  $A_n$  sont pris en considération. Nous nous intéressons ici aux familles pour lesquelles les ensembles  $A_n$  possèdent une fonction  $\tau_A$  multiplicative et jamais nulle.

**EXEMPLES.** Soit  $k \in \mathbf{N}$  et  $2 \leq y \in \mathbf{R}$ . Définissons de plus  $P(1) = 1$  et  $P(n) = \max\{p : p | n\}$ . Alors les ensembles

$$\begin{aligned} A_n(k) &= \{d : d | n \text{ et } d = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r}, 0 \leq \alpha_i < k\} \\ &= \{d : d | n \text{ et } d \text{ est } k\text{-libre}\}, k \geq 2, \end{aligned}$$

$$B_n(y) = \{d : d | n \text{ et } P(d) \leq y\},$$

$$E_n(k) = \left\{ d : d^k | n \text{ et } \left(d^k, \frac{n}{d^k}\right) = 1 \right\}$$

donnent lieu à trois familles  $A$ ,  $B$  et  $E$  de sous-ensembles de  $D_n$  pour lesquels les fonctions  $\tau_A$ ,  $\tau_B$  et  $\tau_E$  sont multiplicatives et jamais nulles.

Etant donné une fonction arithmétique  $f$  et une famille  $A$ , on pose maintenant

$$f_A(n) = \frac{1}{\tau_A(n)} \sum_{\substack{d|n \\ d \in A_n}} f(d),$$

ce qui revient à écrire

$$(5.1) \quad f_A := \frac{f *_A 1}{1 *_A 1}.$$

Aux cas particuliers  $*_A = *$ ,  $*_A = *_l$  (où  $*_l$  est la restriction de  $*$  aux diviseurs libres de carrés) et  $*_A = *_u$ , correspondent bien sûr les fonctions  $\bar{f}$ ,  $\hat{f}$  et  $\tilde{f}$ .

On a mentionné à la section 2 qu'en général  $\bar{f}(n) \neq f(n)$ . Il en est de même pour sa généralisation  $f_A$  en ce sens que l'on peut facilement démontrer que

$f_A(n) = f(n)$  pour tout  $n \geq 1 \Leftrightarrow f \equiv c$  pour une certaine constante  $c$ ; auquel cas, si  $f$  est multiplicative on a  $c = 1$ , alors que si  $f$  est additive, on a  $c = 0$ .

Le prochain résultat généralise le théorème 2.2.

THÉORÈME 5.1. *Soit  $f \in \mathbf{F}$  et  $A$  une famille d'ensembles  $A_n \subset D_n$  et supposons que  $\tau_A \in \mathcal{M}$ . Alors la fonction  $f_A$  est multiplicative si  $f \in \mathcal{M}$  et elle est additive si  $f \in \mathcal{A}$ .*

REMARQUES. Il est également possible de considérer les familles d'ensembles  $A_n$  pour lesquelles  $\tau_A(n)$  peut être nulle pour certains entiers  $n$ ; pour ce faire, il suffit de remplacer (5.1) par

$$(5.2) \quad f_A(n) = \begin{cases} \frac{f *_A 1}{1 *_A 1}(n) & \text{si } (1 *_A 1)(n) \neq 0, \\ 0 & \text{autrement.} \end{cases}$$

Dans ce cas, seule la première partie du théorème 5.1 reste valide i.e. si  $f \in \mathcal{M}$  alors la fonction  $f_A$  définie par l'égalité (5.2) est multiplicative. En effet, soit  $(m, n) = 1$  et supposons que  $f \in \mathcal{M}$ . Si  $\tau_A(n) \neq 0$  et  $\tau_A(m) \neq 0$  alors  $f_A(mn) = f_A(m)f_A(n)$ ; si par contre  $\tau_A(n)$  ou  $\tau_A(m)$  est nulle alors,

puisque  $\tau_A \in \mathcal{M}$ ,  $\tau_A(mn) = 0$ , i.e.  $f_A(mn) = 0 = f_A(m)f_A(n)$  car au moins une des quantités  $f_A(m)$  et  $f_A(n)$  est nulle. Donc si  $f \in \mathcal{M}$  alors  $f_A \in \mathcal{M}$ .

Pour montrer que la fonction  $f_A$  de la relation (5.2) ne préserve pas l'additivité sur certains ensembles de diviseurs, il suffit de considérer  $A_n = \{d : d \mid n, (d, 2) = 1\}$  et  $f \in \mathcal{A}$  avec  $f(n) > 0$  pour chaque  $n > 1$ . On a alors  $\tau_A(3) = 2$ ,  $\tau_A(4) = 0$  et  $\tau_A(12) = 0$ . Il est clair que  $f_A(12) = f_A(4) = 0$  alors que  $f_A(3) = \frac{1}{2}f(3) > 0$ . Ainsi  $f_A(12) \neq f_A(4) + f_A(3)$ .

La définition de la fonction  $f_A$  à partir de la restriction du produit de Dirichlet à certains diviseurs est basée sur la notion de *A-convolution* introduite par Narkiewicz [6] (voir également Subbarao [8] et le chapitre 4 du livre de McCarthy [5]). Soit  $h$  et  $g \in \mathbf{F}$  alors pour une famille  $A$  de sous-ensembles  $A_n$  de  $D_n$ , on définit la *A-convolution* de  $h$  et  $g$  par

$$(h *_A g)(n) := \sum_{\substack{d \mid n \\ d \in A_n}} h(d)g(n/d),$$

qui de façon générale n'est pas commutative. C'est-à-dire qu'il arrive qu'on ait, pour une certaine famille d'ensembles  $A_n \subset D_n$ ,

$$\sum_{\substack{d \mid n \\ d \in A_n}} h(d)g(n/d) \neq \sum_{\substack{d \mid n \\ d \in A_n}} h(n/d)g(d).$$

**EXEMPLES.** On a ainsi les cas particuliers suivants:

- (i) Soit  $*_A = *$  alors  $f_A(n) = \bar{f}(n) = \frac{1}{\tau(n)} \sum_{d \mid n} f(d)$ .
- (ii) Soit  $*_A = *_l$  alors  $f_A(n) = \hat{f}(n) = \frac{1}{2^{\omega(n)}} \sum_{d \mid n} \mu^2(d)f(d)$ .
- (iii) Soit  $*_A = *_u$  alors  $f_A(n) = \tilde{f}(n) = \frac{1}{2^{\omega(n)}} \sum_{\substack{d \mid n \\ (d, n/d) = 1}} f(d)$ .
- (iv) Soit  $(a, b)^*$  le plus grand commun diviseur unitaire de  $a$  et  $b$  et  $\tau_A(n) = \sum_{\substack{d \mid n \\ (d, n/d)^* = 1}} 1 = \tau(n) \prod_{\substack{p^a \parallel n \\ a \text{ pair}}} \frac{a}{1+a}$ , alors  $f_A(n) = \frac{1}{\tau_A(n)} \sum_{\substack{d \mid n \\ (d, n/d)^* = 1}} f(d)$ .

(v) On pose  $\omega_k(n) := \sum_{\substack{p|n \\ (p,k)=1}} 1$ . Soit  $\tau_A(n) = \sum_{\substack{d|n; (d,k)=1 \\ (d,n/d)=1}} 1 = 2^{\omega_k(n)}$  alors

$$f_A(n) = \frac{1}{2^{\omega_k(n)}} \sum_{\substack{d|n; (d,k)=1 \\ (d,n/d)=1}} f(d).$$

(vi) Soit  $y$  un nombre réel fixe ( $y \geq 2$ ) et  $\tau_A(n) = \sum_{\substack{d|n \\ P(d) \leq y}} \mu^2(d)$ , alors

$$f_A(n) = \frac{1}{\tau_A(n)} \sum_{\substack{d|n \\ P(d) \leq y}} \mu^2(d) f(d). \text{ Soit } f \in \mathcal{A} \text{ alors } f_A(n) = \frac{1}{2} \sum_{\substack{p|n \\ p \leq y}} f(p).$$

En particulier, si  $P(n) \leq y$  alors  $f_A(n) = \hat{f}(n)$  et  $f_A(n) = 0$  si  $p(n) > y$ , où  $p(n)$  désigne le plus petit facteur premier de  $n$ , avec la convention  $p(1) = 1$ .

(vii) Soit  $\tau_A(n) = \prod_{\substack{p^\alpha || n \\ p > 2}} (\alpha + 1)$  avec  $\tau_A(2) = \tau_A(1) = 1$ , alors

$$f_A(n) = \frac{1}{\tau_A(n)} \sum_{\substack{d|n \\ d \text{ impair}}} f(d). \text{ En particulier, si } n \text{ est impair alors}$$

$f_A(n) = \bar{f}(n)$ . Soit  $f \in \mathcal{A}$ , alors  $f_A(n) = 0$  si  $n = 2^m$  et

$$f_A(n) = \sum_{\substack{p^\alpha || n \\ p \neq 2}} \frac{1}{\alpha + 1} \sum_{m=1}^{\alpha} f(p^m) \text{ si } n \text{ n'est pas une puissance de 2.}$$

(viii) Soit  $\tau_A(n) = \sum_{\substack{d^k|n \\ (d^k, n/d^k)=1}} 1 = 2^{\#\{p : p^\alpha || n \text{ avec } \alpha \equiv 0 \pmod{k}\}}$ , alors

$$f_A(n) = \frac{1}{\tau_A(n)} \sum_{\substack{d^k|n \\ (d^k, n/(d^k))=1}} f(d).$$

(ix) Soit  $y \geq 2$  fixe et  $\tau_A(n) = \sum_{\substack{d|n \\ P(d) \leq y}} 1$ , alors  $f_A(n) = \frac{1}{\tau_A(n)} \sum_{\substack{d|n \\ P(d) \leq y}} f(d)$ .

Soit  $f \in \mathcal{A}$ , alors  $\bar{f}(n) = f_A(n) + \sum_{\substack{p^\alpha || n \\ p > y}} \frac{1}{\alpha + 1} \sum_{m=1}^{\alpha} f(p^m)$ . En parti-

culier  $f_A(n) = \bar{f}(n)$  si  $P(n) \leq y$  et  $f_A(n) = 0$  si  $p(n) > y$ .

(x) La relation (5.2) est valable avec

$$\tau_A(n) = \begin{cases} \prod_{i=1}^r (\alpha_i + 1) & \text{si } n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r} \prod_{i>r}^s q_i^{\beta_i}, (p_i, kl) = 1 \text{ et } q_i \nmid (k, l), \\ 0 & \text{autrement.} \end{cases}$$

On peut même démontrer un résultat d'un caractère un peu plus général que le théorème 5.1 en considérant une fonction arithmétique multiplicative  $g$  qui n'a aucun lien avec un ensemble de diviseurs. C'est ainsi qu'on a le résultat suivant, dont le théorème 2.2 devient un cas particulier.

**THÉORÈME 5.2.** *Soit  $A$  une famille d'ensembles  $A_n \subset D_n$  telle que la convolution  $*_A$  est commutative. Supposons de plus que  $\tau_A \in \mathcal{M}$ . On considère  $U$  et  $g$  deux fonctions arithmétiques multiplicatives telles que  $(U *_A g)(n) \neq 0$  pour chaque entier  $n \geq 1$ . Enfin, soit  $f \in \mathbf{F}$ , alors  $\check{f}_A = \check{f}_A(g, U) := \frac{Uf *_A g}{U *_A g}$  est multiplicative si  $f$  est multiplicative, et additive si  $f$  est additive.*

*Démonstration.* On sait que le produit de Dirichlet de deux fonctions multiplicatives est multiplicatif (voir Apostol [1], p. 35). Cette propriété est également vraie pour le produit  $*_A$  tel que défini ici. En effet, il est facile de démontrer que si  $f$  et  $g$  sont multiplicatives, alors  $f *_A g$  est aussi multiplicative. Ainsi la première affirmation du théorème est vraie.

Pour démontrer le cas additif, on procède comme suit. Soit  $f \in \mathcal{A}$ , alors pour  $(m, n) = 1$ ,

$$\begin{aligned} \check{f}_A(mn) &= \frac{(Uf *_A g)(m)(U *_A g)(n)}{(U *_A g)(mn)} + \frac{(Uf *_A g)(n)(U *_A g)(m)}{(U *_A g)(mn)} \\ &= \frac{(Uf *_A g)(m)}{(U *_A g)(m)} + \frac{(Uf *_A g)(n)}{(U *_A g)(n)} = \check{f}_A(m) + \check{f}_A(n), \end{aligned}$$

d'où l'additivité de  $\check{f}$ .

#### REMARQUES

1) Pour déduire le théorème 2.2 du théorème 5.2, il suffit de poser  $*_A = *$ ,  $g \equiv 1$  et de substituer pour  $U$  les fonctions  $1$  et  $\mu^2$ , et cela afin d'obtenir successivement  $\check{f}_A = \bar{f}$  et  $\check{f}_A = \hat{f}$ . Pour obtenir  $\check{f}_A = \tilde{f}$ , en plus de poser  $g = U \equiv 1$ , il faut considérer la convolution unitaire  $*_u$ .

2) Nous avons vu que  $\hat{f}$  ne satisfait pas la réciproque du théorème 2.2. De même la réciproque du théorème 5.2 n'est pas vraie: il suffit de choisir  $*_A = *$ ,  $U(n) = \mu^2(n)$  et  $g(n) = 1(n)$  pour obtenir  $\check{f}_A = \hat{f}$ .

**COROLLAIRE 5.3.** *Etant donné  $f \in \mathbf{F}$ , il existe une fonction  $h = h(f)$  telle que  $f$  est liée à la fonction  $\phi$  d'Euler par la relation*

$$(5.3) \quad f(n) = \frac{1}{n} \sum_{d|n} h(d) \phi(d).$$

En particulier  $f \in \mathcal{A}$  (respectivement  $f \in \mathcal{M}$ ) si et seulement si  $h \in \mathcal{A}$  (respectivement  $h \in \mathcal{M}$ ).

*Démonstration.* On pose  $*_A = *$ ,  $U(n) = n$  et  $g(n) = \mu(n)$  dans le théorème 5.2 et on obtient ainsi la fonction

$$(5.4) \quad \check{f}(n) = \frac{1}{\phi(n)} \sum_{d|n} df(d)\mu(n/d).$$

La fonction  $h$  cherchée est alors  $h = \check{f}$ , car (5.4) implique  $h(n)\phi(n) = \sum_{d|n} df(d)\mu(n/d)$ , de sorte que, par l'inversion de Moebius, on en déduit (5.3).

Avant d'énoncer le prochain corollaire, nous allons introduire la notion de nombre  $k$ -parfait. Soit  $k$  un entier ( $k \geq 2$ ). On dit d'un entier  $n$  qu'il est  $k$ -parfait s'il existe  $m$  tel que  $n = m^k$ ; en d'autres mots si les exposants des facteurs premiers (distincts) de  $n$ , dans sa décomposition canonique, sont des multiples de  $k$ , i.e.

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r} \quad \text{avec } \alpha_i \equiv 0 \pmod{k} \quad \text{pour } i = 1, 2, \dots, r.$$

**COROLLAIRE 5.4.** *Etant donné un nombre réel  $r$ , il existe une fonction arithmétique  $g_r \in \mathcal{FM}$  définie en (5.5) telle que  $n^r = \sum_{d|n} d^{r-1}\phi(d)g_r(d)$ , pour tout nombre naturel  $n$ . En particulier un entier positif  $n$  est  $k$ -parfait si et seulement si il existe  $m$  tel que  $n = \sum_{d|m} d^{k-1}\phi(d)g_k(d)$ . Pour des valeurs entières de  $k$ , la fonction  $n^{k-1}\phi(n)g_k(n)$  est tout simplement la fonction indicatrice  $J_k(n)$  de Jordan définie par  $J_k(n) := n^k \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p^k}\right)$ , soit une généralisation de la fonction  $\phi$  d'Euler.*

*Démonstration.* Soit  $r$  un nombre réel. On pose  $f(n) = n^{r-1}$  dans le corollaire 5.3. On a ainsi  $n^r = \sum_{d|n} h(d)\phi(d)$  avec  $h(n) = \frac{1}{\phi(n)} \sum_{d|n} d^r \mu(n/d)$ .

En posant

$$(5.5) \quad g_r(n) := \prod_{p|n} \left(1 + \frac{1 - p^{1-r}}{p-1}\right) \quad \text{avec } g_0(n) = E(n),$$

il vient

$$h(n) = \frac{1}{\phi(n)} \sum_{d|n} d^r \mu(n/d) = \prod_{p^\alpha || n} p^{(r-1)\alpha} \left( 1 + \frac{1 - p^{1-r}}{p-1} \right) = n^{r-1} g_r(n).$$

Ceci permet de déduire l'identité  $n^r = \sum_{d|n} d^{r-1} \phi(d) g_r(d)$ .

**EXEMPLES.** De ce dernier corollaire, on obtient facilement les identités suivantes :

$$\sqrt{n} = \sum_{d|n} \frac{\phi(d)}{\sqrt{d}} \prod_{p|d} (1 + p^{-1/2})^{-1},$$

$$10^r = \sum_{d|10} d^{r-1} \phi(d) g_r(d),$$

$$\frac{1}{n} = \sum_{d|n} \frac{(-1)^{\omega(d)} \delta(d)}{d^2} \phi(d),$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} = \sum_{d|2} \frac{\phi(d)}{d^{3/2}} \prod_{p|d} (2 - p^{3/2}),$$

$$n^2 = \sum_{d|n} \phi(d) \sum_{c|d} c \mu^2(d/c).$$

Comme on l'a mentionné dans la seconde remarque qui suit le théorème 5.2, la réciproque de ce théorème n'est pas toujours vraie. C'est dans ce contexte qu'il est intéressant de mentionner qu'on a quand même le résultat suivant.

**THÉORÈME 5.5.** *Soit  $*_A$  une A-convolution commutative telle que  $\tau_A \in \mathcal{M}$  et  $n \in A_n$  pour chaque  $n \geq 1$ . Soit  $U \in \mathcal{M}$  et  $g \in \mathcal{M}$  tels que  $U(n) \neq 0$  et  $(U *_A g)(n) \neq 0$  pour chaque entier  $n \geq 1$ . Pour  $f \in \mathbf{F}$  on pose  $\overset{\vee}{f}_A = \frac{Uf *_A g}{U *_A g}$ . Alors  $f$  est additive si  $\overset{\vee}{f}_A$  est additive, et multiplicative si  $\overset{\vee}{f}_A$  est multiplicative.*

**Démonstration.** Soit  $f \in \mathbf{F}$  tel que  $\overset{\vee}{f}_A \in \mathcal{A}$ . On a  $\overset{\vee}{U}(1) = g(1) = (U *_A g)(1) = 1$  d'où  $(Uf *_A g)(1) = f(1)$  i.e.  $f(1) = \overset{\vee}{f}(1)$ . Il faut maintenant montrer que pour tout couple  $(m, n)$  d'entiers positifs relativement premiers, on a  $f(mn) = f(m) + f(n)$ . Supposons qu'il existe de tels couples pour lesquels la relation d'additivité pour  $f$  ne tient pas. Soit  $m_0$  le plus petit élément de  $\mathbf{N}$  pour lequel il existe au moins un entier positif  $n$  (premier avec  $m_0$ ) tel que  $f(m_0 n) \neq f(m_0) + f(n)$ . D'autre part soit  $n_0$  le plus petit parmi tous ces entiers  $n$ . Il est alors clair que :

- $1 < m_0 < n_0$  avec  $(m_0, n_0) = 1$ ,  $f(m_0 n_0) \neq f(m_0) + f(n_0)$   
 $f(ln) = f(l) + f(n)$  pour tout  $n$  et  $l$  ( $1 \leq l < m_0$ ),  $(l, n) = 1$   
 $f(m_0 r) = f(m_0) + f(r)$  pour tout  $r$ ,  $1 \leq r < n_0$  et  $(m_0, r) = 1$ .

D'autre part, puisque tout diviseur de  $m_0 n_0$  est le produit de deux entiers relativement premiers, l'un divisant  $m_0$  et l'autre divisant  $n_0$ , et qu'en plus  $\check{f}_A \in \mathcal{A}$  (avec  $(U *_A g)(n) \neq 0$ ,  $\forall n \geq 1$ ), il suit que

$$(Uf *_A g)(m_0 n_0) = (Uf *_A g)(m_0)(U *_A g)(n_0) \\ + (Uf *_A g)(n_0)(U *_A g)(m_0),$$

soit l'égalité

$$\sum_{\substack{d_1 | n_0, d_1 \in An_0 \\ d_2 | m_0, d_2 \in Am_0}} U(d_1 d_2) f(d_1 d_2) g\left(\frac{m_0 n_0}{d_1 d_2}\right) \\ = \sum_{\substack{d_1 | n_0, d_1 \in An_0 \\ d_2 | m_0, d_2 \in Am_0}} U(d_1) U(d_2) (f(d_1) + f(d_2)) g\left(\frac{m_0 n_0}{d_1 d_2}\right),$$

qui peut également s'écrire

$$\sum_{\substack{d_1 | n_0, d_1 \in An_0 \\ d_2 | m_0, d_2 \in Am_0}} U(d_1 d_2) (f(d_1 d_2) - f(d_1) - f(d_2)) g\left(\frac{m_0 n_0}{d_1 d_2}\right) = 0.$$

Mais tous les termes de cette somme sont nuls sauf lorsque  $d_1 = n_0$  et  $d_2 = m_0$ . Il suit que  $U(m_0 n_0) (f(m_0 n_0) - f(n_0) - f(m_0)) = 0$ , i.e.  $f(m_0 n_0) = f(m_0) + f(n_0)$ , ce qui contredit le choix minimal de  $m_0$ . D'où l'additivité de  $f$ . La démonstration du cas où  $f \in \mathcal{M}$  se fait de manière analogue.

**REMARQUE.** Pour déduire la réciproque du théorème 2.2 dans le cas de  $\bar{f}$  et celui de  $\tilde{f}$ , en utilisant le théorème 5.5, il faut poser  $U = g \equiv 1$ : on obtient alors successivement  $\check{f}_A = \bar{f}$  en substituant  $*$  à  $*_A$  et  $\check{f}_A = \tilde{f}$ , en substituant  $*_u$  à  $*_A$ .

## RÉFÉRENCES

- [1] APOSTOL, T. M. *Introduction to Analytic Number Theory*. Springer-Verlag (New York), 1976.
- [2] BINGHAM, N. H., C. M. GOLDIE and J. L. TEUGELS. *Regular Variation*. Encyclopedia of mathematics and its applications (27), Cambridge University Press, 1989.