Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

**Band:** 46 (2000)

**Heft:** 3-4: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: ÉCHELLES DE SOBOLEV D'ORIGINE ARBITRAIRE

Autor: Bourdaud, Gérard / WOJCIECHOWSKI, Micha

**Kapitel:** 2. Les espaces de Banach de distributions

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-64803

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Avant d'y parvenir, il nous faudra faire quelques rappels sur les espaces de Banach de distributions, en particulier sur leur dualité, et traiter le cas très particulier de la dimension 1.

NOTATIONS. Choisissons une fois pour toutes les fonctions usuelles de troncation et de régularisation. Ce sont des fonctions positives  $\rho, \varphi \in \mathcal{D}(\mathbf{R}^n)$  telles que

$$\rho(x) = 1 \quad \text{(pour } |x| \le 1/2) \;, \quad \rho(x) = 0 \quad \text{(pour } |x| \ge 1) \;, \quad \int \varphi(x) \, dx = 1 \;;$$

nous poserons

$$\rho_k(x) = \rho\left(\frac{x}{k}\right), \qquad \varphi_k(x) = k^n \varphi(kx).$$

Les opérateurs de translation et de dilatation sont définis par:

$$\tau_t f(x) = f(x - t) \quad (t \in \mathbf{R}^n), \quad h_{\lambda} f(x) = f\left(\frac{x}{\lambda}\right) \quad (\lambda > 0).$$

On pose enfin  $\widetilde{f}(x) = f(-x)$ .

### 2. LES ESPACES DE BANACH DE DISTRIBUTIONS

# 2.1 Définition et premières propriétés

Si E un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{D}'(\mathbf{R}^n)$ , muni d'une norme complète rendant continue l'injection canonique  $E \hookrightarrow \mathcal{D}'(\mathbf{R}^n)$ , on dit que E est un espace de Banach de distributions (EBD). Notons d'ailleurs que toute injection canonique  $E \hookrightarrow F$  entre deux EBD est nécessairement continue; c'est une conséquence immédiate du théorème du graphe fermé. En particulier, un sous-espace donné de  $\mathcal{D}'(\mathbf{R}^n)$  possède au plus une structure d'EBD, à une équivalence de normes près.

PROPOSITION 1. Si E est un EBD incluant  $\mathcal{D}(\mathbf{R}^n)$  comme sous-espace dense, alors E' s'identifie à un EBD. Si E et F sont des EBD incluant  $\mathcal{D}(\mathbf{R}^n)$  comme sous-espace dense, alors E' = F' si et seulement si E = F.

*Preuve.* Si  $\mathcal{D}(\mathbf{R}^n)$  est dense dans E, l'application de restriction  $u \mapsto u|_{\mathcal{D}(\mathbf{R}^n)}$  est linéaire, injective et continue de E' dans  $\mathcal{D}'(\mathbf{R}^n)$ , de sorte qu'on peut identifier E' avec le sous-espace suivant de  $\mathcal{D}'(\mathbf{R}^n)$ :

$$\left\{u \in \mathcal{D}'(\mathbf{R}^n) : \exists C > 0, \forall g \in \mathcal{D}(\mathbf{R}^n), |\langle u, g \rangle| \leq C \|g\|_E\right\}.$$

Si  $E' \subset F'$ , il existe C > 0 tel que, pour tout  $u \in E'$ ,

$$||u||_{F'} \leq C ||u||_{E'};$$

puisque

$$||g||_E = \sup \{ |\langle u, g \rangle| : u \in E', ||u||_{E'} \le 1 \},$$

il vient  $\|g\|_E \leq C \|g\|_F$  pour tout  $g \in \mathcal{D}(\mathbf{R}^n)$ , ce qui, par densité, entraîne  $F \subset E$ .

## 2.2 ÉCHELLES DE RÉGULARITÉ

DÉFINITION 1. Une suite  $(E^m)_{m \in \mathbb{Z}}$  d'EBD est une échelle de régularité si, pour tous  $m \in \mathbb{Z}$  et j = 1, ..., n:

(i) 
$$E^{m+1} \subset E^m$$
 et (ii)  $\partial_j (E^{m+1}) \subset E^m$ .

 $E^0$  est appelé l'origine de l'échelle.

Si E est un EBD donné, il existe au moins une échelle de régularité d'origine E: c'est l'échelle de Sobolev définie par (1) et (2); on vérifie en effet ([3]) que  $W^m(E)$  et  $W^{-m}(E)$  sont des EBD pour les normes respectives:

$$\begin{split} \|f\|_{W^m(E)} &= \sum_{|\alpha| \le m} \left\| f^{(\alpha)} \right\|_E, \\ \|f\|_{W^{-m}(E)} &= \inf \left\{ \sum_{|\alpha| \le m} \left\| f_{\alpha} \right\|_E : \quad f = \sum_{|\alpha| \le m} f_{\alpha}^{(\alpha)} \right\}. \end{split}$$

Dès que l'espace E est invariant sous l'effet des automorphismes linéaires de  $\mathbf{R}^n$ , l'espace  $W^m(E)$  ( $m \in \mathbf{Z}$ ) ne dépend pas du système de coordonnées par rapport auxquelles sont calculées les dérivées partielles.

PROPOSITION 2. On a  $W^{m+k}(E) = W^m(W^k(E))$ , quel que soit E, dès que les entiers m et k sont de même signe.

*Preuve*. Elle repose sur la remarque élémentaire suivante : si  $\alpha \in \mathbb{N}^n \setminus \{0\}$  et si l'entier m vérifie  $0 < m < |\alpha|$ , il existe  $\beta \in \mathbb{N}^n$  tel que  $\beta < \alpha$  et  $|\beta| = m$ . Les détails sont laissés au lecteur.

DÉFINITION 2. L'échelle de Sobolev d'origine *E* est dite *invariante* si elle vérifie la propriété (3), ce qui, d'après la proposition précédente, est équivalent à:

(5) 
$$W^{m-k}(E) = W^m(W^{-k}(E)) = W^{-k}(W^m(E)) \qquad (m > 0, k > 0).$$

### 2.3 Dualité de l'échelle de Sobolev

On notera  $E_0$  et  $W_0^m(E)$  les fermetures respectives de  $\mathcal{D}(\mathbf{R}^n)$  dans E et dans  $W^m(E)$ .

PROPOSITION 3. Soit E un EBD incluant  $\mathcal{D}(\mathbf{R}^n)$ . On a alors:

(i) 
$$(W_0^m(E))' = W^{-m}((E_0)') \qquad (m \ge 0),$$

(ii) 
$$\left(W_0^{-m}(E)\right)' \subset W^m\left((E_0)'\right) \qquad (m>0).$$

Preuve. Voir [3]. Précisons que, dans l'ouvrage en question, l'inclusion

$$W^m\left((E_0)'\right)\subset\left(W_0^{-m}(E)\right)'$$

est donnée pour vraie; mais il y a une lacune dans la preuve: quand on décompose  $g \in \mathcal{D}(\mathbf{R}^n)$  sous la forme

$$g = \sum_{|\alpha| \le m} g_{\alpha}^{(\alpha)}$$

où  $g_{\alpha} \in \mathcal{D}(\mathbf{R}^n)$ , rien ne dit qu'on obtient ainsi toutes les décompositions possibles de g avec  $g_{\alpha} \in E$ ! Une chose reste exacte cependant:

PROPOSITION 4. Soit m > 0. Alors, pour tous  $f \in \mathcal{D}(\mathbf{R}^n)$  et  $g \in W^{-m}(E)$ , on a:

$$|\langle g, f \rangle| \le ||f||_{W^m((E_0)')} ||g||_{W^{-m}(E)}.$$

COROLLAIRE 1. Soit m > 0. Si  $\mathcal{D}(\mathbf{R}^n)$  est dense dans  $W^m((E_0)')$ , alors

$$\left(W_0^{-m}(E)\right)' = W^m\left((E_0)'\right).$$

On a, par exemple, la propriété bien connue suivante:

$$\left(W^{-m}(L^p(\mathbf{R}^n))\right)' = W^m(L^{p'}(\mathbf{R}^n)),$$

pour 1 , <math>p' = p/(p-1).

# 2.4 Les $\mathcal{D}(\mathbf{R}^n)$ -modules invariants par translation

Nous allons voir que l'identité (6) est vérifiée pour une classe assez vaste d'EBD invariants par translation.

On dit que E est un  $\mathcal{D}(\mathbf{R}^n)$ -module si, pour tous  $g \in \mathcal{D}(\mathbf{R}^n)$  et  $f \in E$ , on a  $gf \in E$ . Notons qu'alors l'opérateur linéaire  $f \mapsto gf$  est borné sur E et donc que la fonction g admet une norme en tant que multiplicateur ponctuel de E:

$$||g||_{M(E)} = \sup\{||gf||_E : ||f||_E \le 1\}.$$

THÉORÈME 2. Soit E un EBD satisfaisant les trois propriétés suivantes:

- $(P_0)$   $\mathcal{D}(\mathbf{R}^n)$  est un sous-espace dense de E;
- (P<sub>1</sub>) pour tout  $f \in E$  et  $t \in \mathbb{R}^n$ , on a  $\tau_t f \in E$  et  $\|\tau_t f\|_E = \|f\|_E$ ;
- (P<sub>2</sub>) E est un  $\mathcal{D}(\mathbf{R}^n)$ -module et, pour tout  $g \in \mathcal{D}(\mathbf{R}^n)$ , on a:

$$\sup_{\lambda \geq 1} \|h_{\lambda}g\|_{M(E)} < +\infty.$$

Alors, pour  $m \in \mathbf{Z}$ ,

- 1. E' possède les propriétés (P<sub>1</sub>) et (P<sub>2</sub>);
- 2.  $W^m(E)$  possède les propriétés  $(P_0)$ ,  $(P_1)$  et  $(P_2)$ ;
- 3.  $(W^m(E))' = W^{-m}(E')$ .

*Preuve*. Le fait que E' et  $W^m(E)$  possèdent les propriétés  $(P_1)$  et  $(P_2)$  se vérifie sans difficulté. La preuve de la seconde assertion repose sur les résultats classiques suivants:

LEMME 1. Si E vérifie  $(P_0)$  et  $(P_1)$ , alors, pour tous  $g \in \mathcal{D}(\mathbf{R}^n)$  et  $f \in E$ , on a  $g * f \in E$  et  $\|g * f\|_E \le \|g\|_1 \|f\|_E$ ; la même estimation est satisfaite dans E' et dans  $W^m(E)$   $(m \in \mathbf{Z})$ .

LEMME 2. Sous les hypothèses du théorème 2, on a, pour tous  $f \in E$  et  $g \in \mathcal{D}(\mathbf{R}^n)$ ,

$$\lim_{k \to +\infty} f(h_k g) = g(0)f \quad et \quad \lim_{k \to +\infty} k^n (h_{1/k} g) * f = \left( \int g(x) dx \right) f$$

dans l'espace de Banach E.

A l'aide du lemme 2, on montre aisément que, pour  $f \in W^m(E)$ ,

$$\lim_{k \to +\infty} f \rho_k = f, \qquad \lim_{k \to +\infty} \varphi_k * f = f$$

en norme  $W^m(E)$ ; la densité de  $\mathcal{D}(\mathbf{R}^n)$  dans  $W^m(E)$  en découle aussitôt.

Il reste à prouver l'inclusion  $W^m(E') \subset (W^{-m}(E))'$ , pour m > 0. Soit f une distribution à support compact appartenant à  $W^m(E')$  et  $g \in \mathcal{D}(\mathbf{R}^n)$ ; en appliquant la proposition 4 à  $f * \varphi_k$  et g, on obtient:

$$|\langle f * \varphi_k, g \rangle| \le ||f||_{W^m(E')} ||g||_{W^{-m}(E)};$$

puisque  $\widetilde{\varphi}_k * g \to g$  dans  $\mathcal{D}(\mathbf{R}^n)$ , il vient

$$|\langle f, g \rangle| \le ||f||_{W^m(E')} ||g||_{W^{-m}(E)},$$

autrement dit  $f \in W^{-m}(E)'$ . Si f est un élément quelconque de  $W^m(E')$ , on approche f par les  $f\rho_k$  et on conclut comme ci-dessus.

REMARQUE. L'étude de la dualité des  $W^m(E)$  peut se conduire dans le cadre plus général de l'échelle de Sobolev associée à un  $C_0$ -groupe (voir le chapitre III de [1], notamment le théorème 3.3.28).

### 3. RÉSULTATS POSITIFS EN DIMENSION UN

THÉORÈME 3. Soit E un EBD dans  $\mathcal{D}'(\mathbf{R})$ , ayant les propriétés  $(P_0)$  et  $(P_1)$ ; soit m > 0. Alors

$$E = W^{-m}(W^m(E)), \quad E' = W^{-m}(W^m(E')).$$

Si de plus E satisfait  $(P_2)$ , alors les échelles de Sobolev d'origines E et E' sont invariantes.

Preuve. D'après le lemme 1, l'opérateur défini par

$$Tf = \int_0^\infty e^{-t} \tau_t f \, dt$$

est borné sur E. Puisque (Tf)' = f - Tf pour  $f \in \mathcal{D}(\mathbf{R})$ , la même propriété est vraie au sens des distributions quel que soit  $f \in E$ . On en déduit aussitôt que  $T^m$  est un opérateur borné de E dans  $W^m(E)$ . Si  $f \in E$  et  $g = T^m(f)$ , il vient

$$f = \sum_{j=0}^{m} C_m^j g^{(j)},$$

de sorte que f appartient à  $W^{-m}(W^m(E))$ . On peut aussi définir T sur E', à l'aide de la formule