

**Zeitschrift:** L'Enseignement Mathématique  
**Herausgeber:** Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique  
**Band:** 47 (2001)  
**Heft:** 1-2: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

**Artikel:** UNE QUINTIQUE DE GENRE 1 QUI CONTREDIT LE PRINCIPE DE HASSE  
**Autor:** WUTHRICH, Christian  
**Kapitel:** 2. Quintiques planes de genre 1  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-65433>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 17.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

mais il doit apparemment se restreindre à des courbes elliptiques avec 5-torsion sur  $\mathbf{Q}$ .

La première partie de cet article décrit la méthode pour construire les courbes qui satisfont la condition géométrique, en utilisant des surfaces de Del Pezzo de degré 4. Après la construction du contre-exemple, la démonstration du théorème est expliquée en détail. J'aimerais attirer l'attention sur la démonstration du cas global qui contient des éléments originaux, comme l'examen simultané – *pour une même équation* – de deux éléments qui sont des normes : voir (4.1) et (4.2). Entièrement programmée sur ordinateur, elle a été appliquée à des familles de courbes pour tamiser un contre-exemple. La fin de l'article est réservée au calcul de la jacobienne  $E$  associée à cette quintique qui nous sert de contre-exemple. La normalisée de  $C$  représente alors un élément d'ordre 5 dans le groupe de Tate-Shafarevich  $\text{III}(E/\mathbf{Q})$ .

## 2. QUINTIQUES PLANES DE GENRE 1

Soit  $\omega$  un nombre algébrique de polynôme minimal

$$p(X) = g_0 + g_1 X + g_2 X^2 + g_3 X^3 + g_4 X^4 + X^5$$

sur  $\mathbf{Q}$ . Soit  $P_1 = (1 : \omega : \omega^2) \in \mathbf{P}^2(\mathbf{Q}(\omega))$  et soient  $P_2, P_3, P_4$  et  $P_5$  ses conjugués sur  $\mathbf{Q}$ . On introduit la notation  $B$  pour la conique  $xz - y^2 = 0$  qui est définie par les  $P_i$ . Nous allons chercher toutes les quintiques  $C/\mathbf{Q}$  du plan ayant des points doubles en  $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5$ . Pour cela nous considérons le système linéaire complet des cubiques passant par les points  $P_i$ . Prenons comme base les cubiques  $A_i/\mathbf{Q}$  suivantes :

$$A_0: x(xz - y^2) = 0, \quad A_1: y(xz - y^2) = 0, \quad A_2: z(xz - y^2) = 0,$$

$$A_3: g_0 x^3 + g_1 x^2 y + g_2 x^2 z + g_3 xyz + g_4 xz^2 + yz^2 = 0,$$

$$A_4: g_0 x^2 y + g_1 x^2 z + g_2 xyz + g_3 xz^2 + g_4 yz^2 + z^3 = 0.$$

Ceci donne une application birationnelle  $j$  de  $\mathbf{P}_{\mathbf{Q}}^2$  dans une surface  $S$  de Del Pezzo de degré 4 dans  $\mathbf{P}_{\mathbf{Q}}^4$ , isomorphe au plan éclaté en les cinq points  $P_i$ , voir [Be].

Un petit calcul de syzygies montre que  $S$  est égale à l'intersection complète des deux quadriques

$$Q_0: x_0 x_4 - x_1 x_3 = g_1 x_0^2 + g_3 x_0 x_2 + x_2^2$$

$$Q_1: x_2 x_3 - x_1 x_4 = g_0 x_0^2 + g_2 x_0 x_2 + g_4 x_2^2$$

définies sur  $\mathbf{Q}$ .

L'intersection de  $S$  avec une quadrique  $Q$  qui ne contient pas la surface se contracte sur  $\mathbf{P}^2$  en une sextique ayant des points doubles dans les cinq points  $P_i$ . On prend une droite du plan, par exemple  $x = 0$ , paramétrée par  $(s : t) \mapsto (0 : s : t)$ . Son image sur la surface  $S$  est une cubique gauche  $h$  paramétrée par

$$(s : t) \mapsto (0 : -s^3 : -s^2t : st^2 : g_4st^2 + t^3).$$

On cherche toutes les quadriques de  $\mathbf{P}^4$  qui contiennent cette cubique gauche  $h$  sans contenir toute la surface  $S$ . Une telle quadrique coupe la surface le long de  $h$  et d'une courbe dont la contraction sur le plan est une quintique ayant un point double en chacun des points  $P_i$ . On n'a pas de peine à trouver déjà cinq quadriques dégénérées de la forme  $x_0x_i = 0$  pour  $0 \leq i \leq 4$ . Les quintiques correspondantes s'écrivent comme

$$C_i = A_i + B \quad \text{pour } 0 \leq i \leq 4.$$

De plus, on trouve trois cônes quadratiques de sommet  $(1 : 0 : 0 : 0 : 0)$ , au-dessus de trois quadriques dans l'hyperplan donné par l'équation  $x_0 = 0$  :

$$x_1x_3 + x_2^2 = 0, \quad x_1x_4 - x_2x_3 - g_4x_1x_3 = 0, \quad x_2x_4 + x_3^2 - g_4x_2x_3 = 0.$$

Voici les quintiques associées :

$$C_5: (xz - y^2)(g_0x^2y + g_1xy^2 + g_2xyz + g_3y^2z + g_4yz^2 + z^3) = 0,$$

$$C_6: (xz - y^2)(-g_0g_4x^2y - g_0x^2z + (g_0 - g_1g_4)xy^2 - g_2g_4xyz \\ - g_2xz^2 + (g_2 - g_3g_4)y^2z - g_4^2yz^2 - g_4z^3) = 0,$$

$$C_7: g_0^2x^5 + 2g_0g_1x^4y + 2g_0g_2x^4z + g_1^2x^3y^2 + 2(g_1g_2 + g_0g_3)x^3yz \\ + (g_2^2 + g_0g_4)x^3z^2 + (2g_1g_3 + g_0g_4)x^2y^2z \\ + (3g_0 + 2g_2g_3 + g_1g_4)x^2yz^2 + (g_1 + g_2g_4)x^2z^3 + (-g_0 + g_1g_4)xy^3z \\ + (g_1 + g_3^2 + g_2g_4)xy^2z^2 + (3g_2 + g_3g_4)xyz^3 + g_3xz^4 \\ + (-g_2 + g_3g_4)y^3z^2 + (g_3 + g_4^2)y^2z^3 + 2g_4yz^4 + z^5 = 0.$$

On voit que les équations de  $C_5$  et  $C_6$  sont des combinaisons linéaires des équations de  $C_0$ ,  $C_2$  et  $C_4$ . Les quintiques  $\{C_0, C_1, C_2, C_3, C_4, C_7\}$  forment une base du système des quintiques du plan ayant des points doubles en  $P_1, \dots, P_5$ ; on vérifie qu'elles sont indépendantes et que la dimension du système est égale à  $\binom{5+2}{2} - 3 \cdot 5 = 6$ , car les conditions imposées par les points  $P_i$  sont indépendantes.

REMARQUE. D'après le théorème de Riemann-Roch, tout diviseur de degré 1 est linéairement équivalent à un diviseur effectif, c-à-d. à un point rationnel. Pour éviter d'avoir de tels points sur notre courbe, il faut que l'application  $\text{deg}: \text{Div}(C/\mathbf{Q}) \rightarrow \mathbf{Z}$  ait  $5\mathbf{Z}$  comme image.

Nous avons utilisé cela pour tamiser une certaine famille de quintiques pour trouver notre exemple: on prend une quintique dont on a vérifié qu'elle a des points locaux. On choisit quelques droites au hasard. L'intersection de la quintique avec chacune des droites doit être un diviseur irréductible sur  $\mathbf{Q}$ . Sinon la quintique possède des points rationnels. Pour la courbe

$$324x^5 - 36x^4y + x^3y^2 + 45x^2yz^2 - x^2z^3 - xy^2z^2 - 9y^5 + z^5 = 0,$$

par exemple, on ne trouve pas tout de suite un point rationnel. Mais quand on coupe par la droite  $3x - y + z = 0$ , on trouve un polynôme qui se factorise:

$$9(2y^2 + 3yz - 3z^2)(109y^3 - 96y^2z + 99yz^2 - 4z^3),$$

ce qui montre qu'il y a un point rationnel quelque part.

### 3. UN CORPS DE NOMBRES

Soit  $\zeta$  une racine primitive 11<sup>ème</sup> de l'unité. On considère le corps cyclotomique  $\mathbf{Q}(\zeta)$ . Pour tous les résultats de ce paragraphe, je me réfère à [CF], chap. 3. L'anneau des entiers  $\mathcal{O}_{\mathbf{Q}(\zeta)}$  est égal à  $\mathbf{Z}[\zeta]$  et le discriminant vaut  $\text{disc}(\mathbf{Q}(\zeta)) = -11^9$ . Le premier 11 est totalement ramifié:  $11\mathcal{O}_{\mathbf{Q}(\zeta)} = (1 - \zeta)^{10}$ . Un premier rationnel  $p \neq 11$  se décompose en dix idéaux premiers si  $p \equiv 1 \pmod{11}$ , en cinq si  $p \equiv -1 \pmod{11}$ ; autrement il reste premier si  $p^5 \equiv -1 \pmod{11}$  et dans les autres cas il se factorise en deux idéaux premiers.

Dans  $\mathbf{Q}(\zeta)$  il y a un sous-corps réel de degré 5,  $K = \mathbf{Q}(\zeta + \bar{\zeta})$ , qui est le corps fixe sous l'action de l'élément  $\sigma$  d'ordre 2 dans  $\text{Gal}(\mathbf{Q}(\zeta):\mathbf{Q})$ . Comme l'extension  $\mathbf{Q}(\zeta):\mathbf{Q}$  est abélienne,  $K:\mathbf{Q}$  est galoisienne. Le discriminant  $\text{disc}(K)$  doit diviser celui de  $\mathbf{Q}(\zeta)$ , ce qui entraîne que 11 est le seul premier ramifié dans  $K$ ; il est aussi totalement ramifié. On trouve un générateur de l'idéal au-dessus de  $11\mathbf{Z}$  en prenant  $\theta = N_{\mathbf{Q}(\zeta):K}(1 - \zeta) = 2 - \zeta - \bar{\zeta} \in \mathcal{O}_K$ . Il est facile de calculer le polynôme minimal de  $\theta$ :

$$\theta^5 - 11\theta^4 + 44\theta^3 - 77\theta^2 + 55\theta - 11 = 0.$$

De plus, l'anneau des entiers  $\mathcal{O}_K$  de  $K$  est égal à  $\mathbf{Z}[\theta]$ . Il est principal; un fait que nous n'utiliserons pas. On a  $11\mathcal{O}_K = (\theta)^5$ . On peut déduire de l'action de  $\sigma$  sur les idéaux que les premiers rationnels  $p \equiv \pm 1 \pmod{11}$  se factorisent