Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

**Band:** 49 (2003)

**Heft:** 3-4: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: ANALYSE DE FOURIER DES FRACTIONS CONTINUES À

QUOTIENTS RESTREINTS

**Autor:** Queffélec, Martine / Ramaré, Olivier

Kurzfassung

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-66692

# Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

## **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 15.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# ANALYSE DE FOURIER DES FRACTIONS CONTINUES À QUOTIENTS RESTREINTS

par Martine QUEFFÉLEC et Olivier RAMARÉ

ABSTRACT. Let  $\mathcal{A}$  be a finite alphabet of positive integers with  $|\mathcal{A}| \geq 2$ , and  $F(\mathcal{A})$  be the set of numbers in [0,1) whose partial quotients belong to  $\mathcal{A}$ . We construct a Kaufman measure on every such set with Hausdorff dimension > 1/2 and establish, in this way, the existence of infinitely many normal numbers in  $F(\mathcal{A})$ . This improves previous results of Kaufman and Baker.

## 1. Introduction

Il est intéressant de classer les ensembles de mesure de Lebesgue nulle : on peut considérer leur cardinalité, leur dimension de Hausdorff, ou préciser le comportement des mesures (singulières) qu'ils portent.

1.1. On sait que les nombres normaux (en toute base) sont de mesure pleine pour la mesure de Lebesgue, et Kahane & Salem [9] ont posé la question suivante: soit  $\mu$  une mesure borélienne sur  $\mathbf{T}$  identifié à [0,1), dont la transformée de Fourier tend vers 0 à l'infini ( $\mu \in M_0(\mathbf{T})$ ); est-il encore vrai que  $\mu$ -presque tout nombre de [0,1) est normal en base 2 par exemple?

Autrement dit, est-ce que l'ensemble des nombres non-normaux en base 2 est annulé par toute mesure de  $M_0(\mathbf{T})$ ? Ou porte-t-il, au contraire, une mesure de  $M_0(\mathbf{T})$ ?

DÉFINITION 1.1. Un sous-ensemble  $E \subset \mathbf{T}$  est dit de multiplicité (stricte) s'il existe une mesure (de probabilité)  $\in M_0(\mathbf{T})$  telle que  $\mu(E) \neq 0$ .