

Application des théories précédentes a la construction des COURBES.

Objekttyp: **Chapter**

Zeitschrift: **L'Enseignement Mathématique**

Band (Jahr): **8 (1906)**

Heft 1: **L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE**

PDF erstellt am: **19.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

$$yF_1^n(xy) + x(A'y^n + B'xy^{n-1} + \dots + M'x^{n-1}y) - k(A'y^n + B'xy^{n-1} + \dots + M'x^{n-1}y) = 0.$$

ou

$$F_1^n(xy) + xF_3^{n-1}(xy) - kF_3^{n-1}(x, y) = 0.$$

Le terme de degré inférieur est du $(n - 1)^e$.

L'origine est un point multiple d'ordre $n - 1$. D'autre part $y = 0$ amène

$$x = \frac{M'}{M' + N} k.$$

Donc le point $(k, 0)$ n'est plus sur la courbe.

$\nu = \infty$ ne donne plus de solutions en μ autre que $\mu = \infty$, par conséquent la première base n'est plus une tangente; par contre $\mu = \infty$ donne $(n - 1)$ solutions en ν différentes et différentes de $\nu = \infty$ ce qui prouve que la deuxième base est une tangente multiple d'ordre $(n - 1)$

APPLICATION DES THÉORIES PRÉCÉDENTES A LA CONSTRUCTION DES COURBES.

Les deux théorèmes précédents et leurs cas spéciaux permettent de construire par points et par tangentes les courbes du 3^e degré à point double ou de la 3^e classe à tangente double quand on connaît 5 paires d'éléments homologues dans les groupes générateurs.

Les cas spéciaux déterminent des coniques auxiliaires au moyen desquelles on peut trouver tous les éléments des groupes et par conséquent les courbes considérées.

Courbes du 3^e degré.

Le groupe primitif du 3^e degré sera formé par un faisceau S (α, b, c) et un faisceau S_1 $(a_1, a_2, b_1, b_2, c_1)$ contenant les rayons homologues nécessaires.

Le rayon c détermine sur S_1 une division A_1, A_2, B_1, B_2, C_1 et le rayon C_1 sur S une division A, B, C ; celles-ci ont le point CC_1 commun. Elles ont pour enveloppe une courbe de 2^e degré

Courbes de la 3^e classe.


Désignons par A, B, C des points de la 1^{re} division et par A_1, A_2, B_1, B_2, C_1 les points homologues nécessaires de la 2^e. Les tangentes sont avec les deux bases :

$$AA_1, AA_2, BB_1, BB_2, CC_1.$$

En considérant les points C et C_1 comme sommet de deux fais-


déterminée par les tangentes AA_1, AA_2, BB_1, BB_2 et la base c de la division.

Par tout point X de c_1 on peut mener deux tangentes arbitraires à cette conique. Elle déterminent 2 points X_1 et X_2 sur c . Donc SX et S_1X_1 puis S_1X_2



sont des rayons homologues du groupe primitif et ils déterminent deux points nouveaux de la courbe. En laissant X décrire C_1 on forme l'ensemble des tangentes de la conique auxiliaire et l'ensemble des points de la courbe du 3^e degré. (Voir fig. 1)

ceux et en joignant C avec les points de la 2^e base, C_1 avec ceux de la 1^{re} base, on obtient un groupe du 3^e degré dans lequel CC_1 représente 2 rayons homologues confondus. Ce groupe détermine une conique



que l'on construit par les cinq points 1, 2, 3, 4, 5 connus.

Tout rayon passant par C_1 et coupant la conique donne deux points que l'on joint à C et qui sont les rayons homologues du 2^e faisceau. Les 3 rayons sont prolongés jusqu'aux bases et déterminent ainsi 2 nouvelles paires de points du groupe primitif de 3^e classe et par conséquent deux nouvelles tangentes. Donc la courbe peut être construite par tangentes en menant par C des rayons arbitraires qui coupent la conique auxiliaire. (Voir fig. 2).

REMARQUE. Le 2^e faisceau ou la 2^e ponctuelle forme une involu- tion du 2^e degré, qui est homographique avec l'autre faisceau ou l'autre ponctuelle. La construction précédente donne une démon- stration des théorèmes suivants très connus.

Quand le sommet d'un fais- ceau involutif est sur une co- nique, les sécantes déterminées

Quand une tangente d'une conique est considérée comme base d'une involu- tion, les points

par chaque paire de rayons homologues sont concourantes.

de coupe de chaque paire de tangentes menées par deux points homologues sont sur une même ligne droite.

Courbes du $(n + 1)^{\text{e}}$ degré.

1) Etant donné deux faisceaux S_n, S_1 formant un groupe du $(n + 1)^{\text{e}}$ degré, celui-ci est déterminé par $(2n + 1)$ paires de rayons homologues fournissant $(2n + 1)$ points de la courbe en dehors du point multiple d'ordre n et du point simple considérés aux sommets des deux faisceaux.

2) Soient maintenant deux rayons homologues a et a' coupant les deux faisceaux a coupe S_1 et a' coupé S_n . Ceux-ci donnent deux divisions de points du $(n + 1)^{\text{e}}$ degré avec un point homologue commun. Ces divisions entraînent une courbe auxiliaire de la n^{e} classe dans laquelle la base a' est tangente d'ordre $(n - 1)$ tandis que a n'est pas tangente.

3) Si nous supposons cette courbe auxiliaire construite ; par tous les points de a' on peut lui mener une tangente mais une seule qui donne un point sur la division a , mais par contre par le point trouvé on peut mener $(n - 1)$ tangentes, nouvelles qui donnent les $n - 1$ autres points correspondant à celui-là, de telle sorte par les points ainsi considérés, on peut toujours mener les rayons homo-

Courbes de la $(n + 1)^{\text{e}}$ classe.

1) Etant donné deux divisions de points D_n et D_1 , formant un groupe de la $(n + 1)^{\text{e}}$ classe celle-ci est déterminée par $(2n + 1)$ paires de points, c'est-à-dire par $(2n + 1)$ tangentes en dehors de la tangente multiple d'ordre n et de la tangente simple considérées comme bases des divisions.

2) Si maintenant nous prenons deux points homologues A et A' et que nous joignons tous les points de D_n avec A' et tous ceux de D_1 avec A nous formons deux faisceaux en A' et A tels qu'à tout rayon de A' en correspondent un de A et à tout rayon de A on en trouve n de A' . On a un groupe de la $(n + 1)^{\text{e}}$ classe avec un rayon homologue commun ; la courbe correspondante est du n^{e} degré, le sommet A' est un point multiple d'ordre $n - 1$, l'autre est extérieur.

3) Si nous supposons cette courbe auxiliaire construite, à tout rayon arbitraire issu de A correspondent n points de coupe avec cette courbe, c'est-à-dire n rayons issus de A' (réels ou imaginaires). Le rayon par A donne un point sur D_1 et les n rayons par A' donnent les n points correspondants sur D_n . Ceux-ci déterminent n nouvelles tangentes de la courbe primitive de la $(n + 1)^{\text{e}}$ classe. Par

logues correspondants, n en S_n et un en S_1 . Ces rayons donnent des nouveaux points de la courbe du $(n + 1)^e$ degré, et par conséquent, cette courbe peut être construite au moyen de la courbe auxiliaire correspondante de la n^e classe.

conséquent cette courbe peut être construite au moyen des points de la courbe inférieure du n^e degré.

CONSTRUCTION DE LA COURBE AUXILIAIRE.

Pour déterminer cette courbe de n^e classe qui correspond à un groupe de $(n + 1)^e$ classe ayant une paire de points homologues confondus, nous remarquons que l'on a $2n$ tangentes différentes, une d'ordre $(n - 1)$ et une droite non tangente.

On peut également ramener cette courbe à celle résultant d'un groupe de n^e degré. Cette courbe comporte le point A' comme point multiple d'ordre $(n - 1)$ et en plus $2n + 1 - 1$ ou $2n$ autres points simples.

Si maintenant, nous prenons une quelconque des $2n$ tangentes simples différentes, celle-ci est coupée par les $(2n - 1)$ autres en $2n - 1$ points. A chaque point de la tangente d'ordre $(n - 1)$ correspond un seul point de cette tangente simple et à chaque point de celle-ci correspondent $(n - 1)$ points homologues sur la tangente multiple, car, par chaque point de la tangente simple on peut mener $(n - 1)$ autres tangentes simples.

En joignant un quelconque de ces points avec les $2n - 1$ autres puis ceux-ci avec A' , on forme deux faisceaux, tels qu'à chaque rayon du premier en correspondent $n - 1$ du 2^e et chaque rayon du 2^e un du premier; car tout rayon par le point simple en question a encore $(n - 1)$ points de coupe possible avec la courbe.

Il en résulte donc que la construction de la courbe de la n^e classe se ramène à deux divisions formant un groupe de la n^e classe, donc telle qu'à tout point de l'une correspondent $(n - 1)$ points de l'autre et à tout point de cette autre un seul de la première.

Il en résulte également que la construction de cette courbe se ramène à celle résultant de deux faisceaux formant un groupe du n^e degré d'après les formules précédentes appliquées au nombre des points nécessaires.

Si dans la formule

$$2n + 1$$