

1. Introduction

Objektyp: **Chapter**

Zeitschrift: **L'Enseignement Mathématique**

Band (Jahr): **33 (1987)**

Heft 1-2: **L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE**

PDF erstellt am: **25.04.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

HOMOLOGIE DE DEGRÉ TROIS D'ALGÈBRES DE LIE SIMPLES DÉPLOYÉES ÉTENDUES À UNE ALGÈBRE COMMUTATIVE

par J. L. CATHELINEAU

1. INTRODUCTION

Dans toute la suite, k est un corps de caractéristique nulle et A , une k -algèbre commutative avec un élément unité. Si $\mathfrak{g}$ est une k -algèbre de Lie, on lui associe l'algèbre de Lie

$$\mathfrak{g}_A = A \otimes_k \mathfrak{g}$$

où le crochet est défini par

$$[a \otimes x, b \otimes y] = ab \otimes [x, y].$$

Si $\mathfrak{g}$ est semi-simple, on note $\langle \cdot, \cdot \rangle$ la forme de Killing de $\mathfrak{g}$ et on l'étend à $\mathfrak{g}_A$ par la formule

$$\langle a \otimes x, b \otimes y \rangle = \langle x, y \rangle ab.$$

On note $H_{*,k}(\mathfrak{g}_A)$, l'homologie de $\mathfrak{g}_A$, considérée comme k -algèbre de Lie; $H_{*,k}(\mathfrak{g}_A, \mathfrak{g}_A)$ désigne l'homologie de $\mathfrak{g}_A$, considérée comme k -algèbre de Lie, à coefficients dans $\mathfrak{g}_A$ muni de l'action adjointe.

Remarquons que pour $\mathfrak{g}$ simple, il existe toujours une extension galoisienne, de degré fini (K, k) , telle que la K -algèbre de Lie $K \otimes_k \mathfrak{g}$ soit déployée; le type de $\mathfrak{g}$ est défini alors indépendamment de K .

L'homologie du complexe de de Rham de A sur k ([Bo 1])

$$A \xrightarrow{d} \Omega_{A/k}^1 \rightarrow \dots \rightarrow \Omega_{A/k}^n \dots$$

est notée $H_{DR}^*(A)$.

Le but de cet article est de calculer les groupes $H_{3,k}(\mathfrak{g}_A)$ et $H_{2,k}(\mathfrak{g}_A, \mathfrak{g}_A)$, pour $\mathfrak{g}$ une k -algèbre de Lie simple; on renvoie au § 2 pour l'énoncé complet des résultats.

Ces résultats sont à rapprocher des calculs d'homologies suivants ([K]):

$$H_{2,k}(\mathfrak{g}_A) \xrightarrow{\sim} \Omega_{A/k}^1/dA$$

$$H_{1,k}(\mathfrak{g}_A, \mathfrak{g}_A) \xrightarrow{\sim} \Omega_{A/k}^1,$$

qui sont valables pour une algèbre simple $\mathfrak{g}$ de type arbitraire et une k -algèbre commutative quelconque. D'ailleurs la méthode utilisée ici permet de retrouver simplement ces isomorphismes.

Dans le calcul qui nous concerne, il y a deux cas à considérer suivant le type de $\mathfrak{g}$ et cette distinction s'explique par une propriété géométrique des racines.

Voici deux cas particuliers des théorèmes 1 et 2 du § 2.

PROPOSITION 1. *Avec les hypothèses suivantes :*

- (1) A est une k -algèbre lisse ou un corps extension de k ;
 - (2) $\mathfrak{g}$ est une k -algèbre de Lie simple, de type $A_1, B, C, D_l (l \geq 4), E, F_4$ ou G_2 ¹⁾
- la forme

$$\Lambda_k^3 \mathfrak{g}_A \rightarrow A$$

$$au \wedge bv \wedge cw \mapsto \langle [au, bv], cw \rangle = \langle [u, v], w \rangle abc, \quad (au = a \otimes u)$$

induit un isomorphisme de k -espaces vectoriels

$$H_{3,k}(\mathfrak{g}_A) \xrightarrow{\sim} H_{DR}^0(A).$$

PROPOSITION 2. *Avec les mêmes hypothèses que dans la proposition 1, on a*

$$H_{2,k}(\mathfrak{g}_A, \mathfrak{g}_A) = 0.$$

ORIGINE DES RÉSULTATS (voir aussi [Ca 2])

Rappelons d'abord que l'étude de l'homologie des groupes de Lie, considérés comme groupes discrets, est justifiée par plusieurs domaines : fibrés plats, feuilletages, troisième problème de Hilbert, K -théorie algébrique. Citons deux exemples relatifs aux groupes $SO(3, \mathbf{R})$ et $SU(2, \mathbf{C})$:

J. L. Dupont ([D]) a montré, en rapport avec le troisième problème de Hilbert, que $H_2(SO(3, \mathbf{R}), \mathbf{R}^3) = 0$ équivaut au fait, prouvé par J. P. Sydler ([S]), que l'invariant de Dehn et le volume sont des invariants complets pour la scission des polyèdres de $\mathbf{R}^3$; on ne dispose pas de preuve algébrique directe de la nullité du groupe $H_2(SO(3, \mathbf{R}), \mathbf{R}^3)$.

¹⁾ Rappelons que $A_1 = B_1 = C_1, B_2 = C_2, A_3 = D_3$.

Pour $SU(2, \mathbb{C})$, il existe un homomorphisme $H_3(SU(2, \mathbb{C})) \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}$, construit à l'aide d'une classe de Cheeger-Simons, reliée au volume sur S^3 ([Ch S], [Ch]), dont on sait qu'il ne dépend que des points algébriques de $SU(2, \mathbb{C})$ et a, par suite, une image dénombrable; mais on ignore le rang de cette image; de plus, la question a été posée de savoir si l'application $H_3(SU(2, \bar{\mathbb{Q}})) \rightarrow H_3(SU(2, \mathbb{C}))$ est surjective, où $\bar{\mathbb{Q}}$ est la clôture algébrique de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{C}$.

Les résultats sont reliés à l'aspect « infinitésimal » de ces questions. On prend $A = \mathbb{R}$, $k = \mathbb{Q}$ et $\mathfrak{g} = \mathfrak{so}(3, \mathbb{Q})$, l'algèbre des matrices antisymétriques à coefficients rationnels qui est isomorphe à $\mathfrak{su}(2, \mathbb{Q}[\sqrt{-1}])$. Alors $\mathfrak{g}_A = \mathfrak{so}(3, \mathbb{R}) (\simeq \mathfrak{su}(2, \mathbb{C}))$.

Comme cas très particuliers des propositions 1 et 2 ci-dessus, on obtient :

i) *Il existe des isomorphismes de $\mathbb{Q}$ -espaces vectoriels*

$$H_{3, \mathbb{Q}}(\mathfrak{su}(2, \bar{\mathbb{Q}})) \xrightarrow{\sim} H_{3, \mathbb{Q}}(\mathfrak{su}(2, \mathbb{C})) \xrightarrow{\sim} \bar{\mathbb{Q}} \cap \mathbb{R}$$

où $\bar{\mathbb{Q}} \cap \mathbb{R}$ est l'ensemble des nombres algébriques réels.

ii) *Le groupe d'homologie $H_{2, \mathbb{Q}}(\mathfrak{so}(3, \mathbb{R}), \mathbb{R}^3)$ est nul.*

APPLICATIONS À L'HOMOLOGIE DES ALGÈBRES DE LACETS

Pour $\mathfrak{g}$ une algèbre simple complexe, soit $\tilde{\mathfrak{g}}$ l'algèbre de lacets ([Ka])

$$\tilde{\mathfrak{g}} = \mathbb{C}[t, t^{-1}] \otimes_{\mathbb{C}} \mathfrak{g},$$

considérée comme $\mathbb{C}$ -algèbre; on a comme conséquence facile des théorèmes 1 et 2

$$H_3(\tilde{\mathfrak{g}}) \simeq \mathbb{C},$$

$$H_2(\tilde{\mathfrak{g}}, \tilde{\mathfrak{g}}) = 0,$$

et ceci est indépendant du type de $\mathfrak{g}$.

J'ai bénéficié, pour cet article, des remarques et suggestions de J. Carmona, P. Cartier et Ch. Kassel.

2. PRÉLIMINAIRES ET ÉNONCÉ DES RÉSULTATS

On renvoie à l'article [L Q] de J. L. Loday et D. Quillen, pour la notion d'homologie cyclique d'une algèbre (voir aussi l'article de synthèse [Ca]).

On s'intéresse ici à une notion analogue, où le groupe cyclique est remplacé par le groupe diédral. Cette notion d'homologie diédrale est due à J. L. Loday ([L]), dont nous utiliserons les notations.