Zeitschrift: Bulletin de la Société Fribourgeoise des Sciences Naturelles = Bulletin

der Naturforschenden Gesellschaft Freiburg

Herausgeber: Société Fribourgeoise des Sciences Naturelles

Band: 40 (1949-1950)

Artikel: Contribution à l'étude de l'avifaune de Fribourg

Autor: Strahm, J.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-308279

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 11.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Contribution à l'étude de l'avifaune de Fribourg

par J. STRAHM

Le lac de Pérolles

Comprenant:

Le chantier à bois de Pérolles — Le sentier Schoch — La Pisciculture — Le bois de Pérolles — Le Pont de Pérolles — La forêt entre le Pont de Pérolles et La Schürra — Le Breitfeld — La forêt du Barrage — Le chemin Ritter et les étangs du lac de Pérolles.

Jusqu'à ce jour, nous ne connaissions que très peu cette magnifique région de Fribourg-Ville. Quelques brèves notes seulement avaient été communiquées à la Centrale ornithologique romande ainsi qu'aux journaux de la ville. En 1946 on constata que cette magnifique contrée commençait à changer de visage. La construction de la ligne aérienne de Hauterive, qui traverse à plusieurs endroits les forêts et le lac, a été exécutée sans tenir compte du maintien de la beauté naturelle de ce site unique aux environs immédiats de la ville. La construction de la fabrique de Pavatex, l'installation d'un chantier à gravier et goudronnage, la location des terrains par les EEF avec autorisation de construire des baraques dans les roseaux, la coupe des roseaux, le creusage des fossés pour la plantation des osiers sont venus, par la suite, nuire encore à l'aspect pittoresque des lieux.

Il est temps de faire connaître la richesse de ce coin de terre avant sa transformation totale. Une étude ornithologique plus approfondie s'imposait et les observations ont donné quelques résultats inattendus et très intéressants.

Nous espérons que cette petite étude contribuera à la création d'une réserve scolaire de Fribourg, comme cela s'est fait dans d'autres villes de la Suisse romande, particulièrement à Genève-Versoix.

Grèbe castagneux Podiceps ruficollis.

Niche dans les étangs du Breitfeld, Pérolles et Barrage. Souvent chassé par les foulques. Hiverne

sur les étangs.

Héron cendré Ardea cinerea.

Ne niche pas, les forêts ne sont pas assez tranquilles, mais toute l'année présent sur les sapins

à proximité du lac, aime le chaud.

Bihoreau Nycticorax nycticorax.

De passage rare. Observé le 24.4.48.

Blongios nain Ixobrychus minutus.

Eventuellement nicheur. Observé dans les roseaux le soir, le 25.6.49 — 2.7.49 — 24.6.50 —

15.7.50.

Cygne muet Cygnus olor.

Nicheur dans les roseaux en 1948, 1949, 1950.

Canard col-vert Anas platyrhyncha.

Niche régulièrement dans les roseaux des étangs. Aussi de passage. Forte diminution pendant la chasse dangereuse pour pêcheurs et canotiers, etc.

Sarcelle d'été Anas querquedula.

De passage au printemps dans les étangs, isolément et irrégulièrement. Observé en 1948 et 1950.

Sarcelle d'hiver Anas crecca.

De passage irrégulier et isolément dans les étangs. Observé en 1948 et 1950.

Canard siffleur Anas penelope.

De passage irrégulier et isolément. Observé en 1948.

Fuligule milouin Aythya ferina.

De passage régulier, isolément ou en petits groupes. Observé en 1947, 1948, 1949, 1950.

Fuligule morillon Aythya fuligula.

De passage régulier, mais isolément. Observé en 1948, 1949, 1950.

Harle bièvre Mergus merganser.

Nicheur régulier, hivernant et de passage.

Milan noir Milvus migrans.

Nicheur dans les forêts du Breitfeld et du Bar-

rage, mais on ne veut pas le tolérer.

Epervier Accipiter nisus.

Nicheur probable et de passage.

Buse variable Buteo buteo.

Nicheur régulier dans les forêts de La Schurra

et de passage.

Faucon pèlerin Falco peregrinus.

Observé en 1946, 1947, 1949 et 1950. Accou-

plement observé en 1950.

Faucon hobereau Falco subbuteo.

De passage au printemps et en automne.

Faucon émerillon Falco columbarius aesalon.

Observé le 1.11.1950.

Crécerelle Falco tinnunculus.

Nicheur régulier au sentier Schoch.

Faisan de chasse Phasianus colchicus.

Une observation en 1949.

Râle d'eau Rallus aquaticus.

Nicheur régulier dans les étangs, aussi hiver-

nant si les étangs restent ouverts.

Poule d'eau Gallinula chloropus.

Nicheur régulier dans les étangs et hivernant

régulier.

Foulque macroule Fulica atra.

Nicheur régulier un peu partout. Hivernant.

Courlis cendré Numenius arquata.

De passage régulier en automne.

Chevalier guignette Actitis hypoleucos.

Observé au printemps 1948 et 1949 sur un îlot en dessous de l'Asile, de passage en 1950.

Bécassine des marais Capella gallinago.

De passage.

Pigeon colombin Columba oenas.

Nicheur régulier dans les trous du rocher du Breitfeld, irrégulièrement au sentier Schoch

et Pont de Pérolles.

Pigeon ramier Columba palumbus.

Nicheur régulier dans la forêt sous La

Schurra. Fort passage en octobre.

Coucou Cuculus canorus.

De passage isolé au printemps.

Chouette hulotte Strix aluco.

Nicheur au Barrage.

Chouette chevêche Athene noctua (Carine).

Eventuellement nicheur au Barrage?

Martinet noir Micropus apus.

Colonie sous le trottoir ouest du Pont de

Pérolles.

Martinet à ventre blanc Micropus melba.

Niche isolément sous le toit du Rex à

l'avenue de Pérolles.

Martin-pêcheur Alcedo atthis ispida.

Sédentaire, vient pêcher dans les étangs

toute l'année.

Huppe Upupa epops.

Nicheur au Breitfeld en 1950.

Pic épeiche Dryobates major pinetorum.

Nicheur au Breitfeld.

Pic-vert Picus viridis.

Nicheur au Breitfeld.

Pic cendré Picus canus.

Nicheur au Pont de Pérolles.

Alouette des champs Alauda arvensis.

Niche à l'est de la Fabrique Winckler.

Hirondelle de rivage Riparia riparia.

De passage.

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica.

Colonie à l'avenue de Pérolles. De passage

dans les roseaux de Pérolles.

Hirondelle de cheminée Hirundo rustica.

De passage dans les roseaux.

Loriot jaune Oriolus oriolus.

De passage rare au printemps.

Corneille noire Corvus corone.

Nicheur un peu partout. Nombreux aux

dortoirs de Pérolles et au Breitfeld.

Corbeau freux Corvus frugilegus.

De passage et aux dortoirs de Pérolles, en

automne.

Choucas des tours Coloeus monedula spermologus.

Nicheur régulier dans les rochers du sentier

Schoch, chemin Ritter, Breitfeld.

Pie Pica pica.

Niche à La Schurra.

Geai Garrulus glandarius.

Niche entre le Pont de Pérolles et le Breit-

feld.

Mésange charbonnière Parus major.

Peu de nicheurs à la Pisciculture, Pont de

Pérolles, La Schurra, Breitfeld, Barrage.

Mésange bleue Parus caeruleus.

Niche un peu partout. Souvent dans les

roseaux.

Mésange noire Parus ater.

Observée toute l'année entre le Pont de

Pérolles et La Schurra.

Mésange huppée Parus cristatus mitratus.

Niche sous le chantier à bois de Pérolles

et entre le Pont de Pérolles et La Schurra.

Mésange nonnette Parus palustris communis.

Niche sous le chantier à bois de Pérolles

et un peu partout dans les forêts.

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus europaeus.

Niche relativement peu. Vis-à-vis du sentier Schoch, Breitfeld et chemin Ritter.

Augmente en hiver.

Sittelle torchepot Sitta europea.

Niche au sentier Schoch, Pont de Pérolles,

Breitfeld.

Grimpereau familier Certhia familiaris.

A observer en hiver.

Observation des oiseaux

Mois	1X.	. 49		2	X. 49				XI	. 49			2	XII. 4	9		1.50				
Jour	18	24	1	8	19	27	30	5	12	20	26	3	10	17	24	31	8	14	29		
Temps	c		c		b	c	c	b	pl	pl	c	c	c	pl	c	c	b	b	b		
Vent	c		e		f	0	С	lb	f	0	c	c	c	f	c	lb	c	c	lb		
Parcours	A	В	A	В	A	A	В	A	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB		
Grèbe castagneux	4	4	12	4	7	5	5	11	11	13	10	10	6	3	7	7	6	5	2		
Héron cendré	9	1	6	7	6	3	2	4	1	4	3	2	3	1	2	4	2	4	1		
Butor blongios nain																					
Canard col-vert	21	8	10	1	20	3		2	6	2	4	40	20	30	2	7	5	~	9		
Cygne	6	6	7		7	6	6	6	8	6	6	7	7	7	7	7	7	7	6		
Sarcelle d'hiver									0												
Sarcelle d'été																					
Canard siffleur																	1	1			
Fuligule milouin									2	1	1	1	1					1	9		
Fuligule morillon																1		1	1		
Harle bièvre								1					2		2	1		1			
Buse ordinaire						1	1					1		1	1	1	1	1	1		
Milan noir							-														
Epervier							1									M					
Faucon pèlerin				-2/3	1		2	1				1									
Faucon hobereau		1		1										ļ							
Faucon émerillon				~															1		
Faucon crécerelle	1	1	1	2	1			2											0		
Faisan à collier						1									100		١.		-		
Râle d'eau	2	1	1	1	1	1	2	3	1	1	2	2	3		1		1		1		
Poule d'eau	4	3	6		4	3	1	6	6	9	9	11	14	9	9	13	13	8	5		
Foulque	20	20	58	10	30	26	24	58	59	74	73	73	78	71	78	76	66	70	87		
Courlis cendré										1			27								
Chevalier guignette																					
Bécassine des marais																					
Pigeon colombin				90	10	-															
Pigeon ramier	6		8	20	12	1															
Coucou					-			,				١,									
Chouette hulotte					1			1				1									
Chouette chevêche																					
Martinet	40	55															- 1				
The second secon	10000000	1	1	1	2		2	1		1		3			1		1	1	1		
Martin-pêcheur		1	1	1	4		ت ا	1		1		0			1		1	1	1		
Huppe			1	1	1	1				1			1	1	1.		82		1		
Pic épeiche		1	$\frac{1}{2}$	1	1	1	1	2	1	1	1		2	1	2		1	2	1		
Pic cendré	1	1	4	1	1		1	4	1		2		4				1		1		
Alouette											4						1				
Hirondelle de fenêtre																					
Hirondelle de cheminée																					
Loriot																					
Corneille	40	40	168	30	150	150	150	200	150	250	250	300	250	250	250	250	150	200	150		
Freux		10	100	50	100	300	100		30	200	200	000	200	200	200	200	100	200	150		
Choucas	40	25	24	20	150	150	150	80	50	50	80	80	80	80	80	90	80	80	70		
Pie		20		20	1	1	100	5	4	2		4	3	1	2	1		1			
Geai	500000000	1	9	3		6	5		5	4			8	1	5		3	2	2		
		_	"		0					1					0		١ ٚ	-	-		
	1					I		<u> </u>		1					1	1			1		

b = beau, c = couvert, pl = pluie, v = variable; c = calme, lb = légère bise, f = föhn, o = ouest. A = Pérolles - Breitfeld - Barrage - Ch. Ritter. B = Pérolles - Ch. Schoch - Pisciculture - Pérolles.

du lac de Pérolles-Fribourg 1949-1950

	II.	50			III	. 50			I	∇. 50				V. 50		,	VI. 50)	7	7II. 5	0	VIII	IX.	50
5 c c AB	11 pl f AB	19 b c B	25 c c AB	4 b lb B	12 v o AB	18 b c AB	25 b lb AB	1 c b AB	9 b f AB	15 pl c AB	22 pl o AB	29 b f AB	6 b lb AB	13 b b AB	27 v o AB	8 b c AB	17 o o AB	24 b c AB	5 b o AB	15 b lb AB	30 b c AB	12 c b AB	10 b f B	16 v o AB
1 1	$\begin{array}{ c c c } 4 \\ 2 \end{array}$	$\frac{1}{4}$	3 5	3	4		1	$\frac{4}{2}$	1 1	4	2 3	5	1 3	2 3	1	$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$	8	5	$\begin{vmatrix} 1 \\ 8 \end{vmatrix}$	6	1 3	2 13	2 18	3 8
9 7	15 7	6	4 7	1 7	12 6	3 7 1 1	1 6	3 7	2 7	5 3	5 7	5 7	4 7	5 7	8 8	5 4	4 4	1	8 3	$\begin{bmatrix} 1\\3\\4 \end{bmatrix}$	9	7 4	3	8 4
6 1 2 1	3 1 2 1	1 1 2	3 1 1	2	1 1	1 1 2	3 4 1	1 1 3	1	3	1 1	1	9 2 1	1 1	1 1 1	1 1	10	10	10 1 1	1 1		2		1
			1		2	2	2	2			1		$\frac{1}{2}$	1	1	1			1	1		1	1	
									1	1	2		1	1	1	2	1	1	1	1	5	3	1	1
1 1 63	1 7 78	$\begin{bmatrix} 2\\6\\72 \end{bmatrix}$	6 43	28	1 5 67	2 6 57	2 5 39	3 5 40	$\begin{bmatrix} 2\\2\\40 \end{bmatrix}$	3 2 26	2 3 31	2 2 20	2 2 19	2 4 16	17	1 1 15	1 16	1 21	1 29	29	2 1 32	1 2 56 1	1 2 57	2 51
					1 14	1 5	5 5	2 3	2 2	11	1	6	3	5	1 4	3 1 1	3 6	1 6	3 2	$\begin{vmatrix} 1 \\ 4 \end{vmatrix}$	4 1	2	2	30
															6	30	1	20	3					
1				1	2				3					1		1	1			1	1	1	1	1
1		1	2	1	1	1	1	1 1 1	1	1	3	$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$	1 1 2	2	1 1 1	1	1	1	1	2	1 4 1	2	2	3
												3					6	~	50	~	80	12 50	~	~
100	100	200	150			100		150			60	120				1	50	80	100		150	250		
80 1 5	70 3 3	90	80	2	33 5 13	30 3 2	1 2	$\frac{1}{2}$	3	3	30 12	30 5	35 6	1	26	5 1 3	120	1	200 1 2	$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$	4 1 3	150 3	1	$\frac{2}{1}$

Vents soulignés = étangs gelés. Temps souligné = terrain enneigé. Heures d'observations : 13-19 h. \sim = plusieurs, \times = la plupart des pipits farlouses = voir Pipit spioncelle, second tableau.

Mois	IX	. 49		2	X. 49				XI	. 49			2	XII. 4	.9				
Jour	18	24	1	8	19	27	30	5	12	20	26	3	10	17	24	31	8	14	29
Temps	c		е		b	c	c	b	pl	pl	c	c	c	pl	c	c	b	b	b
Vent	c		c		f	0	c	lb	f	0	c	c	С	f	c	lb	c	c	lb
Parcours	A	В	A	В	A	A	В	A	AB	AB	AB	AB	AB						
Mésange charbonnière	3		4	2	2	3	3	5	5	9	2	2	1	6	2	1	5	2	1
Mésange bleue	4			6	1	2	2	1	1	3	1	3	2	4	2	5	2	2	2
Mésange noire	1		3					2		2				2					
Mésange huppée	1		1		1			2	1	2	1	2	1	3				1	2
Mésange nonnette	1		1	1	1	4	2	6	3	5	5	6	3	1	2	1	3	4	4
vols = v Mésange à longue queue .				12	v 3	v 3	v 2	$\frac{v}{2}$	v 5	v 5	v 4	v 1	v 3	v 2	v 1		v 1	v 1	v 1
Sittelle	2		1	12	1	2	3	1	2	2	4	2	6	1	1		2	2	1
Grimpereau familier	1		1		2	_		1	1	2	1	l ī	1	4	1		1	_	1
Grimpereau brachydactyle	- 22		1		_					_		-							
Tichodrome échelette									1	2				1					
Cincle aquatique											1								
Troglodyte	2	1	2	3	1	7	5	1	6	7	8	6	6	3	4	8	5	2	3
Rouge-queue muraille																			
Rouge-queue noir	2	1	4	1				_			_					_		_	
Rouge-gorge	2		2	1	1	5		3	3	3	1	2	2		1	3	1	1	1
Grive draine	-					1													
Grive chanteuse Merle	$\frac{1}{4}$	1	1	2	5	$\begin{array}{ c c c }\hline 4\\ 7 \end{array}$	2	16	9	6	7	6	11	8	9	3	6	4	4
Rousserolle effarvate	3	1	1	2	9	•	4	10	ð	0	•	0	1.1	O	0	0	0	-	4
Fauvette des jardins	J																		
Fauvette à tête noire																			
Fauvette grisette																			
Pouillot véloce	2		2																
Pouillot fitis																			
Pouillot bonelli																			
Pouillot siffleur						_	1					_	_		_		_		_
Roitelet huppé	2				~	2	9	3	3	4	~	7	2	3	2		5	3	2
Roitelet triple bandeau Gobe-mouches gris	4		~				2												
Gobe-mouches becfigue.																			
Mouchet chanteur												2	2	1					1
Pipit des buissons	6						×					_	_	1					
Pipit spioncelle				3	11	1	100	~	~	2	2	2	4	2	4	4	4	2	3
Bergeronnette printanière.	3																		
Bergeronnette des ruisseaux			1			1	1	1		1	2		1	2	1	1	1	1	
Bergeronnette grise	10	20	152	~	22	~	50	~	4	1	4								
Etourneau	500	2000	~	3000	~	~	550	80											
Moineau domestique	40		20							~								2	2
Moineau friquet			10		2			50	10				1	10			4	1	1
Pinson	4		3	3		6	7	50	12	17	2	2	2	1	3	2	2	15	28
Pinson du nord					3														1
Gros-bec										16.									
Verdier	7				6		3	3											16
Tarin	١ '				0	13	5	~			~								10
Linotte						10	9												1
Serin			4				4												
Bouvreuil	2					1	3	3		5	10	14	3	4	3		2	3	2
Bruant jaune					2			3	1									2	
Bruant des roseaux																			
	l											l							

	II. 50			III. 50					IV. 50 V. 50 VI							VI. 50) '	VII. 50			VIII	IX	. 50	
5	11	19	25	4	12	18	25	1	9	15	22	29	6	13	27	8	17	24	5	15	30	12	10	16
c	$rac{ ext{pl}}{ ext{f}}$	b c	c c	b lb	v o	b c	b lb	c b	b f	pl c	pl o	b f	b lb	b b	v 0	b c	0	b c	b o	b lb	b c	c b	b f	v o
$\frac{c}{AB}$	AB	В	AB	В	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	В	AB
6	2	1	12	1	12	3	4	8	3	6	9	4	1	3	4	9	5	4	4		11	1		2
4	1	$\frac{1}{2}$	4	1	2	3	$\frac{4}{4}$	1	1		3	$\frac{4}{5}$	$\begin{array}{ c c c }\hline 4 \\ 6 \end{array}$	3	4	3	2	4	4	3	11 2	$\frac{1}{2}$		~
2	1		1				1	1	3	8	1	5 2		1			1	1			2			2
5	3	2	6	2	2	7	6	5	2	2	6	9	5	2	1		2	2	1	2	1	2	2	3
	v 1	v 1	3		$\frac{2}{2}$	8	12	6	4	4	6	2 2	2 3					v 1	v 1	1		v 1		0
4	1		3	1	2	2	3	4	2	1	1	2	3	2	2	4	1	1			2			2
1	1		1	$\frac{2}{2}$		2	1	1				1			1						1			
	1																							
2	2	1	3	- 2	3	5	3	4	2	3	6	3	4	5	$\begin{vmatrix} 4\\1 \end{vmatrix}$	10	3	$\frac{2}{2}$	$\begin{vmatrix} 8 \\ 2 \end{vmatrix}$	2	8	3		3
1		1			3	4	$\frac{4}{2}$	5 13	5 2	$\begin{vmatrix} 4\\10 \end{vmatrix}$	3 12	$\begin{array}{c} 1 \\ 12 \end{array}$	4 13	3	4 7	5 5	$\frac{7}{6}$	$\frac{4}{2}$	$\frac{1}{3}$	3 5	3 5	6 5	3	5 7
1		1			1	4	2	2		10	14	12	10	0	•	0	0	4	ľ	0	0	0	1	•
2	4	4	6	1	1 10	5	4	6	2	8	8	8	11	7	6	4	13	15	16	18	6	2	1	6
													5 1	10 1	9	10 3	7 3	7 1	9	16 2	8	5		1
									1		2	4	4	4	3	5	3	3	3	3	3	2	1	
						10	7	12	6	7	7	9	11	12	7	1 11	10	8	12	5	7	7	1	3
									1	4	7	9	$\frac{4}{4}$	12 3	5 6	$\frac{4}{6}$	4 4	$\frac{1}{2}$	2	2	$\frac{2}{1}$			
	_						_					4	5	3	7	6	4	2	_	_	_			
2	2	1	3	1		5	2	3	2	2	$\frac{1}{2}$	3	1	$\frac{2}{2}$	1 3	$\begin{array}{ c c }\hline 1\\ 2 \end{array}$	1	1 1	2	1	2	2		2
																	1						1	2
																		ś						-
$\frac{\times}{40}$	5	~	~		1	1																		
1			3				2			1			1										1	4
		~	2 500		1	4	5	~	2	~	~	~	2	5	2	6	3	~	~	~	24	80		~
20	12	240	500 10		~	1500	~ 10	1500 9	~ 12	2	~ 1	~	~ 3	~ 1	2	2	350	~ 1	$0 \\ 2$	0 10	0 6	0 6	~	~
																	7 6					0		
	1		6	2	2	2	2	5	3	10	2	4	3	5	9	6	4	6	6	3	7			1
						6	~						2											
										16 5				2	2		2			1	1	1		
5										5		2	1	3	1	2	2		1	2		2		
7		2	9		9	5		9		2			VANCE	1		1	19.50	1	6)	$\frac{2}{1}$	1	4	10	
•		4	2		2	1		2 3		Δ	$\frac{2}{1}$					1	1	1	1	1	1	1		
			}			2					1													

Grimpereau brachydactyle Certhia brachydactyla.

Niche au Breitfeld.

Tichodrome échelette

Tichodroma muraria.

A observer chaque hiver au Pont de Pérolles, aussi vu au sentier Schoch et au

Barrage.

Cincle plongeur

Cinclus cinclus.

Observé en hiver dans la Sarine, au Pont

de Pérolles.

Troglodyte

Troglodytes troglodytes.

Niche au sentier Schoch, Pont de Pérolles, entre Pont de Pérolles et La Schurra,

forêt, Barrage et chemin Ritter.

Rouge-queue de muraille Phoenicurus phoenicurus.

Peu à voir, a niché au Pont de Pérolles.

Rouge-queue noir

Phoenicurus ochruros gibraltariensis.

Niche à Pérolles, chantier bois, Pont de

Pérolles, La Schurra.

Rouge-gorge

Erithacus rubecula.

Niche un peu partout, augmentation au

printemps.

Grive draine

Turdus viscivorus.

Observé un couple à La Schurra au prin-

temps 1950.

Grive chanteuse

Turdus ericetorum philomelos.

De passage seulement.

Merle noir

Turdus merula.

Niche un peu partout dans les forêts avec

sous-bois.

Rousserolle effarvate

Acrocephalus scirpaceus.

Nicheur dans tous les roseaux du lac.

Fauvette des jardins

Svlvia borin.

Niche sous le chantier à bois de Pérolles.

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla.

Niche au sentier Schoch, Pont de Pérolles,

La Schurra, Breitfeld, chemin Ritter.

Fauvette grisette

Sylvia communis.

De passage isolément, à entendre au prin-

temps.

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita.

Niche un peu partout autour du lac.

Pouillot fitis

Phylloscopus trochilus fitis.

Moins fréquent que le pouillot véloce.

Pouillot bonelli

Phylloscopus bonelli.

Niche au Pont de Pérolles et vis-à-vis de

la Pisciculture.

Pouillot siffleur

Phylloscopus sibilatrix.

Niche sous le chantier à bois de Pérolles, au Pont de Pérolles, entre le Pont de Pérolles et La Schurra, chemin Ritter, tou-

jours dans les forêts de hêtres.

Roitelet huppé

Regulus regulus.

Observé de janvier à juin.

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapillus.

Niche entre le Pont de Pérolles et La

Schurra et au Barrage.

Gobe-mouches gris

Muscicapa striata.

De passage isolé.

Gobe-mouches noir

Ficedula hypoleuca.

De passage, observé à Pérolles, manque

nichoirs.

Mouchet chanteur

Prunella modularis.

Hivernant, observé à la Pisciculture.

Pipit farlouse

Anthus pratensis.

De passage dans les dortoirs des roseaux.

Pipit des arbres

Anthus trivialis.

De passage.

Pipit spioncelle

Anthus spinoletta.

Hivernant et de passage dans les roseaux

aux dortoirs.

Bergeronnette printanière Motacilla flava.

De passage aux dortoirs des roseaux.

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea.

Doit nicher au Barrage.

Bergeronnette grise Motacilla alba.

Niche au chantier à bois de Pérolles et de

passage dans les roseaux.

Etourneau Sturnus vulgaris.

Niche au Breitfeld. Fort passage dans les

dortoirs des roseaux. Absent en juillet et août

aux dortoirs.

Moineau domestique Passer domesticus.

Niche à Pérolles et fabrique Winckler.

Moineau friquet Passer montanus.

De passage et hivernant.

Pinson Fringilla coelebs.

Niche peu dans les forêts, vis-à-vis de la Pisci-

culture, Pérolles et Breitfeld.

Pinson du nord Fringilla montifringilla.

Hivernant isolé, nombreux par invasion dans

les hêtres.

Gros-bec Coccothraustes coccothraustes.

Observé vis-à-vis de Pérolles dans forêt de

hêtres de mars en mai.

Verdier Chloris chloris.

Peu à voir.

Chardonneret Carduelis carduelis.

Peu à observer, aussi en hiver.

Linotte Carduelis cannabina.

Observé d'avril à août autour du Pont de

Pérolles.

Tarin Carduelis spinus.

Hivernant autour de l'eau dans les vernes.

Serin Serinus canaria serinus.

Niche à Pérolles.

Bouvreuil Pyrrhula pyrrhula europaea.

Observé de septembre à avril.

Bruant jaune Emberiza citrinella.

Niche à la fabrique Winckler et au Breitfeld.

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus.

De passage isolé dans les roseaux.