

Zeitschrift: Bulletin de la Société Fribourgeoise des Sciences Naturelles = Bulletin der Naturforschenden Gesellschaft Freiburg

Herausgeber: Société Fribourgeoise des Sciences Naturelles

Band: 40 (1949-1950)

Artikel: Contribution à l'étude de l'avifaune de Fribourg

Autor: Strahm, J.

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-308279>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 28.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Contribution à l'étude de l'avifaune de Fribourg

par J. STRAHM

Le lac de Pérrolles

Comprenant :

Le chantier à bois de Pérrolles — Le sentier Schoch — La Pisciculture — Le bois de Pérrolles — Le Pont de Pérrolles — La forêt entre le Pont de Pérrolles et La Schürra — Le Breitfeld — La forêt du Barrage — Le chemin Ritter et les étangs du lac de Pérrolles.

Jusqu'à ce jour, nous ne connaissons que très peu cette magnifique région de Fribourg-Ville. Quelques brèves notes seulement avaient été communiquées à la Centrale ornithologique romande ainsi qu'aux journaux de la ville. En 1946 on constata que cette magnifique contrée commençait à changer de visage. La construction de la ligne aérienne de Hauterive, qui traverse à plusieurs endroits les forêts et le lac, a été exécutée sans tenir compte du maintien de la beauté naturelle de ce site unique aux environs immédiats de la ville. La construction de la fabrique de Pavatex, l'installation d'un chantier à gravier et goudronnage, la location des terrains par les EEF avec autorisation de construire des baraques dans les roseaux, la coupe des roseaux, le creusage des fossés pour la plantation des osiers sont venus, par la suite, nuire encore à l'aspect pittoresque des lieux.

Il est temps de faire connaître la richesse de ce coin de terre avant sa transformation totale. Une étude ornithologique plus approfondie s'imposait et les observations ont donné quelques résultats inattendus et très intéressants.

Nous espérons que cette petite étude contribuera à la création d'une réserve scolaire de Fribourg, comme cela s'est fait dans d'autres villes de la Suisse romande, particulièrement à Genève-Versoix.

Grèbe castagneux	<i>Podiceps ruficollis.</i> Niche dans les étangs du Breitfeld, Pérrolles et Barrage. Souvent chassé par les foulques. Hiverne sur les étangs.
Héron cendré	<i>Ardea cinerea.</i> Ne niche pas, les forêts ne sont pas assez tranquilles, mais toute l'année présent sur les sapins à proximité du lac, aime le chaud.
Bihoreau	<i>Nycticorax nycticorax.</i> De passage rare. Observé le 24.4.48.
Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus.</i> Eventuellement nicheur. Observé dans les roseaux le soir, le 25.6.49 — 2.7.49 — 24.6.50 — 15.7.50.
Cygne muet	<i>Cygnus olor.</i> Nicheur dans les roseaux en 1948, 1949, 1950.
Canard col-vert	<i>Anas platyrhyncha.</i> Niche régulièrement dans les roseaux des étangs. Aussi de passage. Forte diminution pendant la chasse dangereuse pour pêcheurs et canotiers, etc.
Sarcelle d'été	<i>Anas querquedula.</i> De passage au printemps dans les étangs, isolément et irrégulièrement. Observé en 1948 et 1950.
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca.</i> De passage irrégulier et isolément dans les étangs. Observé en 1948 et 1950.
Canard siffleur	<i>Anas penelope.</i> De passage irrégulier et isolément. Observé en 1948.
Fuligule milouin	<i>Aythya ferina.</i> De passage régulier, isolément ou en petits groupes. Observé en 1947, 1948, 1949, 1950.
Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula.</i> De passage régulier, mais isolément. Observé en 1948, 1949, 1950.
Harle bièvre	<i>Mergus merganser.</i> Nicheur régulier, hivernant et de passage.

Milan noir	<i>Milvus migrans.</i> Nicheur dans les forêts du Breitfeld et du Barrage, mais on ne veut pas le tolérer.
Epervier	<i>Accipiter nisus.</i> Nicheur probable et de passage.
Buse variable	<i>Buteo buteo.</i> Nicheur régulier dans les forêts de La Schurra et de passage.
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus.</i> Observé en 1946, 1947, 1949 et 1950. Accouplement observé en 1950.
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo.</i> De passage au printemps et en automne.
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius aesalon.</i> Observé le 1.11.1950.
Crécerelle	<i>Falco tinnunculus.</i> Nicheur régulier au sentier Schoch.
Faisan de chasse	<i>Phasianus colchicus.</i> Une observation en 1949.
Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus.</i> Nicheur régulier dans les étangs, aussi hivernant si les étangs restent ouverts.
Poule d'eau	<i>Gallinula chloropus.</i> Nicheur régulier dans les étangs et hivernant régulier.
Foulque macroule	<i>Fulica atra.</i> Nicheur régulier un peu partout. Hivernant.
Courlis cendré	<i>Numenius arquata.</i> De passage régulier en automne.
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucus.</i> Observé au printemps 1948 et 1949 sur un îlot en dessous de l'Asile, de passage en 1950.
Bécassine des marais	<i>Capella gallinago.</i> De passage.
Pigeon colombin	<i>Columba oenas.</i> Nicheur régulier dans les trous du rocher du Breitfeld, irrégulièrement au sentier Schoch et Pont de Pérrolles.

Pigeon ramier	<i>Columba palumbus.</i> Nicheur régulier dans la forêt sous La Schurra. Fort passage en octobre.
Coucou	<i>Cuculus canorus.</i> De passage isolé au printemps.
Chouette hulotte	<i>Strix aluco.</i> Nicheur au Barrage.
Chouette chevêche	<i>Athene noctua</i> (Carine). Eventuellement nicheur au Barrage ?
Martinet noir	<i>Micropterus apus.</i> Colonie sous le trottoir ouest du Pont de Pérrolles.
Martinet à ventre blanc	<i>Micropterus melba.</i> Niche isolément sous le toit du Rex à l'avenue de Pérrolles.
Martin-pêcheur	<i>Alcedo atthis isspida.</i> Sédentaire, vient pêcher dans les étangs toute l'année.
Huppe	<i>Upupa epops.</i> Nicheur au Breitfeld en 1950.
Pic épeiche	<i>Dryobates major pinetorum.</i> Nicheur au Breitfeld.
Pic-vert	<i>Picus viridis.</i> Nicheur au Breitfeld.
Pic cendré	<i>Picus canus.</i> Nicheur au Pont de Pérrolles.
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis.</i> Niche à l'est de la Fabrique Winckler.
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia.</i> De passage.
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbica.</i> Colonie à l'avenue de Pérrolles. De passage dans les roseaux de Pérrolles.
Hirondelle de cheminée	<i>Hirundo rustica.</i> De passage dans les roseaux.
Loriot jaune	<i>Oriolus oriolus.</i> De passage rare au printemps.

Corneille noire	<i>Corvus corone.</i> Nicheur un peu partout. Nombreux aux dortoirs de Pérrolles et au Breitfeld.
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus.</i> De passage et aux dortoirs de Pérrolles, en automne.
Choucas des tours	<i>Coloeus monedula spermologus.</i> Nicheur régulier dans les rochers du sentier Schoch, chemin Ritter, Breitfeld.
Pie	<i>Pica pica.</i> Niche à La Schurra.
Geai	<i>Garrulus glandarius.</i> Niche entre le Pont de Pérrolles et le Breitfeld.
Mésange charbonnière	<i>Parus major.</i> Peu de nicheurs à la Pisciculture, Pont de Pérrolles, La Schurra, Breitfeld, Barrage.
Mésange bleue	<i>Parus caeruleus.</i> Niche un peu partout. Souvent dans les roseaux.
Mésange noire	<i>Parus ater.</i> Observée toute l'année entre le Pont de Pérrolles et La Schurra.
Mésange huppée	<i>Parus cristatus mitratus.</i> Niche sous le chantier à bois de Pérrolles et entre le Pont de Pérrolles et La Schurra.
Mésange nonnette	<i>Parus palustris communis.</i> Niche sous le chantier à bois de Pérrolles et un peu partout dans les forêts.
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus europaeus.</i> Niche relativement peu. Vis-à-vis du sentier Schoch, Breitfeld et chemin Ritter. Augmente en hiver.
Sittelle torchepot	<i>Sitta europea.</i> Niche au sentier Schoch, Pont de Pérrolles, Breitfeld.
Grimpereau familier	<i>Certhia familiaris.</i> A observer en hiver.

Observation des oiseaux

Mois	IX. 49		X. 49					XI. 49				XII. 49					I. 50			
	Jour	18	24	1	8	19	27	30	5	12	20	26	3	10	17	24	31	8	14	29
Temps	c		c		b	c	c	b	pl	pl	c	c	c	pl	c	c	b	b	b	
Vent	c		c		f	o	c	lb	f	o	c	c	c	f	c	c	lb	c	c	lb
Parcours	A	B	A	B	A	A	B	A	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB
Grèbe castagneux	4	4	12	4	7	5	5	11	11	13	10	10	6	3	7	7	6	5	2	
Héron cendré	9	1	6	7	6	3	2	4	1	4	3	2	3	1	2	4	2	4	1	
Butor blongios nain																				
Canard col-vert	21	8	10	1	20	3		2	6	2	4	40	20	30	2	7	5	~	9	
Cygne	6	6	7		7	6	6	6	8	6	6	7	7	7	7	7	7	7	6	
Sarcelle d'hiver																				
Sarcelle d'été																				
Canard siffleur																	1	1		
Fuligule milouin													2	1	1	1		1	1	9
Fuligule morillon													1					1	1	1
Harle bièvre															2		2	1	1	
Buse ordinaire														1		1	1	1	1	1
Milan noir																				
Epervier													1							
Faucon pèlerin													2							
Faucon hobereau		1			1								1							
Faucon émerillon																				1
Faucon crècerelle	1	1	1	2	1								2							
Faisan à collier						1														
Râle d'eau	2	1	1	1	1	1	2	3	1	1	2	2	3		1		1	1	1	1
Poule d'eau	4	3	6		4	3	1	6	6	9	9	11	14	9	9	13	13	13	8	5
Foulque	20	20	58	10	30	26	24	58	59	74	73	73	78	71	78	76	66	70	87	
Courlis cendré																				
Chevalier guignette																				
Bécassine des marais . . .																				
Pigeon colombin																				
Pigeon ramier	6			8	20	12	1													
Coucou																				
Chouette hulotte							1						1				1			
Chouette chevêche																				
Martinet																				
Martinet à ventre blanc .	40	55																		
Martin-pêcheur	2	1	1	1	2			2	1		1						1	1	1	1
Huppe																				
Pic épeiche			1	1	1	1	1						1			1	1	1	1	1
Pic-vert	1	1	2	1	1			1	2	1			1			2	1	2	1	2
Pic cendré													2							
Alouette																				
Hirondelle de fenêtre . . .																				
Hirondelle de cheminée . .																				
Loriot																				
Corneille	40	40	168	30	150	150	150	200	150	250	250	300	250	250	250	250	150	200	150	
Freux								300		30										
Choucas	40	25	24	20	150	150	150	80	50	50	80	80	80	80	80	90	80	80	70	
Pie								1	1	5	4	2	3	4	3	1	2	1	1	
Geai	5	1	9	3	5	6	5	10	5	4	3	5	8		5		3	2	2	

b = beau, c = couvert, pl = pluie, v = variable ; c = calme, lb = légère bise, f = fôhn, o = ouest.
A = Pérrolles — Breitfeld — Barrage — Ch. Ritter. B = Pérrolles — Ch. Schoch — Pisciculture — Pérrolles.

du lac de Pérrolles-Fribourg 1949-1950

II. 50				III. 50				IV. 50				V. 50			VI. 50			VII. 50			VIII	IX. 50				
5	11	19	25	4	12	18	25	1	9	15	22	29	6	13	27	8	17	24	5	15	30	12	10	16		
e	pl	b	c	b	v	b	b	e	b	pl	pl	b	b	b	v	b	o	b	b	b	c	e	b	f		
c	f	c	c	lb	o	c	lb	b	f	c	o	f	lb	b	o	c	o	c	o	lb	c	b	f	o		
AB	AB	B	AB	B	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB		
1	4	1	3	3	4			1	4	1	4	2	5	1	2	1	2	8	5	1	1	1	2	2	3	
1	2	4	5	3	1			2	1	3	1	3	3	3	3	8	1	6	1	3	13	18	8			
9	15	~	4	1	12	3	1	3	2	5	5	5	4	5	8	5	4	1	8	3	9	7	3	8		
7	7	6	7	7	6	7	6	7	7	3	7	7	7	7	8	4	4	1	3	4	1	4	3	4		
					1			1	1																	
6	3	1	3	2	1			1		1																
1	1	1	1	1	1			1		1																
2	2	2	1					1		3		1	1	1	1	1	1	1	10	10	10					
1	1				2			2		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2		1	
					2	2	2	2		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					1					1	1	2		1	1	1	2	1	1	1	1	1	5	3	1	
1	1	2		1	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	
1	7	6	6	5	6	5	5	5	2	2	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	
63	78	72	43	28	67	57	39	40	40	26	31	20	19	16	17	15	16	21	29	29	32	56	57	51		
					1																	1		1		
					1																					
					14	5	5	3	2	11	1	6	3	5	1	3	3	1	3	2	4	1	2	30	30	
1								3																		
1						1	2																			
						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
						2																				
100	100	200	150		100		150			60	120								50	80	100		150	250		
80	70	90	80	33	30	1	1	30	30	35		26	5	120		200	1	4	150							
1	3		1	2	5	3	1	1	3	3	12	5	6	1	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1	2	
5	3			13	2	2	2	3	3	12	5	6	1	1	3	1	1	2	2	3	3	3	1	1		

Vents soulignés = étangs gelés. Temps souligné = terrain enneigé. Heures d'observations : 13-19 h.
 ~ = plusieurs, × = la plupart des pipits farlouses = voir Pipit spioncelle, second tableau.

Grimpereau brachydactyle	<i>Certhia brachydactyla.</i> Niche au Breitfeld.
Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria.</i> A observer chaque hiver au Pont de Pérrolles, aussi vu au sentier Schoch et au Barrage.
Cincale plongeur	<i>Cinclus cinclus.</i> Observé en hiver dans la Sarine, au Pont de Pérrolles.
Troglodyte	<i>Troglodytes troglodytes.</i> Niche au sentier Schoch, Pont de Pérrolles, entre Pont de Pérrolles et La Schurra, forêt, Barrage et chemin Ritter.
Rouge-queue de muraille	<i>Phoenicurus phoenicurus.</i> Peu à voir, a niché au Pont de Pérrolles.
Rouge-queue noir	<i>Phoenicurus ochruros gibraltariensis.</i> Niche à Pérrolles, chantier bois, Pont de Pérrolles, La Schurra.
Rouge-gorge	<i>Erithacus rubecula.</i> Niche un peu partout, augmentation au printemps.
Grive draine	<i>Turdus viscivorus.</i> Observé un couple à La Schurra au printemps 1950.
Grive chanteuse	<i>Turdus ericetorum philomelos.</i> De passage seulement.
Merle noir	<i>Turdus merula.</i> Niche un peu partout dans les forêts avec sous-bois.
Rousserolle effarvate	<i>Acrocephalus scirpaceus.</i> Nicheur dans tous les roseaux du lac.
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin.</i> Niche sous le chantier à bois de Pérrolles.
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla.</i> Niche au sentier Schoch, Pont de Pérrolles, La Schurra, Breitfeld, chemin Ritter.

Fauvette grisette	<i>Sylvia communis.</i> De passage isolément, à entendre au printemps.
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita.</i> Niche un peu partout autour du lac.
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus fitis.</i> Moins fréquent que le pouillot véloce.
Pouillot bonelli	<i>Phylloscopus bonelli.</i> Niche au Pont de Pérrolles et vis-à-vis de la Pisciculture.
Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix.</i> Niche sous le chantier à bois de Pérrolles, au Pont de Pérrolles, entre le Pont de Pérrolles et La Schurra, chemin Ritter, toujours dans les forêts de hêtres.
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus.</i> Observé de janvier à juin.
Roitelet à triple bandeaу	<i>Regulus ignicapillus.</i> Niche entre le Pont de Pérrolles et La Schurra et au Barrage.
Gobe-mouches gris	<i>Muscicapa striata.</i> De passage isolé.
Gobe-mouches noir	<i>Ficedula hypoleuca.</i> De passage, observé à Pérrolles, manque nichoirs.
Mouchet chanteur	<i>Prunella modularis.</i> Hivernant, observé à la Pisciculture.
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis.</i> De passage dans les dortoirs des roseaux.
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis.</i> De passage.
Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta.</i> Hivernant et de passage dans les roseaux aux dortoirs.
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava.</i> De passage aux dortoirs des roseaux.
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea.</i> Doit nicher au Barrage.

Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba.</i> Niche au chantier à bois de Pérrolles et de passage dans les roseaux.
Etourneau	<i>Sturnus vulgaris.</i> Niche au Breitfeld. Fort passage dans les dortoirs des roseaux. Absent en juillet et août aux dortoirs.
Moineau domestique	<i>Passer domesticus.</i> Niche à Pérrolles et fabrique Winckler.
Moineau friquet	<i>Passer montanus.</i> De passage et hivernant.
Pinson	<i>Fringilla coelebs.</i> Niche peu dans les forêts, vis-à-vis de la Pisciculture, Pérrolles et Breitfeld.
Pinson du nord	<i>Fringilla montifringilla.</i> Hivernant isolé, nombreux par invasion dans les hêtres.
Gros-bec	<i>Coccothraustes coccothraustes.</i> Observé vis-à-vis de Pérrolles dans forêt de hêtres de mars en mai.
Verdier	<i>Chloris chloris.</i> Peu à voir.
Chardonneret	<i>Carduelis carduelis.</i> Peu à observer, aussi en hiver.
Linotte	<i>Carduelis cannabina.</i> Observé d'avril à août autour du Pont de Pérrolles.
Tarin	<i>Carduelis spinus.</i> Hivernant autour de l'eau dans les vernes.
Serin	<i>Serinus canaria serinus.</i> Niche à Pérrolles.
Bouvreuil	<i>Pyrrhula pyrrhula europaea.</i> Observé de septembre à avril.
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella.</i> Niche à la fabrique Winckler et au Breitfeld.
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus.</i> De passage isolé dans les roseaux.