Zeitschrift: Bulletin de la Société Fribourgeoise des Sciences Naturelles = Bulletin

der Naturforschenden Gesellschaft Freiburg

Herausgeber: Société Fribourgeoise des Sciences Naturelles

Band: 66 (1977)

Heft: 1

Artikel: La végétation du Vanil Noir et du Vallon des Morteys : Préalpes de la

Suisse occidentale

Autor: Richard, Jean-Louis / Bourgnon, Roland / Strub, Daniel

Kapitel: 6: Les associations végétales et leurs milieux

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-308543

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 14.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

6. Les associations végétales et leurs milieux

6.1. Forêts, prairies, pâturages et pelouses des versants ensoleillés

6.1.1. L'érablaie à alisier (Sorbo-Aceretum, Tableau No 1) est rare dans la région, car les versants chauds furent déboisés beaucoup plus largement que les versants frais pour faire place aux pâturages. Le seul peuplement du vallon des Morteys se trouve en amont de la Ruine de Oussanna, au bas d'une pente raide couverte de pelouses à Laserpitium. Il se compose de groupes d'érables périodiquement déchiquetés par les avalanches, les chutes de pierres et les glissements de plaques de neige du printemps. On en trouve d'autres exemples au bas du versant sud-est de la Dent des Bimis. Tous les peuplements visités (dont il est difficile de donner des relèvés purs) sont très clairiérés et ne doivent par conséquent pas être considérés comme bien représentatifs d'une association de forêt.

Parmi les arbres et arbustes (qui ont été séparés arbitrairement sur le tableau, ce qui fausse un peu l'aspect de ces taillis aux troncs déformés par la neige), à part Acer pseudoplatanus qui est toujours dominant, il faut noter surtout Sorbus aucuparia, S. aria, S. mougeotii, Lonicera alpigena (à vitalité remarquable), Rhamnus alpina et Rubus idaeus. Plusieurs arbustes figurent également dans le Roso-Rhamnetum qui forme le "manteau" du Sorbo-Aceretum.

La richesse floristique de la strate herbacée trahit les clairières naturelles. Les seules espèces vraiment forestières sont celles de l'alliance *Lunario-Acerion* et des unités syntaxonomiques supérieures ¹. Toutes les autres proviennent soit de l'ourlet (notamment les différentielles d'association), soit des pelouses, soit des mégaphorbiaies, soit enfin des eboulis avoisinants.

Le Sorbo-Aceretum se distingue de l'Ulmo-Aceretum par la présence d'éléments thermophiles et héliophiles comme Sorbus aria, Rhamnus alpina, Viburnum lantana, Vicia silvatica, Convallaria majalis, Laserpitium latifolium, etc., ainsi que par un nombre plus modeste de composants des mégaphorbiaies subalpines (7 au lieu de 19).

Localisation des relevés du Sorbo Aceretum:

- 1–3: Oussanna, Vallon des Morteys/FR,
- 4: Vers-Champ, Vallon des Ciernes-Picat/VD.

¹ Comme du reste la sous-association "adenostyletosum" du Sorbo-Aceretum décrite dans le Haut-Jura genevois (RICHARD, 1968, p. 209).

1. Sorbo-Aceretum

No	1	2	3	4	
Altitude (10m)	153	156	153	141	
Exposition	S	S	SE	SE	
Pente (%)	50	55	40	70	
Recouvrement des arbres (%)	60	80	80	80	
Surface (m2)	200	200	200	300	
Nombre d'espèces	41	55	56	57	
Arbres					
Acer pseudoplatanus	4.3	5.3	5.5	4.2	4
Sorbus aucuparia	+	+	+	+	4
Sorbus aria			+	+	2
Sorbus mougeotii			+		1
Fraxinus excelsior				1.1	1
Acer platanoides				2.2	1
Ulmus scabra				+	1
Arbustes	١.	•	•		١'
	2 2	1 0	1 0	1 0	,
Lonicera alpigena	2.2	1.2	1.2	1.2	4
Ribes alpinum	+ + 2	+		+	4
Rhamnus alpina		1.2	+.2	•	3
Rubus idaeus	1.2	1.2	2.2	•	3 3 2
Daphne mezereum		1.1	+.2	+	2
Viburnum lantana		+	+	•	2
Lonicera xylosteum		. •	+.2	+	2
Salix grandifolia		+	•		1
Corylus avellana		•	•	2.2	1
Plantes herbacées					
1. Différentielles d'association					
Vicia silvatica	+.2	+.2	+	+.2	4
Lathyrus vernus	+	+	+	+	4
Crepis blattarioides	+	1.1	+	+	4
Convallaria majalis	+	2.1	1.1	+	4
Melica nutans	+	+	+	+.2	4
Dactylis glomerata	+.2	+.2	+		3
Laserpitium latifolium		+	r	+	3 2
Chaerophyllum aureum		1.2		+	2
Silene cucubalus	+	+			2
Agropyron caninum		+	+		2
Cynanchum vincetoxicum	+	+			2
2. Espèces de l'alliance et de l'	ordre				
(Lunario-Acerion, Aceretalia)	1				
Aconitum lycoctonum	+	1.1	2.1	2.2	4
Aconitum paniculatum	1.1	+	+	+	4
Polystichum lobatum		+	+	1.2	3
Actaea spicata	+		1.1	1.2	3
Cardamine pentaphyllos	+		+	+	3
Enilohium montanum	+				2
Epilobium montanum	+	٠	+		2
Mercurialis perennis			+	· 3.3	2
Mercurialis perennis Campanula latifolia		:	+ •	3.3 1.2	2 1 1
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea	:		+	· 3.3	2
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. <u>Espèces de la classe</u> (Fraxino-	Faget	ea)	+ 1.2	3.3 1.2	2 1 1 1
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Espèces de la classe Dryopteris filix-mas	Faget	ea) +	+ 1.2	3.3 1.2	2 1 1 1 4
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. <u>Espèces de la clacse</u> (Fraxino- Dryopteris filix-mas Lamiun geleobdolon	Faget 1.2 2.1	ea) + 1.1	+ 1.2 1.2 2.2	3.3 1.2 + 1.2	2 1 1 1 4 4
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Espèces de la classe (Fraxino- Dryopteris filix-mas Lamiun geleobdolon Lilium martagon	Faget 1.2 2.1 +	ea) + 1.1 +	+ 1.2 1.2 2.2 1.1	3.3 1.2 + 1.2 2.2	2 1 1 1 4 4 4 4
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydelis fabacea 3. Espèces de la classe Dryopteris filix-mas Lamiun geleobdolon Lilium martagor Paris quadrifolia	Faget 1.2 2.1 + 1.1	ea) + 1.1 + +	+ 1.2 1.2 2.2 1.1 +	3.3 1.2 + 1.2 2.2	2 1 1 1 4 4 4 3
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Espèces de la classe Dryopteris filix-mas Lamiun geleobdolon Lilium martagon Paris quadrifolia Centaurea montane	Faget 1.2 2.1 +	ea) + 1.1 + + +	+ 1.2 1.2 2.2 1.1 +	3.3 1.2 + 1.2 2.2	2 1 1 1 4 4 4 3 3
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Espèces de la classe Dryopteris filix-mas Lamiun geleobdolon Lilium martagor Paris quadrifolia Centaurea montane Prenanthes purpurea	Faget 1.2 2.1 + 1.1	ea) + 1.1 + + 1.2	+ 1.2 1.2 2.2 1.1 +	3.3 1.2	2 1 1 1 4 4 4 3 3 2
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Espèces de la classe (Fraxino- Dryopteris filix-mas Lamiun geleobdolon Lilium martagor Paris quadrifolia Centaurea montane Prenenthes purpurea Polygonatum multiflorum	Faget 1.2 2.1 + 1.1	ea) + 1.1 + + +	+ 1.2 1.2 2.2 1.1 +	3.3 1.2 + 1.2 2.2 +	2 1 1 1 4 4 4 3 3 2 2
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Espèces de la classe (Fraxino- Dryopteris filix-mas Lamiun geleodolon Lilium martagon Paris quadrifolia Centaurea montane Prenanthes purpurea Polygonatum multiflorum Asperula odorata	Faget 1.2 2.1 + 1.1	ea) + 1.1 + + 1.2	+ 1.2 1.2 2.2 1.1 +	3.3 1.2 + 1.2 2.2 + +	2 1 1 1 4 4 4 3 3 2 2 1
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Espèces de la classe Dryopteris filix-mas Lamiun galeobdolon Lilium martagon Paris quadrifolia Centaurea montane Prenanthes purpurea Polygonatum multiflorum Asperula odorata Elymus europaeus	Faget 1.2 2.1 + 1.1	ea) + 1.1 + + 1.2	+ : 1.2 1.2 2.2 1.1 + : (+)	3.3 1.2 + 1.2 2.2 + + +.2 +	2 1 1 1 4 4 4 3 3 2 2 1 1
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Espèces de la classe Dryopteris filix-mas Lamiun geleobdolon Lilium martagor Paris quadrifolia Centaurea montane Prenanthes purpurea Polygonatum multiflorum Asperula odorata Elymus europaeus Bromus benekeni	Faget 1.2 2.1 + 1.1	ea) + 1.1 + + 1.2	+ : 1.2 1.2 2.2 1.1 + : (+)	3.3 1.2 + 1.2 2.2 + +.2 +	2 1 1 1 4 4 4 3 3 2 2 1 1
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Espèces de la classe Dryopteris filix-mas Lamiun galeobdolon Lilium martagor Paris quadrifolia Centaures montane Prenanthes purpurea Polygonatum multiflorum Asperula odorata Elymus europaeus Bromus benekeni Brachypodium silvaticum	Faget 1.2 2.1 + 1.1	ea) + 1.1 + + 1.2	+ : 1.2 1.2 2.2 1.1 + : (+)	3.3 1.2 + 1.2 2.2 + + +.2 +	2 1 1 1 4 4 4 3 3 2 2 1 1
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Espèces de la classe Dryopteris filix-mas Lamiun galeobdolon Lilium martagon Paris quadrifolia Centaurea montane Prenanthes purpurea Polygonatum multiflorum Asperula odorata Elymus europaeus Bromus benekeni Brachypodium silvaticum 4. Compagnes	Faget 1.2 2.1 + 1.1 +	ea) + 1.1 + + 1.2 .	+ : 1.2 1.2 2.2 1.1 + : (+)	3.3 1.2 + 1.2 2.2 + +.2 +	2 1 1 1 4 4 4 3 3 2 2 1 1
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Espèces de la classe Dryopteris filix-mas Lamiun galeobdolon Lilium martagon Paris quadrifolia Centaurea montane Prenanthes purpurea Polygonatum multiflorum Asperula odorata Elymus europaeus Bromus benekeni Brachypodium silvaticum 4. Compagnes a) Espèces des mégaphorbiaies sub	Faget 1.2 2.1 + 1.1 +	ea) + 1.1 + + 1.2	+	3.3 1.2 + 1.2 2.2 + +.2 + (+)	2 1 1 1 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Espèces de la classe Dryopteris filix-mas Lamiun geleobdolon Lilium martagor Paris quadrifolia Centaurea montana Prenanthes purpurea Polygonatum multiflorum Asperula odorata Blymus europaeus Bromus benekeni Brachypodium silvaticum 4. Compagnes a) Espèces des mégaphorbiaies sub Myrrhis odorata	Faget 1.2 2.1 + 1.1 +	ea) + 1.1 + + 1.2	+ 1.2 1.2 2.2 1.1 +	3.3 1.2 + 1.2 2.2 + +.2 + +(+)	2 1 1 1 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 4 4
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Espèces de la classe Dryopteris filix-mas Lamiun geleobdolon Lilium martagor Paris quadrifolia Centaurea montane Prenanthes purpurea Polygonatum multiflorum Asperula odorata Elymus europaeus Bromus benekeni Brachypodium silvaticum 4. Compagnes a) Espèces des mégaphorbiaies sub Myrrhis odorata Senecio fuchsii et nemorensis	Faget 1.2 2.1 + 1.1 +	ea) + 1.1 + + 1.2	+ 1.2 1.2 2.2 1.1 + + (+) 	3.3 1.2 + 1.2 2.2 + +.2 + (+)	2 1 1 1 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 4 4 4
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Espèces de la classe (Fraxino- Dryopteris filix-mas Lamiun galeobdolon Lilium martagor Paris quadrifolia Centaurea montane Prenenthes purpurea Polygonatum multiflorum Asperula odorata Elymus europaeus Bromus benekeni Brachypodium silvaticum 4. Compagnes a) Espèces des mégaphorbiaies sub Myrrhis odorata Senecio fuchsii et nemorensis Ranunculus platanifolius	Faget 1.2 2.1 + 1.1 +	ea) + 1.1 + + 1.2	+	3.3 1.2 + 1.2 2.2 + +.2 + +(+)	2 1 1 1 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 4 4 4
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Espèces de la classe Dryopteris filix-mas Lamiun geleobdolon Lilium martagon Paris quadrifolia Centeurea montane Prenanthes purpurea Polygonatum multiflorum Asperula odorata Elymus europaeus Bromus benekeni Brachypodium silvaticum 4. Compagnes a) Espèces des mégaphorbiaies sub Myrrhis odorata Senecio fuchsii et nemorensis Ranunculus platanifolius Geranium silvaticum	Faget 1.2 2.1 + 1.1 +	ea) + 1.1 + + 1.2	+	. 3.3 1.2 . + 1.2 2.2 . + . + . + . + (+)	2 1 1 1 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 4 4 4
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Espèces de la classe Dryopteris filix-mas Lamiun geleobdolon Lilium martagor Paris quadrifolia Centaurea montana Prenanthes purpurea Polygonatum multiflorum Asperula odorata Elymus europaeus Bromus benekeni Brachypodium silvaticum 4. Compagnes a) Espèces des mégaphorbiaies sub Myrrhis odorata Senecio fuchsii et nemorensis Ranunculus platanifolius Geranium silvaticum Heracleum montanum	1.2 2.1 + 1.1 + + 2.2 1.1 + + + + + + + + + + + + + + + + + +	eea) + 1.1 + + 1.2	+	. 3.3 1.2 . + 1.2 2.2 . + . + . + . + (+)	2 1 1 1 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 4 4 4
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Espèces de la classe Dryopteris filix-mas Lamiun geleobdolon Lilium martagor Paris quadrifolia Centaurea montane Prenanthes purpurea Polygonatum multiflorum Asperula odorata Elymus europaeus Bromus benekeni Brachypodium silvaticum 4. Compagnes a) Espèces des mégaphorbiaies sub Myrrhis odorata Senecio fuchsii et nemorensis Ranunculus platanifolius Geranium silvaticum Heracleum montanum Polygonatum verticillatum	Faget 1.2 2.1 + 1.1 +	eea) + + + 1.2	+	. 3.3 1.2 . + 1.2 2.2 . +	2 1 1 1 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 4 4 4
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Espèces de la classe Dryopteris filix-mas Lamiun galeobdolon Lilium martagor Paris quadrifolia Centaures montane Prenanthes purpurea Polygonatum multiflorum Asperula odorata Elymus europaeus Bromus benekeni Brachypodium silvaticum 4. Compagnes a) Espèces des mégaphorbiaies sub Myrrhis odorata Senecio fuchsii et nemorensis Ranunculus platanifolius Geranium silvaticum Heracleum montanum Polygonatum verticillatum Thalictrum aquilegiifolium	1.2 2.1 + 1.1 + + 2.2 1.1 + + + + + + + + + + + + + + + + + +	eea) + 1.1 + + 1.2	+	. 3.3 1.2 . + 1.2 2.2 . + . + . + . + (+)	2 1 1 1 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 4 4
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Espèces de la classe Dryopteris filix-mas Lamiun geleobdolon Lilium martagon Paris quadrifolia Centaurea montane Prenanthes purpurea Polygonatum multiflorum Asperula odorata Elymus europaeus Bromus benekeni Brachypodium silvaticum 4. Compagnes a) Espèces des mégaphorbiaies sub Myrrhis odorata Senecio fuchsii et nemorensis Ranunculus platanifolius Geranium silvaticum Heracleum montanum Polygonatum verticilatum Thaliotrum aquilegiifolium b) Espèces des éboulis	Fraget 11.2 2.1 + 1.1 +	eea) + 1.1 + + 1.2	+	. 3.3 1.2 . + 1.2 2.2 . + . + . + . + . + . + . + . + . + + . r	2 1 1 1 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 4 4 3 3 3 3 3 3 2
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Espèces de la classe Dryopteris filix-mas Lamiun geleobdolon Lilium martagor Paris quadrifolia Centeurea montane Prenanthes purpurea Polygonatum multiflorum Asperula odorata Blymus europaeus Bromus benekeni Brachypodium silvaticum 4. Compagnes a) Espèces des mégaphorbiaies sub Myrrhis odorata Senecio fuchsii et nemorensis Ranunculus platanifolius Geranium silvaticum Heracleum montanum Polygonatum verticillatum Thalictrum aquilegiifolium b) Espèces des éboulis Polystichum lonchitis	Feget 1.2 2.1 + 1.1 +	ea) + 1.1 + + 1.2	+ 1.2 2.2 2.2 1.1 + + (+) +	. 3.3 1.2 . + 1.2 2.2 . + . + . + . + . + . + . + . + . + . +	2 1 1 1 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 4 4 3 3 5 3 3 2 2 4
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Espèces de la classe Dryopteris filix-mas Lamiun geleobdolon Lilium martagor Paris quadrifolia Centaurea montane Prenanthes purpurea Polygonatum multiflorum Asperula odorata Elymus europaeus Bromus benekeni Brachypodium silvaticum 4. Compagnes a) Espèces des mégaphorbiaies sub Myrrhis odorata Senecio fuchsii et nemorensis Ranunculus platanifolius Geranium silvaticum Heracleum montanum Polygonatum verticillatum Thalictrum aquilegiifolium b) Espèces des éboulis Polystichum lonchitis Geranium robertianum	Fraget 11.2 2.1 + 1.1 + 1.1 + + 1.1	es + 2.2 2.1 + + 1.1 ·	+ 1.2 2.2 1.1 + + (+) + 1.2 + + 1.2 +	. 3.3 1.2 . + 1.2 2.2 . + + + .2 + + .2 + + .2 + + + +	2 1 1 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 4 4 3 3 3 5 3 2 4 4 4
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Espèces de la classe Dryopteris filix-mas Lamiun galeobdolon Lilium martagon Paris quadrifolia Centaurea montane Prenenthes purpurea Polygonatum multiflorum Asperula odorata Elymus europaeus Bromus benekeni Brachypodium silvaticum 4. Compagnes a) Espèces des mégaphorbiaies sub Myrrhis odorata Senecio fuchsii et nemorensis Ranunculus platanifolius Geranium silvaticum Heracleum montanum Polygonatum verticillatum Thalictrum aquilegiifolium b) Espèces des éboulis Polystichum lonchitis Geranium robertianum (voir aussi Valeriana, Cystopteri	Fraget 11.2 2.1 + 1.1 + 1.1 + + 1.1	es + 2.2 2.1 + + 1.1 ·	+ 1.2 2.2 1.1 + + (+) + 1.2 + + 1.2 +	. 3.3 1.2 . + 1.2 2.2 . + + + .2 + + .2 + + .1 + + .2 + + .2 + + .2 	2 1 1 1 4 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Espèces de la classe Dryopteris filix-mas Lamiun geleobdolon Lilium martagon Paris quadrifolia Centeurea montane Prenanthes purpurea Polygonatum multiflorum Asperula odorata Elymus europaeus Bromus benekeni Brachypodium silvaticum 4. Compagnes a) Espèces des mégaphorbiaies sub Myrrhis odorata Senecio fuchsii et nemorensis Ranunculus platanifolius Geranium silvaticum Heracleum montanum Polygonatum verticillatum Thaliotrum aquilegiifolium b) Espèces des éboulis Polystichum lonchitis Geranium robertianna, Cystopteri viride parmi les accidentelles)	Fraget 11.2 2.1 + 1.1 + 1.1 + + 1.1	es + 2.2 2.1 + + 1.1 ·	+ 1.2 2.2 1.1 + + (+) + 1.2 + + 1.2 +	. 3.3 1.2 . + 1.2 2.2 . + + + .2 + + .2 + + .1 + + .2 + + .2 + + .2 	2 1 1 1 4 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Espèces de la classe Dryopteris filix-mas Lamiun geleobdolon Lilium martagor Paris quadrifolia Centeurea montane Prenanthes purpurea Polygonatum multiflorum Asperula odorata Blymus europaeus Bromus benekeni Brachypodium silvaticum 4. Compagnes a) Espèces des mégaphorbiaies sub Myrrhis odorata Senecio fuchsii et nemorensis Ranunculus platanifolius Geranium silvaticum Heracleum montanum Polygonatum verticillatum Thalictrum aquilegiifolium b) Espèces des éboulis Polystichum lonchitis Geranium robertianum (voir aussi Valeriana, Cystopteri viride parmi les accidentelles) c) Diverses	Faget 1.2 2.1 + 1.1 +	ea) + 1.1 + + 1.2	+ 1.2 2.2 1.1 + + + + + 2.2 1.1 + + + + + + + + + + + + +	. 3.3 1.2 . + 1.2 2.2 . + . + . + . + . + . + . + . + . + . +	2 1 1 1 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 4 4 4 3 3 5 3 2 2 4 4 4
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Espèces de la classe Dryopteris filix-mas Lamiun geleobdolon Lilium martagor Paris quadrifolia Centaurea montane Prenanthes purpurea Polygonatum multiflorum Asperula odorata Elymus europaeus Bromus benekeni Brachypodium silvaticum 4. Compagnes a) Espèces des mégaphorbiaies sub Myrrhis odorata Senecio fuchsii et nemorensis Ranunculus platanifolius Geranium silvaticum Heracleum montanum Polygonatum verticillatum Thalictrum aquilegiifolium b) Espèces des éboulis Polystichum lonchitis Geranium robertianum (voir aussi Valeriana, Cystopteri viride parmi les accidentelles) c) Diverses Knautia silvatica	alpin + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	eea) + 1.1 + + 1.2	+ 1.2 2.2 1.1 + (+) + 2.2 1.1 + + , Asp	. 3.3 1.2 	2 1 1 1 4 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Espèces de la classe Dryopteris filix-mas Lamiun geleobdolon Lilium martagon Paris quadrifolia Centaurea montane Prenenthes purpurea Polygonatum multiflorum Asperula odorata Elymus europaeus Bromus benekeni Brachypodium silvaticum 4. Compagnes a) Espèces des mégaphorbiaies sub Myrrhis odorata Senecio fuchsii et nemorensis Ranunculus platanifolius Geranium silvaticum Heracleum montanum Polygonatum verticillatum Thalictrum aquilegiifolium b) Espèces des éboulis Polystichum lonchitis Geranium robertianum (voir aussi Valeriana, Cystopteri viride parmi les accidentelles) c) Diverses Knautia silvatica Aegopodium podagraria	Faget 1.2 2.1 + 1.1 +	ea) + 1.1 + + 1.2	+ 1.2 2.2 1.1 + + + + + 2.2 1.1 + + + + + + + + + + + + +	. 3.3 1.2 . + 1.2 2.2 . + . + . + . + . + . + . + . + . + . +	2 1 1 1 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 4 4 4 3 3 5 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Espèces de la classe Dryopteris filix-mas Lamiun geleobdolon Lilium martagor Paris quadrifolia Centaurea montane Prenanthes purpurea Polygonatum multiflorum Asperula odorata Elymus europaeus Bromus benekeni Brachypodium silvaticum 4. Compagnes a) Espèces des mégaphorbiaies sub Myrrhis odorata Senecio fuchsii et nemorensis Ranunculus platanifolius Geranium silvaticum Heracleum montanum Polygonatum verticillatum Thalictrum aquilegiifolium b) Espèces des éboulis Polystichum lonchitis Geranium robertianum (voir aussi Valeriana, Cystopteri viride parmi les accidentelles) c) Diverses Knautia silvatica	alpin + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	eea) + 1.1 + + 1.2	+ .: 1.2 2.2 2.2 1.1 + . + (+) .: .: + 1.1 + Asp	. 3.3 1.2 	2 1 1 1 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 4 4 4 3 3 5 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Espèces de la classe Dryopteris filix-mas Lamiun geleobdolon Lilium martagon Paris quadrifolia Centaurea montane Prenenthes purpurea Polygonatum multiflorum Asperula odorata Elymus europaeus Bromus benekeni Brachypodium silvaticum 4. Compagnes a) Espèces des mégaphorbiaies sub Myrrhis odorata Senecio fuchsii et nemorensis Ranunculus platanifolius Geranium silvaticum Heracleum montanum Polygonatum verticillatum Thalictrum aquilegiifolium b) Espèces des éboulis Polystichum lonchitis Geranium robertianum (voir aussi Valeriana, Cystopteri viride parmi les accidentelles) c) Diverses Knautia silvatica Aegopodium podagraria	Faget 11.2 2.1 + 1.1 + alpin + 2.2 1.1 + + + 1.1 + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + 1.1 + + 1.1 +	ea) + 1.1 + + 1.2	+ 1.2 2.2 1.1 + (+) + 2.2 1.1 + + + + 1.2 + +	. 3.3 1.2 	2 1 1 1 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 4 4 4 3 3 5 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Espèces de la classe Dryopteris filix-mas Lamiun geleobdolon Lilium mertagon Paris quadrifolia Centaurea montane Prenanthes purpurea Polygonatum multiflorum Asperula odorata Elymus europaeus Bromus benekeni Brachypodium silvaticum 4. Compagnes a) Espèces des mégaphorbiaies sub Myrrhis odorata Senecio fuchsii et nemorensis Ranunculus platanifolius Geranium silvaticum Heracleum montanum Polygonatum verticillatum Thaliotrum aquilegiifolium b) Espèces des éboulis Polystichum lonchitis Geranium robertianum (voir aussi Valeriana, Cystopteri viride parmi les accidentelles) c) Diverses Knautia silvatica Aegopodium podagraria Valeriana officinalis	Faget 1.2 2.1 + 1.1 +	ea) + 1.1 + + 1.2	+ .: 1.2 2.2 2.2 1.1 + . + (+) .: .: + 1.1 + Asp	. 3.3 1.2 . + 1.2 2.2 . + . + . + . + + . + . + . + . + . +	2 1 1 1 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 4 4 4 3 3 5 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Espèces de la classe Dryopteris filix-mas Lamiun geleobdolon Lilium martagor Paris quadrifolia Centeurea montane Prenanthes purpurea Polygonatum multiflorum Asperula odorata Elymus europaeus Bromus benekeni Brachypodium silvaticum 4. Compagnes a) Espèces des mégaphorbiaies sub Myrrhis odorata Senecio fuchsii et nemorensis Ranunculus platanifolius Geranium silvaticum Heracleum montanum Polygonatum verticillatum Thalictrum aquilegiifolium b) Espèces des éboulis Polystichum lonchitis Geranium robertianum (voir aussi Valeriana, Cystopteri viride parmi les accidentelles) c) Diverses Knautia silvatica Aegopodium podagraria Valeriana officinalis Poa nemoralis	Faget 11.2 2.1 + 1.1 + alpin + 2.2 1.1 + + + 1.1 + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + 1.1 + + 1.1 +	ea) + 1.1 + + 1.2	+ 1.2 2.2 1.1 + + + + + + + 1.1 + + 1.2 + + 1.1 + 1.2	. 3.3 1.2 . + 1.2 2.2 . + . + . + . + . + . + . + . + . + . +	2 1 1 1 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 4 4 4 3 3 5 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Espèces de la classe Dryopteris filix-mas Lamiun geleobdolon Lilium martagor Paris quadrifolia Centaurea montane Prenanthes purpurea Polygonatum multiflorum Asperula odorata Elymus europaeus Bromus benekeni Brachypodium silvaticum 4. Compagnes a) Espèces des mégaphorbiaies sub Myrrhis odorata Senecio fuchsii et nemorensis Ranunculus platanifolius Geranium silvaticum Heracleum montanum Polygonatum verticillatum Thalictrum aquilegiifolium b) Espèces des éboulis Polystichum lonchitis Geranium robertianum (voir aussi Valeriana, Cystopteri viride parmi les accidentelles) c) Diverses Knautia silvatica Aegopodium podagraria Valeriana officinalis Poa nemoralis Urtica dioeca	Faget 11.2 2.1 + 1.1 + alpin + 2.2 1.1 + + + 1.1 + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + 1.1 + + 1.1 +	eea) + 1.1 + + 1.2	+ 1.2 2.2 1.1 + (+) + 2.2 1.1 + + + 1.1 1.2 1.1	. 3.3 1.2 	2 1 1 1 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 4 4 4 3 3 5 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Espèces de la classe Dryopteris filix-mas Lamiun geleobdolon Lilium martagon Paris quadrifolia Centaurea montane Prenenthes purpurea Polygonatum multiflorum Asperula odorata Elymus europaeus Bromus benekeni Brachypodium silvaticum 4. Compagnes a) Espèces des mégaphorbiaies sub Myrrhis odorata Senecio fuchsii et nemorensis Ranunculus platanifolius Geranium silvaticum Heracleum montanum Polygonatum verticillatum Thalictrum aquilegiifolium b) Espèces des éboulis Polystichum lonchitis Geranium robertianum (voir aussi Valeriana, Cystopteri viride parmi les accidentelles) c) Diverses Knautia silvatica Aegopodium podagraria Valeriana officinalis Poa nemoralis Urtica dioeca Solidago virga-aurea	Faget 11.2 2.1 + 1.1 + alpin + 2.2 1.1 + + + 1.1 + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + 1.1 + + 1.1 +	ea) + 1.1 + + + 1.2 es + 2.2 2.1 + + 1.1 . + + gilis	+ 1.2 2.2 1.1 + (+) + 2.2 1.1 + + + 1.1 + 1.2 + + 1.1 + 1.1 + + 1.1 + 1.1	. 3.3 1.2 . + 1.2 2.2 . + . + . + . + + (+) + + + . + . + + . clenium	2 1 1 1 4 4 4 3 3 5 2 2 2 1 1 1 1 1 4 4 4 3 3 3 5 3 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Espèces de la classe Dryopteris filix-mas Lamiun geleobdolon Lilium martagor Paris quadrifolia Centeurea montane Prenanthes purpurea Polygonatum multiflorum Asperula odoreta Elymus europaeus Bromus benekeni Brachypodium silvaticum 4. Compagnes a) Espèces des mégaphorbiaies sub Myrrhis odorata Senecio fuchsii et nemorensis Ranunculus platanifolius Geranium silvaticum Heracleum montanum Polygonatum verticillatum Thalictrum aquilegiifolium b) Espèces des éboulis Polystichum lonchitis Geranium robertianum (voir aussi Valeriana, Cystopteri viride parmi les accidentelles) c) Diverses Knautia silvatica Aegopodium podagraria Valeriana officinalis Poa nemoralis Urtica dioeca Solidago virga-aurea Campanula trachelium Galium mollugo	Faget 11.2 2.1 + 1.1 + alpin + 2.2 1.1 + + + 1.1 + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + 1.1 + + 1.1 +	ea) + 1.1 + + 1.2	+ 1.2 2.2 1.1 + + (+) + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + + 1.1 + + + 1.1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	. 3.3 1.2 . + 1.2 2.2 . + . + . + . + + . + . + . + . + . +	2 1 1 1 4 4 4 3 3 5 2 2 2 1 1 1 1 1 4 4 4 3 3 3 5 3 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Especes de la classe Dryopteris filix-mas Lamiun geleobdolon Lilium martagor Paris quadrifolia Centaurea montane Prenanthes purpurea Polygonatum multiflorum Asperula odorata Blymus europaeus Bromus benekeni Brachypodium silvaticum 4. Compagnes a) Espèces des mégaphorbiaies sub Myrrhis odorata Senecio fuchsii et nemorensis Ranunculus platanifolius Geranium silvaticum Heracleum montanum Polygonatum verticillatum Thalictrum aquilegiifolium b) Espèces des éboulis Polystichum lonchitis Geranium robertianum (voir aussi Valeriana, Cystopteri viride parmi les accidentelles) c) Diverses Knautia silvatica Aegopodium podagraria Valeriana officinalis Poa nemoralis Urtica dioeca Solidago virga-aurea Campanula trachelium Galium mollugo Vicia sepium	Faget 11.2 2.1 + 1.1 + alpin + 2.2 1.1 + + + 1.1 + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + 1.1 + + 1.1 +	ea) + 1.1 + + 1.2	+ 1.2 2.2 1.1 + + (+) + 1.2 + Asp	. 3.3 1.2 . + 1.2 2.2 . + . + . + . + . + . + . + . + . + . +	2 1 1 1 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 4 4 4 3 3 5 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Espèces de la classe Dryopteris filix-mas Lamiun geleobdolon Lilium martagon Paris quadrifolia Centaurea montane Prenenthes purpurea Polygonatum multiflorum Asperula odorata Elymus europaeus Bromus benekeni Brachypodium silvaticum 4. Compagnes a) Espèces des mégaphorbiaies sub Myrrhis odorata Senecio fuchsii et nemorensis Ranunculus platanifolius Geranium silvaticum Heracleum montanum Polygonatum verticillatum Thalictrum aquilegiifolium b) Espèces des éboulis Polystichum lonchitis Geranium robertianum (voir aussi Valeriana, Cystopteri viride parmi les accidentelles) c) Diverses Knautia silvatica Aegopodium podagraria Valeriana officinalis Poa nemoralis Urtica dioeca Solidago virga-aurea Campanula trachelium Galium mollugo Vicia sepium Veronica chamaedrys	Faget 11.2 2.1 + 1.1 + alpin + 2.2 1.1 + + + 1.1 + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + 1.1 + + 1.1 +	es) + 1.1 + + 1.2	+ 1.2 2.2 1.1 + + + 1.2 + + 1.1 + + 1.2 + + 1.1 + +	. 3.3 1.2 	2111 444332221111 44335322 44 443333332222
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Espèces de la classe Dryopteris filix-mas Lamiun geleobdolon Lilium mertagon Paris quadrifolia Centaurea montane Prenanthes purpurea Polygonatum multiflorum Asperula odorata Elymus europaeus Bromus benekeni Brachypodium silvaticum 4. Compagnes a) Espèces des mégaphorbiaies sub Myrrhis odorata Senecio fuchsii et nemorensis Ranunculus platanifolius Geranium silvaticum Heracleum montanum Polygonatum verticillatum Thaliotrum aquilegiifolium b) Espèces des éboulis Polystichum lonchitis Geranium robertianum (voir aussi Valeriana, Cystopteri viride parmi les accidentelles) c) Diverses Knautia silvatica Aegopodium podagraria Valeriana officinalis Poa nemoralis Urtica dioeca Solidago virga-aurea Campanula trachelium Galium mollugo Vicia sepium Veronica chamaedrys Melandrium diurnum	Faget 11.2 2.1 + 1.1 + alpin + 2.2 1.1 + + + 1.1 + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + 1.1 + + 1.1 +	es) + 1.1 + + 1.2	+ 1.2 2.2 1.1 + (+) + 2.2 1.1 + + 1.1 + + 1.2 1.1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	. 3.3 1.2 . + 1.2 2.2 . + . + . + . + + . + . + . + . + . +	2111 44433221111 444335322 44 44333333322222
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Espèces de la classe Dryopteris filix-mas Lamiun geleobdolon Lilium mertagor Paris quadrifolia Centeurea montane Prenanthes purpurea Polygonatum multiflorum Asperula odorata Elymus europaeus Bromus benekeni Brachypodium silvaticum 4. Compagnes a) Espèces des mégaphorbiaies sub Myrrhis odorata Senecio fuchsii et nemorensis Ranunculus platanifolius Geranium silvaticum Heracleum montanum Polygonatum verticillatum Thalictrum aquilegiifolium b) Espèces des éboulis Polystichum lonchitis Geranium robertianum (voir aussi Valeriana, Cystopteri viride parmi les accidentelles) c) Diverses Knautia silvatica Aegopodium podagraria Valeriana officinalis Poa nemoralis Urtica dioeca Solidago virga-aurea Campanula trachelium Galium mollugo Vicia sepium Veronica chamaedrys Melandrium diurnum Fragaria vesca	Faget 11.2 2.1 + 1.1 + alpin + 2.2 1.1 + + + 1.1 + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + 1.1 + + 1.1 +	es) + 1.1 + + 1.2	+ 1.2 2.2 2.2 1.1 + + (+) + 1.1 + 1.2 1.1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	. 3.3 1.2 . + 1.2 2.2 . + . + . + . + . + . + . + . + . + . +	2 1 1 1 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 4 4 4 3 3 3 5 3 3 2 2 2 2 2 2 2
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Espèces de la classe Dryopteris filix-mas Lamiun geleobdolon Lilium martagor Paris quadrifolia Centaurea montana Prenanthes purpurea Polygonatum multiflorum Asperula odorata Elymus europaeus Bromus benekeni Brachypodium silvaticum 4. Compagnes a) Espèces des mégaphorbiaies sub Myrrhis odorata Senecio fuchsii et nemorensis Ranunculus platanifolius Geranium silvaticum Heracleum montanum Polygonatum verticillatum Thalictrum aquilegiifolium b) Espèces des éboulis Polystichum lonchitis Geranium robertianum (voir aussi Valeriana, Cystopteri viride parmi les accidentelles) c) Diverses Knautia silvatica Aegopodium podagraria Valeriana officinalis Poa nemoralis Urtica dioeca Solidago virga-aurea Campanula trachelium Galium mollugo Vicia sepium Veronica chamaedrys Melandrium diurnum Fragaria vesca Lathyrus levigatus	Faget 11.2 2.1 + 1.1 +	es) + 1.1 + + 1.2	+ 1.2 2.2 1.1 + + (+) + (1.2 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + r r	. 3.3 1.2 	2111 44433221111 444335322 44 44333333322222
Mercurialis perennis Campanula latifolia Corydalis fabacea 3. Espèces de la classe Dryopteris filix-mas Lamiun geleobdolon Lilium mertagor Paris quadrifolia Centeurea montane Prenanthes purpurea Polygonatum multiflorum Asperula odorata Elymus europaeus Bromus benekeni Brachypodium silvaticum 4. Compagnes a) Espèces des mégaphorbiaies sub Myrrhis odorata Senecio fuchsii et nemorensis Ranunculus platanifolius Geranium silvaticum Heracleum montanum Polygonatum verticillatum Thalictrum aquilegiifolium b) Espèces des éboulis Polystichum lonchitis Geranium robertianum (voir aussi Valeriana, Cystopteri viride parmi les accidentelles) c) Diverses Knautia silvatica Aegopodium podagraria Valeriana officinalis Poa nemoralis Urtica dioeca Solidago virga-aurea Campanula trachelium Galium mollugo Vicia sepium Veronica chamaedrys Melandrium diurnum Fragaria vesca	Faget 11.2 2.1 + 1.1 + alpin + 2.2 1.1 + + + 1.1 + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + 1.1 + + 1.1 +	es) + 1.1 + + 1.2	+ 1.2 2.2 2.2 1.1 + + (+) + 1.1 + 1.2 1.1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	. 3.3 1.2 . + 1.2 2.2 . + . + . + . + . + . + . + . + . + . +	2 1 1 1 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 4 4 4 3 3 3 5 3 3 2 2 2 2 2 2 2

Accidentelles: No 1: Sambucus racemosa, Carduus personata, Campanula rotundifolia, Viola hirta. No 2: Rosa pendulina, Acunitum napellus, Valeriana montana, Polygonatum officinale, Arrhenatherum elatius, Carduus defloratus, Euphorbia cyparissias, Orobanche sp., Digitalis grandiflora, Chrysanthemum montanum. No 3: Adenostyles alliariae, Cystopteris fragilis, Cicerbita muralis, Asplenium viride. No 4: Cicerbita plumieri, Myosotis silvatica, Hieracium prenanthoides, Orchis mascula, Poa chaixii, Hieracium murorum, Astrantia major.

6.1.2. Le fourré à nerprun des Alpes (Roso-Rhamnetum alpinae prov., Tableau No 2) est un groupement d'arbustes, riche en rosacées, dont l'aspect est défini par Rhamnus alpina. Il se rencontre sur les pentes ensoleillées d'éboulis plus ou moins consolidés, tantôt en contact avec le Sorbo-Aceretum, tantôt isolé dans des plages d'éboulis mouvants. Dans la zonation, il se situe entre le Lathyro-Vicietum et le Sorbo-Aceretum, selon le schéma de la Fig. no 3.




Fig. 3. 1. Pelouse (Peucedano-Laserpitietum ou groupement à Chaerophyllum aureum et Myrrhis odorata)

- 2. Hautes herbes de l'ourlet (Lathyro-Vicietum silvaticae)
- 3. Arbustes (Roso-Rhamnetum alpinae)
- 4. Forêt (Sorbo-Aceretum).

Une succession vers le Sorbo-Aceretum est possible pour autant qu'aucune chute de pierres ou avalanche de neige n'interrompe la maturation du sol et le développement des arbres pendant plusieurs dizaines d'années. Le relevé suivant, intermédiaire entre le "manteau" et la forêt en rend compte:

Espèces des Rhamno-Prunetea:

- +.2 Rhamnus alpina
- 1.2 Salix grandifolia
- 1.2 Sorbus aria
- +.2 Amelanchier ovalis
- +.2 Cotoneaster tomentosa
- 1.2 Rosa pomifera
- 1.2 Rosa montana
 - + Viburnum lantana
 - + Lonicera xylosteum

Espèces de la forêt:

- 1.2 Acer pseudoplatanus
- + Sorbus aucuparia
- 1.2 Rubus idaeus
- 1.2 Lonicera alpigena
- 1.2 Rosa pendulina
 - + Daphne mezereum

2. Roso-Rhamnetum alpinae prov.

No Altitude (10m) Exposition Pente (%) Surface (m2) Nombre d'espèces	1 152 E 60 50	2 157 SE 60 30 5	3 161 S 50 50	4 154 S 60 50	5 155 S 60 50	6 153 SE 90 30	7 176 S 90 50	
Caractéristique locale d'associat Rosa pomifera Espèces des unités supérieures (Berberidion, Prunetalia, Rhamno-	+.2	+.2	+•2	٠	1.2	1.2	2.2	86 %
Rhamnus alpina Viburnum lantana Rosa montana Sorbus aria Cotoneaster integerrima Rosa rubrifolia Rosa canina Sorbus mougeotii Différentielles de sous-associati	+.2	2.2	1.2	2.2	2.3 +	2.3 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1.2	100 57 29 29 14 14 14
Rubus idaeus Salix grandifolia Acer pseudoplatanus Juniperus sabina Juniperus nana Compagnes Lonicera alpigena Rosa pendulina Ribes alpinum	+.2 + + +	+	2.2	2.2 + 1.2 3.3 +	1.1	1.2 + +.2	1.3 2.2	57 29 29 29 14 86 43 29
Sorbus aucuparia Daphne mezereum	•	:	:	:	+		+	14 14

Deux groupements à Rhamnus alpina ont été décrits dans notre pays:

- a) Salici-Rhamnetum MOOR 1952 du Jura, avec Rhamnus alpina, Salix grandifolia, Sorbus aria, S. aucuparia, Lonicera alpigena, Acer pseudoplatanus, Rosa pendulina. C'est le "manteau" arbustif du Sorbo-Aceretum.
- b) Valeriano-Rhamnetum RICHARD et BEGUIN 1971 du Jura, dont les relevés m'apparaissent aujourd'hui comme trop complexes puisqu'ils comprennent des fragments de l'ourlet à hautes herbes, de l'association d'éboulis mobiles, voire même de la pelouse alpine (voir RICHARD et BEGUIN, 1971).

Le nom de Valeriano-Rhamnetum ne peut pas être maintenu puisque la sous-association "salicetosum" (épurée de la plus grande partie des espèces herbacées) peut être attribuée au Salici-Rhamnetum; tandis que la sous-association "anthericetosum" (épurée) pourrait se rattacher au Cotoneastero-Amelanchieretum (notamment les relevés 18 et 21 à 25).

C'est avec le Salici-Rhamnetum que le groupement du Vallon des Morteys, que je nomme provisoirement Roso-Rhamnetum en raison des Rosa thermophiles, a le plus d'affinités. Mais une étude plus complète des groupements à Rhamnus alpina s'impose pour mieux les définir et pour préciser leur statut syntaxonomique.

Les relevés du Tableau No 2 proviennent tous du Vallon des Morteys (Oussanna).

- 6.1.3. La prairie à vesce des bois (Lathyro-Vicietum silvaticae ass. nov., Tableau No 3) est un groupement de hautes herbes des versants ensoleillés qui voisine avec les fourrés de Rhamnus alpina et le Sorbo-Aceretum. Son aspect est défini:
- a) par une série de papilionacées: Vicia silvatica aux grappes de fleurs blanches veinées de violet, Lathyrus heterophyllus aux grandes fleurs roses (qui forment des guirlandes en s'accrochant parfois aux buissons), Vicia sepium, Lathyrus pratensis, L. vernus et L. levigatus,
- b) par les grandes ombellifères Chaerophyllum aureum, Heracleum montanum, Laserpitium latifolium, L. siler, Myrrhis odorata,
- c) par les deux plantes de très haute taille Cephalaria alpina et Ranunculus platanifolius.

Le Lathyro-Vicietum n'atteint son plein développement qu'à la fin de juillet, au moment où le jaune de Aconitum lycoctonum, Digitalis grandiflora et Crepis blattarioides et le violet de Knautia silvatica et Campanula trachelium s'ajoutent au blanc des ombellifères. Le taux de recouvrement moyen de cette association d'éboulis n'est que de 80 % et son nombre spécifique moyen est de 35.

D'après mes observations dans le Vallon des Morteys², je considère Vicia silvatica, Lathyrus heterophyllus et Cephalaria alpina comme caractéristiques locales d'association et l'espèce subalpine Lathyrus levigatus comme différentielle par rapport aux autres associations de l'alliance qui sont montagnardes ou collinéennes. Les espèces des unités syntaxonomiques supérieures (Trifolion medii, Origanetalia, Trifolio-Geranietea) sont très nombreuses et fort bien développées (voir Tableau No 3). Je distingue deux sous-associations: l'une, plus xérophile (relevés 1–7), avec Laserpitium siler, Stachys recta, Brachypodium pinnatum, Anthericum liliago et Bromus erectus, l'autre (relevés 8–13), mésophile et moins riche en espèces, sans différentielle.

Parmi le grand nombre des compagnes, je me bornerai à signaler celles qui traduisent des affinités avec les associations voisines:

- a) les espèces des mégaphorbiaies subalpines, avec le *Cicerbito-Adenostyletum* dont il existe des fragments dans les éboulis bordant les ruisseaux temporaires des versants S.-E.,
- b) les espèces des Artemisietea (Chaerophyllum aureum surtout), avec le groupement à chérophylle et cerfeuil musqué, plus nitrophile, parcouru par le bétail,
- c) les espèces forestières, peu nombreuses, avec le Sorbo-Aceretum,
- d) les espèces des Arrhenatheretalia, avec les prairies fauchées de plaine dont certains éléments pourraient bien avoir leur station primaire dans ces pentes où la période de végétation est particulièrement longue pour l'altitude,
- e) enfin, parmi les diverses, Crepis blattarioides, Laserpitium latifolium et Peuce-danum austriacum, avec le Peucedano-Laserpitietum.

Ces prairies de hautes herbes qui n'ont jamais été fauchées et qui ne sont pratiquement pas parcourues par le bétail colonisent des pentes d'éboulis mal stabilisés. Elles forment une mosaïque parfois difficile à débrouiller avec les éboulis mobiles à Rumex scutatus d'une part, les fourrés à Rhamnus alpina et le Sorbo-Aceretum d'autre part. Je considère le Lathyro-Vicietum comme l'ourlet des fourrés à Rhamnus alpina qui sont eux-mêmes le manteau arbustif du Sorbo-Aceretum.

Des groupements apparentés ont déjà été décrits, notamment le Vicietum silvaticae-dumetorum OBERD. et MÜLLER 1961 qui est signalé par OBER-DORFER (1971) dans les gorges de la Wutach. Dans le Haut-Jura occidental, j'ai signalé en 1968 une mégaphorbiaie à Crepis blattarioides et Laserpitium latifolium et j'ai constaté plus tard dans le massif du Reculet (Jura genevois) la présence d'une association vicariante à Cephalaria alpina, Astrantia major, Chaerophyllum aureum et Aconitum lycoctonum, qui ne possède ni Vicia

² Qui représente bien sûr une aire trop restreinte.

Comparison 1,2 +,2 +,2 1,2 +,2 + + 6		3. Lathyro-Vicietum silvati	cae a	ass.	nov									
Attitude (10a)	Г	No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Pente (%)			151	156	-									
Recouvement (5) 90 90 70 100 100 90 70 90 80 Surface (n2) 150 30 100 25 50 50 100 30 50 50 50 50 So 30 80 So 30 100 25 So 50 100 30 9 50 50 50 50 So 30 90 So 50 100 30 So 50 100 30 90 So 5		- 4.0									S			
Surface (m2)								60		60				
Nombre d'emphone 47 43 45 85 89 25 28 41 30 39 30									500	70		100		
Caractéristiques et différentielle d'association C Vicia silvatica C Sephalaria alpina 1,2+2,2,1,2 1,3+2,1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,2 2 Eaphees des unités supérieures (Trifolion medit, origentalia, Trifolio-Genanietes) Vicia segúm Cynanchum vénoctoxicum 1,2 1,2 1,1 1 + 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1 + 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1 + 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1 + 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1 + 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 2,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2														
Vicin slivation	-	Nomble d especes	47	47	47)0	77	2)	20	41	-	77		
Complete Singer 1,2 +,2 +,2 2														
Lathyrum levigatus											+.2	1.3		100%
Cathyrus heterophyllus	C	1 114							+	•	•	•	+	
Esphese des unités supérieures (Trifolio médis, Origentalia, Trifolio-Genanietea) Vicia segrium	0				+	+			•	•	23	+	•	27
Trifolion medii, Origenetalia, Trifolio-Genanistes	1		W 00 W	۷.)	•	•	•		•	•	>	•	•	-1
Cymanchum vinoctoxicum				rifo	lio-	Genai	niet	ea)						
In the state of						+		0.0000000						100
Lathyrus pratensis		·												100
Cargamula trachelium								+						100
Crigamum vulgare								1.1					T• 4	82
Stachys alpins		-						2 2 2 2				+		82
Digitalis grandiflora		Polygonatum officinale			+.2	+		+.2		1.2		+.2	2.3	64
Calium mollugo ssp.						+	+	+				+.2		64
Trifolium medium				+		•			•	+.2		•		46
Thalictrum minus			15 1500001	•		+		1 3		. 2	+.2	1 2		3.00
Valeriana officinalis ssp.		A 100 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 1		+				1.0	•	+• ∠	+	1.2		46
Pos nemoralis				+		+			+.2	+.2				46
Suphthalmum salicifolium														27
Victo hirts Veronica chamaedrys Silene nutans Différentielles de sous-association Laserpitium siler Stachys rects +2 2,2 1,2 1,2 +		O.					1.2			+				18
Veronica chamaedrys Silene nutans DiffFerentielles de sous-association Laserpitium siler +.2 + 2.2 1.2 1.2 + Stachys recta +.2 + 1.2 +				+	•	•	•			•	•	•		
Silene nutans				•	•	•	٠		٠		•	•	•	
Différentielles de sous-association Laserpitium siler				•					•	+	•	•		
According to the state 1.2 2.2 1.2 1.2 +			ı · iatio	on.	•	•	•		•	•	•	٠	,	
Brachypodium pinnatum					1.2	1.2	+							46
Anthericum Iiliago Compagnes 1. des mégaphorbiaies subalpines Heracleum montanum Heracleum montanum Heracleum montanum Lanium galeobdolon Lalium martagon Phyteuma spicatum Lalium martagon Phyteuma spicatum Lalium spicatum Laserptium latifolium Laserptium montanum Laserptium paniculatum 1. 1 + 2 . 1 . 1 . 2 . 2 . 2 . 1 . 1 . 1 . 2 . 3 . 3 + . 2 18		Stachys recta	+.2	+	+.2	+								36
Compagnes					+					•	•			18
1. des mégaphorbiaies subalpines Heracleum montanum		The state of the s	+	+		•			•			•		18
Heracleum montanum			nog											İ
Ranunculus platanifolius				+.2	1.1	2.2	+	2.2	1.2	1.1	1.2	3.3	+.2	100
Geranium silvaticum		and the second s										1000		100
Myrrhis odorata 1.2		Aconitum paniculatum				+	+				+	+	+	46
Senecio fuchsii et nemorensis Rumex arifolius	1			+			+					+.2		36
Rumex arifolius Polygonatum verticillatum Carduus personata 2. des Artemisietea Chaerophyllum aureum Geranium robertianum Agropyron repens Aegopodium podagraria Urtica dioeea Epilobium angustifolium Agropyron caninum Agropyron caninum Agropyron caninum Agropyron caninum 5. des Fraxino-Pagetea Aconitum lycoctonum Lamium galeobdolon Epilobium montanum Lilium martagon Phyteuma spicatum A. des Arrhenatheretalia Arrhenatherum elatius (ssp.?) Dactylis glomerata Primpinella major Tragopogon orientalis Creptis blattarioides Creptis blattarioides Creptis blattarioides Convallaria majalis Convallaria majalis Convallaria majalis Convallaria majalis Centaurea montana Lathyrus vernus Silene cucubalus Chysanthemum montanum Lathyrus vernus Carduus defloratus Carduus defloratus Carduus defloratus Carex flacca ssp.claviformis Hoppe Lacer flacca sp.claviformis Hoppe Lacer flacca ssp.claviformis				*			٠	(+)	•	•	•	+		36
Polygonatum verticillatum				•		1.2			+.2	•		1 1		
Carduus personata	.000	-		r		•	•		•	+	•		+•∠	27
2. des Artemisietea Chaerophyllum aureum Geranium robertianum + 1.1 + 1.2 + 2.2 + 1.2 1.2 + 1.2 Agropyron repens - r + 2 + 2 + + 2 + + 6.4 Aegopodium podagraria 1.2 + 1.2 1.1 - + 1.2 Urtica dioeca Epilobium angustifolium Agropyron caninum 3. des Fraxino-Fagetea Aconitum Iyooctonum Lamium galeobdolon Epilobium montanum + + 1.1 1.1 - + 1.2 + 1.2 . 7 Lamium galeobdolon Epilobium montanum + + + + 2 +		0.0	+	:		:			•	:	:			18
Hamilton								1						
Agropyron repens Aegopodium podagraria Urtica dioeca Epilobium angustifolium Agropyron caninum 3. des Fraxino-Fagetea Aconitum lycoctonum Lamium galeobdolon Epilobium montanum 4. des Arrhenatheretalia Arrhenatherum elatius (ssp.?) Dactylis glomerata Pimpinella major Tragopogon orientalis 5. diverses Crepis blattarioides Crepis blattarioides Crepis blattarioides Laserpitium latifolium Convallaria majalis		Chaerophyllum aureum	3.2	+		2.2	1.1	1.2	+.2	+.2	1.2	1.2	+	100
Aegopodium podagraria			+			+		+.2		2.2		+	+	73
Urtica dioeca Epilobium angustifolium Agropyron caninum 3. des Fraxino-Fagetea Aconitum lycoctonum Lamium galeobdolon Epilobium montanum Lilium martagon Phyteuma spicatum 4. des Arrhenatheretalia Arrhenatherum elatius (ssp.?) Dactylis glomerata Pimpinella major Tragopogon orientalis 5. diverses Crepis blattarioides Laserpitium latifolium Lathyrus vernus Lathyrus vernus Silene cucubalus Chrysanthemum montanum Lathyrus vernus Carduus defloratus Epilobium montanum Lathyrus vernus Lilium martagon Later				r		•				+	+.2			64
## Pimpinella major				•	+	•	•				•			46
Agropyron caninum 3. des Fraxino-Fagetea Aconitum lycoctonum Lamium galeobdolon Epilobium montanum + + + 1.1 1.1 . + 1.2 + 1.2 . 7. Lilium martagon Phyteuma spicatum 4. des Arrhenatheretalia Arrhenatherum elatius (ssp.?) Dactylis glomerata Pimpinella major Tragopogon orientalis 5. diverses Crepis blattarioides Crepis blattarioides Crepis blattarioides Laserpitium latifolium Lathyrus vernus Lathyrus vernus Silene cucubalus Chrysanthemum montanum Helica nutans Carduus defloratus Euphorbia cyparissias Creck Garage Aconitum Hoppe Laser flacca ssp.claviformis Hoppe Laser f					•						•	т.		18
3. des Fraxino-Fagetea Aconitum lycoctonum Lamium galeobdolon Epilobium montanum Lilium martagon Phyteuma spicatum 4. des Arrhenatheretalia Arrhenatherum elatius (ssp.?) Dactylis glomerata Pimpinella major Tragopogon orientalis 5. diverses Crepis blattarioides Laserpitium latifolium Convallaria majalis Contaurea montana Lathyrus vernus Silene cucubalus Chrysanthemum montanum Melica nutans Carduus defloratus Euphorbia cyparissias Calamagrostis varia Carex flacca ssp.claviformis Hoppe 1. + + 1.1 1.1			1											18
Aconitum lycoctonum Lamium galeobdolon Epilobium montanum Lilium martagon Phyteuma spicatum 4. des Arrhenatheretalia Arrhenatherum elatius (ssp.?) Dactylis glomerata Pimpinella major Tragopogon orientalis 5. diverses Crepis blattarioides Laserpitium latifolium Convallaria majalis Convallaria majalis Centaurea montana Lathyrus vernus Silene cucubalus Chrysanthemum montanum Melica nutans Carduus defloratus Euphorbia cyparissias Calamagrostis varia Carex flacca ssp.claviformis Hoppe . + 1.1 1.1 1.														
Lamium galeobdolon				+	+	1.1	1.1		+	1.2	+	1.2		73
Lilium martagon Phyteuma spicatum 4. des Arrhenatheretalia Arrhenatherum elatius (ssp.?) Dactylis glomerata Pimpinella major Tragopogon orientalis 5. diverses Crepis blattarioides Crepis blattarioides Laserpitium latifolium Convallaria majalis Convallaria majalis Lathyrus vernus Lathyrus vernus Lathyrus vernus Silene cucubalus Chrysanthemum montanum Melica nutans Carduus defloratus Euphorbia cyparissias Calamagrostis varia Carex flacca ssp.claviformis Hoppe		Lamium galeobdolon	1.1											46
Phyteuma spicatum 4. des Arrhenatheretalia Arrhenatherum elatius (ssp.?) Dactylis glomerata Pimpinella major Tragopogon orientalis 5. diverses Crepis blattarioides Convallaria majalis Convallaria majalis Centaurea montana Lathyrus vernus Silene cucubalus Chrysanthemum montanum Melica nutans Carduus defloratus Euphorbia cyparissias Carex flacca ssp.claviformis Hoppe 1. 2 1. 2 1. 2 1. 2 1. 1 1. 2 1. 2 1.	1		+	•						+				36
4. des Arrhenatheretalia Arrhenatherum elatius (ssp.?) Dactylis glomerata Pimpinella major Tragopogon orientalis 5. diverses Crepis blattarioides Laserpitium latifolium Convallaria majalis Centaurea montana Lathyrus vernus Silene cucubalus Chrysanthemum montanum Melica nutans Carduus defloratus Euphorbia cyparissias Calamagrostis varia Carex flacca ssp.claviformis Hoppe + .2 1.2 1.2 1.2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +					+	*						+		27
Arrhenatherum elatius (ssp.?) Dactylis glomerata Pimpinella major Tragopogon orientalis 5. diverses Crepis blattarioides Laserpitium latifolium Convallaria majalis Centaurea montana Lathyrus vernus Silene cucubalus Chrysanthemum montanum Melica nutans Carduus defloratus Euphorbia cyparissias Calamagrostis varia Carex flacca ssp.claviformis Hoppe + 2 1.2 1.2 1. + + + + + + + + + + + + + + + + + +				r	•	•	•		•	r	•	•	•	18
Dactylis glomerata				+.2	1.2	1.2	+		1.1	1.1	1.2	+	1-2	82
Pimpinella major 1.1 1.1 . +														82
Tragopogon orientalis 5. diverses Crepis blattarioides Laserpitium latifolium		Pimpinella major												73
1.2 +.2 1.2 2.2 1.1		0.0		r	•	+				+				27
Laserpitium latifolium	1													
Convallaria majalis Centaurea montana Lathyrus vernus Silene cucubalus Chrysanthemum montanum Melica nutans Carduus defloratus Euphorbia cyparissias Calamagrostis varia Carex flacca ssp.claviformis Hoppe 1.1 2.2 1.1 . +.2 2.3 2.3 . 1.1 1.2 2.2 88 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3									1.2					91
Centaurea montana Lathyrus vernus 1.1 . + . + . + . 1.1 . + . + . 6 Silene cucubalus +.2 + + . + . 2 + . + . 5 Chrysanthemum montanum + + + 2 . + + +									2 7				2 2	82
Lathyrus vernus 1.1 . + . + 1.1 . + . + 6. Silene cucubalus +.2 + + +.2 + + . 5. Chrysanthemum montanum + + + + + +.2 + + + + + + + + +			1									1.2		82 73
Silene cucubalus +.2 +			1								+	+		64
Chrysanthemum montanum				+				100						55
Carduus defloratus + + + + +			+	+			+							55
Euphorbia cyparissias r . + r + . r 4 Calamagrostis varia			1		+		+		•				+	46
Calamagrostis varia				+	•		•		•	r				46
Carex flacca ssp.claviformis Hoppe + 1.2 + 1.2 30				٠			. ^		•					46
Description of the second of t				•					•	٠		•		46 36
		Peucedanum austriacum	норр: I .	e . 1.1	+	+	r	+	r	•	1.2			36
20 000 00000000000000000000000000000000			1			+				:				27
Valeriana montana . + + +					+									27
														27
Accidentelles (n) 4 2 0 4 2 2 1 2 2 3 3		Accidentelles (n)	4	2	0	4	2	2	1	2	2	3	3	

Accidentelles: No 1: Scabiosa lucida, Lamium maculatum, Campanula glomerata, Molinia litoralis. No 2: Lactuca perennis, Centaurea alpestris. No 4: Hieracium prenanthoides, Picris hieracioides, Solidago virga-aurea, Centaurea alpestris. No 5: Carex sempervirens, Polygonatum multiflorum. No 6: Adenostyles glabra, Prenanthes purpurea. No 7: Brachypodium silvaticum. No 8: Hypericum hirsutum, Campanula glomerata. No 9: Lactuca perennis, Lotus corniculatus. No 10: Festuca ovina, Phyteuma orbiculare. No 11: Sesleria coerulea, Potentilla rupestris, Dryopteris filix-mas.

silvatica, ni Lathyrus heterophyllus, ni Myrrhis odorata, mais par contre des espèces comme Hellebórus foetidus, Seseli libanotis, Hypericum richeri, Dianthus hyssopifolius qui n'existent pas dans les Préalpes.

Tous les relevés du Tableau No 3 proviennent du Vallon des Morteys. Le type nomenclatural est représenté par le relevé No 2.

6.1.4. Le groupement à chérophylle doré et cerfeuil musqué (Tableau No 4) se distingue par la dominance absolue des grandes ombellifères associées au chénopode bon-henri et à l'ortie. Relativement pauvre (nombre spécifique moyen: 24), il est intermédiaire entre le *Lathyro-Vicietum* des pentes d'éboulis non pâturées et le *Rumicetum alpini* des terrasses servant de reposoirs au bétail. C'est la station où *Myrrhis odorata* et *Chaerophyllum aureum* sont les plus abondants.

Si la sociologie de Chaerophyllum aureum est relativement bien connue, celle de Myrrhis odorata par contre doit encore être précisée: HEGI (1926) indique son aire de distribution (Préalpes occidentales jusque dans l'Oberland bernois, Alpes calcaires du sud, Montagnes illyriques jusqu'au Montenegro, Pyrénées et nord de l'Espagne) et cite même dans quelles "associations" on le rencontre à l'état spontané (forêts riveraines subalpines, taillis d'Aunes verts, mégaphorbiaies subalpines, groupements nitrophiles de hautes herbes liés aux chalets d'alpage). DUTOIT (1934) ne le signale, dans les Préalpes vaudoises, que dans deux associations d'éboulis ombragés: "Adenostyletum alliariae" (entre 1630 et 1700 m) et "peuplements de Acer pseudoplatanus et Ulmus scabra" (entre 1400 et 1600 m). OBERDORFER (1970) situe son centre de gravité dans le Rumicion alpini et dans l'Adenostylion. Dans le vallon des Morteys, cette grande ombellifère très odorante³ se rencontre dans le Cicerbito-Andenostyletum. l'Ulmo-Aceretum, le Sorbo-Aceretum, le Lathyro-Vicietum et le groupement à Chaerophyllum aureum. Je ne l'ai noté qu'une seule fois, non fleuri, dans le Rumicetum alpini. Je pense donc que les stations primaires de Myrrhis odorata se situent dans des associations de l'Adenostylion (comprenant les clairières des érablaies subalpines) et que c'est secondairement que cette espèce s'est disséminée en aussi grande quantité dans les pâturages, favorisée par les défrichements et par le piétinement modéré du bétail. C'est pourquoi je n'attribue pas ici à cette espèce pourtant remarquable le rôle de caractéristique, mais plutôt celui de différentielle.

³ Lors du mémorable orage du 26 août 1971, qui fit de gros dégâts dans toute la région, l'odeur des plantes du cerfeuil musqué(Myrrhis odorata), hâchées par la grêle, embaumait l'atmosphère du Vallon des Morteys.

4. Groupement à Chaerophyllum aureum et Myrrhis odorata

	_				
No	1	2	3	4	
Altitude (10m)	152	150	150	193	
Exposition	SE	SE	S	SE	
Pente (%)	70	10	70	60	
Surface (m2)	50	15	100	10	
Nombre d'espèces	13	25	28	29	
Espèces dominantes					
Chaerophyllum aureum	3.3	2.2	1.2	3.3	4
Myrrhis odorata		4.4			4
Espèces des unités supérieures					
(Aegopodion, Galio-Alliarietalia,	Arte	misie	tea)		
Chenopodium bonus-henricus	1.1	1.2	1.2	1.2	4
Urtica dioeca	1.2		1.2	V-PUN-PROPER	4
Aegopodium podagraria	2.2		2.2		
Lamium maculatum			+.2	12	3 3
Rumex alpinus		+.2			1
Geranium robertianum			+		1
Geranium phaeum var. lividum				+	1
Compagnes	1		•	,	,
1. Espèces des mégaphorbiaies subs	l alnin	98			
Heracleum montanum	2.3	+	1.2	2.2	4
Rumex arifolius	+	1.1		-	4
Geranium silvaticum		+	1.2	+	3
Senecio fuchsii	+		1 • 2		1
Ranunculus platanifolius	,	•	+	•	1
Epilobium alpestre		•	750	+	1
Aconitum napellus		•	•	+	1
2. Espèces des Trifolio-Geranietes			•	-	,
Vicia sepium	+	+	+.2	+	4
Vicia silvatica	+.2	313	+.2		2
Galium mollugo ssp.	1.2	+	+.2	:	2
Valeriana officinalis ssp.	•	-	+	1.1	2
Poa nemoralis	١.	•	+.2	+.2	2
Campanula trachelium		•	T. 2	T•2	1
Satureja vulgaris	•	+	•	•	1
Cynanchum vincetoxicum	•	~	+	•	1
Lathyrus pratensis		•	+	:	
	•	*	*	+	1
3. Diverses Crepis blattarioides		.1		1 2	7
Dactylis glomerata	+	+		1.2	3
Silene cucubalus	•	+.2	+	1.1	7
Arrhenatherum elatius	•	+	+	1.1	3 3 2
Lamium galeobdolon	+	1 1	+	•	2
		1.1	+	•	2
Veronica chamaedrys		+	•	+	2
Alchemilla vulgaris	•	1.1	•	1.1	2
Laserpitium latifolium	:	•	+	+	2
Accidentelles (n)	1	5	6	8	

Accidentelles: No 1: Rubus idaeus. No 2: Melandrium diurnum, Achillea millefolium, Ranunculus acer, Poa pratensis, Lamium purpureum. No 3: Epilobium angustifolium, Ranunculus nemorosus, Rosa pomifera, Corydalis fabacea, Ranunculus repens, Rumex scutatus. No 4: Peucedanum austriacum, Campanula rhomboidalis, Myosotis silvatica, Lioium martagon, Pulsatilla alpina, Festuca violacea, Laserpitium siler, Poa alpina.

Quel est le statut syntaxonomique de ce groupement? Il remplace à l'étage subalpin le *Chaerophylletum aurei* OBERD. 1957 dont il se distingue par des espèces de l'*Adenostylion* et des *Trifolio-Geranietea*. Quant à préciser s'il mérite le rang d'association ou celui d'une sous-association du *Chaerophylletum aurei*, je ne saurais le préciser sur la base de quatre relevés seulement. R. TÜXEN (in litteris) propose de le rattacher à l'alliance *Aegopodion podagrariae*.

Quant à l'écologie, ce groupement occupe le bas des pentes d'éboulis ensoleillés et parcourus par le bétail, en mosaïque avec le Sorbo-Aceretum le Lathyro-Vicietum et le Rumicetum alpini.

Enfin, il semble que ce groupement existe même à l'état primaire, comme le montre le relevé no 4 du tableau qui correspond à un reposoir à gibier (chamois, bouquetin) inaccessible au bétail.

Les relevés proviennent des localités suivantes:

1-3: Oussanna,

4: Vanil-du-Croset.

Le type nomenclatural est représenté par le relevé No 1.

6.1.5. Les pâturages qui font la richesse des alpages de Brenleire Dessus, Brenleire Dessous et Petit Croset, ont été gagnés en partie sur la forêt, en partie sur des pelouses. Faute de relevés précis, j'ai distingué trois types physionomiques (voir carte de la végétation):

le premier, à Gentiana lutea, très riche en espèces, sur les pentes les plus raides et sur les sols les mieux drainés (affinités avec le Serratulo-Caricetum et le Peucedano-Laserpitietum;

le second, à *Veratrum album*, plus pauvre en espèces, mais plus productif et plus piétiné par le bétail, sur les sols compacts (affinités avec le *Nardion* et le *Rumicetum alpini*);

le troisième, à Festuca violacea, Carex ferruginea, Crepis aurea, Plantago montana et P. alpina, dans les stations fraîches, plus élevées, à durée d'enneigement plus longue (affinités avec le Trifolio-Festucetum violaceae et le Caricetum ferrugineae). Voir aussi pâturages alpins, sous 6.3.8.

6.1.6. La prairie à laser et peucédan (Peucedano-Laserpitietum ass. nov., Tableau No 5) est l'un des joyaux des Préalpes occidentales, tant au point de vue physionomique que floristique. Pour les raisons que j'exposerai plus bas (p.21) elle comprend l'association à Avena pratensis et Peucedanum austriacum BER-SET 1954.

Ce sont les ombellifères Laserpitium latifolium, L. siler, Peucedanum austriacum, Astrantia major, associées à Pulsatilla alpina, Paradisea liliastrum, Gentiana lutea et Digitalis grandiflora qui déterminent l'aspect de cette association. En outre, un certain nombre d'espèces moins abondantes frappent par leurs couleurs vives: des orchidées aux fleurs rouges ou roses comme Anacamptis pyramidalis⁴, Orchis globosa et Gymnadenia conopea, des composées aux fleurs jaunes comme Buphthalmum salicifolium, Crepis blattarioides et Tragopogon orientalis, ainsi que d'autres plantes aux fleurs rouges comme Lilium martagon, Geranium silvaticum et Stachys densiflora. Quelques grandes graminées prennent part à la composition de la strate dominante: ce sont Avena pubescens, A. pratensis, Dactylis glomerata et Arrhenatherum elatius. Enfin des espèces de taille plus modeste sont masquées par les feuilles des ombellifères et de Pulsatilla alpina: les plus abondantes sont Carex sempervirens, Helianthemum grandiflorum, Trifolium pratense, T. medium, T. montanum et Prunella grandiflora.

Les caractéristiques de cette association sont *Peucedanum austriacum*, *Stachys densiflora* et *Arabis pauciflora*, tandis que *Avena pratensis* assume le rôle de différentielle.

J'ai distingué deux sous-associations de valeur locale :

- a) La première, à *Buphthalmum salicifolium*, est la plus riche (nombre spécifique moyen: 73). Elle colonise les pentes les plus chaudes et les plus raides (en moyenne 75 %) au-dessous de 1700 m d'altitude. Elle comprend une variante xérophile à *Dracocephalum ruyschiana* et *Carex humilis* et une variante "mésophile" à *Molinia coerulea* et *Phaca penduliflora*. C'est celle qui correspond à l'association décrite par BERSET (1954) dont il sera question par la suite.
- b) La seconde, à Anemone narcissiflora, est moins riche (nombre spécifique moyen 61) et se rencontre entre 1700 m et 2000 m d'altitude sur des pentes un peu moins accusées (en moyenne 63 %).

Parmi les compagnes, dont le grand nombre surprend, il faut relever quatre groupes d'espèces qui permettent de mieux comprendre le déterminisme de l'association et sa tendance évolutive:

- 1. les plantes des prairies fumées (Molinio-Arrhenatheretea),
- 2. celles des prairies maigres basiphiles (Festuco-Brometea),
- 3. celles des ourlets thermophiles (Trifolio-Geranietea),
- 4. enfin les arbustes (Rhamno-Prunetea).

⁴ Il s'agit de la var. tanayensis CHENEV. qui se distingue par ses capitules moins élancés et surtout par ses fleurs plus foncées et légèrement plus petites que le type, comme le signale GSELL (1941), p. 282 et 284.

5. Peucedano-Laserpitietum ass.	nov.																			_
No Altitude (10m)							7 163				11 173		13 186				17 196		19 182	
Exposition Pente (%)	SE 90	SE 80	S 75	SE 70	S 90	S 60	SE 70	SE 70	S 75	SE 100		SE 50	55	SE SE	SE 50	SE 70	SE 60	E 50	SE 40	
Surface (m2) Nombre d'espèces	30 71	40 78	100 68	50 68	50 76	50 81	50 81	50 64	50 71	100 74	100 71	50 60	30 60	50 59	20 45	30 56	30 63	30 63	50 61	
Auteur	_								_						S		_			_
Caractéristiques et différentiel Peucedanum austriacum	le d		ocia +			+	+	+	1.1	1.1	+	+		1.1						68%
Stachys densiflora			+	+			r		r	+		+	:	+	+	+	+	+	+	63 47
Arabis pauciflora D Avena pratensis		+.2			+	:	+.2	+	+.2	+	+	:	+	+		÷	÷	÷	÷	37
Espèces de l'alliance (Caricion Pulsatilla alpina'	ferr	ugin 1.1	1.1	+	+	+	+	+	1.1	1.1	1.2	2.2	3.2	2.2	1.2	2.2	2.2	1.2	2.2	100
Serratula macrocephala Paradisea liliastrum	r +	+	+	1.1	1.1	+	+	+	1.1	+	+	1.1	1.1	+	+	:	1.1	1.1	1.1	95 79
Phleum hirsutum Onobrychis montana	+	1.2	+	+	+.2	+	+.2	+	+.2	+	+.2	(+)	+ 2.2	+			+			79 53
Lathyrus levigatus		+	1.1	+	+		+	+	r	:	:					÷			+.2	42
Carex ferruginea Espèces des unités supérieures (. Sesl	erie	tali	a, E	lyno	-Ses	leri	etea)		•									5
Helianthemum grandiflorum Sesleria coerulea	1.2	2.2	+.2	+.2	1.2		1.2	1.2	1.1	1.2	2.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	100 90
Phyteuma orbiculare Scabiosa lucida	+	+	:	1.1		+	r +	+	+ r	+	+	1.1	+	+	1.1	+	+	+	+	84 84
Galium anisophyllum Anthyllis alpestris	1:	+		+		+	+	+	1.2	+	+	+.2	+	1.2	1.1	1.2	1.2	+.2	+	74 68
Centaurea alpestris Hieracium villosum s.l.	+	+	+	+	+	+		+	1.2	+	+	+.2	+			+		+		68 63
Linum alpinum	+.2	+		+	+		r	+	1.1				+.2	+	+	÷	·.		+	58 53
Carlina acaulis Bupleurum ranunculoides	1:	+	r		+			÷	r	+	+	+	+	1.1	+	+	+	+	+	53
Carduus defloratus Rhinanthus subalpinus	1:	+	+	+		+	+	+	:	+		1.1	+		:	+	+	+	1.1	47 37
Satureja alpina Thesium alpinum	1.2	+.2	:		+		:		r	:	r	:	r	+	+	:		:		32 26
Alchemilla conjuncta Campanula thyrsoides	1:							:	:	+.2		+	+		:	:	1.2	+.2	:	26
Thymus polytrichus A.Kerner Potentilla crantzii	1.2	+.2	÷						÷	+.2	+.2				+.2	÷	+.2			21
Gentiana verna		·					:		÷		r			÷	+	+		:	÷	16
Globularia nudicaulis Arabis corymbiflora	r	·		:		r		÷	:	:	r	1.2	÷	÷	:			:	:	16
Erigeron alpinus Pedicularis adscendens	:		:	:	r	:	:	·	:	:	÷	÷	:	:	:	+	+		:	10
Senecio doronicum Euphrasia salisburgensis	1:	:		:	:		:			:	+	:	:			+.2	+	:	:	10 5
Aster alpinus Différentielles de sous-associat	١.	et	de v	aris	ntes							٠	٠	٠	+	٠	•	٠	٠	5
Buphthalmum salicifolium Galium mollugo ssp.	11.1		+	+	+	1.1	+	+	+		:	+	:	:	:	:			:	53 42
Stachys recta	+	+	+	+	+	+	+				÷	í	·	•		٠				37
Anacamptis pyramidalis var. tanayensis Chenev.	+	r	÷	r		r	r	r	r				÷							37
Carlina stricta (Rouy) Fritsch Dracocephalum ruyschiana	1.2				:		r	:	:	:	:	:	:	:	:		:	:	i	16
Anthericum liliago Dianthus silvester	+.2			:	÷	ŀ	:	÷	:	:	:					:				10
Carex humilis Echium vulgare	1.2 r	1.2	:	:	:		:	:	:	:	÷	÷	:	÷		:			:	10
Molinia coerulea s.l. Phaca penduliflora	:		•	+.2	r	+.2	2.2				•		:			:	:	:	:	26 16
All. Anemone narcissiflora	:		:	:	:				r	:	+.2	1.1	2.1	1.1		2.1	1.1		1.1	47
Polygonum viviparum Trollius europaeus	:				:			:			+	+	1.1		1.1		+	+	2.2	42 37
All. Pedicularis foliosa All. Festuca violacea	1	:	;	:		:	:	:		1	:	1.1	2.3		2.2	2.3			1.1	37
Campanula scheuchzeri Aposeris foetida	1:	:	:	:		4	:		:			r	:	+	r	1.1	+	1.1	1.1	32 26
Chaerophyllum villarsii Nigritella nigra			1	1	-	1							:	1.2	:		1.2	1.1	2.2 r	21
All. Crepis pontana	1	·			•	- 1						+					+	1.1	1.1	21 16
Soldanella alpina Leontodon hispidus	:			:					:		:			:	+		2.2			16
Compagnes 1. Molinio-Arrhenatheretea																				
Trifolium pratense Avena pubescens	+.2		+	+.2	+ .2	+	+.2	1.2	+.2	+	+	+.2		1.1			+.2		1.2	90 79
Dactylis glomerata Festuca rubra	+.2	+	1.1		:	+	+	+	1.2	1.2		1.2	2.2		:	2.2		+ + . 2		63 58
Pimpinella major Arrhenatherum elatius ssp.	+.2		2.2	1.1		1.1	1.2	1.2	1.2	:		:	+	2.1	+	:	2.2	+	2.2	53 53
Rhinanthus alectorolophus Tragopogon orientalis	+ r	+	+		+	+ r	r	+	r	1.1	1.1		(+)	:	:	:	:	:	r	47
Achillea millefolium	r	r	+		+	+.2	r +	r +		r	·	+				÷			:	42 42
Lathyrus pratensis Plantago lanceolata Poa pratensis	:								r	r		r	÷		÷	i	÷	÷	÷	16
2. Festuco-Brometea														•						
Prunella grandiflora Trifolium montanum	2.2	1.		1.2	2 +.		1.2	1.2		1.2	1.2	2 1.2	2.2		1.1		:	2.2	2 1.2	84 74
Euphorbia cyparissias Sanguisorba minor	+	+	r	+	r	+	r	r	r	+	+	r	:	+	+	:	:	:		68 42
Hippocrepis comosa Primula veris	+	+	:	r		+	:	+	:	+.2	+.2		:	:			+.2	+.2		32 32
Plantago media Brachypodium pinnatum	:	r •	+	+		:	+.2		:	r	r							+		26 16
Orchis ustulata Koeleris cristata				r					r				+.2	÷					÷	10
3. Trifolio-Geranietea Digitalis grandiflora		(+)		+				•			•				•		•		•	
Trifolium medium	+	1.3	1.1	+				3 2.2		+	+	:	:	1.2	:	1.2	1.2	+.2	2 .	63 58
Viola hirta Silene nutans	+	+		+		+	+	+	r	+.2		:	:	+	÷	:	:	:	:	58 42
Polygonatum officinale Origanum vulgare	+.2		+		2 +.	+ 2 +.2			:	+	r	:	:		:	:	:	:	:	42 42
Trifolium rubens Geranium sanguineum		+.		1.1		2 1.2	2 .		+	+		+	٠		•				:	37 26
Thalictrum minus 4. Rhamno-Prunetea		+			+		(+)			:					:					21
Rosa pomifera Sorbus mougeotii	+	:	+	·	+.3	+ +	:	:	:	+						÷	:			26 16
Cotoneaster integerrima Juniperus nana	+		:		+		÷	:	:	+		:	:	+	÷	:	:	:	:	16
Rhamnus alpina	+	:	:	:	:	+	:	:	:	r	+		:	:		:	:	:		10
Salix grandifolia Rosa rubrifolia	:	:	:	:	:	:	:	i		:	:	+	:		:	:	:	:	:	5
Sorbus aria Juniperus sabina	:	:	:	:	+.3	+	:		:	:									:	5
Viburnum lantana 5. Diverses	1:				+			i				i		·	i	i	÷	:		5
Laserpitium latifolium	1:1	3.3	3.2	2 2.2	2 1.2	2 2.2	3.3	2.3	2.1	1.1	+	+	2.2	3.3	3.2	2.2	2.2	1.2	2 2.1	100
Carex sempervirens Lotus corniculatus	1.2	+.	+	1.1	+	+	+.2	1.2	1.1	+.2	1.1	+	1.2	1.1	+.2	1.2	1.2	1.2	2.2	100
Laserpitium siler Gentiana lutea	2.2	2.	+	r	3.2			1.2	1.1	3.2	3.2	1.1	r	+	+		+	1.2	+	95 95
Astrantia major Briza media	1:	+	1.1	+	+	+	r +	+	+	+	+	2.1		1.1	1.1	+	+	+	+	95 84
Chrysanthemum montanum	1.1	+	1.2		+	+	r	+	+	1.1	+		+	+	1.1	+	+	+	+	84
Cymnadenia conopea Dianthus superhus ser	r	r			r	r	r	+	r	+	+	+	r	+		+	+	+	+	84
Anthoxanthum odoratum Cymnadenia conopea Dianthus superbus ssp. speciosus (Rchb.) Hayek Geranium silvaticum		r	+	+.2		+.2		r	r	+.2			r	1.2	+	+	+			79
Polygala chamaebuxus	1.	+.2	r	+	+	+		+	+ r	+	+	1.1	+	+		+	1.1	+		79 79
Crepis blattarioides Linum catharticum	+.2			+.2	+	1.1	+	+	1.2		+.2		(+)	+	2.2	+	+	1.1		74 68
Orchis globosa Calamagrostis varia		r +		2 2.2	2 .	2.2		3.3	2.3		+	+.2		+	:	+	:	r	+ 1.2	63 68
Carex flacca ssp. claviformis Ho Silene cucubalus	ppe		1.2	+.2	2 +		1.2	1.2		+	+	2.1						2.1		63 63
Lilium martagon Euphrasia hirtella	r	+	\pm	r	r		+	r		r			r	+	1.1	:	(+)		r	63
Hieracium murorum et mougeotii						+	:	+	+	+	+		+	+		+	+	1.1		53 53
Ranunculus nemorosus Ranunculus montanus	:	+	:	+	r	:	+	+	1.1	+	1.1	+	1.1	+	1.2	+	+	1.2		53 53
Campanula glomerata Centaurea montana	:	+ r	+	:	+	+	:	+.2	:	+ r	+		+	+	+			+	:	53
Polygala vulgaris et alpestris Valeriana officinalis		+		+	:	+	+.2 r		+.2		÷	:	i		i			+		42
Knautia silvatica Agrostis tenuis			1.1				+ r	+	. +	· +	+.2	:	:	:	:	+	÷	+	+	37
Festuca crassifolia (Gaudin)Zoll Cuscuta epithymum	ler +.2	1.2			1.2	2 .	+.2		+.2	1.2	+.2		+	÷		:	:	+.2		37 32
Convallaria majalis				3.2	2 .	+.2	1.2	1.2		+	1.1		÷	:	:	:	:	:		32 26
Campanula rotundifolia Agropyrum caninum	:	+		:	+ r	r		1.2		:	+	+	:	Ċ	:	:			:	26 26
Thesium pyrensicum <u>Accidentelles</u> (n) voir texte!	4		10		9	9	9	+.2 5			1		2	4	1	5	5	5		26
	_			-	_	-		100		1	-	-	- 0		-	-	-	100		1

Espèces accidentelles du tableau No 5. Peucedano-Laserpitietum.

No 1: Saponaria ocymoides, Galium verum, Sempervivum tectorum, Veronica spicata. No 2: Galium verum, Allium senescens. No 3: Vicia silvatica, Vicia sepium, Allium oleraceum, Campanula trachelium, Aconitum lycoctonum, Aconitum paniculatum, Stachys alpina, Hieracium prenanthoides, Chaerophyllum aureum, Campanula rhomboidalis. No 4: Saponaria ocymoides, Medicago lupulina, Lathyrus heterophyllus, Vicia silvatica, Botrychium lunaria. No 5: Aconitum paniculatum, Satureja vulgaris, Hypericum hirsutum, Phyteuma spicatum, Poa nemoralis, Allium oleraceum, Sempervivum tectorum, Allium senescens, Hieracium prenanthoides. No 6: Campanula trachelium, Cynanchum vincetoxicum, Picris hieracioides, Lactuca perennis, Orobanche laserpitii-sileris, Galium cruciata, Veronica chamaedrys, Medicago lupulina, Hieracium prenanthoides. No 7: Allium senescens, Heracleum sphondylium, Allium oleraceum, Cynanchum vincetoxicum, Festuca arundinacea, var. subalpina, Lathyrus vernus, Platanthera chlorantha, Fragaria vesca, Vicia sepium. No 8: Festuca arundinacea var. subalpina, Heracleum sphondylium, Cirsium acaulon var. caulescens, Fragaria vesca, Chaerophyllum aureum. No 9: Heracleum sphondylium, Listera ovata. No 10: Aconitum napellus, Thalictrum aquilegiifolium, Veronica spicata. No 11: Hieracium prenanthoides. No 12: Botrychium lunaria, Coronilla vaginalis, Alchemilla vulgaris, Cirsium acaulon, Potentilla erecta, Gentiana campestris. No 13: Myosotis alpestris, Alchemilla vulgaris. No 14: Plantago atrata, Botrychium lunaria, Luzula silvatica, Hieracium aurantiacum. No 15: Coeloglossum viride. No 16: Bellidiastrum michelii, Homogyne alpina, Bartsia alpina, Plantago atrata, Myosotis alpestris. No 17: Homogyne alpina, Bartsia alpina, Myosotis alpestris, Plantago atrata, Botrychium lunaria. No 18: Vaccinium myrtillus, Gymnigritella suaveolens, Listera ovata, Stachys alpina, Luzula silvatica. No 19: Plantago atrata, Alchemilla vulgaris, Homogyne alpina, Bellidiastrum michelii, Luzula silvatica, Campanula rhomboidalis, Ajuga reptans, Veronica chamaedrys, Trifolium badium, Carex ornithopoda, Taraxacum officinale.

En effet, la richesse exceptionnelle de ces prairies (avec des taxons relativement rares comme Anacamptis tanayensis, Carlina stricta, Dracocephalum ruyschiana, Crepis pontana), la vitalité remarquable des ombellifères et la coexistence peu commune de hautes herbes subalpines avec des espèces thermophiles des Festuco-Brometea et avec des plantes "mésophiles" un peu nitratophiles des Molinio-Arrhenatheretea peuvent s'expliquer, partiellement du moins, par l'écologie et par l'influence anthropo-zoogène:

- a) La situation au contact de la forêt potentielle de feuillus (Sorbo-Aceretum) permet le développement des espèces des ourlets thermophiles (voir Lathy-ro-Vicietum) et même de petites enclaves d'une association arbustive pré-forestière (voir Roso-Rhamnetum). Il est probable que des groupes d'arbres (Acer pseudoplatanus, Sorbus) et de buissons (Rhamnus alpina, Rosa, Juniperus) ont existé sur ces pentes, et la tendance évolutive vers le Sorbo-Aceretum est bien visible. Toutefois, ces pentes ensoleillées très raides, parcourues dès la fin de l'hiver par des glissements de neige mouillée et déneigées très tôt au printemps, ne permettent pas une maturation des sols et de la végétation jusqu'au stade boisé (la forêt ne se maintient que dans des endroits plus ou moins protégés des avalanches); au contraire ces conditions permettent la "descente" d'espèces alpines et la conservation d'espèces pionnières douées d'une force de concurrence plutôt faible.
- b) Aussi surprenant que la chose paraisse en 1977, une partie de ces prairies étaient fauchées et faiblement pâturées jusque vers 1950. Ceci a peut-être permis la survie d'un certain nombre d'espèces dites nitratophiles, du moins dans les stations inférieures (Dactylis, Arrhenatherum, Tragopogon dans les relevés 1 à 9). On pourrait aussi envisager au contraire que ces mêmes espèces auraient de tous temps fait partie de la végétation originelle et qu'elles se seraient propagées jusqu'en plaine après les défrichements.

Le Peucedano-Laserpitietum est en contact avec les groupements suivants :

- a) dans les stations les plus sèches, avec le *Teucrio-Globularietum* des vires rocheuses, avec le *Lathyro-Vicietum* et le *Roso-Rhamnetum* qui borde la forêt d'érables, enfin avec le groupement à *Chaerophyllum aureum* et *Myrrhis dorata* parcouru par le bétail,
 - b) dans les stations fraîches, avec le Caricetum ferrugineae,
 - c) en altitude avec le Seslerio-Caricetum et le Senecioni-Caricetum,
- d) sur les sols les plus argileux, avec le Serratulo-Caricetum BERSET 1954 qui est plus acidophile.

En outre, l'association a des affinités floristiques avec l'Asphodelo-Caricetum SUTTER 1962 (du Caricion austroalpinae) du versant sud des Alpes et avec le Campanulo-Laserpitietum BEGUIN 1972 du Jura occidental.

L'association est répandue dans toutes les Préalpes calcaires de la Suisse occidentale et plusieurs relevés de DUTOIT (1934) des Préalpes vaudoises, peuvent lui être attribués.

On peut se demander pourquoi j'ai repris l'étude de ces prairies, en proposant d'en modifier le nom, alors que BERSET en avait publié en 1954 une première analyse. La cartographie de la végétation du Vallon des Morteys m'a montré que l'analyse de BERSET ne recouvrait qu'une partie de l'amplitude écologique de l'association et que, dans la majorité des cas, le nom (Association à Avena pratensis et Peucedanum austriacum) que cet auteur lui avait donné alors ne correspondait plus à l'aspect actuel de la végétation.

La comparaison des deux tableaux (BERSET 1954 et RICHARD 1977) fait apparaître en effet les différences significatives suivantes:

- a) le nombre spécifique moyen est de 58 chez BERSET, de 66 chez moi, pour des surfaces moyennes de relevés de 60 m² chez BERSET et de 50 m² chez moi.
- b) la grande majorité des espèces mieux représentées chez BERSET sont des xérophiles (Allium sphaerocephalum, A. oleraceum, Geranium sanguineum, Carduus defloratus, Avena pratensis, Brachypodium pinnatum, Trifolium rubens, etc.) tandis que celles qui sont mieux représentées chez moi sont des plantes des stations fraîches ou elevées (Pulsatilla alpina, Trollius, Anemone narcissiflora, Pedicularis foliosa, Astrantia major, Aposeris, Gentiana lutea, Geranium silvaticum, Lilium martagon, Campanula thyrsoides, Crepis pontana, Nigritella nigra, etc.).
- c) Le taux de recouvrement des deux *Laserpitium* est insignifiant chez BERSET, mais beaucoup plus important chez moi.
- d) Les orchidées Anacamptis, Orchis globosa et Gymnadenia conopea qui n'existent pas chez BERSET, apparaissent chez moi avec les fréquences respectives de 37, 63 et 84 %.

Pourquoi de telles différences? Ou bien la végétation a évolué depuis l'abandon du fauchage et du pâturage, ou bien les auteurs successifs n'ont pas choisi leurs placettes dans les mêmes milieux.

Il est dangereux de comparer deux etats successifs de la végétation et d'en tirer des déductions sur une succession hypothétique lorsque la situation et l'aire des placettes n'ont pas été fixées avec précision sur le terrain, ceci d'autant plus que dans notre cas, les relevés furent réalisés par deux personnes différentes! Tous les relevés de BERSET ont été localisés et faits par lui-même en compagnie de son ami J. BRAUN-BLANQUET le 24 juillet 1946. Il n'est pas désobligeant de suspecter ces deux auteurs (qui sont d'excellents floristes) d'avoir orienté leur choix d'avantage en fonction d'espèces relativement rares et localisées dans des stations spéciales (les plus sèches) qu'en fonction du type de végé-

tation le plus répandu. De plus, on conçoit aisément qu'il n'eût pas été possible, en un seul jour et en térrain très escarpé, à la fois de faire neuf relevés d'une soixantaine d'espèces chacun et de montrer toute l'amplitude écologique d'une
nouvelle association. En ce qui me concerne au contraire, les relevés faits entre
1971 et 1975 ont été choisis à l'occasion de nombreuses excursions de manière
à montrer toute l'amplitude de l'association jusqu'à son contact avec les groupements avoisinants.

Afin de contrôler les observations ci-dessus au moyen d'une technique numérique (analyse factorielle des correspondances), j'ai fait traiter par ordinateur et transcrire graphiquement les tableaux des deux auteurs (Ass. à Avena pratensis et Peucedanum austriacum et Peucedano-Laserpitietum) auxquels j'ai adjoint le Serratulo-Caricetum qui est très voisin. La figure no 4 montre qu'il n'y




Fig. 4. Analyse factorielle des correspondances. Carte des relevés.

⁵ Voir GUINOCHET (1973), p.41.

a pas de confusion possible avec le Serratulo-Caricetum. On voit ensuite que l'Association à Avena et Peucedanum BERSET 1954 (à part le relevé No 1 qui est le seul à posséder Festuca violacea, Pulsatilla alpina, Alchemilla conjuncta et Pedicularis foliosa et qui peut être rattaché sans autre à l'aile mésophile du Peucedano-Laserpitietum) est la plus xérophile: en effet, les relevés 2 à 5 font partie du même nuage de points que les relevés 1 à 7 du Peucedano-Laserpitietum (sous-ass. à Buphthalmum) tandis que les Nos 6 à 9 sont situés à l'aile droite (encore plus xérophile). On voit enfin que le Peucedano-Laserpitietum couvre une plus large amplitude écologique et que l'ordinateur à distribué les relevés presque "intelligemment", c'est-à-dire presque dans le même ordre que je l'avais fait moi-même dans le Tableau No 5 selon la technique manuelle classique!

En tenant compte de la psychologie des auteurs, du temps dont ils disposaient et des résultats de l'analyse factorielle des correspondances, je crois pouvoir interpréter les différences relevées à la page 19 comme suit :

- a) L'augmentation du nombre spécifique moyen, du taux de recouvrement des grandes ombellifères et des hautes herbes, l'apparition des grandes orchidées peut être la conséquence (partiellement du moins) de l'abandon du fauchage et du pâturage.
- b) La prédominance d'espèces xérophiles chez BERSET et d'espèces mésophiles dans mes relevés (en fait la plupart des taxons de ma sous-association à *Anemone narcissiflora*) indiquent que les milieux ne sont pas exactement les mêmes, bien que les espèces caractéristiques figurent pour la plupart dans les deux cas.

Par conséquent, je pense avoir pu donner une vue d'ensemble plus étendue de l'association que n'a pu le faire BERSET dans le peu de temps dont il disposait. Je propose donc de modifier le nom de l'association et de la nommer *Peucedano-Laserpitietum* pour mieux tenir compte de l'aspect actuel de la végétation dans la grande majorité de ses peuplements.

Lorsqu'on s'efforce de rendre compte de toute l'amplitude écologique de l'association dont BERSET (1954) ne décrit que l'aile xérophile (son relevé No 1 exclu) et qu'on la compare aux autres prairies montagnardes et subalpines des Préalpes occidentales (qui sont mieux connues aujourd'hui qu'en 1954), on s'aperçoit qu'il faut modifier le rôle hiérarchique ou le statut phytosociologique des espèces suivantes: Avena pratensis (qui est une espèce du Bromion) devient différentielle d'association, Buphthalmum salicifolium (du Geranion sanguinei), Carlina stricta (syn. de C. longifolia) et Dracocephalum ruyschiana deviennent différentielles de sous-association, tandis que Serratula macrocephala et Paradisea liliastrum passent dans le groupe des espèces de l'alliance (Caricion

⁶ Les relevés 18 et 19 ont été ajoutés au tableau après le traitement par l'ordinateur.

ferrugineae). Enfin, je pense que BERSET a confondu Viola pyrenaica avec V. hirta (Trifolio-Geranietea) et que je n'ai pas su reconnaître Potentilla parviflora et Erigeron atticus.

Au point de vue synsystématique, l'association reste provisoirement attribuée au Caricion ferrugineae BR.-BL. 1931. Cependant, on peut se demander si l'on ne devrait pas réunir en une alliance distincte, nommée Laserpition latifolii, des associations relativement thermophiles à grandes ombellifères comme Seslerio-Laserpitietum MOOR 1957, Laserpitio-Calamagrostietum (KUHN 1937) MOOR 1957, groupement à Crepis blattarioides et Laserpitium latifolium RI-CHARD 1968, Campanulo-Laserpitietum BEGUIN 1972 et Peucedano-Laserpitietum, avec des espèces comme Laserpitium latifolium, L. siler, Peucedanum austriacum, Astrantia major, Serratula macrocephala et Crepis blattarioides.

Localisation des relevés:

1, 3: Entre Oussanna et Chaux de Brenleire,

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9: au-dessus de Oussanna,

10, 11, 13, 18, 19: Brenleire Dessus,

12: Les Bimis,

14, 16, 17: Entre Chaux de Brenleire et Brenleire Dessus,

15: Entre Roches.

Le type nomenclatural est représenté par le relevé No 3 pour la sous-association à *Buphthalmum* et par le relevé No 14 pour la sous-association à *Anemone narcissiflora*.

6.1.7. La pelouse à seslérie et laiche toujours verte (Seslerio-Caricetum sempervirentis, Tableau No 6) n'occupe jamais de grandes surfaces dans la région du Vanil Noir. Cette association de l'étage alpin, qui comprend plusieurs orophytes médio- et sud-européens et dont le centre de gravité se trouve dans les montagnes calcaires sèches, est concurrencée, dans les Préalpes fribourgeoises et vaudoises dont la pluviosité estivale est bien connue des botanistes de terrain, par des groupements du Caricion ferrugineae.

C'est une pelouse en gradins, ouverte, riche en espèces aux couleurs variées à l'époque de la floraison, époque qui s'étend sur 5 mois (d'avril à fin août). Pour éviter des répétitions, je me bornerai à citer les caractères propres à l'asso-

⁷ L'association est epurée de groupements mésophiles du Caricion ferrugineae. Les pelouses mentionnées par GILOMEN (1941) au versant sud de la Dent de Brenleire sous le nom de "Seslerietum coeruleae alpinum" comprennent l'ensemble des trois groupements suivants: Seslerio-Caricetum, Senecioni-Caricetum et Peucedano-Laserpitietum.

6. Seslerio-Caricetum sempervirentis

6. <u>Se</u>	eslerio-Caricetum sempe	rvire	entis	<u> </u>																						
No Altit	tude (10m)	1 213	2 231	3 235	4 213	5 230	6 219		8 238				12 205							19 213		21 230	22 230	23 230	24 230	
	sition	S	S	W	S	S	S		S						S					S	S	S	E	E	E	
Pente								150				120		90		100				90			100			
	ace (m2) ovrement (%)	5 20	2	2	10	5 50	5		10 70	3 50		5 70	2	5 50	6 70			6 80		30 80	20 80	20 90	3 80	6 90	30 60	
	re d'espèces		17		26	29				S					41			31						40		
Auteu	ır														S			S					S		_	
Carac	 ctéristiques d'associat	ion																								
Oxytr	copis jacquinii		1.2	+.2		1.2	+.2	2.2	2.2	1.2	r	+	÷			1.2			+.2			+.2	+		1.2	79
	topodium alpinum Érentielles locales de]							•	•	•	+	1.2	•	1.1	+.2	1.1	+.2	1.2	•	1.2	1.2	+.2	46
	anula cochleariifolia	+.2		+.2	r	. et	ı e	·	intes	<u>-</u>															.	13
Ranun	nculus alpester	1.1	+	-	$\overline{}$	+													(*)		•					13
	osace helvetica	(+)	•	•	+.2	•		•	•	•	*	٠	•	•	•	•		•	•	•			•	•		8
	ocallis pyrenaica a aizoides	1.2	•	+.2	r		+	+	+	+	r	+.2	+	+.2	+.2	:	:		:	:	:	:		:		46
	manta cretensis	+	+	-	+	+	+		•	•	•		+		+											29
	Fraga moschata	+.2			•	•	•	+.2	+	•		+.2	+	+.2	•	٠	٠	•	•	•	•	•		•		25 17
	ophila repens Lana orbicularis	:	+	+	+.2	+	+.2	+.2	1.2	+.2	+.2	:			:	:			:	•	:	:		:	:	29
	agalus australis				+	+		1.2	+.2																	17
	ularia cordifolia		•	•	•	•	•	•	•			3.3		1.3	1.2	٠	٠	•	•	*	•	*	•	•		29 17
	thus silvester nica fruticulosa	1	•	•	•	•				+.2	+	1.2	+	:	+.2	:					:		:	:	:	13
	ervivum tectorum			i					ì			+	+													8
	anula thyrsoides				•	•		•	٠	•		+	+	+	+	+	r	•	•	*	•	•	•			25 21
	ervivum arachnoideum	:					:		+			:	+.2	+.2	+.2	:	+	+	+	+	+	+	+	+	+	42
	ala farinosa	:															+	+	1.1	+	1.1	•	+	+	+	33
	assia palustris			•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	+	•	+	1.1	1.1		+	+	+	29 25
200000000000000000000000000000000000000	sia alpina anula scheuchzeri		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•			:	+	:	•	+	:	1.1	+	+	+	17
0.Festu	aca violacea	:						·	·											1.2	1.2					13
	s octopetala	١.								`				•			+.2		•						3.3	8
	ces de l'alliance et de eria coerulea	1'0	rdre +	(Sea				lerie +.2			1.2	1.2	+.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	100
	um anisophyllum			+		+.2		1.2		+	+.2		+	1.2	+	1.1	+	+.2		1.2	1.2	1.2	+	+	+.2	83
	rasia salisburgensis		1.1		+	+	+		1.1		1.1						+	+			1.1		+	+	+	83
	yllis alpestris us polytrichus		*	•	+.2	1.2	+.2	1.2			+.2		+	2.2	1.1 +.2		+.2	+	+.2	+.2			1.1	+.2		79 7 9
	iana clusii			•	+		+	+		+	r		+	+	+		+	r	:	+	+	r	+	+	+	67
Buple	eurum ranunculoides				+	•		+						+	+	+	+	+	+	+	+	+		1.1	+	58
	eron alpinus		•	+	٠	•	•	+ + 2	+.2	٠	1.2	+.2	1.2	1.2	2.2	1.2	+	+	+.2	3.3	1.2	2.3	+	+		54 50
	anthemum grandiflorum euma orbiculare	:	:	:	:	:		+.2	+.∠			+ • ∠				+	+	:	+	+	+	+	:	:		29
Hiera	acium villosum s.l.										+				+					r	+			+	+	25
1	uus defloratus		٠	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	+	+	•	+	٠	•	٠	+	•	1.1	+	•		25 25
	ium alpinum a frigida	1:	:		•	•	:	:	:		:	:	:			:		+		+		+.2	+	+		21
Pulsa	atilla alpina										r					r	r					(+)				17
	iosa lucida			•		•	٠	•	•		•	*	•	*	•	+	•	•	•	1.2	+	(+)	*	+		17 13
	m alpinum cio doronicum	:			•		:	:	:	:	:	:	+	:	+	:	:	:	:			+				13
	anthus subalpinus											+		+												8
	utella levegata				٠	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•		•	*	+	+		•	•		8
	um hirsutum m atr a tum		•	•	•	+	•		•	*	•				•	+	:	•		•	•	+.2	•			8
	reja alpina		i												+				÷							4
	rychis montana				•		•			*	+.2				٠			•		•	*	•	•	٠		4
	one narcissiflora ces de la classe (Elyno	1 .	lori			•	•		•		•	•	•	•	٠	•	•	•	*	•	+	•	•	•		4
	uca pumila	(+)	1.2	1.2	+.2																				1.1	100
	anthemum alpestre	+.2	1.2		1.2																				2.2	
	r alpinus artia verna		+.2		+ 2	1.2		1.2			1.2							1.2	+	1.2	+.2	+			1.2	100000
	artia verna cularis verticillata	:		+	r.2	+	:	+.2		+.2	+			+		+	1.1		+	+	+	+	+	+	+	67
Elyna	a myosuroides	+.2				1.2		1.2		2.3	+.2				+.2			2.2				•			2.2	62
	osace chamaejasme aria multicaulis		•	•	•	1.1		•	•	1 2	++.2	+ ?	+ 2	+.2 1.2		+.2	1.1		+.2	+ + 2	1.1	+.2		+	1.1	54 54
	ne acaulis	1.2	+.2	:	+.3	+.2		÷			•	•	•	+.2		+.2		+.2						+.2		46
Oxyta	ropis campestris						1.2					1.2	+		1.1		r	+	٠	٠	٠		•	+	•	33
	sarum hedysaroides ntilla crantzii		•	r	+	•	•	•	•	•	•	+	•	•	•	٠	+.2	+	2.3	+	٠	•	+	+.2	+	21
	ntilla crantzii iana verna	:				:	:	:			:	•	:	+	+	:	+ +	:	•••		÷	+				17
Gent:	iana nivalis							+		•	1.	+									r					13
	x retusa orchis alpina	r	•	+.2	•	•	•	•	•	•	•	•	٠		•	•		٠	٠	•		٠	+.2	+		13 4
1	orchis alpina agnes	r	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•		-
	fraga aizoon	+	+.2	+.2	+	+.2	+.2	1.2	1.2	+	+	+.2	1.2	+.2	+.2	+	+	1.2		+	+.2	+	+.2	+.2	+	96
Ranur	nculus montanus		+		+	+	+	1.1	1.1		+	+		+	+	2.1	+.2	+	1.1	+	+	1.1	+	+	+	83
	uca crassifolia Zoller ula auricula	,i.	•	+	•	+	+	1.2		+ r		1.2				1.2		+.2	1.2						+.2	75
	x sempervirens	1	+.2		+.2		1.2		+		2.2		+	1.2	1.2	3.3	1.2	+	2.2	+ 3.3	2.2			1.2	2.3	79 71
Myoso	otis alpestris			+				+	+		+		+	+	+	+	+		+	+	+				r	62
	stis alpina fraga oppositifolia	1.2	1.2					+.2			2.2	1.2	٠	1.2	٠	•	2.2	+		+.2		•			+	67
	gonum viviparum	1.2	+.2	+	+.2	+	1.2	+.2	+.2	+.2	:			+		•	2.1	+.2			+.2 1.1				+.2 1.1	62 58
	alpina						+			r	+	1.1	+	+							r		•		1.1	38
			•					+	+		+	1.2			+	+		•					+	+		38
Genti	iana campestris				*	٠	٠	(+)	+.2	٠		•	•	r +	•	•	+	٠	r	•	+	•	r	r	r	25 25
Genti Nigri	itella nigra		•	100				V T 1														. 1				
Genti Nigri Veror Veror	itella nigra nica fruticans nica aphylla		:	+	+		:					÷	r		:	r	+		:			+	:		:	21
Genti Nigri Veror Veror Chrys	itella nigra nica fruticans nica aphylla santhemum montanum		:	+	+	•	•	•		:	•	:	r +		+	r +	-	:	:	:	:	1.1	:	•	:	21 17
Genti Nigri Veror Veror Chrys Gymna	itella nigra nica fruticans nica aphylla santhemum montanum adenia albida			+	+	•		•		•	•	:			+	r + r	+	:	:	:		1.1 r	:	:		21 17 17
Genti Nigri Veror Veror Chrys Gymna Belli	itella nigra nica fruticans nica aphylla santhemum montanum			+	r	:		•		•					+	r +	+	:	:	:	· · ·					21 17
Genti Nigri Veror Veror Chrys Gymna Belli Lotus	itella nigra nica fruticans nica aphylla santhemum montanum adenia albida idiastrum michelii							•								r + r	+		6		r					21 17 17 13

Accidentelles: No 3: Hutchinsia alpina, Ligusticum mutellinoides.No 5: Minuartia sedoides. No 11: Cuscuta epithymum, Koeleria cristata, Cerastium strictum, Trifolium thalii. No 12: Cuscuta epithymum, Sedum album. No 14: Juniperus nana, Primula veris, Euphorbia cyparissias. No 15: Arctostaphylos uva-ursi, Trollius europaeus. No 16: Luzula spicata, Alchemilla vulgaris, Trollius europaeus. No 18: Coeloglossum viride, Avena pubescens, Luzula spicata, Alchemilla vulgaris, Anthoxanthum alpinum, Leontodon hispidus. No 19: Silene cucubalus. No 20: Leontodon hispidus. No 24: Antennaria carpathica, Ligusticum mutellinoides.

.

a A

ciation des sommets entourant le vallon des Morteys. Lorsqu'on s'efforce de délimiter très soigneusement les surfaces des relevés pour tenir compte des finesses dues au sol et au climat local, on s'aperçoit que les peuplements ne sont pas aussi riches en espèces qu'on le prétend. BRAUN-BLANQUET (1969, p.68) signale un nombre spécifique moyen de 42 pour des surfaces de l'ordre de 50–100 m² et BERSET (1968/69 p.39) publie un relevé, fait avec BRAUN-BLANQUET, comptant même 52 espèces sur 100 m². Je n'ai que rarement rencontré des surfaces homogènes aussi grandes et c'est pourquoi le nombre spécifique moyen de l'association n'atteint que 35⁸ pour la région. Ceci n'empêche pas que l'association, considérée dans toute son amplitude écologique, soit très riche en phanérogames: en effet, les relevés du tableau No 6 groupent 108 taxons et ce nombre se réduit à 100 lorsqu'on exclut les stades pionniers⁹. C'est tout de même considérable.

D'entente avec E. OBERDORFER, je n'ai conservé, comme espèces caractéristiques, que les deux orophytes Oxytropis jacquini (Alpes centrales et orientales, Montagnes illiriques) et Leontopodium alpinum (Europe centrale et méridionale) qui, sans être exclusifs, ont nettement leur optimum dans l'association. Peut-être pourrait-on leur adjoindre Gentiana orbicularis (médio- et sud-européen) et Senecio capitatus (arctico-alpin qui ne se rencontre en Suisse que dans les Préalpes du nord). Je ne connais toutefois pas assez la distribution de ces deux espèces dans nos montagnes, de sorte que je préfère leur attribuer provisoirement le rôle de différentielles de sous-associations puisqu'elles semblent s'exclure mutuellement. Le fait que les espèces des unités syntaxonomiques supérieures sont si bien représentées, tandis que les compagnes et les accidentelles sont beaucoup moins nombreuses, confirme la position centrale de l'association dans la classe Elyno-Seslerietea.

Le tableau No 6 tente de rendre compte de la variabilité floristique et de l'amplitude écologique de l'association. En attendant de pouvoir disposer d'une vue synthétique sur l'ensemble du *Seslerio-Caricetum*, je propose deux sous-associations de valeur locale:

⁸ Le nombre spécifique moyen de 35 se rapporte aux relevés 6 à 24. Les relevés 1 à 5 correspondent à des stades pionniers ou même à des transitions avec l'Androsacetum helveticae.

⁹ BRAUN-BLANQUET (1969, p.69) en compte 95 pour les 15 relevés des Alpes rétiques.

- 1. Une sous-association xérophile à *Draba aizoides* ¹⁰ (Relevés 1 à 15, taux de recouvrement moyer 50 %, ou 60 % si l'on exclut les stades pionniers) sur des croupes ou affleurements rocheux très exposés au vent, peu enneigés pendant l'hiver et mal protégés de la sécheresse et des variations de température: on remarque en outre une variante à *Gentiana orbicularis* et *Astragalus australis* sur des rochers très fissurés, dans des situations de crêtes, et une variante à *Globularia cordifolia* et *Dianthus silvester* dans des stations plus abritées et plus chaudes; enfin, on distingue un stade pionnier dans des stations les plus rocheuses, sur les vires interrompant les falaises, avec des espèces comme *Campanula cochleariifolia*, *Ranunculus alpester* ¹¹, *Androsace helvetica* et *Petrocallis pyrenaica* rappelant la proximité immédiate de l'*Androsacetum helveticae* (Relevés 1 à 5. Taux de recouvrement inférieur à 50 %. Nombre spécifique moyen: 21).
- 2. Une sous-association plus mésophile à Senecio capitatus (Relevés 16 à 24, taux de recouvrement moyen: 80 %) avec d'autres espèces arctico-alpines comme Primula farinosa et Bartsia alpina qui peuvent subsister sur ces pentes moins rocheuses quoique très raides où la sécheresse est moins accusée. Le relevé No 24, avec Dryas octopetala, Antennaria carpathica et Ligusticum mutellinoides rappelle l'Elynetum qui n'est que très peu représenté dans une région où le plus haut sommet n'atteint pas 2400 m d'altitude.

On pourrait se demander pourquoi ce groupement qui comprend pourtant Elyna myosuroides, Oxytropis campestris et Gentiana orbicularis et où les orophytes médio- et sud-européens sont à peu près à égalité avec les taxons arctico-alpins, n'est pas classé dans l'Oxytropido-Elynion: les meilleures caractéristiques et différentielles (parmi celles qui existent dans la région) de cette alliance, comme Carex atrata, C. capillaris, C. rupestris, Festuca alpina, Chamorchis alpina, Ligusticum mutellinoides, Artemisia mutellina, Antennaria carpathica et surtout les lichens, manquent ou sont vraiment trop rares; d'autre part, l'association possède trop d'espèces mésophiles comme Anthyllis alpestris, Helianthe-

- 10 Dans le Jura, BEGUIN (1972) propose la création d'une sous-alliance *Drabo-Seslerion*, groupant les pelouses "ouvertes" des affleurements rocheux, unité à laquelle le *Seslerio-Caricetum* présenté ici pourrait se rattacher sans difficulté. Cependant, je pense que seule une comparaison portant sur l'ensemble des groupements du *Seslerion* de l'arc alpin permettrait de confirmer, ou d'infirmer, cette proposition que je trouve prématurée.
- 11 La présence de Ranunculus alpester dans ces stations confirme que dans la région cette espèce n'est pas uniquement un spécialiste des combes à neige, mais plutôt des fissures de rochers calcaires ou Asplenietalia rutae-murariae, synonyme de Potentilletalia caulescentis BR.-BL. 1926. Voir à ce sujet RICHARD, 1972, p.94.

7. <u>Senecioni-Caricetum sempervirentis</u> prov.

No	1	2	3	4	
Altitude (10m)	191	195	212	212	
Exposition	SE	SW	S	S	
Pente (%)	70	70	90	80	
Surface (m2)	20	30	20	30	
Nombre d'espèces	44	57	48	45	
Auteur	S			S	
	_				
Caractéristique locale et différ	entiel	les d	asso	ciatio	on
C Senecio doronicum	1 +	+	+	+	4
Daphne mezereum	+		r	r	3
Juniperus nana		+	+	+	3
Company and the company of the compa		-	+	+	3 2
Cotoneaster integerrima		. •		-	
Espèces de l'alliance (Caricion					١.
Festuca violacea	2.2		2.2		4
Pulsatilla alpina	2.2		+	+	4
Phleum hirsutum	1.2	1.2	1.2	1.1	4
Pedicularis foliosa	+	+	+	+	4
Espèces des unités supérieures	1				
(Seslerietalia, Elyno-Sesleriete	a)				
Helianthemum grandiflorum	2.2	2.3	2.2	2.2	4
Sesleria coerulea	2.2		2.2		4
Bupleurum ranunculoides	+.2	1.1			4
Alchemilla conjuncta	+.2	+.2	6 6000	+.2	4
Anthyllis alpestris	+ +	1.1		+	4
	200				
Galium anisophyllum	+.2	+	+	+	4
Phyteuma orbiculare	+	+	+	+	4
Carduus defloratus	+	+	+	+	4
Carlina acaulis	+	+	+	+	4
Linum alpinum	+	+	+	+	4
Erigeron alpinus		+	+	+	3
Scabiosa lucida		+	+	+	3
Campanula thyrsoides		r	r	+	3
Senecio capitatus		+	+		3 3 3 2
Rhinanthus subalpinus	1.1	1.1	-		2
Hieracium villosum	+	+		•	2
Aster alpinus	+	1.1	•	•	2
1	7		•	•	1
Thymus polytrichus		+.2	•	•	1
Gentiana verna	•	+	•	•	1
Polygala alpestris		r	•	•	1
Potentilla crantzii		+	•	•	1
Euphrasia salisburgensis		r			1
Arabis corymbiflora		r			1
Satureja alpina	+				1
Centaurea alpestris	+				1
Compagnes	l				
1. Espèces des Molinio-Arrhenath	Leretea	L			
Festuca rubra	1.2	+.2	1.2	1.2	4
Avena pubescens	+	+	+	+	4
Trifolium pratense	+	1.1	+	+	4
Lotus alpinus	+	1.2		1.2	4
	*				
Tragopogon orientalis		r	+	r)
Pimpinella major		1.1	1.1	1.1	3 3 3
Alchemilla vulgaris	+	•	r	r	3
Leontodon hispidus		+	+.2	+.2	3
2. Diverses					
Carex sempervirens	3.3	3.3	3.3	3.3	4
Anthoxanthum odoratum	1.2	1.2	1.1	1.1	4
Campanula scheuchzeri	+	1.1	1.1	1.1	4
Polygonum viviparum	+	1.1	+	+	4
		+	+	+	4
Chrysanthemum montanum	+				
Myosotis alpestris	+	+	+	+	4
Orchis globosa	+	+	+	r	4
Ranunculus nemorosus	+	+	+	+	4
Geranium silvaticum	+	•	+	+	3
Festuca crassifolia Zoller		1.2	1.2	1.2	3 3 2 2
Coeloglossum viride		+	r	r	3
Silene cucubalus	+		r		2
Hieracium murorum	+	+			2
Nigritella nigra	+	r			2
Bartsia alpina			+	+	2
Sempervivum tectorum		-	r	r	2
			r	r	2
Valeriana tripteris	٠.	•	+	+	2
Cirsium acaulon		•			2
Primula elation	6	•	+	+	_
Accidentelles (n)	ь	9	1	U	
		on th			Iono

Accidentelles: No 1: Poa alpina, Linum catharticum, Silene nutans, Plantago atrata, Prunella grandiflora, Knautia silvatica, No 2: Laserpitium latifolium, Bellidiastrum michelii, Ranunculus montanus, Gentiana campestris, G. lutea, Trollius europaeus, Astrantia major, Euphrasia hirtella, Centaurea montana. No 3: Hippocrepis comosa.

mum grandiflorum, Hieracium villosum, Carex sempervirens, Ranunculus montanus qui sont exclues dans un Elynetum.

Localisation des relevés du Seslerio-Caricetum:

- 1, 2, 5, 6, 10, 13, 15, 16, 18–20, 24: Dent de Brenleire/FR,
- 3, 7, 8, 21: Vanil Noir/FR et VD,
- 4, 12, 14, 17, 22, 23: Dent de Folliéran/FR,
- 9: Vanil de Crozet/FR,
- 11: Schopfenspitz sur Jaun/FR.
- 6.1.8. Le groupement à laiche toujours verte et séneçon doronie (Senecioni-Caricetum sempervirentis prov., Tableau No 7) est une pelouse en gradins qui occupe de grandes surfaces sur les marnocalcaires des versants ensoleillés. Riche en espèces (nombre spécifique moyen = 48) et en couleurs variées lors de la floraison, il est intermédiaire entre le Seslerio-Caricetum et le Serratulo-Caricetum dont il ne possède les caractéristiques ni de l'un ni de l'autre. Il appartient au Caricion ferrugineae et les espèces des prairies et pâturages frais (Molinio-Arrhenatheretea) traduisent des conditions ecologiques moyennes et indiquent que ces pelouses sont encore accessibles au bétail.

Les relevés proviennent des localités suivantes :

- 1: entre les Morteys Dessous et les Marindes,
- 2: Morteys de Folliéran,
- 3, 4: Pied de la Dent de Folliéran.

Le type nomenclatural est représenté par le relevé No 4.

6.1.9. Le groupement à globulaire et germandrée (Teucrio-Globularietum prov., Tableau No 8) colonise les petites vires des parois de rochers ensoleillées entre 1500 et 1800 m d'altitude. C'est un groupément très "ouvert" qui doit à ses conditions écologiques exceptionnelles la présence de reliques oroméditerranéennes rares au nord des Alpes: Astragalus depressus, A. sempervirens et Carex liparocarpos.

L'aspect de ce groupement est défini surtout par Globularia cordifolia et Teucrium montanum qui s'étendent en tapis sur les rochers, ainsi que par Veronica fruticulosa, Festuca crassifolia et Carex humilis.

Le *Teucrio-Globularietum*, qu'on rattache facilement au *Seslerion*, est-il une association? Je ne saurais l'affirmer sur la base d'un si petit nombre de relevés provenant tous de la même région. La présence de reliques xérothermiques et de différentielles xérophiles m'a incité à le séparer du *Seslerio-Caricetum*, bien que ce dernier possède une sous-association locale à *Globularia cordifolia*.

8. Teucrio-Globularietum prov.

No	1	2	3	4	5	6	7	
Altitude (10m)	153	163	160	160	157	160	180	
Exposition	S	S	S	S	S	S	S	1
Recouvrement (%)	40	40	50	60	50	50	40	1
Surface (m2)	1	1	2	2	2	2	3	
Nombre d'espèces	17	18	18	21	22	23	24	
2	1:00/		7.7	7.				
Caractéristiques locales et Globularia cordifolia	2.2		1.2	2.2	2.3	2.3	1.2	100%
Teucrium montanum	1.2	2.3	+.2	2.2	1.2	3.3	1.2	100/8
Campanula rotundifolia	+	+		+	+		10000000	100
Sempervivum tectorum	- 82	+	+	0070	+	+	+	1000000
	+	•	+	+	•	+	+	71
Astragalus depressus		•	+.2	•	+	•	•	29
Astragalus sempervirens	٠.	•	•	•	•	•	2.3	14
Espèces des unités supérieur		80. 800 n 11 80		\				
(Seslerion, Seslerietalia, E								
Thymus polytrichus	2.2			2.2	+.2	+.2	+.2	100
Sesleria coerulea		+	+	+	•	+	+	71
Helianthemum grandiflorum		•	+	1.2	•	+	+	57
Euphrasia salisburgensis	+	+		•	•	•	+	43
Aster alpinus	+	•		•	•		+	29
Bupleurum ranunculoides	+	•	•	•	•	•	+.2	29
Galium anisophyllum			+	•	•	•	+	29
Centaurea alpestris	+							14
Leontopodium alpinum		1.2						14
Satureja alpina		+			•	•		14
Globularia nudicaulis						+		14
Draba aizoides						+		14
Peucedanum austriacum							+	14
Compagnes								
1. Rupicoles								
Veronica fruticulosa	2.2	+	+	1.2	+	2.2	+.2	100
Gypsophila repens	1.2	2.3		+.2	+.2	+.2	4	71
Sedum album	+.2		+.2		1.2	+.2		57
Sedum dasyphyllum		-	+		+	+	+	57
Allium senescens	+			+	1.2	+		57
Primula auricula		+		121	+		+	43
Kernera saxatilis						+		14
Asplenium ruta-muraria		•	•	•	•	1		14
2. Xérophiles		•	•	•	•	are.	•	14
Laserpitium siler	+	60	(325)	r	r	r	r	71
Carex humilis	T		+.2	1.2	+.2	1.2	1	57
Anthericum liliago	+	+	1 • 2	+	+.2		•	57
Dianthus silvester	Т.	-	•	T		•		43
Stipa calamagrostis		•	+,2	•	+.2	•	+	
		•	•	•	•	+	+	29
Sapanaria ocymoides Veronica spicata		•	•		**	+	+.2	29 29
		•	•	+	+	•	1 1	
Carex liparocarpos		•	•	•	•	•	1.1	14
3. Diverses	¹⁰		4 0	2 2	1 0	. ^	. ^	06
Festuca crassifolia Zoller		+	1.2	2.2	1.2	+.2	+.2	86
Saxifraga aizoon	+	+	1.2	+	+	•	•	71
Carex sempervirens	+	1.2	•	•	+	•	•	43
Chrysanthemum montanum		+	+	+	•	•	•	43
Thalictrum minus	•	+	•	•	+	•	•	29
Poa alpina		•	+	•	1.2	•	•	29
Stachys recta		•	•	+	+	•	•	29
Accidentelles (n)	0	1	0	3	0	2	2	
						-		

Accidentelles: No 2: Polygala chamaebuxus. No 4: Polygonatum officinale, Trifolium montanum, Galium verum. No 6: Orobanche teucrii, Echium vulgare. No 7: Koeleria cristata, Bromus erectus.

D'autre part, toutes proportions gardées, on constate une analogie frappante avec l'Astragalo-Onosmetum LACOSTE 1975 qui occupe les stations correspondantes dans les Alpes-Maritimes, mais avec le cortège floristique du Xerobromion.

Cette étude trop brève demande à être approfondie et étendue à un territoire plus vaste, ne fût-ce que pour assurer statistiquement la composition du groupement.

Les relevés 1-6 proviennent des pentes dominant Oussanna, le No 7 des rochers entre Brenleire Dessus et le Vanil de Croset.

Le type nomenclatural est représenté par le relevé No 3.

6.2. La végétation alpine des rochers et des éboulis

6.2.1. L'association à androsace helvétique (Androsacetum helveticae, Tableau No 9), avec Androsace helvetica et Petrocallis pyrenaica comme caractéristiques, colonise les fissures de rochers et parfois les vires escarpées de l'étage alpin. Les relevés du tableau, ordonnés selon le nombre croissant des espèces, montrent que l'association est en contact avec un stade pionnier du Seslerio-Caricetum¹² et que la limite entre ces deux associations n'est pas toujours facile à définir.

Les relevés de l'Androsacetum helveticae proviennent des localités suivantes :

1 et 6: Dent de Brenleire,

2: Meielgrat (BE),

3: Vanil Carré,

4 et 5: Vanil Noir.

6.2.2. La végétation des éboulis (Thlaspietalia rotundifolii, Tableau No 10) Les éboulis mobiles sont un des éléments caractéristiques du paysage des Préalpes calcaires. Ils garnissent régulièrement la base des falaises de roche compacte, comme par exemple au pied du versant nord des Rochers des Tours, au pied de la Dent de Folliéran ou à Entre Roches. Tous ceux qui occupent de grandes surfaces sont composés de calcaires durs. D'autres, d'extension plus modeste, sont formés par des marnocalcaires, comme par exemple au versant

¹² Le relevé No 6, qui ne fut peut-être pas délimité avec assez de soin, figure intentionnellement aussi dans le tableau du *Seslerio-Caricetum* (comme No 1).

9. Androsacetum helveticae

No	1	2	3	4	5	6	
Altitude (10m)	225	205	214	236	225	213	1
Exposition	S	SW	S	S	S	S	
Surface (m2)	10	1	1	2	5	5	
Nombre d'espèces	5	6	7	7	8	16	
Caractéristiques d'associat	ion ot	ognåg	on do	10.0	lagge		
(Asplenietea			es de	1a C	Tabbe	-	
C Androsace helvetica	+.3	1.2		+.3	+.3	+	83%
C Petrocallis pyrenaica			+.2			1.3	33
Primula auricula		+				+	33
Draba aizoides			-	+	+		33
Compagnes			-				
1. des Elyno-Seslerietea							
Festuca pumila	+		+.2	+	+.2	(+)	83
Sesleria coerulea		r	r			+	50
Saxifraga moschata				+.2	+.2	+.2	50
Silene acaulis		+.2				1.3	33
Gentiana orbicularis			+.2	+			33
Elyna myosuroides						+.2	17
Helianthemum alpestre						+.2	17
Chamorchis alpina						r	17
2. Diverses							
Saxifraga oppositifolia	+.2	•	•	+.2	+.2	1.2	66
Saxifraga aizoon	+			+.2	1.2	+	66
Campanula cochleariifolia		+			+	+.2	50
Festuca crassifolia Zoller	+	•	•		+.2		33
Agrostis alpina		+	•	•		+	33
Athamanta cretensis			+			+	33
Ranunculus alpester			+			1.1	33
Gypsophila repens		•	1.2	•	•	•	17

10. Associations des éboulis de l'étage alpin

1-6: Poo minoris-Hutchinsietum prov.
7-11: Violo cenisiae-Ranunculetum parnassifolii prov.

12-15: Leontodontetum montani 16-21: Petasition paradoxi

16-21: Petasition paradoxi																					
No Altitude (10m) Exposition Pente (%) Recouvrement (%) Surface (m2) Nombre d'espèces Auteur	1 204 N 35 20	2 200 N 35 10 6	3 195 N 70 100 7	N 40 10	N 50	6 204 N 50 50 5	7 206 W 60 5 2 7	8 205 W 50 10 10	9 214 S 60 5 10 8	10 208 W 50 5 2	206 W 80 5	E 60 10		E 80 20 20	213 SE 70 20		17 199 SW 70 40 10		19 180 NW 70 30 50	20 184 SE 40 30 20 8	21 184 SE 40 50 50
Espèces de l'Arabidion alpinae Arabis alpina C Hutchinsia alpina C Poa minor Moehringia ciliata Espèces du Thlaspion rotundifoli	1.1	1.1	+.2	1.1		+ + + + + .	+.2		:	•	:		:	•			:		:	:	•
Galium helveticum Viola cenisia C Ranunculus parnassifolius C Valeriana saliunca Anemone baldensis		:	•	:	•	:	+.2	1.2	+ + . 2	1.2	1.2		+ .	+.2	:		:			•	•
C Leontodon montanus Poa cenisia Espèces du Petasition paradoxi Adenostyles glabra		:		•	•				•			1.2	1.2	1.2	•	1,000,000,000	2.1	111 1000000		2.2	
Valeriana montana C Petasites paradoxus C Rumex scutatus Différentielles locales	:	:	•	:	•	:			; ;	:	:	:	:	:	:	Caron Works	1.1			+.2	
Oxyria digyna Saxifraga stellaris Adenostyles alliariae Cystopteris fragilis	+.2	+	+.2 ·	+	r +			•	:	•	:	:		•	:				•		
Ligusticum mutellina Plantago atrata Taraxacum alpinum				:	:					•		r +	· +	+ •	+ + + + + + + 2				•		•
Tussilago farfara Campanula scheuchzeri Solidago alpestris Phleum hirsutum		•	•	•	:	:		•	:	:			:	:	•	+ + +	+ + +	:	:	•	•
Galium anisophyllum Rhamnus alpina Espèces des unités supérieures (Thlaspietalia, Thlaspietea rotu		: lii)	:	:•: :•:	:		:		:	•		:		:	:			:	:	+	+
Doronicum grandiflorum Saxifraga oppositifolia Achillea atrata Thlaspi rotundifolium	+	+ • •	:	+ •	+.2	2.2 3.3	1.2	:	:	:	:		+	+.2	+		1.1		· · +		1.2
Trisetum distichophyllum Athamanta cretensis Campanula cochleariifolia Silene prostrata (Gaudin) Litard	ière	:	•	:	:	:		•	+,2	•		1.2	+	+ + +	+.2	· · ·	:	2.2	+.2		•
Linaria alpina Compagnes Ranunculus alpester Poa alpina Saxifraga aizoides		+	:	+	•	+			:	+	+.2	+.2			+.2			:	:	+.2	
Ranunculus oreophilus M. Bieb. Oxytropis jacquinii Sesleria coerulea Alchemilla conjuncta	:	:	•		:	:	+	+	+	+.2 · · r	:		+ +.2 r	+	+.2		:		+	:	:
Carduus defloratus Senecio doronicum Accidentelles (n)	0		. 1	•	:	· · 1	:	•	1	· · 3	· · 5	+.2 + + 2	2	: r 1	+.2	+ + 2	+ + 1	1		•	r r

Accidentelles: No 3: Festuca violacea. No 5: Saxifraga moschata. No 6: Cirsium spinosissimum. No 7: Anthyllis alpestris. No 9: Pulsatilla alpina. No 10: Phaca frigida, Carex sempervirens, Festuca pumila. No 11: Minuartia verna, Arenaria multicaulis, Phyteuma orbiculare, Phymus polytrichus, Festuca crassifolia. No 12: Lotus alpinus, Euphorbia cyparissias. No 13: Polygonum viviparum, Festuca crassifolia. No 14: Leontodon hispidus. No 15: Cirsium spinosissimum. No 16: Pimpinella major, Geranium silvaticum. No 17: Chrysanthemum montanum. No 18: Biscutella levigata. No 21: Euphorbia cyparissias, Geranium silvaticum, Vicia silvatica.

S.-E. du Vanil Carré ou aux Roches pourries, entre le col de Bounavalette et la Tête de l'Herbette.

J'ai groupé dans le même tableau les cinq principaux groupements d'éboulis mobiles du massif du Vanil Noir:

- 6.2.2.1. Le groupement à cresson des chamois et paturin nain (Poo minoris-Hutchinsietum prov. (relevés 1 à 6) colonise les éboulis formés d'assez gros blocs de calcaire dur situés au pied des falaises ombragées. La neige y persiste très tard pendant l'été et le microclimat y est froid et humide en permanence. Il faut relever la présence, dans cette station exceptionnelle, de Oxyria digyna, qu'on peut attribuer peut-être au dépôt, sous les blocs, d'argile de décalcification et de sable de quartz provenant de l'altération des nodules de silice contenus dans la roche calcaire. Ce groupement correspond à la variante à Doronicum grandiflorum du Thlaspietum rotundifolii signalée par BRAUN-BLANQUET (dans BRAUN-BLANQUET et JENNY, 1926, p.197), ainsi qu'au Doronicetum grandiflori décrit par THIMM (1953). Le type nomenclatural est représenté par le relevé No 4.
- 6.2.2.2. L'association à renoncule à feuille de parnassie et violette du Mont Cenis (Violo cenisiae-Ranunculetum parnassifolii prov., relevés 7 à 11) est une spécialiste des éboulis mobiles de marnocalcaires se délitant en plaquettes, qui sont relativement riches en terre fine dans la zone d'enracinement, avec des blocs et des graviers en surface. Elle se développe sur des "pentes écorchées", en mosaïque avec des pelouses initiales à Sesleria. L'exposition ne joue pas un rôle déterminant. Ce groupement, qui me semble mériter le rang d'association, a un nombre spécifique moyen de 8 et réunit 4 taxons rares dans la région: Ranunculus parnassifolius (Pyrénées et Alpes), Viola cenisia (Alpes occidentales), Valeriana saliunca (Alpes occidentales) et Anemone baldensis (Alpes). Une étude s'étendant à un plus grand territoire précisera le statut synsystématique de cette unité qu'on pourrait attribuer aussi, faute de mieux, au Leontodontetum montani 13. Le type nomenclatural est représenté par le relevé No 7.
- 6.2.2.3. L'association à liondent des montagnes (Leontodontetum montani, relevés 12 à 15) colonise des stations presque identiques dont le substrat semble toutefois un peu plus riche en terre fine et un peu moins mobile, ce qui se

¹³ BRAUN-BLANQUET (dans BRAUN-BLANQUET et JENNY, 1926, p.197 et 198) publie deux relevés d'un groupement intermédiaire qu'il attribue au *Leontodontetum* montani.

traduit par un nombre spécifique moyen (13 au lieu de 8) et un taux moyen de recouvrement (14 % au lieu de 7 %) nettement plus élevés que pour le groupement à Ranunculus parnassifolius.

6.2.2.4. Les groupements à adénostyle glabre et valériane des montagnes (Petasition paradoxi ZOLLITSCH 1966, relevés 16 à 21) occupent des stations plus chaudes, plus sèches. Les deux premiers relevés correspondent au Petasitetum paradoxi, tandis que les 4 derniers, avec Rumex scutatus, Athamanta cretensis, Thlaspi rotundifolium et Trisetum distichophyllum, font la transition avec le Athamanto-Trisetetum distichophylli. Rhamnus alpina indique la tendance évolutive vers le Roso-Rhamnetum.

Localisation des relevés du tableau No 10:

1, 2, 4, 5, 6, 14: sous les Rochers des Tours,

3: sous la Dent des Bimis,

7, 8, 10, 11: Vanil Noir, Tête de l'Herbette (roches pourries),

9, 12, 13, 15: Vanil Carré,

16, 17: sous la Dent de Folliéran,

18, 19: Mont d'Or (VD),

20, 21: Brenleire Dessus.

6.3. Forêts, prairies, pâturages et pelouses des versants ombragés

6.3.1. L'érablaie à orme (Ulmo-Aceretum, Tableau No 11) dont le nom prête malheureusement à confusion ¹⁴ est une forêt feuillue subalpine qui revêt les pentes raides et ombragées d'éboulis mêlés de terre fine à forte activité biologique. Dans les Préalpes fribourgeoises et vaudoises, elle est moins rare qu'un rapide examen du paysage ne le laisse supposer. En effet, les groupes d'épicéas, localisés soit sur les gros blocs, soit le long de la bordure supérieure des falaises de rochers, masquent en partie la forêt feuillue dont les arbres sont plus courts. L'association ne comprend que des feuillus, à l'exclusion du hêtre, et pour cause: les résineux, incapables de se régénérer végétativement par rejets

¹⁴ L'association étant mieux connue aujourd'hui que du temps de BERGER (1922) et ISSLER (1926), elle devrait être dénommée *Campanulo latifoliae-Aceretum*, d'après l'une des espèces différentielles les mieux visibles, par exemple *Campanula latifolia*. Malheureusement les règles de la nomenclature ne l'autorisent pas.

11. <u>Ulmo-Aceretum</u>

Γ.					_												1
1 155 N									10 165 SE		12 163 E	13 154 E	14 151 E	15 139 SE	16 146 E	17 137 E	
70 .	60 70	60	70	70	60	60 70	60 90	40	70 60	80 50	70	70 60	70 70	70	70	60 80	
200	200	200	100	200	200	150	150	200	200	200	200	200	100	200	100	200	
45	47	59	41	52	26	44	47	42	47	29	59	90	40	20	20	20	1
4.2	4.2	4.3	4.2	4.4	4.3	4.2	5.5	5.5	4.4	3.2	3.2	4.2	4.3	4.2	5.5	4.4	10
+	1.1	+	+	1.1	+	+		+	+	+	+	+	+	+	:	+	82 29
											•	•		2.1		1.1	12
		1.1	1.2	+	+		+	+				+	+	+	+		88
+.2	+	:	1.2	2.3	+.2	1.2	+.2	1.2	1.2	1.2	1.2	+	+.2	+.2	1.2	+.2	88 29
		•		+.2			٠	٠	+	+	+	*	٠	+	٠		29 18
1				+	+	+	·							i	:		18
1	:			1.2				:	:		+			:	+	+.2	18 12
pad:	r us. I	Loni	cera	r nig	ra. I	No 7	: So:	rbus	char	naeme	espi	lus.			٠		12
No 15: Lonicera xylosteum, Corylus avellana, Sorbus aria.																	
Plantes herbacées 1. Caractéristiques et différentielles d'association																	
1.2	1.1	1.1	1.2	+.2	+		+			+	+.2	2.1	1.1	1.1	1.1	2.2	
		. 2	1.2	1.1		2 2		1 2	÷	+	+	+	+ 2		1.1	1.2	41 82
+	1.1	+	1.1	+	+	+	+	+	+			+	+				71
+	r	r •	+	:	+	+	+		2.2	+	1.2	+.2	+.2	:		1.2	53 53
+ ce e	t de	1'0	rdre	(Tar	nari	-Acc	· erio	. A	cere	tali				٠	+.2		12
+.2	1.1	1.1	+.2	1.2	+	+	+	+.2	+.2	2.2	+.2	+	1.2	;			
	1.1	1.1	+.2	1.1	+	r •	1.1				1.1	+	1.1	+	+	+	94
+ 2.3	+ 3.2	(+) 2.2	1.2	+ 2.2	+ 2.3	1.1	+ 1.2	1.2	+	+	1.2	r +	+ 1.2	2.1	1.1	+	88 82
+	+	+	+	+	+		+			٠		+	r	+			59 47
+.2			2.5	:	J.J		1.1		1.2	:	+.2	+	+.2	:	1.2	2.5 r	41
	raxi	· no-Fa	agete	ea)	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠			•		+	6
11.2	2.2	3.2	1.2	1.2							+						10
+	1.1	+	+	+	+		+		+	+	+	+	+	+	+	+	88
1:	+	(+)	r	+	:	r +		+	+	+	1.1	+	+	+	+		77 35
	+			+	+		+	+.2		+.2							35 29
:			+.2	+	+	:	+		:	:	:	+.2		:			18
1:				:	:		:	:	+	+	+	+.2		:	r	:	18 12
												+		+			12 6
sous	-ass	ocia	tion	s	•	•			•	•	•	•		•	•	•	ľ
2.3	2.2	1.2	3.3	3.3	3.2	3.2	2.2	2.2			+						59
				+.2	+	:	+									:	29 29
+	r	:	+	+		+	+	:			:			:	:	:	23 18
	+			1.1		:	r										18
:		+			+					:	÷						12
:	:			:		÷								+.2	+	1.2	59 47
	•	•	•	٠	٠	•	•	1.1	+.2	2 2	1.2	+	2 2	+ 3 3	2 3	+	41
	:	:	:			:		:	+	+.2	+			•	r	+	29
1	:	:						:	+	+	+		+	+	+		18 29
	•	•	٠	٠							2 2	2 2	2 2	1.1	2 2	+	29 23
.											2.2			3.3	1.1	1.2	23
:	:	:				:	:	:		:	+.2	+	+	1.1	:	:	23 18
m .		•	•			٠	•	٠	٠		•	+		+	+	+	23
					0.0												
+	+	+	1.1	+	+	+	+	2.2	+	+	+	+	+	+	+	2.2	88
1.2	1.1	+	+.2	+	+	2.1	+		2.2	2.2	+ 1.1	1.1	+				77
١.			+	+	+	+	+	1.1	1.1	1.1	+	•	1.1		1.1		71
1.2	2.2	2.2	1.1	+.2	2.2	1.2	1.1	1.2	1.1	:	:	1.2	1.1	:	:	+	71 71
r +	r	r +	r +	+	+	r	+	+	+	r	+	+	+	+		+	65 59
	r			+			+		+	+		+	+		+	+	53
	r.2	r	+			+	:	:	+	+	+		+		÷	:	53 53
1:	٠.	r	+	+		r		+	+	1.2		+			1.1	•	47
+			1.2	+		+		1.1			+		r	+.2			47
	:		+.2	+		+	:	1.2	+	:	:	+.2					35 29
1:	:	:		+		+	+	:	:	1.2	:	+	+		+	:	23 18
	1 2		1 2	1 2													
1.1		2.1	1.1		+	ī,	1.1		•		+		+	+	:		77 47
+ r	+	r	+.2	:		:	:	:	:	:	:	:	:		:	•	18
	r	+	•	٠			·						•	٠			12
			•				•				•		٠	•	•		
+.2	1.2	+.2 2.2		1.2	1.2	+.2	1.1	+.2	+.2	1.2	+	1.1	+	1.2	:	1.2	77 65
+	+	r	+	+		r	+	+			+				+		59
								+.2	+.2	-		+.2	+			+.2	
a+.2	+	:	+			r					1.1				1.1		
a+.2	+	:			:						1.1	+ 1.1	:				18 18 18
	770 760 200 45 4.2 + + + + 2.3 + 2.2 2 + + + + 2.3 + 2.2 2 7 + + + + + + + + + + + + + + + + +	N N 70 660 70 70 60 70 70 60 70 200 200 45 47 4.2 4.2 + 1.1 + 2.1 + 1.1 + 2.3 3.2 + 1.1 + 1.2 2.2 + 1.1 + 2.3 3.2 + 1.1 + 1.1 + 2.2 + 1.1 + 1.1 + 2.2 + 1.1 + 1.1 + 2.2 + 1.1 + 1.1 + 2.2 + 1.1 + 1.1 + 2.2 + 1.2 + 2.2	155 153 153 N N N N N O O 60 60 60 70 70 60 200 200 200 245 47 39 4.2 4.2 4.3 + 1.1 +	155 153 153 154 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	155 153 153 154 150 N N N N N C 0 60 60 70 70 70 20 200 200 200 100 200 45 47 39 41 52 4.2 4.2 4.3 4.2 4.4 + 1.1 + + 1.1	155 153 153 154 150 139 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	155 153 153 154 150 139 159 N N N N N N W N N O N N N N N N N N N N	155 153 153 154 150 159 159 140 N N N N N NW N NW 0 60 60 70 70 60 60 60 60 70 70 70 70 60 70 90 200 200 200 200 100 200 200 150 150 45 47 39 41 52 36 44 47 4.2 4.2 4.3 4.2 4.4 4.3 4.2 5.5 + 1.1 + + 1.1 + + + 2	155 153 153 154 150 139 159 140 163 N N N N N N N N N N N N N S 060 60 60 70 70 60 60 60 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	155 153 153 154 150 139 159 140 163 165 N N N N N N N N N N W S S S S S N 70 60 60 70 70 60 60 60 40 70 60 60 70 70 60 70 90 80 60 60 40 70 70 60 70 70 60 70 90 80 60 60 40 70 70 60 70 70 60 70 90 80 60 60 40 70 70 60 70 70 60 70 90 80 60 60 40 70 70 60 70 70 60 70 90 80 60 60 40 70 70 60 70 90 80 60 60 40 70 70 60 70 90 80 60 60 40 70 70 60 70 90 80 60 60 40 70 70 60 70 90 80 60 70 70 60 70 90 80 60 60 40 70 70 60 70 90 80 60 70 70 60 70 90 80 60 70 70 60 70 90 80 60 70 70 60 70 90 80 60 70 70 60 70 90 80 60 70 70 60 70 90 80 60 70 70 60 70 90 80 60 70 70 60 70 90 80 60 70 70 60 70 90 80 60 70 70 60 70 90 80 60 70 70 70 70 60 70 90 80 60 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	155 153 153 154 150 139 159 140 163 165 171 N N N N N N N N N N N S SR S	155 155 154 150 139 159 140 163 165 171 163 N N N N N N N N N N N S RS RS R 70 60 60 70 70 60 60 60 40 70 80 70 200 200 200 100 200 200 150 150 200 200 200 200 45 47 39 41 52 36 44 47 42 47 39 59 4.2 4.2 4.3 4.2 4.4 4.3 4.2 5.5 5.5 4.4 3.2 3.2 + 1.1 + + 1.1 + + . + + + + + 2.1 2.1.2 + 1.1 + + 1.1 + + . + + + + + 2.1.2 1.2 + 2.	155 155 154 150 139 159 140 163 165 171 163 154 N N N N N N N N N N N S R S E R S E R 70 60 60 70 70 60 60 60 40 70 80 70 70 60 70 70 70 70 60 70 90 80 60 50 50 50 200 200 200 100 200 200 150 150 200 200 200 200 200 45 47 39 41 52 36 44 47 42 47 39 59 56 4.2 4.2 4.3 4.2 4.4 4.3 4.2 5.5 5.5 4.4 3.2 3.2 4.2 + 1.1 + + 1.1 + + + + + + + + + + + + +	155 153 153 154 150 139 159 140 163 165 171 165 154 151 N N N N K N W N N S S S S S E E E E 70 60 60 70 70 60 60 60 60 40 70 80 70 70 70 200 200 200 100 200 200 150 150 200 200 200 200 200 100 45 47 39 41 52 36 44 47 42 47 73 9 59 56 48 4.2 4.2 4.3 4.2 4.4 4.3 4.2 5.5 5.5 4.4 3.2 3.2 4.2 4.3 4.1 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 4.2 1.1 1.1 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 1.2 1.2 1.2 + 1.2 4.2 1.2 1.3 1.3 1.2 1.2 + 1.2 + 1.2 1.2 1.2 1.2 + 1.2 4.2 1.2 1.1 1.1 1.2 + 1.3 + 1.4	155 153 153 154 150 139 159 140 163 165 171 163 154 151 139 N N N N N N N N N N N S S S S S S S E S S S C O 60 60 70 70 60 60 60 60 40 70 80 70 70 70 70 70 70 90 80 60 50 50 50 60 70 80 200 200 200 100 200 200 150 150 200 200 200 200 200 100 200 45 47 39 41 52 36 44 47 42 47 79 59 59 56 48 38 4.2 4.2 4.3 4.2 4.4 4.3 4.2 5.5 5.5 4.4 3.2 3.2 3.2 4.2 4.3 4.2 4.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1	155 153 155 154 150 139 159 140 163 165 171 165 154 151 139 146 170 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7	155 155 155 154 150 139 159 140 163 165 171 163 154 151 139 146 137 N N N N N N N N N S S S S B S B S S S S

accidentelles: No 2: Luzula sieberi, Solidago virga-aurea. No 5: Astrantia major, Gentiana asclepiadea, Asplenium viride, Rubus saxatilis, Dryopteris dilatata. No 7: Alchemilla vulgaris, Campanula rhomboidalis. No 9: Ranunculus nemorosus. No 10: Ranunculus pemorosus, Knautia silvatica. No 11: Poa nemoralis, Vicia silvatica. No 12: Crocus albiflorus, Pimpinella major, Dactylis glomerata, Vicia sepuim, Orchis mascula, Campanula trachelium, Cicerbita muralis. No 15: Geranium phaeum ssp. lividum, Fragaria vesca, Hieracium prenanthoides, Vicia sepuim, Knautia silvatica. No 15: Vicia silvatica. No 16: Dactylis glomerata, Melica nutans. No 17: Anemone ranunculoides.

de souche, ne résistent ni aux glissements de neige mouillée, ni aux chutes de pierres, ni au croulement des éboulis qui recouvrent les sols au pied des bancs de rochers. Ces conditions de sols sont également trop extrêmes pour le hêtre.

C'est toujours l'érable sycomore qui domine, en petits peuplements clairiérés, par cépées de rejets de souche, tordus, à cimes multiples, avec des troncs parfois énormes, supports de mousses, de lichens (Lobaria pulmonaria) et plantes supérieures épiphytes (Picea abies, Lonicera nigra, Ribes alpinum, Sorbus aucuparia, Polypodium vulgare, Poa nemoralis, etc.). Le sorbier des oiseleurs participe régulièrement à la strate arborescente, tandis que l'orme de montagne et le frêne sont plutôt rares. L'érable faux-platane (Acer platanoides) ne se rencontre que dans des stations plus chaudes, formant transition avec le Sorbo-Aceretum ou l'Aceri-Tilietum. Les arbustes sont peu nombreux: seuls le framboisier et le chèvrefeuille des Alpes sont très fréquents. La strate herbacée par contre, très riche en espèces, présente une structure compliquée. On y distingue:

- a) une strate supérieure composée de très hautes herbes comme Aconitum paniculatum, A. lycoctonum, A. napellus, Adenostyles alliariae, Campanula latifolia, Achillea macrophylla, Lunaria rediviva, Cicerbita alpina, C. plumieri, Epilobium alpestre, Ranunculus platanifolius, Lilium martagon, Aruncus dioecus, Milium effusum, Senecio nemorensis et fuchsii, Rumex arifolius, Thalictrum aquilegiifolium, Carduus personata et les grandes ombellifères Anthriscus nitida, Heracleum montanum, Myrrhis odorata, Chaerophyllum cicutaria, Peucedanum ostruthium;
- b) des grandes fougères comme Polystichum lobatum, P. lonchitis, Dryopteris filix-mas, Athyrium filix-femina;
- c) des phanérogames de taille moyenne comme *Petasites albus* (parfois très abondant), *Actaea spicata*, *Cardamine pentaphyllos*, *Lamium galeobdolon*, *Paris quadrifolia*, *Saxifraga rotundifolia*, etc.;
- d) enfin des espèces de petite taille, parfois difficiles à déceler (notamment des géophytes printaniers), comme Adoxa moschatellina, Chrysosplenium alternifolium, Corydalis fabacea, Leucojum vernum, Tozzia alpina. Les mousses, peu nombreuses, n'ont pas été notées systématiquement: citons cependant la présence de Conocephalum conicum.

Aconitum paniculatum, Campanula latifolia et Corydalis fabacea 15 ont été choisis provisoirement comme caractéristiques d'association au sens assez large, tandis que Viola biflora, Achillea macrophylla, Epilobium alpestre, Anthriscus

¹⁵ Corydalis fabacea, qui passe souvent inaperçue, puisqu'elle fleurit peu après la fonte de la neige et disparaît ensuite, est peut-être une caractéristique d'association.

nitida et Delphinium elatum sont de bonnes différentielles par rapport aux autres associations du Lunario-Acerion. Ces dernières expriment que l'Ulmo-Aceretum est en contact avec le Cicerbito-Adenostyletum.

Pour une forêt, la richesse floristique est exceptionnelle: le nombre spécifique moyen atteint 44, ce qui traduit les conditions écologiques extrêmes rencontrées par les arbres. En effet, l'instabilité des sols, les avalanches et la rudesse du climat subalpin affaiblissent la force de concurrence des arbres et permettent le développement de nombreuses espèces qui ne sont pas liées absolument à la forêt, comme des hautes herbes du *Cicerbito-Adenostyletum* et des plantes d'éboulis ombragés. Cette mosaïque de micro-stations est un caractère spécifique de l'association.

Les espèces de l'alliance Lunario-Acerion (voir MOOR, 1975a) sont nombreuses et ont une vitalité remarquable, excepté Phyllitis scolopendrium pour lequel le climat est probablement trop rude. Actaea spicata et Polystichum lobatum trouvent ici un milieu qui leur convient tout spécialement.

Dans la région étudiée, l'association atteint sa limite altitudinale supérieure et correspond dans l'ensemble à la sous-association "lonchitidetosum" décrite par MOOR (1975b). Cependant, on s'aperçoit qu'il existe deux sous-associations nouvelles (peut-être seulement de valeur locale): a) "adenostyletosum" occupant exclusivement les pentes ombragées froides et ayant des affinités avec l'Alnetum viridis et le Cicerbito-Adenostyletum (relevés 1-8); b) "mercurialetosum", plus thermophile et hébergeant entre autres une série d'espèces légèrement nitrophiles comme Corydalis fabacea, Lamium maculatum, Leucojum vernum, Aegopodium podagraria et Chaerophyllum aureum, ainsi que le bel ascomycète rouge Sarcoscypha coccinea (relevés 9-17). Plusieurs de ces différentielles sont fréquentes dans le Corydalido-Aceretum et soulignent ainsi l'affinité de ces deux groupements. MOOR (1975b) pense que la présence d'espèces nitrophiles dans l'Ulmo-Aceretum est due au parcours du bétail. C'est exact dans certains cas, mais je pense que la minéralisation plus rapide de la matière organique au versant chaud peut aussi favoriser les espèces dites nitrophiles (comme c'est le cas de la sous-association à Mercurialis) et que le parcours des chamois joue aussi un rôle non négligeable 16.

Enfin, sur le plan phytogéographique, notons que dans les Préalpes de la Suisse orientale où l'association vient d'être étudiée par MOOR (1975b), celle-

¹⁶ Depuis que le chamois fut réintroduit et protégé dans le Jura central et au Creux du Van en particulier, j'ai constaté une augmentation spectaculaire de *Urtica dioeca* dans l'érablaie (Sorbo-Aceretum) de La Roche des naturalistes. MOOR (1952) signale *Urtica* par +.2 en 1948 dans cette localité, alors qu'aujourd'hui cette espèce couvre probablement plus de la moitié de la surface!

ci s'enrichit de Cardamine bulbifera, C. kitalbelii et Asperula taurina qui n'existent pas en Suisse occidentale où nous trouvons par contre Cicerbita plumieri et Myrrhis odorata¹⁷.

Localisation des relevés de l'Ulmo-Aceretum:

- 1-4 et 7: Oussanna, Vallon des Morteys/FR,
- 5: Entre-Foli et Unter Meieli/BE,
- 6, 8: Varvalanna, Vallon de Motélon/FR,
- 9-14 et 16: Au-dessus de la Randonnaire, Vallon des Ciernes Picat/VD,
- 15 et 17: Vers Champ, Vallon des Ciernes Picat/VD.

Le type nomenclatural est représenté par le relevé No 6 pour la sous-association "adenostyletosum" et par le No 14 pour la sous-association "mercurialetosum".

6.3.2. La mégaphorbiaie à adénostyle et chicorée des Alpes (Cicerbito-Adenostyletum, Tanleau No 12) est une association dont l'aspect est défini par de très hautes herbes hygrophiles comme Adenostyles alliariae (dominant), Cicerbita alpina, Achillea macrophylla, Epilobium alpestre, Senecio nemorensis et fuchsii Heracleum montanum, Peucedanum ostruthium, Rumex arifolius, Myrrhis odorata Petasites albus, Chaerophyllum cicutaria, Delphinium elatum et Talictrum aquilegiifolium. Dans la région, on peut retenir 4 caractéristiques d'associations, soient deux exclusives: Delphinium elatum et Streptopus amplexifolius, et deux préférentes: Achillea macrophylla et Tozzia alpina qui se trouvent aussi dans certains peuplements de l'Ulmo-Aceretum.

L'association est particulièrement bien développée au Vallon des Morteys ainsi que dans les Préalpes calcaires humides en général. Elle colonise, à l'étage subalpin, les pentes ombragées où la neige, persistant jusqu'au début de l'été, s'oppose au développement des arbres.

J'ai distingué deux sous-associations de valeur locale: la première à Chrysosplenium alternifolium et Athyrium distentifolium, pauvre en espèces (nombre
spécifique moyen: 25), dans les cuvettes abritées au sol profond, riche en terre
minérale argileuse, mais pauvre en squelette, la seconde, à Arabis alpina, Cerinthe
glabra, Aconitum lycoctonum, Polystichum lonchitis, etc., plus riche en espèces (nombre spécifique moyen: 44), sur des sols squelettiques mêlés de terre
fine, mieux aérés, parfois mobiles et dans des stations très exposées aux glissements de neige.

¹⁷ Voir sous 6.1.4.

¹⁸ Ces deux taxons, difficiles à déterminer, n'ont pas été notés séparément.

¹⁹ Voir sous 6.1.1. et 6.1.4.

Si les deux sous-associations se rencontrent en mosaïque avec la forêt, c'est surtout la seconde qui héberge des espèces ligneuses comme Lonicera alpigena, Salix grandifolia, Sorbus aucuparia, Alnus viridis, Rubus idaeus et parfois même de jeunes plants de Acer pseudoplatanus, indiquant les possibilités de succession vers l'Ulmo-Aceretum, le Salicetum grandifoliae ou même l'Alnetum viridis. Ces arbustes peuvent prendre pied dans ces stations exposees aux avalanches et malgré l'instabilité relative du sol, probablement en raison d'une durée d'enneigement moins longue, d'une plus forte luminosité et d'une concurrence moins active des hautes herbes que dans la sous-association à Athyrium.

Enfin, il faut signaler une variante très appauvrie à *Doronicum grandiflorum* et *Arabis alpina*, localisée dans les eboulis mobiles ombragés au-dessus de 1900 m d'altitude et qui illustre la zone de contact entre *Adenostylion* et *Thlaspietalia rotundifolii*. En voici trois relevés:

Altitude (m) Exposition Pente (%) Surface (m2) Nombre d'espèces	1950 N 60 50 12	2050 N 70 100 9	2010 N 70 10 16
Espèces de l'Adenostylion: Adenostyles alliariae Peucedanum ostruthium Aconitum napellus Saxifraga rotundifolia Tozzia alpina Heracleum montanum	5.5 +.2 1.2	5.5 1.1 1.1	4.3 1.2 2.2 1.2 +
Espèces des Thlaspietalia: Doronicum grandiflorum Arabis alpina Poa minor Hutchinsia alpina Achillea atrata Rumex scutatus	2.2 1.1 + +.2 r	+.2 +	+ +
Compagnes: Primula elatior Cirsium spinosissimum Ligustucum mutellina Poa alpina Phyteuma spicatum Alchemilla vulgaris Phleum alpinum	+ + r ·	+++2	+ + r r + 1.2
Soldanella alpina Festuca violacea		•	+

12. Cicerbito-Adenostyletum															
No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	14	
Altitude (10m)				55			7						13		
The second secon		165													
Exposition	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
Pente (%)	50	60	60	70	80	30	80	60	70	70	80	70	70	70	
Surface (m2) Nombre d'espèces	30 17	100	25	100 37	28	100		30 34		100		50 44	30	100 52	
Nombre d'especes	17	21	20	21	20	44	37	24	43	47	32	44	41	52	
Caractéristiques d'association															
Achillea macrophylla	<u> </u>	+	+	1.1	1.1	+	2.2	1 - 1	+	+	1.2	1 1	+	+	100%
Delphinium elatum				1.0	1.2	-	+	1 . 1					2.2		57
Tozzia alpina	+	1.2	+	+		+	+	+	1 • -	+			L • L	1 • -	57
Streptopus amplexifolius			-			1.2	-1	4	•	1	•	·	•	•	14
Espèces des unités supérieures		•	•	•		1 • 4	•	•	•	•	•		•	•	14
(Adenostylion, Adenostyletalia		a+117	2-44	anna	l trolo:	toa)									
		5.5					1.2	1.2	3.2	1.2	3.3	2.2	3.3	3.3	100
Saxifraga rotundifolia	+	+	+		820 23	1.1							1.1		93
Viola biflora		1.1		1.2											93
Epilobium alpestre	+	+	1 • 4	+	2.2	+.2		+	+	+	+	+	+	+	86
Cicerbita alpina		+.2	2 2	2.2	1 2	1.2		+.2		+.2		+		+	86
Senecio fuchsii et nemorensis	+		+	1.1		+	(+)	+.2	+	2.2	+	+.2	1.1	+	86
Heracleum montanum		+		+	+	+	1.2		+	+	+	+	+	+	79
Stellaria nemorum	2.2	3.3	2.2	2.2			2.3		1.1			1.2		1.2	79
Peucedanum ostruthium		+			1.1	+	2.2		+	+	1.2	2.2	1.1	+	79
Rumex arifolius	•	+	+	1.1	+		1.1	+		+		+	+	1.1	79
Veratrum album		+	r	+	+	+	+		+		+	+	•	+	71
Aconitum napellus	1:			+	+.2	+	1.1		+	1.1	1.1	+	2.2	1.2	71
Crepis paludosa	l :	+	+	+	+	1.1	+	+	+	1.1		-	- • -		64
Myrrhis odorata				+	+.2		-	2.2	r	+.2	+	4	+	+	57
Thalictrum aquilegiifolium				+	+		:	+		+	1.1	+	+	+	57
Aconitum paniculatum	1	•	•	1.2		+		1.1	1.1	1.1		-	-		36
Anthriscus nitida			1.1		:	+	-	+.2	2			-	-		21
Poa hybrida	:	+				+							•		14
Différentielles de sous-assoc	i o ti.		•	•			•	•	•		•		•	•	1.4
Chrysosplenium alternifolium			1.1	+											29
All. Athyrium distentifolium		+.2	3.2			•	:		•		•	•	•	•	21
Arabis alpina	2.2	T • Z	2.6	•	1000	•	r	r	r	•	•				50
Cerinthe glabra		•	•	•	++		+	+			+	+	+	1.2	50
Aconitum lycoctonum	١.	•	•	•		+	+.2		•	+	+	+		2.2	57
Geranium silvaticum		•	•	•		T	1.2	1.2	+	+	1.1	+	+	+	57
Carex ferruginea		•		•		•	1.2	1	+		+	+		+.2	36
		•	•	•	+	•	•	+.2	1.2	+	+	1 2	1 . 2	+.2	36
Polystichum lonchitis		•	•	•		•	•	+.2	1.2	+	•	1.2	+		29
Astrantia major		*	•	•			•	•	•	+	+			+	29
Poa nemoralis	١.	•	•	•		•	•	•		•	+.2		+.2		21
Valeriana tripteris		•	*	•		•	•	•	+	•	•	1.2	*	+	11000000
Cystopteris fragilis		•	•	•		•	•	•	+	•	•	1.2	•	•	14
Plantes ligneuses										0 0		4 0	. 0		17
Lonicera alpigena		•	•	•		1.2	+	•	+.1	2.2	•		+.2	•	43
Salix grandifolia	,	•	•	•		(+)	(+)	*	(+)	(+)	•	(+)	•		
Sorbus aucuparia		•	•	•		(+)	(+)	•	(+)	(+)	•	(+)	•	•	36
Alnus viridis Rubus idaeus		•	*	•		(+)	•	•	(+)	(+)	•	(+)	•	•	29
		•	•	•		•	•	•	1.1	•	•	+	•	+	
Acer pseudoplatanus juv.		•		•		•	•			+	•	+		+	21
Compagnes			1												
1. espèces des forêts (Fraxino	o−Fa	gete	a)												
Primula elatior		•	r	+	+	+	+	+	•	+	+	•	+	+	71
Dryopteris filix-mas	2.2	•	+	+	•	2.2	•		2.2		•	2.2	•	•	57
Petasites albus		•	•	1.2	+	+.2	•		+.2	1.2	2.2	•	•	•	50
Cardamine pentaphyllos	+	•	r	+	•	+	r	+			•	٠.	•	•	43
Lamium galeobdolon	+	•	•	1.1		٠	٠	+	1.1	1.1	•	1.1		•	43
Ranunculus lanuginosus	(+)		+	1.1		+	•	+	•		•	•	•	•	36
Milium effusum		+.2	•	r		+	•	•	+	•	•	٠	•	+	36
Paris quadrifolia			r	•				+	1	+	•	r	•		29
Phyteuma spicatum		•		•	+		•	•	•		+	+	•	+	29
Actaea spicata		•	r	r		•		•	+.2		•	•	•		21
Cardamine flexuosa		•	+.2	r		r	•		•	•			•		21
Polystichum lobatum			•	+		+		•	+		•				21
Lilium martagon		•		•		r		•		•	•		+	+	21
Adoxa moschatellina	+		+		+										21
2. diverses	1														
Chaerophyllum cicutaria	+	+	+	2.2		1.2		2.2	+	2.2	1.1	1.2	2.2		100
Alchemilla vulgaris		+		+	1.2	+	+.2			+	+.2	•	+.2	+.2	64
Veronica latifolia				+	+	r	\mathbf{r}		+		+	+		+	57
Valeriana officinalis				+.2				+.2	r	+		+	+	+	50
Ranunculus aconitifolius s.l.					+	+.2			+	+	1.0	+		+	43
Melandrium diurnum				+.2		r	1.1			+			+	+	43
Knautia silvatica		+.2				+				+	+		+	+	43
Athyrium filix-femina	1.2		+	2.2		2.2			1.1			•			36
Carduus personata				+				1.1	+	+	r				36
Silene cucubalus							+			+	r		1.2	+.2	36
Myosotis silvatica		+	•				+	+					+	+ ,	36
Geum rivale				+		+		4		+.2				+	29
Dactylis glomerata							+			+	1.2		+		29
Campanula rhomboidalis						+				+			+	+	29
Oxalis acetosella			+						1.2			+.2			21
Aposeris foetida	١.					1.1				+				+	21
	١.				+								+	r	21
Trollius europaeus															
Trollius europaeus <u>Accidentelles</u> (n)	0	0	0	1	0	1	5	1	4	4	3	5	8	8	

Accidentelles: No 4: Polygonum bistorta. No 6: Luzula sieberi. No 7: Filipendula ulmaria, Calamagrostis varia, Urtica dioeca, Solidago virga-aurea, Cirsium oleraceum. No 8: Dryopteris robertiana. No 9: Dryopteris disjuncta, Epilobium montanum. No 10: Prenanthes purpurea, Rosa pendulina, Agropyron caninum, Cirsium oleraceum. No 11: Petasites hybridus, Pedicularis foliosa, Alchemilla conjuncta. No 12: Solidago virga-aurea, Gentiana lutea, Ranunculus nemorosus, Alchemilla conjuncta, Epilobium montanum. No 13: Gentiana lutea, Hypericum maculatum, Pulsatilla alpina, Ligusticum mutellina, Vicia sepium, Trisetum flavescens, Phleum hirsutum, Vicia silvatica. No 14: Bellidiastrum michelii, Daphne mezereum, Ranunculus nemorosus, Pedicularis foliosa, Hypericum maculatum, Veronica chamaedrys, Festuca rubra, Phleum hirsutum.

Comparée à celle du Jura (RICHARD, 1968) dont le climat atlantique est bien connu, l'association des Préalpes est non seulement plus riche en espèces, mais elle présente aussi une plus grande amplitude écologique, car elle est moins limitée dans son extension par la concurrence de la forêt.

Localisation des relevés:

- 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12: Vallon des Morteys, région de Oussanna (FR),
- 2: La Latte, au N. de la Tour de Famelon (VD),
- 13, 14: Vallon des Morteys, entre Dzori Marro et Dent des Bimis.

Le type nomenclatural est représenté par le relevé No 2 pour la sous-association à *Chrysosplenium* et par le relevé No 14 pour celle à *Arabis*.

6.3.3. L'association à cystoptéris des montagnes (Cystopteridetum montanae, Tableau No 13) n'occupe que de toutes petites surfaces d'éboulis suintants et ombragés sous des bancs de rochers. Cette association, qu'on pourrait rattacher à l'alliance Arabidion alpinae BEGUIN 1972, est en contact avec l'Ulmo-Aceretum et le Cicerbito-Adenostyletum.

Localisation des relevés:

- 1-3: Vallée de Motélon, Le Patchalet,
- 4: La Latte (VD).

6.3.4. Le groupement à rhododendron, arole et saule à grandes feuilles (Salici grandifoliae-Rhododendretum prov., Tableau No 14) est intermédiaire entre la lande et la forêt: les vieux aroles (Pinus cembra) aux troncs tourmentés et quelques épicéas isolés forment des peuplements lâches sous lesquels se développe une véritable brousse d'arbustes et de sous-arbrisseaux ligneux: il s'agit surtout des deux Sorbus, S. aucuparia et S. chamaemespilus, du saule à grandes feuilles (Salix grandifolia), du rhododendron (Rh. ferrugineum) et des deux Vaccinium, V. myrtillus et V. vitis-idaea. Les autres plantes vasculaires sont disséminées par pieds isolés. Les mousses par contre sont nombreuses (de même que les lichens) et ce sont elles qui sont avant tout responsables de l'édification de la partie organique du substrat. Celui-ci est un lithosol à humus brut (ou "mor") très acide et tourbeux comparable à celui de l'Asplenio-Piceetum et du Lycopodio-Pinetum uncinatae. La plupart des plantes sont isolées de la roche mère calcaire par le tapis de mousses et l'humus. Les arbres par contre enfoncent leurs racines jusque dans les fentes des rochers. L'arole et l'épicéa se régénèrent par semis dans la mousse et surtout sur les souches pourries.

13. Cystopteridetum montanae

No Altitude (10m)	1 125	2 126	3 129	4 162	
Exposition	N	N	N	N	
Pente (%)	60	80	60	40	
Surface (m2)	10	3	10	2	1
Nombre d'espèces	22	16	16	12	
Caractéristique et différentiel	es d'a	ssoci	ation	-0	
C Cystopteris montana	5.4	5,4	4.3	3.3	4
Chaerophyllum cicutaria	2.1	1.2	1.1	•	3 3 3
Cardamine pentaphyllos	+.2	+	+	•	3
Oxalis acetosella	+	•	+	+	3
Espèces des unités supérieures	I				1 1
(Arabidion alpinae ?, Thlaspieta	lia, T	hlasp	pietea	rotu	indifolii)
Arabis alpina	+.2	+	•	+	3
Dryopteris robertiana	+	+	•	•	2
Campanula cochleariifolia		+	•	+	2
D Geranium robertianum	+		1.1	•	2
D Cystopteris fragilis	١.		+	2.2	2
Moehringia muscosa	١.			+.2	1
Compagnes	1				1
1. de l'Adenostylion	1				
Saxifraga rotundifolia	1.1	1.1	1.1	2.2	4
Viola biflora	2.2	+	+.2	2.2	4
Stellaria nemorum	1.2		1.2	+	3
Crepis paludosa	+	2.1	1.1		3 3
Adenostyles alliariae	(+)		+	+	3
Myosotis silvatica		+			1
Thalictrum aquilegiifolium	+				1
Geum rivale	+				1 1
Melandrium diurnum	+				1 1
2.de la forêt (Fraxino-Fagetea)					
Lamium galeobdolon	1.1	+	+		3
Primula elatior	+		+		2
Dryopteris filix-mas	١.	r	+		2
Milium effusum	r	+			2
Festuca altissima	r	r			2
Adoxa moschatellina	1 .	-		1.2	1
Epilobium montanum	+				1 1
3. diverses			-	8 8	
Chrysosplenium alternifolium	1.1		+	2.2	3
Veronica latifolia	r	+			2
Urtica dioeca	1 .	r			1
Athyrium filix-femina			+		1

14. Salici-Rhododendretum prov.

No		1	2	3	4	5	
	titude (10m)	186	175	170	176	177	
	position	N	N	N	N	N	
100	nte (%)	40	60	60	100	100	
Su	rface (m2)	30	50	50	20	10	
Re	couvrement des arbres (%)	30	20	30	40	10	
No	mbre d'espèces	37	30	23	23	14	
Ar	bres						
	nus cembra	3	1	2	2	1	100%
* Pi	cea abies	+	+		2		60
So	rbus aucuparia		1	1			40
	bustes						
* Rh	ododendron ferrugineum	4.4	3.3	4.4	4.4	3.3	100
Sa	lix grandifolia		1.2	1.2	+	+	80
So	rbus chamaemespilus	2.2	+	1.2	+		80
So	rbus aucuparia	+			+	+	60
Sa	lix hastata		•	+			20
Lo	nicera nigra		+				20
* Ro	sa pendulina	+					20
* Lo	nicera coerulea	+					20
	niperus nana	+					20
	us-arbrisseaux et plantes herb	acé es					
* Va	ccinium myrtillus	2.3	3.4	2.3	3.4	2.3	100
* Va	.ccinium vitis-idaea	1.2	2.2	2.2	2.2	2.2	100
* Ho	mogyne alpina	+	+	+	+		80
Hi	eracium murorum	+	+	+	+		80
* Py	rola secunda	+	+.2	+	3.0		60
Ar	ctostaphylos alpina				1.2	2.2	40
Ox	alis acetosella		+	+.2			40
* Lu	zula sieberi	+	+				40
* Me	lampyrum silvaticum	+	+				40
So	lidago virga-aurea	+	+				40
Ca	mpanula scheuchzeri		•		+	•	20
As	plenium viride			+			20
Dr	yopteris dilatata		•	+			20
* Ly	copodium annotinum		1.2				20
	copodium selago		+.2				20
* Ca	lamagrostis villosa		+				20
* Va	ccinium uliginosum	1.2	•				20
	petrum hermaphroditum	+					20
Mo	usses et lichens						
* Pt	ilium crista-castrensis	1.2	2.2	2.3	1.2	2.2	100
* Pl	eurozium schreberi	2.2	3.3	3.3	3.3	1.2	100
Di	cranum scoparium	1.2	2.3	2.2	2.2	1.2	100
Ну	locomium splendens	2.2	2.2	1.2	3.3	4.4	100
* Cl	adonia elongata		2.2	+	2.2	1.2	80
	ltigera aphthosa	+	+	+	2.2		80
	adonia pyxidata	+.2	•		+.2	1.2	60
Cl	adonia rangiferina		1.2		1.2	2.2	60
	traria islandica		1.2	+	+.2		60
* Ну	locomium umbratum	+.2	3.4	4.4			60
Rh	ytidiadelphus triqueter	2.3		•	1.2		40
* Ba	rbilophozia lycopodioides	+.2			+.2		40
Po	lytrichum attenuatum		1.2	1.2			40
CI	adonia squamosa		+				20
Sp	hagnum quinquefarium	+.2					20

^{*} Espèces de la classe Vaccinio-Piceetea

Cette association est localisée sur les versants ombragés et froids, au pied de falaises rocheuses, dans des paysages karstiques, sur des blocs et des lapiés de calcaire dur.

Bien que mes observations soient trop fragmentaires pour me permettre de généraliser, il semble qu'on puisse distinguer provisoirement deux unités: la première à *Hylocomium umbratum* et *Oxalis* (relevés 1 à 3), traduisant un mésoclimat forestier relativement peu contrasté (présentant des affinités avec l'*Asplenio-Piceetum*), la seconde, à *Arctostaphylos alpina*, des stations plus exposées aux vents et moins enneigées (affinités avec l'*Arenario-Salicetum reticulatae*).

Ce groupement, relativement rare, fait partie d'un complexe de végétation comprenant plusieurs éléments disposés en mosaïque, ainsi qu'on peut l'observer à la "forêt du Lapé" (au nord de la Dent de Savigny) ou aux "Grosses Pierres" (au nord de la Dent des Bimis):

- a) le Salici-Rhododendretum est localisé de préférence sur les gros blocs, au bord des rochers, où la neige disparaît relativement tôt au printemps,
- b) les fourrés d'Alnus viridis, Salix hastata et Salix grandifolia avec sous-bois de hautes herbes (Athyrium distentifolium, Dryopteris dilatata, Polystichum lonchitis, Adenostyles alliariae, Cicerbita alpina, Saxifraga rotundifolia), occupent le fond des trous ainsi que les éboulis ombragés où la neige subsiste longtemps,
- c) l'Arenario-Salicetum reticulatae se limite aux pentes rocheuses raides et froides, partiellement recouvertes de mousses,
- d) enfin une association à Asplenium viride, Cystopteris fragilis, Cystopteris regia et Valeriana tripteris (Cystopteridion) colonise les fentes de rochers.

Quel statut syntaxonomique et quel nom donner à ce groupement? On pourrait l'identifier au Vaccinio-Rhododendretum au sens large, comme l'a fait SCHWEINGRUBER (1972) en créant une sous-association nouvelle "seslerietosum". Malheureusement, les relevés de cet auteur n'ont pas été délimités avec suffisamment de soin (ceux-ci comprenant de nombreuses espèces des trois groupements qui participent, avec le groupement principal, au complexe cité ci-dessus) ce qui rend son étude inutilisable pour la synsystématique. On pourrait aussi l'attribuer au Rhododendro-Pinetum cembrae, comme sous-association "salicetosum grandifoliae", à condition qu'une étude plus poussée montre clairement que ce groupement doit être assimilé à une forêt plutôt qu'à une lande. En attendant, je le nomme provisoirement Salici grandifoliae-Rhododendretum ferruginei en l'attribuant à l'alliance du Rhododendro-Vaccinion. Il diffère de la forêt d'aroles et de mélèzes des Alpes centrales par la présence de Salix grandifolia, Salix hastata et Sorbus chamaemespilus, par l'apparition sporadique de rares spécialistes des fentes de rochers calcaires (Aspleinium viride, Valeriana tripteris), par l'absence du mélèze, de Saxifraga cuneifolia et de Linnaea borealis et par la faible vitalité de Calamagrostis villosa.

La localisation de l'arole au versant nord des Alpes, sur les lapiés et les blocs de calcaire dur n'est pas sans rappeler celle du pin de montagne érigé (Pinus uncinata) dans les régions Karstiques du Vercors, du Parmelan et du Jura genevois. On a l'impression de stations-reliques où ces deux essences, bien connues pour leur frugalité exceptionnelle, ont résisté à la concurrence du sapin, puis de l'épicea, puis enfin aux défrichements de l'époque actuelle. En effet, comme l'ont montré les études palynologiques de P. et M. VILLARET (1958) et WEG-MÜLLER (1977, ces deux pins (qui ont peut-être même enduré la dernière glaciation sur place dans des refuges épargnés par les glaces) ont joué un rôle important à l'étage subalpin dès l'époque boréale (à partir de 7000 av. J.-C.) et ils ont connu leur extension maximale bien avant l'arrivée tardive de l'épicéa.

Le type nomenclatural est représenté par le relevé No 2.

6.3.5. La pelouse à laîche ferrugineuse (Caricetum ferrugineae, Tableau No 15) est moins répandue que la plante qui a donné son nom à l'association. Carex ferruginea est relativement fréquent dans le vallon des Morteys: il est lié aux cuvettes, aux bas de pentes avec suintements d'eau, avec une prédilection pour les versants ombragés (mais non exclusivement!). Le petit tableau ne rend toutefois compte que d'une partie de l'amplitude de l'association, c'est-à-dire d'une sous-association pionnière à Saxifraga aizoides localisée sur les pentes raides, ombragées et suintantes de marnocalcaires. Les espèces différentielles locales ainsi que les mousses (en particulier Cratoneurum commutatum et Orthothecium rufescens) traduisent l'affinité avec la végétation fontinale (Cartoneurion), Campanula cochleariifolia et Asplenium viride avec le Cystopteridion des fissures de rochers ombragés, enfin Primula elatior, Cardamine pentaphyllos et Salix grandifolia avec l'Ulmo-Aceretum.

Localisation des relevés:

- 1. En aval de Oussanna, bord du sentier,
- 2.3.4. Au sud de Oussanna, entre les bancs de rochers.
- 6.3.6. L'association à saule réticulé et sabline (Arenario-Salicetum reticulatae ass. nov., Tableau No 16) est l'une des plus faciles à reconnaître au triple point de vue physionomique, floristique et écologique.

Ce sont des arbrisseaux nains à feuilles caduques qui dominent, en partie enfouis dans la mousse: Salix reticulata, S. retusa, Arctostaphylos alpina (à voir en automne avec ses feuilles devenant orange vif!) et souvent Dryas octopetala. Deux autres arbrisseaux, mais à feuilles persistantes, sont localisés dans les stations où le tapis de mousses et de lichens est le plus épais: ce sont Rhododen-

15. Caricetum ferrugineae

Altitude (10m)		N.	4	2	7	4	
Exposition Pente (%) 200 80 120 100 Recouvrement (%) 60 100 100 80 Surface (m2) 2 5 10 2 Nombre d'espèces 15 18 26 35	1	No	1	2	3	4	
Pente (%)	1	REALIZATION OF THE PROPERTY OF	8 9 5	100			
Recouvement (%) Surface (m2)	1		37.5	5-00			
Surface (m2)	1		200	80	120	100	
Nombre d'espèces	1	Recouvrement (%)	60	100	100	80	
Nombre d'espèces	1	Surface (m2)	2	5	10	2	
Caractéristique et différentielles locales d'association C Carex ferruginea 2.2 5.5 4.4 3.3 4 Saxifraga aizoides 1.3 + 1.2 1.1 4 Bellidiastrum michelii 2.2 1.1 2.1 2.1 4 Viola biflora + + + + 3 Tofieldia calyculata + 1.2 + 3 Soldanella alpina + 1.1 1.1 3 Pinguicula vulgaris - + r 3 Espèces des unités supérieures (Seslerietalia, Elyno-Seslerietea) Sesleria coerulea 1.1 + 1.1 1.1 4 Alchemilla conjuncta +.2 + + 2 + 2 3 Galium anisophyllum +.2 + 2 + 2 3 Galium anisophyllum +.2 + 2 + 2 3 Hedysarum hedysaroides - 1.2 1 Scabiosa lucida - + 1 Phyteuma orbiculare + 1 Euphrasia salisburgensis + 1 Compagnes Campanula cochleariifolia Campanula selaginoides + - + + 3 Polygonum viviparum + - + + 3 Hieracium murorum + + + + 3 Luzula sieberi - + + + 3 Bartsia alpina - r + - 2 Knautia silvatica - + + +	1		15	18	26	35	
C Carex ferruginea 2.2 5.5 4.4 3.3 4 Saxifraga aizoides 1.3 + 1.2 1.1 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5	-						
C Carex ferruginea 2.2 5.5 4.4 3.3 4 Saxifraga aizoides 1.3 + 1.2 1.1 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5	١	Caractéristique et différentielle	s loc	ales	d'ass	ociatio	on
Saxifraga aizoides 1.3	C						0.00
Bellidiastrum michelii			1.3	+	1.2		4
Viola biflora	1					2.1	4
Tofieldia calyculata	1	Viola biflora	1	+	+	+	
Soldanella alpina	1		10.00			+	3
Pinguicula vulgaris	1	TO CORPUTE TRANSPORTED TO STATE TO CONTRACT OF THE STATE			100700000		3
Espèces des unités supérieures	1						3
Seslerietalia, Elyno-Seslerietea Sesleria coerulea			١.	1	53165		
Sesleria coerulea	1)				
Alchemilla conjuncta +.2 +.2 +.2 3 Galium anisophyllum +.2 . +.2 2 Yedysarum hedysaroides . . 1.2 1 Scabiosa lucida . . . + 1 Phyteuma orbiculare 1 Euphrasia salisburgensis .	1				1 1	11	1
Galium anisophyllum +.2 . +.2 2 Yedysarum hedysaroides		7		Τ.			
Hedysarum hedysaroides	1		50,000	•	T. C	2000	
Scabiosa lucida	١		+.2	•	•	0 F10000	1000000
Phyteuma orbiculare Euphrasia salisburgensis Compagnes Campanula cochleariifolia Parnassia palustris Selaginella selaginoides Polygonum viviparum Hieracium murorum Hieracium murorum Hieracium silvatica Veronica latifolia Primula elatior Orchis maculata Cardamine pentaphyllos Crepis paludosa Calamagrostis varia Linum catharticum Salix grandifolia Astrantia major - + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1			•	•		
Euphrasia salisburgensis Compagnes Campanula cochleariifolia Parnassia palustris Selaginella selaginoides Polygonum viviparum Hieracium murorum Hieracium murorum Hieracium silvatica Veronica latifolia Primula elatior Orchis maculata Cardamine pentaphyllos Crepis paludosa Calamagrostis varia Linum catharticum Salix grandifolia Astrantia major 1.2	1						
Compagnes 1.2 1.1 3 Parnassia palustris + 1.1 + 3 Selaginella selaginoides + + + 3 Polygonum viviparum + + + + 3 Hieracium murorum + + + + 3 Luzula sieberi - + + + 3 Bartsia alpina - r r 3 Knautia silvatica - + + + 3 Veronica latifolia + - + 2 Orchis maculata - r + - 2 Cardamine pentaphyllos - r - 2 Crepis paludosa - - + + 2 Calamagrostis varia - 1.1 1.2 2 Linum catharticum - + + 2 Astrantia major - r r 2	1	And the Broad and the Control of the			•		
Campanula cochleariifolia 1.2 1.1 + 3 Parnassia palustris + 1.1 + 3 Selaginella selaginoides + + + + 3 Polygonum viviparum + + + + 3 Hieracium murorum + + + + 3 Luzula sieberi - + + + 3 Bartsia alpina - r r 3 Knautia silvatica - + + + 3 Veronica latifolia + - + + 2 Primula elatior - r + - 2 Orchis maculata - r - 2 Cardamine pentaphyllos - r r - 2 Crepis paludosa - - + + 2 Calamagrostis varia - 1.1 1.2 2 Linum catharticum - + + 2 Astrantia major -	1			•	•	+	1
Parnassia palustris + 1.1 + 3 Selaginella selaginoides + + + + 3 Polygonum viviparum + + + + 3 Hieracium murorum + + + + 3 Luzula sieberi - + + + 3 Bartsia alpina - r r 3 Knautia silvatica - + + - 3 Veronica latifolia + + + - 2 Primula elatior - r + - - 2 Orchis maculata - r - <	1						
Veronica latifolia + + 2 Primula elatior . r + 2 Orchis maculata . r + 2 Cardamine pentaphyllos . r r 2 Crepis paludosa + +	1	Comp. To the same that the sam	1.2			+	3
Veronica latifolia + + 2 Primula elatior . r + 2 Orchis maculata . r + 2 Cardamine pentaphyllos . r r 2 Crepis paludosa + +	1		+	•	1.1	+	3
Veronica latifolia + + 2 Primula elatior . r + 2 Orchis maculata . r + 2 Cardamine pentaphyllos . r r 2 Crepis paludosa + +	1		+	•	+	+	3
Veronica latifolia + + 2 Primula elatior . r + 2 Orchis maculata . r + 2 Cardamine pentaphyllos . r r 2 Crepis paludosa + +	1	Polygonum viviparum	+		+	+	3
Veronica latifolia + + 2 Primula elatior . r + 2 Orchis maculata . r + 2 Cardamine pentaphyllos . r r 2 Crepis paludosa + +	1	Hieracium murorum	+	+		+	3
Veronica latifolia + + 2 Primula elatior . r + 2 Orchis maculata . r + 2 Cardamine pentaphyllos . r r 2 Crepis paludosa + +	1	Luzula sieberi		+	+	+	3
Veronica latifolia + + 2 Primula elatior . r + 2 Orchis maculata . r + 2 Cardamine pentaphyllos . r r 2 Crepis paludosa + +	1	Bartsia alpina		r	r	+	3
Veronica latifolia + + 2 Primula elatior . r + 2 Orchis maculata . r + 2 Cardamine pentaphyllos . r r 2 Crepis paludosa + +	1	Knautia silvatica	١.	+	+	+	3
Primula elatior . r + . 2 Orchis maculata . r + . 2 Cardamine pentaphyllos . r r . 2 Crepis paludosa + + 2 Calamagrostis varia . 1.1 1.2 2 Linum catharticum + + 2 Salix grandifolia + + 2 Astrantia major . r r 2	1	Veronica latifolia	+			+	2
Orchis maculata . r + . 2 Cardamine pentaphyllos . r r . 2 Crepis paludosa + + 2 Calamagrostis varia . 1.1 1.2 2 Linum catharticum + + 2 Salix grandifolia + + 2 Astrantia major . r r 2	1	Primula elatior	١.	r	+		2
Cardamine pentaphyllos . r r . 2 Crepis paludosa + + 2 Calamagrostis varia . 1.1 1.2 2 Linum catharticum + + 2 Salix grandifolia + + 2 Astrantia major . r r 2	1	Orchis maculata		r	+		
Crepis paludosa + + 2 Calamagrostis varia 1.1 1.2 2 Linum catharticum + + 2 Salix grandifolia + + 2 Astrantia major	1				יד		
Calamagrostis varia Linum catharticum Salix grandifolia Astrantia major . 1.1 1.2 2 . + + 2 + + 2	1			-	-	+	
Linum catherticum Salix grandifolia Astrantia major + + 2 + + 2 r r 2	1			•			
Salix grandifolia Astrantia major + + 2 2		The state of the s	١.	3. 	2000	S. 50.7400	
Astrantia major r r 2			١.	•	-	75	
115 01 011 012 110 110 110 110 110 110 110				•			
Accidenteries (n)	1	·	2				-
	1	Accidenteries (II)	2	4	2	L	

Accidentelles: No 1: Plantago alpina, Asplenium viride. No 2: Heracleum montanum, Phyteuma spicatum, Listera ovata, Pyrola secunda. No 3: Aposeris foetida, Gentiana lutea. No 4: Tussilago farfara, Salix retusa, Chrysanthemum montanum, Geranium silvaticum, Agrostis stolonifera, Gentiana asclepiadea, Picea abies.

Salix retuss		a vae	_														
Reposition	No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Pente (\$)	Altitude (10m)	195	213	202	233	205	237	195	204	195	192	193	193	197	198	188	
Recoursement pl. amp. (%)	1	1															
## mouses, lichens	2 22	L									3.0			2000			
Martine despices	1	100	80			80	70							60.0			
Nombre d'espàces 15 20 23 24 25 20 27 26 24 20 15 28 23 22 23 Auteur Saix reticulata 12 23 33 2.2 +2 2.2 1.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2	4					_											
Satix retual	, , ,			100000					-	-							-
Caractéristiques d'association Saita reticulata 2.2 3.3 2.2 +.2 2.2 1.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2	Description	15	20	23	24	25		2.1	26	24	20	15	28	23		31	
Salix reticulates 2, 2, 3, 3, 2, 2, 4, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,	Auteur						S								S		
Salix reticulates 2, 2, 3, 3, 2, 2, 4, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,	Carpatáriatiques d'association																
Salix retues		7	3 3	2 2	+ 2	2 2	1.2	2.2	2.2	2 2	1.2	2 3	2 2	2 2	2.2	2.2	100%
Aremaria ciliata supicemental Papager																	100
Pavanger			1.)	4.4	L•)	J• J	L.)	1.2	7.4	L•)	1 • 4	1 • 4	1 • 4	-	1 • 6	1 • 2	100
Rephace des unités susérieures Corytropide Signés Corytropide Sign	And the state of t				1.2	+.2		1.2	+.2	+.2		+	+.2		+.2	+.2	60
Coxtropido-Slymin, OElymetalia, Elymo-Senleristent Prestuca pumila	0	1	•	-			•				-						
Sestieris cosmules			a, E.	lyno-	Ses.	leri	etea										
Hadysarum hadysaroides									1.2	1.2	1.2	+	1.2	1.2	1.2	1.2	100
Fadicularis verticillates	Sesleria coerulea	+	1.2	+	2.3	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	+	+	1.1	+.2	2.2	1.2	100
Silene acquisis	Hedysarum hedysaroides	+	+	+	+	+		+	+	+	1.1	1.1	+.2	+.2	+	+.2	93
Payso cotopetala	Pedicularis verticillata		+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	87
Pinese frigidas		+.2	+.2		+.2	+.2	+.2	1.2	1.3	+.2	+.3	+.2	+.3		+.2	+.2	87
Calium anisophyllum			•		•		+		+.2		2.3	+		1.2	2.2	2.3	67
Minuartia verma			•		1.1	2.1	+	2.1	•	1.1	+	•		•	1.1		
Carex capillaris	1 0		+		•	•	+			•	•	•	+	+	•	+	1
Restuce violaces	And the second second second second		•	•	+.2	+.2	•	+.2	•	+.2	•	•	*	•	•		1
Alchemilla conjuncta		1.0	•	. •	٠	•	•			•		•	+	+	•	+	
Veronica aphylla			•	+.2	*	21		•	+.2	•	•	•	*	٠	•	•	1
Seablosa lucida			r	•		+.2	•	r	•	•	•	•		•	•	•	
Helianthemum alpestre	1 0	r	•	+	+	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	
Sentiana verms	The state of the s		+	•	•	•	•		. 2	•	•	•	٠	•	+	. •	
Androsace chamacjasme			•	•	•	•	•		+.2	•	•	•	•	+	•	•	1000000
Saxifraga moschata			•		+				•			•	•	•		•	
Chamorchis alpina Gentiana nivalis Gentiana nivalis Fedicularis oederi Carex atrata				•	+	•			•	•	•	•	•	•	•	•	
Gentiana nivalis			-	•	•	•			•	•	· 2	•		•	•	•	
Pedicularis oederi			•	•	•	•				•	T•4	•		•	•	•	1
Oxytropis jacquinii + 2 7			•	•	•	•		•	т.	•	•		•	•	•	•	1
Elyna myosuroides Gentiana tenella Carex atrata A +	\$60,000 \$60,000,000,000 \$50,000 \$53,000 \$50,00	1	•			•				•	•		- 1		•		
Centiana tenella		1.				+.2								÷			1
Carex atrata					+												7
Différentielles de sous-associations	Carex atrata	١.		+	٠.												1
Saxifraga androsacea	Arenaria multicaulis	١.	+.2														7
Hutchinsia alpina Minuartia sedoides	Différentielles de sous-associ	ati	ons														
Minuartia sedides	Saxifraga androsacea		+	+_		+											20
Arctostaphylos alpina Rhodoendron ferrugineum	Hutchinsia alpina	+		+													13
Rhododendron ferrugineum	Minuartia sedoides		+.2		1.2												13
Vaccinium vitis-idaea	Arctostaphylos alpina			•	+.2			2.2	3.3	2:3	3.3	4.4	3.3	4.4	2.2	3.3	67
Compagnes			•	r		•	•	•	+		r				+		53
The spèces described			•	•			•		•	1	+	2.2	1.2	1.2	+	2.2	40
Ranunculus alpester Saxifraga oppositifolia 2. espèces des sols suintants Parnassia palustris Saxifraga aizoides +.2 + . + . + . + . + . + . + . + . + .		1															
Saxifraga oppositifolia 1.2		1															
2. espèces des sols suintants Parnassia palustris Saxifraga aizoides +.2 + + +	Control of the Contro	1	+				+	2000000000		+	1.1	+			1.1	1.2	100
Parnassia palustris	0 11	+.2	•	+.2	+.2	+.2	•	+.2	+.2	•	•	•	+.2	+	•	•	53
Saxifraga aizoides		1															
Bartsia alpina			•	•	•	+	•	+	+	+	•	•	*	•	•	•	P. C. C.
Pinguicula alpina		1	•	+	•	•	•		•	•	•	•		1 0	•		1
Gentiana bavarica	1		•	+	•	•	•		•	•	•	•		1 . 2	•	+	0.000
Bellidiastrum michelii			•	•	•	•	•		+	•	•	•	+	•	•	•	100000
Tofieldia calyculata 3. diverses Carex sempervirens Polygonum viviparum + 1.2 . (+) 2.2 3.2 1.2 1.2 +.2 +.2 + 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 93 Polygonum viviparum + + 1.1 1.1 . 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 93 Campanula scheuchzeri r + + + + + + + + + + + + + + + + + + +			•	•	•		•	+	•	•	•	•	•		•	•	
3. diverses Carex sempervirens Polygonum viviparum Campanula scheuchzeri Myosotis alpestris Poa alpina Euphrasia minima Selaginella selaginoides Coeloglossum viride Luzula sudetica Luzula sieberi Cymnadenia albida Ranunculus montanus Ligusticum mutellina Pinus cembra juv. + 1.2 . (+) 2.2 3.2 1.2 1.2 +.2 +.2 + 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 93 1.2 1.2 1.2 +.2 +.2 +.2 + 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2			•	•	•	т.	•		•	•	•	٠	•	т.	•	•	1
Carex sempervirens			٠	٠	•	×	•	+	•			•	•			r	13
Polygonum viviparum + + 1.1 1.1 . 1.1 + + 1.1 + + 1.1 + + 1.1 93 Campanula scheuchzeri r + + + + + 1.1 + r			. ~		()					Q1	77			7		10	50000
Campanula scheuchzeri r + + + + + 1.1 + r		1			, ,	2.2											93
Myosotis alpestris + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		1				*	1.1					+		+			93
Poa alpina		1					•			+	r	•		+	+		80
Euphrasia minima		+	+		+		+			•	•	,		•	•	+	1000000
Selaginella selaginoides			•	+	•		•		+	+	•	•		•	+	•	5.000
Coeloglossum viride			•	•	*	+			•	•	+	•	+	•	•		
Luzula sudetica		1.	•	•		•					•	•	•	r	•		
Luzula sieberi		1.	•	•	•		•		+		+	•	•	•	•	+	80000
Gymnadenia albida		1	•	•	٠	+	•	+	•		•	•	r	•			
Ranunculus montanus +	The state of the s	1:	•	•	•	•			•	т	•	•	*	•	1.		200000
Ligusticum mutellina		1	+						•	•	•	•	T.	T.		10.1	
Pinus cembra juv. + 13		1			+	•			•	•	•	•		•	π.		
		1.						:		+	•	•		•	•		10 800
		0	0	3	1	1					1	0	0	1	1		1'
	. ,				50												

Accidentelles: No 3: Alchemilla vulgaris, Homogyne alpina, Luzula alpino-pilosa. No 4: Gentiana campestris. No 5: Viola biflora. No 6: Potentilla aurea. No 9: Picea abies, semis. No 10: Gentiana brachyphylla. No 13: Saxifraga aizoon. No 14: Vaccinium uliginosum.

dron ferrugineum et Vaccinium vitis-idaea. Deux graminées et une seule cypéracée sont constantes et bien visibles: Festuca pumila, Sesleria coerulea et Carex sempervirens. En juin-juillet, ce sont les fleurs blanches de Dryas qui attirent l'attention, en août, les fleurs rouges de Hedysarum et de Pedicularis verticillata et en septembre, les petites étoiles blanches de Arenaria bernensis qui contrastent avec le vert sombre des mousses. Celles-ci, ainsi que les lichens, forment un tapis assez épais qui recouvre 70–100 % de la surface; Hylocomium splendens est l'espèce dominante; il est accompagné de Rhytidiadelphus triqueter, Dicranum scoparium et Tortella tortuosa ainsi que de lichens comme Cetraria islandica, Cladonia rangiferina, Cl. elongata, Peltigera aphthosa, etc. Les mousses et les lichens n'ont pas toujours été notés et c'est pourquoi ils ne figurent pas au tableau.

L'Arenario-Salicetum reticulatae est localisé sur les pentes rocheuses ombragées exposées aux vents froids et humides. Les peuplements les plus représentatifs se rencontrent sur des pentes très raides dépassant souvent largement 100 %, de sorte que l'accès peut en être dangereux. L'association ne colonise que des lithosols (de préférence sur calcaires durs: rochers en gradins, éboulis stabilisés, blocs) recouverts de mousses et d'humus brut. La roche calcaire est souvent visible en surface et la plupart des plantes sont en contact avec les débris de roche mêlés à l'humus. La durée d'enneigement n'est pas aussi longue qu'on pourrait l'imaginer, car la neige glisse facilement sur ces pentes très raides. Malgré tout, la période de végétation est très courte à cause du manque d'ensoleillement.

Dans les Préalpes de la Suisse occidentale, l'association comprend trois espèces caractéristiques: Salix reticulata, Salix retusa et Arenaria bernensis²⁰. On peut en outre distinguer deux sous-associations de valeur locale: a) à Saxifraga androsacea dans les stations rocheuses (relevés 1–6); b) à Arctostaphylos alpina dans les stations où l'humus brut est très développé (relevés 7–15).

Comme le montrent les relevés 1 à 6, l'association est en contact avec le *Poo minoris-Hutchinsietum* des éboulis ombragés où la neige persiste plus longtemps. D'autre part, dans les stations où l'humus brut est très développé, sur les blocs où la neige disparaît tôt au printemps (relevés 10 —a 15), plusieurs espèces (notamment des éricacées comme *Arctostaphylos alpina*, *Rhododendron ferrugineum* et *Vaccinium vitis-idaea*) attestent l'affinité avec l'*Arctostaphylo-Loise-leurietum* et le *Salici-Rhododendretum*.

On serait tenté d'assimiler ce groupement au Salicetum retuso-reticulatae, dont le statut syntaxonomique n'est pas évident et que BRAUN-BLANQUET

²⁰ Arenaria ciliata ssp. bernensis est un taxon 16-ploîde, à n = 120, décrit par FAVARGER en 1963. Voir aussi FAVARGER 1960.

lui-même (dans BRAUN-BLANQUET et JENNY, 1926) attribue tout d'abord à la classe *Thlaspietea rotundifolii*, puis, en 1948, à celle des *Salicetea herbaceae*. Or, l'association des Préalpes de la Suisse occidentale ne possède non seulement aucune espèce des *Salicetea herbaceae* au sens strict, mais elle est riche en plantes des pelouses alpines calcicoles. Parmi celles-ci, on remarquera surtout le groupe des taxons arctico-alpins et l'absence d'espèces oro-méditerranéennes, ce qui impose l'attribution de cette nouvelle association à l'alliance *Oxytropido-Elynion* et à l'ordre *Oxytropido-Elynetalia*²¹.

Localisation des relevés:

- 1, 3, 5, 7, 9-12, 14, 15: Sous la Dent des Bimis, Vallon des Morteys (FR),
- 2, 4: Dent de Folliéran (FR),
- 6: Vanil Noir (FR),
- 8: Schopfenspitz sur Jaun (FR),
- 13: Tour de Famelon (VD).

Le type nomenclatural est représenté par le relevé No 5 pour la sous-association à Saxifraga androsacea et par le relevé No 12 pour la sous-association à Arctostaphylos alpina.

6.3.7. Je n'ai rencontré la lande à azalée des Alpes (Arctostaphylo-Loiseleurietum) qu'au versant nord de la Tour de Famelon (VD), entre 1950 et 2000 m d'altitude. Ce groupement, pourtant si caractéristique, n'a été signalé qu'une seule fois jusqu'ici, par OBERDORFER (1950), dans l'Allgäu. Bien qu'il soit en contact avec l'Arenario-Salicetum, il doit être rattaché au Rhododendro-Vaccinion en raison de la dominance des espèces d'humus brut. Le substrat est un lithosol à Mor.

En voici deux relevés:

21 Sur la base d'une comparaison des pelouses arctico-alpines japonaises avec celles des autres grands massifs montagneux de l'hémisphère nord, OHBA (1974) propose de séparer les pelouses riches en éléments arctico-alpins de celles qui hébergent une majorité d'espèces oro-méditerranéennes. En reprenant l'idée de OBERDORFER (1957, p. 305), il propose la création des deux classes Carici rupestris-Kobresietea bellardii (syn. de Kobresio-Elynetea OBERD. 1957) et Seslerietea (syn. de Seslerietalia BR.-BL. 1926). Dans le même ordre d'idées, on peut se demander s'il ne conviendrait pas de grouper dans l'ordre Oxytropido-Elynetalia et l'alliance Oxytropido-Elynion les groupements riches en taxons arctico-alpins, c'est-à-dire Elynetum, Caricetum firmae et Arenario-Salicetum reticulatae.

Espèces du Rhododendro-Vac	cinion	:
Loiseleuria procumbens	3.3	5.5
Vaccinium uliginosum	3.3	1.2
Vaccinium vitis.idaea	1.2	1.2
Vaccinium myrtillus	+.2	1.2
Empetrum hermaphroditum	+	1.2
Espèces des Oxytropido-Ely	netea:	
Salix reticulata	2.2	
Salix retusa	1.2	+.2
Arctostaphylos alpina	3.3	3.2
Dryas octopetala	+.2	+
Sesleria coerulea	1.2	+
Hedysarum hedysaroides	1.1	
Festuca pumila	+	:
Galium anisophyllum		+
Diverses: a) phanérogames		
Campanula scheuchzeri	1.1	+
Carex sempervirens	+	•
Polygonum viviparum	+	•
Anthoxanthum alpinum	+	•
Avena versicolor	+	
Homogyne alpina	+	•
b) lichens et mousses		
Cladonia rangiferina	1.2	2.2
Cetraria islandica	3.3	2.2
Peltigera aphthosa	+.2	•
Thamniola vermicularis		+
Dicranum scoparium	2.2	1.2
Pleurozium schreberi	2.2	1.2
Rhytidiadelphus triqueter	2.2	•
Hylocomium splendens	1.2	•

- 6.3.8. Les pâturages alpins qu'on rencontre surtout dans la région des Morteys de Folliéran, Morteys Dessous, Les Marrindes, et qui ne sont que faiblement pâturés, sont en contact avec des pelouses à Carex ferruginea et Festuca violacea. Ils se distinguent par un lot d'espèces dominantes comme Poa alpina, Phleum alpinum, Crepis aurea, Plantago alpina, P. atrata, Polygonum viviparum, Ligusticum mutellina, Alchemilla vulgaris, Soldanella alpina, etc., qui permettraient de les attribuer au Poion alpinae OBERD. 1950. Cependant, l'observation plus attentive révèle trois groupements différents:
- a) le premier, qui occupe les pentes où la neige ne persiste pas longtemps au printemps, se distingue par des espèces des Seslerietalia comme Galium anisophylium, Anthyllis alpestris, Gentiana verna et Chrysanthemum montanum,
- b) le second, localisé sur des lentilles de sols décarbonatés, héberge des différentielles comme Nardus stricta, Hieracium auricula, Luzula campestris, L. spicata, Carex pallescens, Orchis maculata et même Sieversia montana et peut être attribué au Nardion BR.-BL. 1926,

c) le troisième (Tableau No 17), que j'ai attribué provisoirement au *Trifolio-Festucetum violaceae*, occupe les replats et les cuvettes en pente douce où la neige persiste tard dans la saison et comprend des espèces différentielles comme *Festuca violacea*, *Trifolium thalii*, *T. badium* et un lot important de spécialistes des combes à neige (Salicetea herbaceae) comme Salix herbacea, Sagina saginoides, Gentiana bavarica, Carex nigra, Gnaphalium supinum, Sibbaldia procumbens, etc. Le sol, où l'argile est accumulé dans les cuvettes par solifluxion, présente, sous l'horizon A₁ argileux, un horizon de gravier de quartz provenant de l'altération des rognons de silice contenus dans le calcaire compact de la roche-mère.

Les relevés du tableau No 17 proviennent de la région située entre les Morteys Dessous et les Rochers des Tours.

6.4. La végétation des reposoirs du bétail et du gibier

6.4.1. L'association à oseille des Alpes (Rumicetum alpini, Tableau No 18) s'installe à proximité des chalets d'alpage et sur les terrasses où le bétail se repose pendant qu'il rumine. Le sol est frais, profond et surtout périodiquement alimenté en produits azotés par les excréments du bétail. Rumex alpinus (plus rarement Senecio alpinus) est l'espèce dominante, toujours accompagné de quelques hautes herbes de l'Adenostylion, notamment dans les pâturages éloignés des écuries. Poa supina, espèce nitrophile favorisée par le piétinement (parfois aussi Veronica serpyllifolia qui a à peu près la même écologie) est très fréquent, caché sous les hautes herbes.

J'ai tenté de distinguer des sous-associations: a) le type, le plus fréquent dans le vallon des Morteys, avec Myosotis silvatica, Ranunculus lanuginosus, Veratrum album et Adenostyles alliariae; b) une sous-association à Corydalis fabacea, Anemone ranunculoides, Leucojum vernum, Ranunculus ficaria et Aegopodium podagraria qui sont les vestiges de l'Ulmo-Aceretum originel; c) enfin, le long d'un ruisseau, une sous-association à Caltha palustris et Veronica beccabunga où Senecio alpinus est l'espèce dominante.

Les relevés proviennent des localités suivantes:

- 1, 2, 7: La Case,
- 3: Les Morteys Dessous,
- 4, 8: Les Marindes,
- 5: entre La Case et Les Marindes,
- 6, 9: Oussanna,
- 10: entre Gros Croset et Oussanna,
- 11: Brenleire Dessus.

17. Trifolio-Festucetum violaceae

					_		
No	1	2	3	4	5	6	
Altitude (10m)	208	199	200	196	196	195	
Exposition	N	N	N	E	N	N	
Pente (%)	20	20	20	30	10	10	53
Surface (m2)	20	2	10	6	2	2	
Nombre d'espèces	24	26	17	21	25	27	
					- /	-1	
Caractéristiques locales							
Festuca violacea	2.2	2.2	+	+	1.1	1.2	100%
Trifolium thalii	1.2		+	+	+.2	+.2	100
Plantago alpina	2.2	2.2	+	2.2	2.2	3.2	100
Plantago atrata	1.2	1.2	'	+	2.2	1.2	83
Trifolium badium	1.2	+.2	+	100	+	+	66
Espèces des combes à neige			100		т-	Т	00
Sagina saginoides	1.1	1.1	i +	1.2	+	+	100
Soldanella alpina	2.2	2.1	1.1	1.1	2.2	2.2	100
Gentiana bavarica	+.2		1.1		+.2	+	E - 25 E
Salix herbacea	187 (500) 330	10 Total (10	200 200 200	•	n - 70 m		83
Veronica alpina	+.2	+.2	+.2	•	1.2	1.2	83
-	•	+	+	•	+	•	50
Carex nigra	•	•	+	• •	1.1	+	50
Gnaphalium supinum	•			+.2	*	1.2	33
Sibbaldia procumbens	•	•		+.2	•	1.2	33
Luzula alpino-pilosa		•		*	+	+.2	33
Cerastium cerastioides	١,,	•		•	+	+	.33
Différentielles de variantes							
Ranunculus alpester	1.1	1.1		•	•	•	33
Salix retusa	+.2	2.3		•	•	•	33
Achillea atrata	r	r		*		•	33
Bellidiastrum michelii	+	2.1		•	•	•	33
Crepis aurea		•	2.2	2.2	+	2.2	66
Alchemilla vulgaris	•	•	1.1	1.2	+	1.2	66
Compagnes							
Ligusticum mutellina	2.1	2.1	+	1.1	2.1	2.2	100
Polygonum viviparum	2.2	2.1	2.1	•	2.2	1.2	83
Campanula scheuchzeri	+	+	+	*	+	+	83
Phleum alpinum	1.1	+		1.1	+	1.1	83
Leontodon hispidus	+	+	1.1	3.2	•	+	83
Poa alpina	1.1	1.1		+	•	1.1	66
Cirsium spinosissimum	+	r			r	+	66
Myosotis alpestris	r	+				r	50
Homogyne alpina	+	+		+			50
Luzula spicata				1.1	r		33
Euphrasia minima	r	+					33
Ranunculus nemorosus	+			+			33
Taraxacum alpinum		+			+		33
Deschampsia caespitosa	+					+	33
Bartsia alpina			+			+	33
Accidentelles (n)	0	1	0	4	3	1	

Accidentelles: No 2: Pulsatilla alpina. No 4: Rumex arifolius, Anthoxanthum odoratum, Potentilla aurea, Nardus stricta.

No 5: Ranunculus acer, Primula elatior, Carex ferruginea.

No 6: Festuca rubra.

18. Rumicetum alpini

No													
Ryposition NW Pente (%) 15		1		0.50				22					
Pente (\$)	A STATE OF THE STA	170		189	185	178	165	172	182	150	152	167	
Surface (m2)												E	
Nombre d'espèces			15									30	
Runer		100	100	100	100	100	50	100	100	10	6	20	
Expèces de l'association et de l'alliance (Rumicion alpini) Rumex alpinus 5.5 5.5 5.5 4.4 4.4 5.5 4.4 4.4 5.5 5.5	Nombre d'espèces	11	17	10	16	18	19	20	23	22	24	15	
Rumex alpinus	Auteur	S	В	В	B	В	B	B	В				
Rumex alpinus		-											
D Pos supina													
D Veronuca sergyllifolia		5.5	5.5	5.5	4.4	4.4	5.5	4.4	4.4	5.5	5.5	2.2	100%
Senecio alpinus		1.1	1.2	2.2	+	+	+	1.1	1.2	+	1.2		91
Festuca pratensis var.appening Espèces des unités supérieures (Artemisietalia, Artemisietea vulgaris Urtica dioeca	1.0		+	+	1.2				+				36
Emphases des unités supérieures Artemisietalia, Artemisietea vulgaris Urtica dioeca			•				+					4.4	18
Urtica dioeca													18
Chenopodium bonus-henricus	Espèces des unités supérieures	(A	rtem	isie	talia	a, A	rtem	isie	tea	vulga	aris)	
Capsella bursa-pastoris + +		+	1.1		•		+	+		+	1.2	1.2	64
Geranium phaeum var. lividum	Chenopodium bonus-henricus	1.1	+					+			+.2		36
Chaerophyllum aureum	Capsella bursa-pastoris	+	+							1.1	+		36
Gagea fistulosa	Geranium phaeum var. lividum						+			+			18
Geranium robertianum											+.2		9
Galeopsis tetrahit											+		9
Caleopsis tetrahit	Committee of the Commit		•								+		9
Myosotis silvatica 1.1 +		١.									+		9
Ranunculus lanuginosus		ati	ons										
Veratrum album	Myosotis silvatica	1 .	1.1	+		+		+	+				55
Adenostyles alliariae	Ranunculus lanuginosus		•	2.2		1.1	+	2.2	1.1				46
Corydalis fabacea					+	+	+	+					36
Anemone ranunculoides Leucojum vernum Ranunculus ficaria Aegopodium podagraria Caltha palustris Veronica beccabunga Compagnes 1. de l'Adenostylion Rumex arifolius Ranunculus aconitifolius Stellaria nemorum 1.2 3.2 2.2 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 + 1.2 100 Renunculus aconitifolius 1.1 1.1 2.2 2.2 2.2 + 3.2 2.1 1.2 2.1 2.3 82 Chaerophyllum cicutaria Ceranium silvaticum 1.2 3.2 2.2 1.1 2.1 2.1 1.1 1.2 1.2 73 Geranium napellus Aconitum napellus 1. de l'Adenostylion Rilium effusum var.violaceum 2. des Molinio-Arrhenatheretea Alchemilla vulgaris Taraxacum officinale Dactylis glomerata Aconitum repens Trifolium repens Trifoli	Adenostyles alliariae				+	1.1	+		2.2				36
Leucojum vernum Ramunculus ficaria										+	+_		18
Ranunculus ficaria Aegopodium podagraria Caltha palustris Veronica beccabunga Compagnes 1. de l'Adenostylion Rumex arifolius Ranunculus aconitifolius + + 2.2 2.2 + + 3.2 2.1 2.1 2.3 82 Stellaria nemorum 1.2 3.2 2.2 1.1 2.1 2.1 1.1 1.2 1.2 82 Chaerophyllum cicutaria Geranium silvaticum r + + 1.1 + + 1.1 1.1 2.2 73 Geranium napellus Milium effusum var.violaceum 2. des Molinio-Arrhenatheretea Alchemilla vulgaris Taraxacum officinale Dactylis glomerata Ranunculus repens Trifolium repens Trifolium repens Trisetum flavescens Phleum alpinum Poa alpina 3. Diverses Melandrium diurnum Vicia sepium Poeschampsia caespitosa Ligusticum mutellina Stellaria media Veronica chamaedrys Acer pseudoplatanus (semis) 1.1 1.1 2.2 2.2 2.1 1.1 1.1 1.1 1.1 + 1.2 100 1.2 10	Anemone ranunculoides									+	1.2		18
Aegopodium podagraria Caltha palustris Veronica beccabunga Compagnes 1. de l'Adenostylion Rumex arifolius Ranunculus aconitifolius Stellaria nemorum Chaerophyllum cicutaria Geranium silvaticum Aconitum napellus Milium effusum var.violaceum 2. des Molinio-Arrhenatheretea Alchemilla vulgaris Taraxacum officinale Dactylis glomerata Ranunculus repens Trifolium repens Trisetum flavescens Phleum alpinum Poa alpina Diverses Melandrium diurnum Vicia sepium Deschampsia caespitosa Ligusticum mutellina Stellaria media Veronica chamaedrys Acer pseudoplatanus (semis) 1.1 1.1 2.2 2.2 2.1 1.1 2.1 1.1 1.1 + 1.2 100 1.2 10 1.2	Leucojum vernum		•	•							1.2		9
Caltha palustris Veronica beccabunga Compagnes 1. de l'Adenostylion Rumex arifolius 1.1 1.1 2.2 2.2 2.1 1.1 2.1 1.1 1.1 + 1.2 100 Ranunculus aconitifolius + + 2.2 2.2 + + 3.2 2.1 2.3 82 Stellaria nemorum 1.2 3.2 2.2 1.1 2.1 1.1 1.2 1.2 38 82 Stellaria nemorum 1.2 3.2 2.2 1.1 2.1 1.1 1.2 1.2 38 32 32 32 32 32 32 3	Ranunculus ficaria			•							1.2		9
Caltha palustris Veronica beccabunga Compagnes 1. de l'Adenostylion	Aegopodium podagraria		•	•	•						+		9
Veronica beccabunga												1.2	
Compagnes 1. de l'Adenostylion Rumex arifolius 1.1 1.1 2.2 2.2 2.1 1.1 2.1 1.1 1.1 + 1.2 100 Ranunculus aconitifolius + + 2.2 2.2 + + 3.2 2.1 2.3 82 Stellaria nemorum 1.2 3.2 2.2 1.1 2.1 2.1 1.1 1.2 1.2 82 Chaerophyllum cicutaria + + + 1.1 + + + 1.1 1.2 73 Geranium silvaticum r + - + 1.2 + + 1.2 + 1.1 1.2 46 Milium effusum var.violaceum 2. des Molinio-Arrhenatheretea Alchemilla vulgaris + 2.1 + + + 1.1 1.1 1.2 46 Milium repens + 2.1 + + 1.1 1.1 1.2 46 Milium repens +	Veronica beccabunga												
Rumex arifolius	Compagnes												
Ranunculus aconitifolius Stellaria nemorum 1.2 3.2 2.2 1.1 2.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 82 Chaerophyllum cicutaria Geranium silvaticum Aconitum napellus Milium effusum var.violaceum 2. des Molinio-Arrhenatheretea Alchemilla vulgaris Taraxacum officinale Dactylis glomerata Ranunculus repens Trifolium repens Trifolium repens Trisetum flavescens Phleum alpinum Poa alpina 3. Diverses Melandrium diurnum Vicia sepium Deschampsia caespitosa Ligusticum mutellina Stellaria media Veronica chamaedrys Acer pseudoplatanus (semis) + + - + 1.2 1.2 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2	1. de l'Adenostylion												
Ranunculus aconitifolius Stellaria nemorum 1.2 3.2 2.2 1.1 2.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 82 Chaerophyllum cicutaria Geranium silvaticum Aconitum napellus Milium effusum var.violaceum 2. des Molinio-Arrhenatheretea Alchemilla vulgaris Taraxacum officinale Dactylis glomerata Ranunculus repens Trifolium repens Trifolium repens Trisetum flavescens Phleum alpinum Poa alpina 3. Diverses Melandrium diurnum Vicia sepium Deschampsia caespitosa Ligusticum mutellina Stellaria media Veronica chamaedrys Acer pseudoplatanus (semis) + + - + 1.2 1.2 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2		1.1	1.1	2.2	2.2	2.1	1.1	2.1	1.1	1.1	+	1.2	100
Stellaria nemorum 1.2 3.2 . 2.2 1.1 2.1 2.1 1.1 1.2 . 1.2 82 Chaerophyllum cicutaria . + . + 1.1 + . + . + 1.2 . 1.2 73 Geranium silvaticum . + . + 1.2 + . + 1.2 +	Ranunculus aconitifolius	+	+	. •	2.2	2.2	+	+	3.2	2.1		2.3	82
Geranium silvaticum r + + 1.2 + . 73 Aconitum napellus . + + . + . 46 Milium effusum var.violaceum . + . 2.2 2.1 2.1 . . 46 2. des Molinio-Arrhenatheretea Alchemilla vulgaris . + . 1.2 . . 46 Alchemilla vulgaris .	Stellaria nemorum	1.2	3.2										82
Geranium silvaticum r + + 1.2 + . 73 Aconitum napellus . + + . + . 46 Milium effusum var.violaceum . + . 2.2 2.1 2.1 . . 46 2. des Molinio-Arrhenatheretea Alchemilla vulgaris . <td< td=""><td>Chaerophyllum cicutaria</td><td></td><td>+</td><td></td><td>+</td><td>1.1</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>1.1</td><td></td><td>1.2</td><td>73</td></td<>	Chaerophyllum cicutaria		+		+	1.1	+	+	+	1.1		1.2	73
Aconitum napellus Milium effusum var.violaceum 2. des Molinio-Arrhenatheretea Alchemilla vulgaris Taraxacum officinale Dactylis glomerata Ranunculus repens Trifolium repens Trisetum flavescens Phleum alpinum Poa alpina 3. Diverses Melandrium diurnum Vicia sepium Deschampsia caespitosa Ligusticum mutellina Stellaria media Veronica chamaedrys Acer pseudoplatanus (semis)	Geranium silvaticum	r	+		+	1.2	+	+	1.2	+			
2. des Molinio-Arrhenatheretea Alchemilla vulgaris Taraxacum officinale Dactylis glomerata Ranunculus repens Trifolium repens Trisetum flavescens Phleum alpinum Poa alpina 3. Diverses Melandrium diurnum Vicia sepium Deschampsia caespitosa Ligusticum mutellina Stellaria media Veronica chamaedrys Acer pseudoplatanus (semis)	Aconitum napellus			+	+		+		+			1.2	
Alchemilla vulgaris Taraxacum officinale Dactylis glomerata Ranunculus repens Trifolium repens Trisetum flavescens Phleum alpinum Poa alpina 3. Diverses Melandrium diurnum Vicia sepium Deschampsia caespitosa Ligusticum mutellina Stellaria media Veronica chamaedrys Acer pseudoplatanus (semis) - + 2.1 + + + 1.1 1.1 1.1 +.2 + 1.2 46 - 46 - 46 - 46 - 46 - 46 - 46 - 46 -	Milium effusum var.violaceum		+		•	2.2	2.1	2.1		+.2		8	46
Taraxacum officinale		1											
Dactylis glomerata			+	2.1	+	+	+	1.1	1.1	+.2	+	1.2	
Ranunculus repens	Taraxacum officinale		+	•	•	•	•	+	+	+	+	•	
Trifolium repens Trisetum flavescens Phleum alpinum Poa alpina Joiverses Melandrium diurnum Vicia sepium Deschampsia caespitosa Ligusticum mutellina Stellaria media Veronica chamaedrys Acer pseudoplatanus (semis) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1	Dactylis glomerata		+			+		+	+				36
Trifolium repens Trisetum flavescens Phleum alpinum Poa alpina Joiverses Melandrium diurnum Vicia sepium Deschampsia caespitosa Ligusticum mutellina Stellaria media Veronica chamaedrys Acer pseudoplatanus (semis) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1	Ranunculus repens							+		+	+	+.2	36
Phleum alpinum			•	•	•	•				+	r		18
Poa alpina +	Trisetum flavescens							+	(+)				18
3. Diverses Melandrium diurnum . + . + (+) + 1.1 1.1 + . + . 73 Vicia sepium . + + . (+)	Phleum alpinum							+	+				18
Melandrium diurnum . + . + (+) + 1.1 1.1 + . + . 73 Vicia sepium . + + . (+) +	Poa alpina				+				+	•			18
Vicia sepium . + + . (+)													
Vicia sepium . + + . (+)	Melandrium diurnum		+		+	(+)	+	1.1	1.1	+		+	73
Deschampsia caespitosa	Vicia sepium		+	•			+		(+)				27
Ligusticum mutellina				1.2						•			18
Stellaria media					+								18
Veronica chamaedrys r											1.1		18
Acer pseudoplatanus (semis)		r											18
						•	•	•		+	r		18
TO UT JUNE 2 IN THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		1	\cap	\cap	1	3	0	\circ	2	2	1	1	
	TOCTAGINGTIES (II)	<u> </u>	U	U)	0	. 0	۷		'	1	

Accidentelles: No 1: Aposeris foetida. No 4: Cirsium oleraceum. No 5: Primula elatior, Peucedanum ostruthium, Epilobium montanum. No 8: Viola biflora, Cirsium spinosissimum. No 9: Heracleum sphondylium, Myrrhis odorata. No 10: Plantago major. No 11: Epilobium alpestre.

6.4.2. L'association à râpette (Lappulo-Asperuginetum, Tableau No 19) n'a été trouvée, dans la région du Vanil Noir, qu'au pied des rochers dominant "la Randonnaire", sur une étroite bande de terrain abrité des précipitations où le gibier peut se réfugier au gros de l'hiver. C'est dans ces abris sous roche, qui n'ont parfois même pas 1 m de large, que se trouve la station primaire de Asperugo procumbens connu surtout à proximité des chalets d'alpage et propagé par le gibier et le bétail. Les thérophytes Asperugo procumbens (la râpette), et Capsella bursa-pastoris rencontrent sur ces sols secs et riches en nitrates et phosphates des conditions optimales de développement à l'abri de la compétition des hautes herbes dont la vitalité est limitée par la sécheresse.

Je ne me prononce pas sur la synsystématique de cette association rarement décrite, dénommée par BRAUN-BLANQUET d'après *Lappula deflexa* et classée par lui dans l'alliance *Onopordion (Stellarietea mediae)* mais qu'on pourrait aussi attribuer à l'*Arction (Artemisietea)* sur la base de mes relevés.

19. Lappulo-Asperuginetum

No	1	2	3	4	
Altitude (10m)	166	166	166	169	
Recouvrement (%)	20	30	50	90	
Surface (m2)	1	1	3	2	
Nombre d'espèces	10	10	12	11	
Caractéristiques locales d'associ	iation		7		
Asperugo procumbens	+		3.3	4.4	4
Capsella bursa-pastoris	2.1		2.1		4
Autres espèces nitrophiles				-•.	
Dactylis glomerata	+.2	1.2	1,2	1.2	4
Geranium pyrenaicum	+	+		1.2	4
Chenopodium bonus-henricus				1.2	3
Urtica dioeca		+		2.3	2
Verbascum sp.		+		•	1
Chaerophyllum aureum	[+	
Galium aparine				1.2	1 1
Compagnes			7		
Taraxacum officinale	+	+	+		3
Poa pratensis	1.2			1.2	3
Galium mollugo	+	+			3 2
Melandrium diurnum		+	+		2
Medicago lupulina	+		+.2		2
Sedum dasyphyllum	+.2				1
Festuca ovina	+.2				1
Myosotis silvatica			+		1
Hippocrepis comosa			r		1
Chrysanthemum montanum	١.		r		1
Silene cucubalus				+	1
Heracleum montanum	<u> </u>			r	1