

Zeitschrift: Bulletin de la Société Fribourgeoise des Sciences Naturelles = Bulletin der Naturforschenden Gesellschaft Freiburg

Herausgeber: Société Fribourgeoise des Sciences Naturelles

Band: 75 (1986)

Heft: 1-2

Anhang: [Fragnièremoos]

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)


Download PDF: 07.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

FRAGNIÈREMOOS

STAND DER VEGETATION 1983


INST. FÜR BOTANISCHE BIOLOGIE
UNIVERSITÄT FREIBURG



0 30 (m)

Legende : PFLEGEPLAN


- [Hatched pattern] Gebüsch- und Waldzonen
- [Cross-hatched pattern] Jährlich zu mähende Streu- und Futterwiesen
- [Wavy lines pattern] Schilf: jedes Jahr einen Sektor mähen
- [Horizontal lines pattern] Alle 2 -3 Jahre zu mähende Wiesen und Staudenfluren
- [Vertical lines pattern] Alle 3 -5 Jahre entbuschen
- [Dashed pattern] Säubering alle 5 -10 Jahre
- [Solid line] Pufferzone: 1 -2 Mal jährlich zu mähen
- [Open space] Offene Wasserflächen (Torfstiche) erhalten
- [Dashed line with dots] Trampelpfad



FRAGNIÈREMOOS


STAND DER VEGETATION 1983

INST. FÜR BOTANISCHE BIOLOGIE
UNIVERSITÄT FREIBURG



Legende : PHYTOSOZIOLOGISCHE KARTE

- 0 Freie Wasserfläche
- 1 Typhetum latifoliae
- 2 Typhetum latifoliae, Variante mit *Solanum dulcamara*
- 2 Phragmitetum communis var. typicum
- 3 Caricetum appropinquatae
- 4 Carex acutiformis-Gesellschaft
- 5 Valeriano-Filipenduletum
- 6 Feuchtwiese
- 7 Cirsio-oleracei-Polygonetum
- 11 'Pionierstandorte'
- 8 Brennessel-Gürtel
- 9 Salicetum albae
- 10 Frangulo-Salicetum cinereae
- 11 Betulo-Quercetum roboris var. typicum
- 12 Ackerland
- 13 Wiesen und Weiden
- Lemnetum minoris
- Sparganio-Glycerietum fluitantis
- Caricetum rostratae
- Scirpetum silvatici



L
G
R
S