

<b>Zeitschrift:</b>	Bulletin de la Société Fribourgeoise des Sciences Naturelles = Bulletin der Naturforschenden Gesellschaft Freiburg
<b>Herausgeber:</b>	Société Fribourgeoise des Sciences Naturelles
<b>Band:</b>	76 (1987)
<b>Heft:</b>	1-2
<b>Artikel:</b>	Contribution à la connaissance de la faune d'opilions (Arachnida) du canton de Fribourg (Suisse)
<b>Autor:</b>	Dumitrescu, Dan
<b>DOI:</b>	<a href="https://doi.org/10.5169/seals-308666">https://doi.org/10.5169/seals-308666</a>

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 28.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Contribution à la connaissance de la faune d'opilions (Arachnida) du canton de Fribourg (Suisse)

par DAN DUMITRESCU,  
CH-1700 Fribourg, Rte de Bertigny 9

Les opilions constituent un des groupes les plus importants d'arachnides (3000 espèces environ). Ils vivent dans des milieux extrêmement divers: grottes, horizons inférieurs du sol, humus, littière, mousses, vieux troncs d'arbres, plantes herbacées, etc.

Les opilions sont répartis en trois sous-ordres: Cyphophthalmi, Laniatores et Palpatores. Les Cyphophthalmi – animaux très anciens, dont la répartition est antérieure à la disjonction des plaques continentales (JUBERTHIE et MASSOUD, 1976) – n'ont pas été signalés en Suisse. A une exception près – *Peltonychia leprieuri* (LUCAS), placée dans le sous-ordre des Laniatores, toutes les espèces citées dans la faune helvétique (une quarantaine) font partie du sous-ordre des Palpatores. Pour ce qui est de l'arachnofaune du canton de Fribourg, les données publiées jusqu'à ce jour sont (fort curieusement) rarissimes. Ainsi, pour les araignées par exemple, le seul travail quelque peu important est dû à BARTELS (1931) qui cite 41 espèces récoltées à Heitenried. En ce qui concerne les opilions, ni LESSERT (1917), ni MARTENS (1978) ne mentionnent dans leurs ouvrages monographiques aucune espèce du canton de Fribourg.

«Notre collection d'arachnides était formée, jusqu'à ces dernières années, de quelques sujets desséchés et généralement mal conservés», écrit MUSY (1918a). «... cette année (1917)... M. le Dr Roger de Lessert, spécialiste pour ce groupe et auteur du volume du catalogue des invertébrés de la Suisse qui traite les araignées, voulut gracieusement remettre à notre Musée un grand nombre d'espèces prélevées sur ses doublets». En effet, il s'agit de 44 espèces d'arachnides (araignées, 32; opilions, 7; pseudoscorpions, 3; scorpions, 2), exotiques (3) et indigènes, mais aucune du canton de Fribourg!

Dans son rapport sur le Musée d'Histoire naturelle de Fribourg en 1918, MUSY (1918b) fait la mention suivante: «M. le Dr Roger de Lessert, à

Genève, notre spécialiste suisse bien connu pour ce groupe, a bien voulu nous déterminer les espèces recueillies spécialement en 1917; nous les donnons à titre de première contribution à l'étude de nos espèces locales». La liste comprend 16 espèces d'araignées, une espèce d'opilions (*Phalangium opilio* L., Marly) et une de scorpions.

En 1923, MUSY enregistre la «seconde contribution à la connaissance des arachnides fribourgeois» (déterminés par Roger de Lessert, savoir une liste de neuf espèces: araignées, 7; opilions, 1: *Mitopus morio* [FABR.], route de Cousimbert à Fribourg; pseudoscorpions, 1). Ainsi, pour le canton de Fribourg n'ont été signalées (sauf erreur de notre part) que deux espèces d'opilions.

De nombreuses récoltes effectuées irrégulièrement dans la période allant de septembre 1983 au mois d'avril 1987 nous permettent d'apporter des précisions sur ce groupe d'arachnides appelés communément «faucheurs» (ou «faucheurs»), mais aussi «cordonniers» (dans le canton de Fribourg; information: M. Marius Grossrieder, Granges Paccot). Les opilions ont été chassés à vue et conservés dans de l'alcool 70°; la collection se trouve déposée chez l'auteur de cet article.

## Subordo PALPATORES

### 1. Suprafamilia Troguloidea

#### Familia Nemastomatidae

##### Subfamilia Nemastomatinae

###### *Nemastoma lugubre* (MÜLLER, 1776)

Fribourg, 1 ♀, 20-VIII-83; 13 ♂♂, 15 ♀♀, 25-VIII-86; 2 ♂♂, 2 ♀♀, 26-IX-86; 21 ♂♂, 14 ♀♀, 29-IX-86; 2 ♂♂, 1♀, 6-X-86; 8 ♂♂, 8♀♀, 15-X-86; 1 ♀, 13-XII-86. Givisiez, Bois de la Faye, 1 ♂, 1 ♀, 1 juv., 2-IX-86; Illens, forêt, 1 ♀ 19-VIII-83; Les Joncs-Les Paccots, à 1200 m, 1 ♀, 31-VIII-86; Klein-Bösingen (Réserve naturelle), 1 ♀, 27-IX-86; Moléson, à 1300 m, 1 ♂, 12-IX-86; Neyruz, forêt, 1 ♂, 1 ♀, 1-IX-86; Villars-sur-Glâne, Forêt de Belle-Croix, 1 ♂, 1 juv., 28-VI-85; 2 ♂♂, 2 ♀♀, 5-IX-86.

###### *Paranemastoma quadripunctatum* (PERTY, 1833)

Klein-Bösingen (Réserve naturelle), 1 ♂, 27-IX-86; Neyruz, forêt, 1 ♀, 17-VIII-85; Villars-sur-Glâne, Forêt de Belle-Croix, 1 ♀, 28-VI-85.

*Histicostoma dentipalpe* (AUSSERER, 1867)

Falli-Hölli, près de Passelb, à 1173 m, 1 ♀, 6-V-84; Les Joncs-Les Paccots, à 1200 m, 2 ♂♂, 1 ♀, 31-VIII-86; Moléson, à 1300 m, 2 ♂♂, 3 ♀♀, 1 juv., 12-IX-86.

*Mitostoma chrysomelas* (HERMANN, 1804)

Fribourg, 1 juv., 24-V-84; 3 ♀♀, 31-V-85; 1 ♀, 9 juv., 25-VIII-86; 1 ♂, 1 juv., 26-IX-86; 1 ♂, 1 juv., 6-X-86; 2 juv., 28-X-86; 1 juv., 5-XI-86; 4 ♀♀, 13-XII-86. Klein-Bösingen (Réserve naturelle), 1 ♀, 27-IX-86; Neyruz, forêt, 2 ♂♂, 1 juv., 1-IX-86; Villars-sur-Glâne, Forêt de Belle-Croix, 3 juv., 28-VI-85.

Familia Trogulidae

*Trogulus nepaeformis* (SCOPOLI, 1763)

Fribourg, 1 ♂, 1 juv., 25-VIII-86; 1 ♀, 29-IX-86. Vallée du Gottéron, 1 ♀, 22-VII-86.

*Anelasmococephalus cambridgei* (WESTWOOD, 1874)

Fribourg, 1 ♀, 6-IX-83; 1 ♀, 29-IX-86.

2. Suprafamilia Ischyropsaldoidea

Familia Ischyropsalididae

*Ischyropsalis carli* LESSERT, 1905

La Berra, Gîte du commun, à 1275 m, 4 juv., 28-IX-86. Espèce endémique dans l'ouest des Alpes centrales. Locus typicus: Engadine.

3. Suprafamilia Phalangoidea

Familia Phalangiidae

Subfamilia Phalangiinae

*Phalangium opilio* LINNAEUS, 1761

Fribourg, 2 ♂♂, 1 ♀, 27-VIII-86; 1 ♂, 2 ♀♀, 29-VIII-86; 3 ♂♂, 1-IX-86; 2 ♂♂, 1 ♀, 6-IX-86; 6 ♂♂, 3 ♀♀, 14-IX-86; 1 ♂, 2 ♀♀, 16-IX-86; 5 ♂♂, 2 ♀♀, 17-IX-86; 1 ♂, 24-IX-86; 1 ♀, 26-IX-86; 2 ♂♂, 2-X-86; 2 ♂♂, 8-X-86; 4 ♂♂, 1 ♀, 31-X-86. Villars-sur-Glâne, Forêt de Belle-Croix, 1 ♂, 2 ♀♀, 5-IX-86.

*Opilio parietinus* (DE GEER, 1778)

Fribourg, 1 ♀, 27-VIII-86; 1 ♂, 11-IX-86; 1 ♂, 20-IX-86; 1 ♀, 6-X-86. Vallée du Gottéron, 1 ♂, 1 ♀, 20-IX-86; 1 ♂, 2 ♀♀, 11-X-86. Pour cette espèce, LESSERT (1917) note: «Habitat: Toute la Suisse. Biologie: Plaine et (?) région subalpine. Commun sur les murs notamment sur l'extérieur des habitations. Adulte de juillet à octobre. Les jeunes (*O. saxatilis* auct.) vivent également sous les pierres et à la base des plantes» (p. 46). Bien qu'il fût l'un des premiers arachnologistes à utiliser la morphologie des organes génitaux externes comme caractère d'identification des opilions, Lessert en l'occurrence a confondu deux espèces, savoir *Opilio parietinus* (DE GEER) et *Opilio saxatilis* C.L. KOCH. Du reste, MARTENS (1978) écrit en se référant à *O. parietinus*: «Schweiz: Die Daten von LESSERT (1917) scheinen nicht verlässlich, da nicht zwischen *parietinus* und *saxatilis* differenziert» (p. 242).

*Opilio saxatilis* C.L. KOCH, 1839

Fribourg, 1 ♂, 1 ♀, 25-VIII-86; 1 ♀, 28-VIII-86; 1 ♂, 1-IX-86; 1 ♂, 1 ♀, 14-IX-86; 1 ♂, 3 ♀♀, 17-IX-86; 2 ♂♂, 8-X-86; 5 ♀♀, 31-X-86.

MARTENS (1978) remarque: «Schweiz: Bisher keine verlässlichen Nennungen, da LESSERT (1917) *saxatilis* nicht von *parietinus* trennt» (p. 246).

Nous avons également identifié l'espèce *O. saxatilis* à Sion (1 ♂, 15-XI-86, leg. Ioana Căpitanescu).

*Opilio canestrinii* (THORELL, 1876)

Fribourg, 1 ♂, 1 ♀, 27-VIII-86; 2 ♂♂, 3 ♀♀, 3 juv., 29-VIII-86; 1 ♂, 3 ♀♀, 14-IX-86; 1 ♂, 1 ♀, 1 juv., 17-IX-86; 2 ♂♂, 4 ♀♀, 29-IX-86; 1 ♂, 2 ♀♀, 3-X-86; 2 ♂♂, 2 ♀♀, 6-X-86; 2 ♂♂, 2 ♀♀, 8-X-86; 1 ♂, 16-X-85; 2 ♀♀, 31-X-86; 1 ♂, 2 ♀♀, 5-XI-86; 2 ♂♂, 1 ♀, 9-XI-86; 2 ♀♀, 25-XI-86; 4 ♂♂, 6 ♀♀, 26-XI-86; 1 ♀, 7-XII-86.

Nous avons également récolté cette espèce sur l'Ile Saint-Pierre (canton de Berne) – 2 ♂♂, 3 ♀♀, 28-VIII-83 – ainsi qu'à la Madonna del Sasso, près de Locarno (canton du Tessin) – 1 ♂, 13-VIII-84. Ces données représentent la troisième citation de *O. canestrinii* pour la faune de la Suisse (après MARTENS, 1978 – «*Opilio ravennae*», SPOEK, «Solothurn; Luzern, Salzfaß (MARTI leg.)» et GRUBER, 1984 – «Varesotto/Tessin bis Trentino»).

*Platybunus pinetorum* (C.L. KOCH, 1839)

Vallée du Gottéron, 1 ♀, 19-VII-86.

*Rilaena triangularis* (HERBST, 1799)

Fribourg, 1 ♂, 2 ♀♀, 24-V-84; 1 ♂, 1 ♀, 31-V-85.

*Lophopilio palpinalis* (HERBST, 1799)

Givisiez, Bois de la Faye, 1 juv., 2-IX-86; Neyruz, forêt, 1 ♀, 1 juv., 1-IX-86; Villars-sur-Glâne, Forêt de Belle-Croix, 1 ♀, 2 juv., 5-IX-86.

#### Subfamilia Oligolophinae

*Oligolophus tridens* (C. L. KOCH, 1836)

Fribourg, 5 ♂♂, 9 ♀♀, 6 juv., 25-VIII-86; 1 ♂, 28-VIII-86; 2 ♀♀, 29-VIII-86; 1 ♀, 1-IX-86; 3 ♂♂, 2 ♀♀, 11-IX-86; 1 ♂, 25-XI-86; Givisiez, Bois de la Faye, 3 ♂♂, 3 ♀♀, 2-IX-86; Lossy, 6 juv., 1-VIII-86; Moléson, à 1600 m, 1 ♀, 12-IX-86; Neyruz, forêt, 1 ♀, 1-IX-86; St. Wolfgang, forêt, 2 ♂♂, 6-IX-86; Vallée du Gottéron, 9 ♂♂, 3 ♀♀, 11-X-86; Villars-sur-Glâne, Forêt de Belle-Croix, 6 juv., 28-VI-85; 17 ♂♂, 26 ♀♀, 5-IX-86.

*Lacinius horridus* (PANZER, 1794)

Fribourg, 1 ♀, 19-IX-83.

*Lacinius ephippiatus* (C. L. KOCH, 1835)

Fribourg, 1 ♂, 25-VIII-86; Schwarzsee, 1050 m, 1 ♂, 1 ♀, 27-VII-86; Villars-sur-Glâne, Forêt de Belle-Croix, 1 ♀, 30 juv., 28-VI-85; 1 ♂, 13-VII-86; 1 ♂, 5-IX-86.

*Mitopus morio* (FABRICIUS, 1799)

Givisiez, Bois de la Faye, 2 ♂♂, 1 ♀, 2-IX-86; La Berra, à 1050 m, 2 ♂♂, 28-IX-86; Moléson, à 2002 m, 1 ♂, à 1600 m, 2 ♂♂, 3 ♀♀, 12-IX-86; Les Joncs-Les Paccots, à 1200 m, 1 ♀, 31-VIII-86; Schwarzsee, 1050 m, 6 ♂♂, 7 ♀♀, 27-VII-86; Villars-sur-Glâne, Forêt de Belle-Croix, 5 juv., 28-VI-85; 3 ♂♂, 3 ♀♀, 5-IX-86.

#### Subfamilia Gyantinae

*Gyas titanus* SIMON, 1879

La Berra, Gîte du Commun, à 1275 m, 20 juv., 28-IX-86; Les Joncs-Les Paccots, à 1200 m, 6 juv., 31-VIII-86; Moléson, à 1200 m, 2 juv., 12-IX-86.

*Amilenus aurantiacus* (SIMON, 1881)

Fribourg, 2 ♀♀, 14-IV-87; 1 ♀, 27-IV-84; 13 juv., 6-X-86; 1 juv., 31-X-86; Falli-Hölli, près de Passelb, 1 ♂, 6-V-84; La Berra, à 1050 m, 4 juv., 28-IX-86; Lac des Joncs, 1300 m, 1 juv., 31-VIII-86; Moléson, à 1300 m, 6 juv., 12-IX-86; Villars-sur-Glâne, Forêt de Belle-Croix, 1 juv., 5-IX-86.

Subfamilia Sclerosomatinae

*Astrobunus bernardinus* SIMON, 1879

Fribourg (La Tour Rouge), 3 ♂♂, 4 ♀♀, 6-X-86; 4 ♂♂, 3 ♀♀, 11-X-86.

Subfamilia Leiobuninae

*Leiobunum limbatum* L. KOCH, 1861

Fribourg, 3 ♂♂, 1 ♀, 1 juv., 28-VIII-86; 7 ♂♂, 5 ♀♀, 29-VIII-86; 2 ♂♂, 3 ♀♀, 1-IX-86; 1 ♂, 9-IX-86; 1 ♀, 14-IX-86; 1 ♂, 17-IX-86; 5 ♂♂, 2 ♀♀, 6-X-86; 3 ♂♂, 15-X-86; 3 ♂♂, 15-X-86; 1 ♂, 5-XI-86; Illens, forêt, 6 ♂♂, 3 ♀♀, 8 juv., 19-VIII-83; Vallée du Gottéron, 3 ♂♂, 1 ♀, 11-X-86.

*Leiobunum rotundum* (LATREILLE, 1798)

Fribourg, 1 ♂, 1 ♀, 25-VIII-86; 1 ♀, 28-VIII-86; 1 ♀, 29-VIII-86; 1 ♀, 6-IX-86; 1 ♂, 14-IX-86; 2 ♂♂, 26-IX-86; 2 ♂♂, 6-X-86; 1 ♂, 10-X-86; 1 ♀, 15-X-86; 1 ♀, 9-XI-86; Vallée du Gottéron, 1 ♂, 2 ♀♀, 11-X-86.

**Remarques**

Dans la ville de Fribourg les récoltes ont été effectuées: au Schönberg (La Tour Rouge, Chemin des zig-zag, etc.), escaliers des Neiges, route de la Palma (Chapelle), Chemin du Palatinat, aux alentours du couvent de la Maigrauge, au Bois de Périsses, au Cimetière Saint Léonard, etc.

Les opilions ont été récoltés après l'exploration de la face inférieure des pierres non-enfoncées, des troncs d'arbres tombés par terre, des détritus, des feuilles mortes, des parois rocheuses, des murs d'habitations, etc.

Exception faite pour la ville de Fribourg, les autres localités où l'on a récolté des opilions sont mentionnées dans l'ordre alphabétique. Les hauteurs des localités situées au-dessous de 1000 m d'altitude ne sont pas indiquées.

## **Remerciements**

Nous tenons à exprimer notre profonde et respectueuse gratitude au Professeur Dietrich Meyer (Université de Fribourg, Institut de Zoologie) pour nous avoir aimablement prêté une loupe binoculaire, instrument indispensable à notre travail.

Nos remerciements et notre reconnaissance vont également à Madame Elisabeth Ottiger (Fribourg) pour avoir facilité nos déplacements à travers le canton de Fribourg.

Nous tenons à remercier le Docteur Jürgen Gruber (Naturhistorisches Museum, Wien) pour les informations qu'il nous a fournies sur l'espèce *Opilio canestrinii*.

Nous remercions vivement le Professeur G. Lampel (Université de Fribourg, Institut de Zoologie) d'avoir accepté la publication de ce travail.

## **Résumé**

Le présent travail mentionne les stations et dates de récolte de 23 espèces de faucheurs (Opiliones) du canton de Fribourg (Suisse), d'où jusqu'à présent deux espèces seulement ont été citées. En utilisant la morphologie génitale, pour la première fois en Suisse une distinction claire entre *Opilio parietinus* (DE GEER) et *O. saxatilis* C. L. KOCH est faite.

## **Zusammenfassung**

Die vorliegende Arbeit beschreibt Fundorte und -daten von 23 Weberknecht-Arten (Opiliones) aus dem Kanton Freiburg (Schweiz), aus dem bisher nur zwei Arten publiziert worden waren. Anhand der Genitalmorphologie wird – erstmalig für die Schweiz – eindeutig zwischen *Opilio parietinus* (DE GEER) und *O. saxatilis* C. L. KOCH unterschieden.

## **Summary**

The present work describes the findings of 23 species of harvestmen (Opiliones) from the canton of Fribourg (Switzerland), from where up to this day only two species were published. Using the genital morphology, for the first time in Switzerland the two species *Opilio parietinus* (DE GEER) and *O. saxatilis* C.L. KOCH are clearly distinguished.

## Bibliographie

- BARTELS, M.: Beitrag zur Kenntnis der Schweizerischen Spinnenfauna. Rev. suisse Zool. 38, 1–30 (1931).
- GRUBER, J.: Über *Opilio canestrinii* (THORELL) und *Opilio transversalis* ROEWER (Arachnida: Opiliones, Phalangiidae). Ann. Naturhist. Mus. Wien 86 B, 251–273 (1984).
- JUBERTHIE, C., et MASSOUD, Z.: Biogéographie, taxonomie et morphologie ultrastructurale des opiliens cyphophthalmes. Rev. Ecol. Biol. Sol 13, 219–231 (1976).
- LESSERT, R. DE: Opiliens. In: Catalogue des invertébrés de la Suisse 9, 1–80. Georg: Genève 1917.
- MARTENS, J.: Spinnentiere, Arachnida: Webspinnen, Opiliones. In: SENGLAUB, K., HANNEMANN, H. J., und SCHUMANN, H.: Die Tierwelt Deutschlands 64. Fischer: Jena 1978.
- MUSY, M.: Le Musée d'histoire naturelle de Fribourg en 1917. Bull. Soc. Frib. Sc. Nat. 24, 85–111 (1918a).
- : Le Musée d'histoire naturelle de Fribourg en 1918. Bull. Soc. Frib. Sc. Nat. 24, 183–213 (1918b).
- : Le Musée d'histoire naturelle de Fribourg en 1922. Bull. Soc. Frib. Sc. Nat. 26, 137–153 (1923).