

Zeitschrift: Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes Rübel in Zürich
Herausgeber: Geobotanisches Institut Rübel (Zürich)
Band: 25 (1952)

Artikel: Irische Pflanzengesellschaften
Autor: Braun-Blanquet, Josias / Tüxen, Reinhold
Kapitel: VIII. Klasse Isoëto-Nanojuncetea Br. - Bl. et Tx. 1943
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-307716>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 24.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

VIII. Klasse: Isoëto-Nanojuncetea Br.-Bl. et Tx. 1943

Ordnung: Isoëtetalia Br.-Bl. 1939

Verband: Nanocyperion flavescentis W. Koch 1926

Wenn auch eine Reihe von wichtigen Arten des Nanocyperion-Verbandes in Irland fehlt (wie *Illecebrum verticillatum*, *Juncus tenageia*, *pygmaeus*, *capitatus* u. a.), sind doch die Gesellschaften dieses Verbandes besonders in W-Irland sehr häufig. Neben *Juncus bufonius* ist *Isolepis setacea* auffällig häufig in allen Gesellschaften des Verbandes zu finden. Unsere Aufnahmen sind zu wenig zahlreich, um eine brauchbare Gliederung aller vorkommenden Nanocyperion-Gesellschaften zu ermöglichen. Wir haben sie in Tab. 17 vereinigt und so geordnet, daß sich 4 Gesellschaften abheben.

**1. Centunculus minimus-Isolepis setacea-Ass.
ass. nov.**

Diese auf kleinstem Raum (0.1 m²) voll entwickelte Zwerggesellschaft fanden wir nur an feuchten kiesigen Straßenrändern im Hochmoor-Gebiet von Craigga-more (Connemara, Co. Galway), wo sie als Erstbesiedler auf periodisch feuchtem Gesteinsgrus ihr kurzes Leben fristet. Aufn. Tx. 199 stellt eine besondere Ausbildung der Gesellschaft auf einer abgeplagten (abgebrannten?) Stelle dar. Diese Assoziation ist erstmals (als Subassoziation des Cicendietum) von Ameland an der w-friesischen Küste beschrieben worden (Br. - Bl. u. de Leeuw 1936, S. 379).

**2. Isolepis setacea-Stellaria uliginosa-Ass.
(W. Koch 1926) Moor 1936**

Mit der aus NW-Deutschland, Holland, Belgien usf. beschriebenen *Isolepis setacea-Stellaria uliginosa-Ass.* sind die auf feuchten Waldwegen im Bereich des azidophilen *Quercion robori-petraeae*-Verbandes lebenden, wenig deckenden Kleinbinsen-Bestände Irlands so nahe verwandt, daß sie zu dieser Assoziation gestellt werden müssen. Unsere Aufnahmen sind mit der von Diemont, Sissingh und Westhoff (1940) beschriebenen *Hypericum humifusum*-Var. identisch. Nur kann in Irland *Isolepis setacea* nicht als Charakterart gewertet werden.

TABELLE 17

Nanocyperion flavescentis

		1. Centunculus-Isolepis setacea-Ass.			2. Isolepis setacea-Stellaria uliginosa-Ass.				3. Scirpus fili- formis-Ges.		4. Peplis por- tula-Ges.	
	Nr. der Aufnahme	200	203	199	61	62	235	236	140a	100	290	
	Autor	Tx	Tx	Tx	BB	Tx	Tx	Tx	Tx	BB	Tx	
	Grösse der Probefläche (m ²)	0.1	0.5	0.1	4.0	0.5	.	0.25	.	4	0.5	
	Veget.-Bedeckung %	30	40	50/60	60	30	10	20	.	90	40	
Lokale Charakterarten:		Artenzahl	8	10	12	10	11	6	4	4	12	6
T	<i>Radiola linoides</i> Roth		1.1	2.2	2.2	1.2	.
T	<i>Centunculus minimus</i> L.		1.1	+.1	2.1
T	<i>Plantago intermedia</i> Gilib.		2.1	2.1	1.1
Hs	<i>Stellaria alsine</i> Grimm (DAss.)		.	.	.	+	+.2	+.1
T	<i>Hypericum humifusum</i> L.		.	.	.	+.2	+	+.1
T	<i>Scirpus filiformis</i> Savi		v	2.2	.
T	<i>Peplis portula</i> L.		2.2
Verbands- und Ordnungscharakterarten:												
T	<i>Juncus bufonius</i> L.		1.2	2.2	1.2	3.3	2.2	2.2	2.2	v	+	3.2
T	<i>Isolepis setacea</i> (L.) R. Br.		1.2	+.2	+.2	2.2	+.2	1.2	2.2	.	.	.
T	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.		.	+	.	.	+.1	+.1
Chp	<i>Mniobryum albicans</i> (Wahlenb.) Limpr.		1.1	2.2?
T	<i>Callitricha</i> cf. <i>verna</i> L. em. Lönnr. f. <i>minima</i> Hoppe		2.2
Begleiter:												
Chr	<i>Sagina procumbens</i> L.		.	+.2	1.2	+	+.2	.	.	v	1.2	.
Hc	<i>Juncus bulbosus</i> L.		.	.	.	1.2?	1.2	1.2	+.2	.	+	.
Hs	<i>Juncus articulatus</i> L.		+.2	+.2	+.2	+.1	.
Hros	<i>Plantago coronopus</i> L.		+	1.1	1.1	.
Hrept	<i>Agrostis stolonifera</i> L.		1.2	2.2	.
Hrept	<i>Anagallis tenella</i> L.		.	.	+.3	2.2	.
Hrept	<i>Veronica serpyllifolia</i> L.		.	.	.	+.?	+.1
Hs	<i>Ranunculus flammula</i> L.		.	.	.	+	.	.	+	.	.	.
T	<i>Poa annua</i> L.		(v)	.	+.1
Chp	<i>Funaria hygrometrica</i> (L.) Sibth.		.	.	4.4

Außerdem kommen vor in Aufn. Tx. 203: Chp *Rhacomitrium canescens* (Timm) Brid. fo. *epilosa* H. Müll. +.2; in Tx. 199: T *Vulpia bromoides* (L.) S. F. Gray +.1, Hrept *Trifolium repens* L. +.2, Chp *Rhytidiodelphus squarrosus* (L.) Warnst. +; in BB. 61: Brr *Acrocladium cuspidatum* (L.) Lindb. +, Hs *Lythrum salicaria* L. +; in Tx. 62: Hth *Pellia epiphylla* (L.) Lindb. +.2, T *Callitricha stagnalis* Scop. (+); in Tx. 235: Hs *Cardamine* L. spec. +.1; in BB. 100: Grh *Carex panicea* L. +, Hc *Carex flava* L. ssp. *Oederi* (Retz.) Syme 1.1, Hrept *Hydrocotyle vulgaris* L. 1.1.

F u n d o r t e :

- Tx. 200, 203, 199: Frische grusige Straßenränder im Hochmoorgebiet von Craigga-more (SW-Connemara, Co. Galway).
BB. 61, Tx. 62: Überrieselte Waldwege am Lough Gill se Sligo.
Tx. 235/36: Feuchte Rinnen. Gebiet der Killarney-Seen (Co. Kerry).
Tx. 140a, BB. 100: Am Fuß des Meenawn (Achill Island).
Tx. 290: Nasser Straßengraben im Tal des Caragh River s Rossbeigh (Co. Kerry).

3. *Scirpus filiformis*-Ges.

Die offenen Bestände mit *Scirpus filiformis*, die am Fuße des Meenawn bei Keel (Achill Island) auf nassem Sandboden bis 10 m gegen den Strand vorkommen, stellen vielleicht eine besondere, anderwärts besser entwickelte Assoziation des Nanocyperion-Verbandes dar. Diese Gesellschaft dürfte auch in Frankreich zu erwarten sein.

4. Eine nicht näher zu identifizierende *Peplis portula*-Ges. trafen wir in nassen Gräben im Tal des Caragh River s Glenbeigh (Co. Kerry).

5. Vielleicht kommt zu diesen Nanocyperion-Gesellschaften in Irland noch das *Cicendietum filiformis* hinzu, von dem wir jedoch keine Aufnahmen machen konnten.

IX. Klasse: Montio-Cardaminetea Br.-Bl. et Tx. 1943

Ordnung: Montio-Cardaminetalia Pawłowski 1928

1. Verband: Cardamineto-Montion Br.-Bl. 1925

In einer kleinen, kalten, kalkarmen Quelle oberhalb Glenbeigh (Co. Kerry) gedeiht die aus den Gebirgen Mitteleuropas beschriebene Quellflur-Assoziation des Montietum. Der Bestand (2 m², BB. 206) setzt sich zusammen aus: