Zeitschrift: Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes der Eidg. Tech.

Hochschule, Stiftung Rübel, in Zürich

Herausgeber: Geobotanisches Institut, Stiftung Rübel (Zürich)

Band: 61 (1977)

Artikel: Verbreitungsbiologie (Diasporologie) der Blütenpflanzen

Autor: Müller-Schneider, P.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-308500

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 20.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Verbreitungsbiologie (Diasporologie) der Blütenpflanzen

von P. MÜLLER-SCHNEIDER

Zweite, neubearbeitete Auflage



INHALTSVERZEICHNIS

Vorwo	rt	zur ersten Auflage	5
		zur zweiten Auflage	5
		ing	6
	Die	Verbreitungsfaktoren Keime A. Samen B. Brutkörper	9 9 11
	2.	Verbreitungsagentien	12
	3.	Verbreitungsökologische Verhältnisse und Anpassungs- vermögen der Pflanzen	13
II.	Vor	kehrungen der Pflanzen für die Keimverbreitung	14
		Verbreitungseinheiten (Diasporen) A. Beschreibung und Einteilung a) Generative Verbreitungseinheiten b) Vegetative Verbreitungseinheiten B. Viviparie C. Polydiasporie	14 14 17 20 20
	2.	Verbreitungsmittel	23
		Bereitstellung der Verbreitungseinheiten für den Transport	24 24 31
III. Verbreitungstypen und ihre Wirksamkeit			
		Selbstverbreiter (Autochoren) A. Selbstableger (Blastochoren) B. Selbststreuer (Ballochoren) a) Saftdruckstreuer b) Austrocknungsstreuer c) Inbetriebsetzung u. Wirksamkeit der Streuvor-	34 35 36 37 41
		richtungen	48
		Pflanzen, die durch die Schwerkraft wandern (Barochoren)	50
	3.	Windwanderer (Anemochoren)	53 56 57 59 65 70
		B. Bodenläufer (Chamaechoren)	73 75

4. 7	Wasserwanderer (Hydrochoren)	80		
	A. Schwimmer (Nautochoren)	81		
I	B. Pflanzen, die mit Hilfe der Regentropfen wandern	0.0		
	(Ombrochoren)	89		
	a) Regenschwemmlinge	91		
	b) Regenballisten	94		
	c) Wirksamkeit der Verbreitung durch Regentropfend) Strömungsschwemmlinge (Bythisochoren)	95		
5. 5	Tierwanderer (Zoochoren)	95		
	A. Pflanzen, deren Verbreitungseinheiten bei der Verbreitung			
-	nur zufällig der Vernichtung durch Agentien entgehen			
	(Dysochoren)	97		
J	B. Mundwanderer (Stomatochoren)	107		
	a) Verbreitungseinheiten mit Oelkörper	107		
	b) Verbreitungseinheiten mit Pulpa	112		
(C. Darmwanderer (Endochoren und Hemiendochoren)	115		
	a) Verbreitungseinheiten ohne besondere Anlockungsmittel .	116		
	b) Verbreitungseinheiten mit Anlockungsmitteln	122		
J	D. Anhafter (Epichoren)	139		
	E. Aussergewöhnliche Zoochorie	145		
	Pflanzen, die dank der zivilisatorischen Tätigkeit der Menschen wandern (Hemerochoren)	147		
	000 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10			
4	A. Pflanzen, deren Verbreitungseinheiten absichtlich gesteckt oder gesät werden (Ethelochoren)	148		
1	B. Pflanzen, die als artfremder Bestandteil von Saatgut			
1	wandern (Speirochoren)	150		
	C. Pflanzen, deren Verbreitungseinheiten mit andern Gütern			
ì	transportiert werden (Agochoren)	155		
	a anopor create werden (ingenieren) tittititititititititititi			
IV. Nah-	- und Fernverbreitung	158		
V Ver	breitung durch zwei oder mehrere wesensverschiedene Agentien			
	plo- und Polychorie)	158		
		161		
VI. Hemr	mung und Beendigung der Verbreitung			
VII. Verb	breitungsschranken	167		
WIII Man	derungen der Pflanzen	169		
IX. Bede	eutung der Verbreitungsbiologie für andere Zweige der Botanik	172		
1. 7	Verbreitungsbiologie und Florengeschichte	172		
	Verbreitungsbiologie und Prähistorie	174		
3. 7	Verbreitungsbiologie und Pflanzengeographie	175		
4. 7	Verbreitungsbiologie, Planzensoziologie und Biocönologie	180		
5. 7	Verbreitungsbiologie und Land- und Forstwirtschaft	186		
6. I	Einfluss der Samenverbreitung auf die Evolution der Pflanzen.	189		
Literatur		191		
	tellung der griechischen Wortstämme und ihrer Bedeutung	201 202		
	is der lateinischen Pflanzennamen	202		
Verzeichnis der deutschen Pflanzennamen				
	is der deutschen und lateinischen Tiernamen	220		
* CT ZGTCIIII	to det dedesenen und tacethitschen Herhallen	220		

VORWORT ZUR 1. AUFLAGE

Durch mehrere eigene Untersuchungen verschaffte ich mir innerhalb eines längeren Zeitabschnittes Einblick in die Verbreitungsbiologie der Blütenpflanzen. Schliesslich entsprang daraus der Gedanke, eine gedrängte Gesamtdarstellung dieses Wissenszweiges der Botanik zu versuchen. Ich wurde dazu namentlich auch durch das Interesse angespornt, das ich bei Vorträgen über dieses Thema gefunden habe. Ferner hoffte ich eine Lücke in der botanischen Literatur zu füllen, weil seit Ulbrichs "Biologie der Früchte und Samen" im Jahre 1928 keine deutsch geschriebene Gesamtdarstellung dieses Wissenszweiges mehr erschienen ist.

Es liess sich nicht vermeiden, neue Begriffe und Ausdrücke einzuführen und einige z.T. schon eingebürgerte fallen zu lassen. Dies geschah immer nur dann, wenn sich dadurch eine natürlichere Einteilung und Durchdringung des Stoffes in Aussicht stellte.

Ich erfreute mich der Mitarbeit zahlreicher Freunde. Herr Rektor Dr. P. WIESMANN, Chur, beriet mich bei der Schaffung neuer Kunstausdrücke, die Herren R. CASPARIS und L. HITZ in Chur, sowie R. SUTTER in Sculms und G. MOUSSON in Yverdon führten Zeichnungen aus. Ferner leisteten mir einige Herren wertvolle Dienste durch das Photographieren von gesammeltem Material. Ihnen allen danke ich bestens. Zu besonders grossem Dank fühle ich mich ausserdem Herrn Dir. Dr. W. LüDI verpflichtet, weil er es ermöglichte, die Arbeit als Veröffentlichung des Geobotanischen Institutes Rübel in Zürich erscheinen zu lassen.

Chur, im Herbst 1954.

P. Müller-Schneider

VORWORT ZUR 2. AUFLAGE

Seit dem Erscheinen der 1. Auflage sind über die Anpassungen und Vorgänge bei der Samenverbreitung der Blütenpflanzen viele neue interessante Forschungsergebnisse veröffentlicht worden; durch ihre Berücksichtigung konnte die vorliegende Auflage wesentlich ergänzt werden.

Herr Prof. Dr. E. LANDOLT, Vorsteher des Geobotanischen Institutes ETH, Stiftung Rübel, Zürich, hat diese Neuauflage nicht nur angeregt, sondern auch tatkräftig unterstützt. Ihm fühle ich mich daher zu ganz besonderem Dank verpflichtet. Ausserdem danke ich Herrn a. Rektor Dr. P. WIESMANN, Chur, für die Beratung bei der Verwendung und Schreibweise von Fachausdrücken, Herrn L. HITZ, Chur, für die Ausführung von Zeichnungen und Herrn Dr. H. WACKERNAGEL, Vizedirektor des Zoologischen Garten in Basel, für die Mitteilung einiger interessanter Beobachtungen bei Zootieren.

Chur, im Herbst 1976

P. Müller-Schneider

EINLEITUNG

Auf unserem Planeten fanden im Laufe der Zeiten immer wieder geographische und klimatische Veränderungen statt, die stets auch grosse Umstellungen in der Zusammensetzung der Vegetation zur Folge hatten. Dies war nach TAKHTAJAN (1973) ganz besonders zur Kreidezeit der Fall, als die Blütenpflanzen (Phanerogamen)sich von ihren Entstehungszentren, den tropischen Gebieten von Ost- und Südostasien, Australien und Melanesien schnell über die ganze Erde ausbreiteten. Neben den paläogeographischen Veränderungen während jener Zeitepoche hat den Blütenpflanzen auch ihre besondere Fähigkeit sich den neuen Lebensbedingungen anzupassen ermöglicht, eine Vielfalt von wirksamen Verbreitungsmitteln zu entwickeln und mittelst derselben in immer neue Ländereien vorzudringen.

Pflanzenwanderungen von grossem Ausmass wurden auch durch die Eiszeiten veranlasst. Ausser den Glazialfundstätten zeugen heute noch Reliktpflanzen aus der letzten Eiszeit vom einstigen Stand der Flora auf den mitteleuropäischen Hochebenen und Mittelgebirgen und im französischen Zentralmassiv, während sich die Hauptmacht ihrer Art wieder in den Norden oder in die Alpen zurückgefunden hat. Wir denken hierbei z. B. an das ehemalige Vorkommen von Saxifraga amphibia am Bodensee, von Salix lapponum und Swertia perennis im norddeutschen Flachland, und an die Glazialflora der Schwäbischen Alb, des Schwarzwaldes, des Brockens und des Mont-Dore in der Auvergne.

Die Forschungsergebnisse der Pollenanalyse zeigen ferner, dass auch im Laufe der Nacheiszeit fortwährend Veränderungen im Vegetationsbild auf den von den Gletschern beeinflussten Gebieten stattgefunden haben. Das freiwerdende Tiefland wurde zunächst von Arten der Tundra, dann der Steppen und Wälder besiedelt.

Um die Jahrhundertwende bot insbesondere die Vulkaninsel Krakatau in der Sundastrasse eine gute Gelegenheit für Besiedlungsstudien. Als Folge der Vulkanausbrüche im Jahre 1883 bedeckten heisse Bimsstein- und Aschenmassen die ganze Insel und versengten wohl alle Lebewesen, die sie bewohnten. Als dann drei Jahre nach der grossen Katastrophe der holländische

Botaniker TREUB die Insel besuchte, fand er neben Farnen bereits 15 Blütenpflanzen-Arten, von denen einige der Landflora angehörten, vor. 1897 hatten
sich schon 56 und 1906 sogar 92 Phanerogamen wieder angesiedelt (ERNST 1934,
S. 61). Die Pflanzen mussten mindestens zum Teil weit her gekommen sein
(vgl. auch BACKER 1929); denn die nächsten Vegetation tragenden Inseln sind
Sebesy in 19 km, Sebekoe in 25 km, Sumatra in 37 km und Java in 41 km Entfernung.

entstand ebenfalls durch submarine Eruptionen vor der Südküste Islands die 2,8 km² grosse Insel Surtsey, deren Besiedlung durch Lebewesen von erfahrenen Wissenschaftlern laufend untersucht wird. Nach ERIKSEN (1973 und schriftl. Mitt. vom 6.10.1975) wuchs 1965 bereits der Meersenf Cakile maritima ssp. arctica auf der Insel. Bis 1975 hatten sich auch noch Honkenya peploides, Cochlearia officinalis, Elymus arenarius, Mertensia maritima, Carex maritima, Tripleurospermum maritimum ssp. boreale, Festuca rubra, Cerastium fontanum, Sagina linnaei, Silene maritima, Juncus trifidus, Stellaria media und Atriplex patula darauf angesiedelt. Ausserdem fanden die Forscher noch Samen von Empetrum spec. und Angelica archangelica. Die Diasporen (Verbreitungseinheiten) sind wie LINDROTH (1970) berichtet z. T. durch eine Meeresströmung von der Bucht Klauf der Insel Heimaey nach der 18 km entfernten Insel Surtsey verfrachtet worden.

Auch überall dort, wo durch Ueberschwemmungen, Bergstürze, Grabungen und andere Ereignisse besiedelbares Neuland entsteht, finden sich nach unseren Beobachtungen bald wieder Pflanzen ein.

Ja, nicht nur Neuland wird wieder besiedelt, selbst der vermeintlich festgefügte Vegetationsteppich ist beständigen Veränderungen unterworfen. Wir können erleben, dass ein Rasen sich zu einer Gebüschformation und diese sich schliesslich zum Wald entwickelt. Erst das letzte Sukzessionsstadium, die sogenannte Klimaxgesellschaft, stellt einen floristisch nahezu stabilen Endzustand dar.

Ferner sei noch darauf hingewiesen, dass viele Arten engere verwandtschaftliche Beziehungen zu Sippen ausserhalb ihres gegenwärtigen Areals erkennen lassen, und ihr Bildungsherd deshalb vielfach weit weg von ihrem heutigen Vorkommen zu suchen ist. So gibt es innerhalb der Alpenflora neben Arten alpigenen, solche arktischen und mediterranen Ursprungs.

Alle diese mannigfachen Feststellungen von Veränderungen im Vegetationsteppich durch Ab- und Zuwanderungen von Arten, erwecken unser Interesse für die Art und Weise und die Mittel, durch welche die in jedem Stadium ihres Lebens zur freien Ortsbewegung unfähigen Blütenpflanzen in einem Gebiet abund zuwandern können. Die Beobachtung zeigt bald, dass sie den Raum hauptsächlich im Keimzustand überwinden. Die Keime sind geeignet, durch mancherlei Kräfte, die wir Verbreitungsagentien nennen, transportiert zu werden. Doch ist dieser Transport nur unter bestimmten Bedingungen und dank besonderer Vorrichtungen möglich. Diese aufzudecken und zu beschreiben, ist die vielseitige Aufgabe der Verbreitungsbiologie.

I. VERBREITUNGSFAKTOREN

1. Keime

Die Keime der Blütenpflanzen sind im Gegensatz zu den Sporen der Kryptogamen durchwegs mehrzellige Gebilde. Sie gehen entweder aus einer befruchteten Eizelle hervor oder sind vegetativen Ursprungs.

Eine befruchtete Eizelle entwickelt sich mitsamt der sie umgebenden Zellschichten, der sogenannten Samenanlage zum Samen. Die Keime vegetativen Ursprungs verlassen die Mutterpflanzen in Form sogenannter Brutkörper.

A) Samen

Die wichtigsten Teile eines normalen Samens sind der Embryo, das Nährgewebe und die Schale. Embryo und Nährgewebe bilden zusammen den Samenkern. Häufig tritt noch eine Nabelschwiele oder Caruncula, manchmal auch eine Raphe in Erscheinung. Der Embryo, die Anlage der Tochterpflanze, kann nur aus wenigen Zellen bestehen, aber auch beträchtliche Ausmasse erreichen. An einem normalen Embryo lassen sich bereits Wurzel und Spross mit 1, 2 oder mehreren Keimblättern unterscheiden. Das die Keimblätter tragende Stengelchen heisst Hypokotyl. Einen reduzierten Embryo finden wir in den Samen mancher Frühlingspflanzen wie Eranthis hiemalis, Ranunculus ficaria, Anemone nemorosa, Paris quadrifolia, ferner speziell bei vielen Saprophyten und Parasiten wie den Pyrolaceen, Orchideen und Orobanchaceen. Bei andern Pflanzen ist die Anlage der Tochterpflanze nicht nur vollkommen entwickelt, sondern sie enthält gleich noch grosse Mengen von Reservestoffen, die beim Keimvorgang eine wichtige Rolle spielen. Bei den Fagaceen, den Leguminosen und den Hippocastaneen z. B. sind die Keimblätter vollgepfropft mit Reservestoffen. Viele Monokotyledonen, namentlich

die Potamogetonaceen und Alismataceen wiederum, speichern die Reservestoffe im hypokotylen Glied des Embryos. Ferner entwickelt sich bei einer
grossen Zahl von Samen der Embryosack zu einem Speichergewebe. Auch das
Perisperm, ein Gewebe, das aus dem Knospenkern der Samenanlage, dem Nucellus, hervorgeht, kann zum Speichergewebe werden, so bei den Piperaceen und
den Musaceen.

Die Samenschale übernimmt den Schutz des Embryos und der Reservestoffe. Sie zeigt ebenfalls je nach Pflanzenart eine verschiedene Ausbildung.
Oft lässt sie deutlich Anpassungen an die Verbreitung durch ein bestimmtes
Agens erkennen. Die Samen der Santalaceen und Loranthaceen sind schalenlos.

Je grösser der Embryo oder die Menge der Reservestoffe, und je stärker die Schale, um so umfangreicher und schwerer ist der Same. Die Samen der meisten Orchideen und Pyrolaceen sind nur einige Millionstelsgramm schwer. Die Samen der Rosskastanie (Aesculus hippocastanum) dagegen wiegen 15 bis 20 g und darüber. Ihr Gewicht wird von vielen Leguminosen- und Palmensamen noch weit übertroffen. So wiegt der Same der Kokosnuss etwa 500 g, derjenige von Lodoicea seychellarum sogar 8 bis 12 kg. Auch in bezug auf das spezifische Gewicht der Samen bestehen grosse Unterschiede. Es liegt zwischen 0,3 und 1,4. Beide, das absolute und das spezifische Gewicht, sind von ausschlaggebender Bedeutung für die Verbreitung der Samen.

Bei den Angiospermen bilden sich die Samen in dem zur Fruchtwand werdenden Fruchtknotengehäuse; bei den Gymnospermen werden sie oft von freien oder erst nach der Befruchtung verwachsenen Blattorganen eingeschlossen. Einsamige Früchte öffnen sich in der Regel nicht, wohl aber die meisten mehrsamigen (siehe S. 15).

Nicht zuletzt ist auch die Lebensdauer der Samen von Bedeutung für ihre Verbreitung; denn ein Transport von toten Samen ist wirkungslos. Die meisten haben eine lange Lebensdauer. Nur bei einigen Strand- und Mangrovepflanzen wächst der Embryo ohne Ruhepause weiter und keimt normalerweise schon auf der Mutterpflanze. Aeusserst kurz ist die Lebenszeit der Samen von Weiden des Tieflandes. Sie sterben schon einige Tage nach ihrer Loslösung von der Mutterpflanze, wenn sie nicht auf guten Keimgrund

fallen. Nur bis zur nächsten Vegetationsperiode leben beispielsweise die Samen von Aesculus hippocastanum, Acer pseudoplatanus, Fagus silvatica und Quercus robur. Bei denjenigen von Sinapis arvensis und vielen andern wurden dagegen nach über 20 Jahren noch Keimfähigkeit festgestellt. Die Samen von Geranium bohemicum keimten nach 80 Jahren Lagerung noch (DAHLGREN 1943). Diejenigen mancher Leguminosen sollen 120 - 200 Jahre, von Nelumbium nuciferum ca.1000 Jahre, von Chenopodium album und Spergularia arvensis 1700 Jahre keimfähig bleiben (ODUM 1965); sie vermögen zu warten, bis sich ihnen günstige Keimungsbedingungen bieten. Dass Lupinus arcticus—Samen im gefrorenen Boden ihre Keimfähigkeit 10'000 Jahre bewahrt haben sollen, wie PORSILD, HARINGTON und MULLIGAN (1967) darlegen, scheint, weil sie in einem Lemming—Bau gefunden wurden doch etwas zweifelhaft.

Der Same ist die wichtigste und häufigste Grundform der Fortpflanzungskörper der Blütenpflanzen.

B) Brutkörper

Unter Brutkörpern verstehen wir Verjüngungssprosse und Adventivknospen, die von den übrigen vegetativen Organen der Mutterpflanzen wesentlich abweichen und individualisiert werden können. Verjüngungs- und Verstärkungssprosse, wie wir sie z. B. bei Syringa vulgaris, Populus, Pyrus, Salix herbacea und ganz besonders ausgeprägt bei Ficus bengalensis beobachten können, fallen ausser Betracht, weil sie erst spät oder überhaupt nie selbständig werden und häufig noch andere Funktionen als die der Vermehrung zu erfüllen haben. Dasselbe gilt von den Trieben grösserer Rasenflekken, die durch besondere Umstände wie etwa durch das Absterben einzelner Partien, selbständig werden. Die meisten Brutkörper sind Achselsprosse. Bei einigen Arten werden sie von den Blättern hervorgebracht. Oft enthalten sie auch Reservestoffe. Im allgemeinen ist aber ihr Wassergehalt wesentlich grösser als derjenige der Samen, weshalb sie gegen zerstörende Einwirkungen weniger widerstandsfähig sind. Zudem bleibt ihre Lebenskraft

nur selten länger als bis zur nächsten Vegetationsperiode erhalten, wenn sie nicht Fuss fassen können.

2. Verbreitungsagentien

Als Verbreitungsagentien wirken oft die Mutterpflanzen selbst, häufiger aber fremde Kräfte, die zur Umgebung der Pflanzen gehören und leicht mit ihnen in Berührung kommen. Gelegentlich kommt es auch vor, dass die Keime mit Hilfe eigener Mechanismen sich scheinbar selbständig fortbewegen. Im primitivsten Falle, bei welchem Kräfte ausserhalb der Pflanze wirken, zieht die Schwerkraft die Keime zur Erde nieder und rollt sie bei geneigter Unterlage noch ein Stück weit fort. Die Tiere sind durch ihr ständiges Nahrungsbedüfnis direkt oder indirekt streng an die Pflanzenwelt gebunden und deshalb zum Teil für die Verbreitung von Samen und Brutkörpern geradezu prädestiniert. Ebenso ist der Mensch durch seine Lebensart geeignet, bei der Keimverbreitung auf eigene Weise mitzuwirken. Auch der Wind ist eine wirksame dynamische Kraft, die überall die Pflanzen erreicht und auf sie einwirken kann. Bei den Wasserpflanzen kommt bewegtes Wasser für den Transport der Samen und Brutkörper in Frage und für manche Landpflanzen auch die fallenden Regentropfen. Vielfach wirken sogar, wie wir noch genauer feststellen werden, zwei oder mehrere Verbreitungsagentien gleichzeitig oder abwechslungsweise auf einen Keim ein. Während die Mutterpflanzen, die Schwerkraft, das Wasser, der Wind und der natürlich sich fortbewegende Mensch verhältnismässig einheitliche Verbreitungsagentien sind, ist die Tierwelt in ihrer Gestaltung und Lebensweise äusserst mannigfaltig und bietet daher auch viele, prinzipiell völlig verschiedene Möglichkeiten für den Transport der Keime. Bei Wind und Wasser sind in bezug auf Stärke und Richtung ihrer Bewegungen grosse Unterschiede vorhanden, die sich auf den Transport der Keime und die hiefür notwendigen Anpassungen auswirken können. Genaueres über die Kräfte und Wirkungsweisen der Verbreitungsagentien dürfte jedoch mit Vorteil erst bei der speziellen Besprechung der Verbreitungsmodi bzw. Verbreitungstypen (S. 33 uff.)

angeführt werden.

Verbreitungsökologische Verhältnisse und das Anpassungsvermögen der Pflanzen

Die Verbreitung der Keime hängt nicht nur von ihrer Beschaffenheit und den Eigentümlichkeiten der Agentien, sondern auch weitgehend von den Standortverhältnissen und der Gestalt der Mutterpflanzen ab. Diese kommen je nach Standort und Wuchsform bald mit dem einen, bald mit dem andern Verbreitungsagens häufiger oder stärker in Berührung.

Der Transport der Keime kann nun einfach dadurch erfolgen, dass sie dank der gegebenen Verhältnisse von einem Agens mitgenommen werden. So verwehen im Gebirge, in Steppen und Wüsten heftige Stürme mit dem Sand und Staub zugleich auch Pflanzenkeime. Andere wiederum werden durch herumwandernde Tiere mit dem Kot, der an ihnen haftet, verschleppt, und an steilen Hängen spült das ablaufende Regenwasser nebst kleinem Geschiebe Samen und Brutkörper mit sich fort.

Der Transport der Keime, der einzig durch die gegebenen Verhältnisse und meist nur unter besonders günstigen Umständen erfolgt, würde aber bei den wenigsten Pflanzen zu einer ausreichenden Verbreitung führen. Es werden daher meist noch bestimmte Vorkehrungen im Hinblick auf die Keimverbreitung getroffen, wobei das grosse Anpassungsvermögen der Blütenpflanzen an die Verbreitungsagentien in Erscheinung tritt.

II. VORKEHRUNGEN DER PFLANZEN FUER DIE KEIMVERBREITUNG

Verbreitungseinheiten (Diasporen*)

A) Beschreibung und Einteilung

Die Samen trennen sich entweder nackt oder dann in Verbindung mit bestimmten Organen von der Mutterpflanze los. Nur bei wenigen Pflanzen fällt der hochentwickelte Embryo oder der fertige Keimling von der Mutterpflanze ab. Die sich ablösenden Brutkörper sind je nach Pflanzenart in ihrer Entwicklung verschieden weit fortgeschritten. Immer aber zeigen die selbständig werdenden Organkomplexe eine für ihre Pflanzenart typische Zusammensetzung, die anderseits wieder bei sehr vielen Arten weitgehend übereinstimmen kann. Auf dieser Einsicht fussend, schuf SERNANDER (1927) eine Einteilung der Verbreitungseinheiten, die von uns (MOLINIER und MüLLER, 1938) mit geringen Aenderungen übernommen wurde.

Wir unterscheiden folgende Grundformen:

a) Generative Verbreitungseinheiten

1. Ungekeimte Embryonen und Keimlinge. Bei der tropischen Salzseepflanze Enalus acoroides verlassen nach
SVEDELIUS (1904) die hochentwickelten Embryonen die Frucht und die dünnen
Samenschalen auf der Mutterpflanze. Die Samen verschiedener Mangrovepflanzen, wie diejenigen von Rhizophora, Kandelia rheedii und Bruguiera
keimen normalerweise auf der Mutterpflanze, und erst die Keimpflanzen

^{*} von diaspeiro = ich säe aus

lösen sich von ihr ab, um Neuland zu besiedeln. Die *Rhizophora*-Keimlinge lassen sogar die Keimblätter auf der Mutterpflanze zurück. Nach längerem Regenwetter erfolgt manchmal auch bei *Trifolium dubium*, *Melilotus albus* und andern Arten Keimung auf der Mutterpflanze. Mit POTONIE (1894) bezeichnen wir das Keimen von Samen auf der Mutterpflanze als Bio-teknose.

- 2. S a m e n. Eine grosse Zahl von Pflanzen schickt die nackten Samen auf die Wanderschaft. Häufig löst sich der Funiculus mit dem Samen los. Bei manchen Arten ist eine Caruncula (Euphorbia) oder ein Arillus (Myristica fragrans, Taxus baccata), bei andern ein fleischiges Integument bzw. eine Sarkotesta (Ginkgo) mit besondern Funktionen entwickelt.
- 3. Früchte, Teil-und Sammelfrüchte.
 Bei der Frucht ist nebst dem Samen die aus dem Fruchtknoten hervorgegangene Fruchtwand an der Zusammensetzung der Verbreitungseinheit beteiligt. Oft bemerken wir noch verkümmerte Reste der Blütenhülle, denen aber keinerlei Funktion mehr zukommt. Die Fruchtwand umschliesst einen, selten mehrere Samen. Bei manchen Pflanzen, z. B. bei Coronilla varia, Acer, den Labiaten und den Umbelliferen, spalten sich die Früchte in Teile auf, dann nehmen nur entsprechende Bruchstücke an der Zusammensetzung der Verbreitungseinheit teil. Neben den Glieder- und Spaltfrüchten stellt man auch die echten Sammelfrüchte, wie diejenigen von Rubus, die durch Verkoppelung mehrerer Früchte enstehen, hieher.

Die Fruchtformen, die wir als Achäne, Caryopse, Nuss, Beere oder Steinfrucht bezeichnen, stimmen trotz der verschiedenen Ausbildung ihrer Gewebeschichten in ihrer Zusammensetzung völlig überein.

4. Früchte mit Blütenorganen. Bei dieser Form der Verbreitungseinheit löst sich die Frucht zusammen mit andern, völlig erhalten gebliebenen, oft sogar postfloral vergrösserten Blütenorganen von der Mutterpflanze los. So ist bei den als Aepfel, Birnen und Hagebutten bekannten Verbreitungseinheiten der Blütenboden stark entwikkelt und umhüllt die ganze Frucht. Die Früchte von Origanum vulgare und

Anthyllis vulneraria fallen mit dem Kelch, und diejenigen von Linnaea borealis und Tilia (Abb. 19, Fig. 9) mitsamt den Vorblättern ab. Die Hülsen von Trifolium badium, T. alpinum und andern Pflanzen wiederum werden auf ihrer Wanderschaft von der ganzen Blütenhülle begleitet, und bei Anacardium spielt der postfloral fleischig gewordene Blütenstiel als Bestandteil der Verbreitungseinheit eine wichtige Rolle.

- 5. Fruchtstände oder Teile von solchen. Die Verbreitungseinheiten von *Phalaris*, Section *Homorphae* z. B.
 bestehen aus mehreren Aehrchen, und bei *Aegilops ovata* und Verwandten fällt die Aehre als Ganzes ab (Abb. 11).
- 6. Zweige und ganze Pflanzen. Besonders unter den Arten von Trockenfloren kommt es vor, dass sogar ganze Pflanzen, oberirdische Sprosse oder Teile von solchen, als Verbreitungseinheiten funktionieren. Wir erwähnen als Beispiele Seseli tortuosum, Eryngium campestre (Abb. 20) und Hedypnois cretica, die alle der Mittelmeerflora angehören.

Die Zusammensetzung der Verbreitungseinheiten ist nicht nur innerhalb der Familien, sondern sogar innerhalb mancher Gattungen recht verschieden. So werden z. B. bei Geranium sanguineum, G. columbinum und G. silvaticum die Samen weggeschleudert, bei G. pusillum, G. molle und G. rotundifolium aber lösen sich die Samen mit den sie einschliessenden Fruchtklappen von der Mittelsäule der Frucht ab, bei G. phaeum und G. bohemicum hingegen bleiben auch die vom Mittelsäulchen sich ablösenden Grannen in fester Verbindung mit den Teilfrüchten. Die Teilfrüchte von G. robertianum hingegen verlassen mit zwei langen Haarsträngen, die als Verbreitungsmittel eine wichtige Rolle spielen können (siehe S. 160), die Mutterpflanzen.

Grosse und schwere Verbreitungseinheiten wie diejenigen von Solanum lycopersicum, Cucumis, Cucurbita oder Adansonia digitata (Baobab) werden oft nicht als Ganzes transportiert, sondern von ihren Verzehrern in kleine Stücke zerlegt, die geschluckt werden können. Schnecken nehmen sogar die verhältnismässig kleinen Scheinfrüchte von Fragaria vesca und Verwandten nur portionsweise auf.

Grosse Unterschiede bestehen besonders auch in bezug auf die Höchstzahlen der Samen, die ein Individuum einer Art während einer Vegetationsperiode hervorbringen kann. Nach PERTTULA (1941) sind es z. B. bei Myosotis stricta 56, Geranium robertianum 300, G. bohemicum 2175, Hypericum maculatum 10656 und bei Orchis maculata etwa 100'000. Eine starke Birke (Betula) kann nach LEIBUNDGUT (1951) in einem Jahr sogar nahezu 30'000'000 Samen reifen.

Manche Arten, so die Waldföhre (*Pinus silvestris*) und der Gemeine Wacholder (*Juniperus communis*) reifen ihre Verbreitungseinheiten erst im zweiten Jahr, die Palme *Lodoicea seychellarum* sogar erst im 10. Jahr.

Ferner fruchten viele Baumarten nur in bestimmten Zeitabschnitten, den sogenannten Samenjahren reichlich. Linden (Tilia) nur etwa alle 3 - 4 Jahre, Fichten (Picea excelsa) und Buchen (Fagus silvatica) meist nur alle 5 - 6 Jahre, Eichen (Quercus robur) in kühleren Lagen sogar nur alle 6 - 8 Jahre. Die Waldföhre (Pinus silvestris) fruchtet in günstigen Lagen oft 2 Jahre hintereinander reichlich, an der polaren Waldgrenze Finnlands jedoch nur alle 50 Jahre.

b) Vegetative Verbreitungseinheiten

Die Brutkörper lösen sich meist ohne besondere Begleitorgane von der Mutterpflanze los, zeigen aber wesentliche Unterschiede in bezug auf die Morphologie und Entwicklungsstufe ihrer Knospen. Es lassen sich darnach folgende Formen unterscheiden:

1. Brutknollen. Sie sind meist kurze, fleischig-angeschwollene Sprossteile von rundlicher Form, in denen Reservestoffe aufgespeichert werden. Ihre Blattorgane sind stark reduziert und erscheinen oft als schuppenförmige, häutige, trockene Niederblätter, die leicht abfallen oder ganz unterdrückt bleiben. Ihre noch unterentwickelten Knospen bezeichnet man als Augen. Diese sind, wie bei Ranunculus ficaria, in der Einzahl, oder wie bei der Kartoffelknolle (Solanum tuberosum), in der Vielzahl vorhanden. Knollenförmige Blattbildungen finden wir bei Malaxis paludosa. Wir bezeichnen sie zum Unterschied von Brutknollen, welche aus

dem Spross hervorgehen, als Brutknöllchen.

2. Brutzwiebelartigen Verbreitungseinheiten bestehen aus einem äusserst kurzen Stamm, von dem aus nach oben fleischige Blätter und nach unten Wurzeln ausgehen. Die Blätter umfassen oder bedecken wenigstens teilweise den stark verkürzten Stamm mit dem Vegetationspunkt. Sie sind auch Speicherorgane für die Reservestoffe. Brutzwiebeln erzeugen: Verschiedene Allium- Arten (Abb. 1, Fig. 1), Fritillaria, Gagea u.a. Pflanzen.




Abb. 1. Vegetative Verbreitungseinheiten. 1. Bulbille von Allium vineale(2x).
2. Turione von Myriophyllum verticillatum, (nat. Grösse). 3. Laubspross von Poa alpina, f. vivipara, (1/2 nat. Grösse). 4. Oberirdische Ausläufer von Ranunculus reptans, (1/2 nat. Grösse).

3. Turionen. Viele Wasserpflanzen, so Spirodela polyrrhiza, Myriophyllum verticillatum (Abb. 1, Fig. 2), Potamogeton- und Utricularia-Arten bilden Knospen von länglicher oder rundlicher Gestalt aus, die sich im Herbst oder im Laufe des Winters infolge Absterbens der sie tragenden

Organe von der Mutterpflanze ablösen. Ihre Blätter sind sehr klein und von lederartiger Beschaffenheit.

- 4. Laubsprosse. Die vegetativen Knospen wachsen bei manchen Arten schon auf der Mutterpflanze zu kleinen Pflänzchen aus, die dann auf die Erde abgesetzt werden. Hierher gehören Poa bulbosa, P. alpina (Abb. 1, Fig. 3) und häufig auch Polygonum viviparum. Manche Begonien-Arten, sowie die auf der Insel Madagaskar wild wachsende Kalanchoë daigremontiana und auch Cardamine pratensis erzeugen an den Blättern solche Gebilde, die wir analog zu den Brutknöllchen Laubsprösschen nennen wollen.
- 5. In dividuen der Ausläufer (Stolonen). Die Ausläufer sind dünne, niederliegende, aus einer unterirdischen Achse oder aus den grundständigen Internodien einer oberirdischen
 Achse entspringende Seitensprosse. An den oft durch lange Internodien getrennten Knoten oder an den Enden der Triebe entwickeln sich junge Sprosse und Wurzeln. Die jungen Pflanzen verlieren schliesslich durch Absterben der Internodien ihren Zusammenhang mit der Mutterpflanze. Während
 z. B. Ranunculus reptans (Abb. 1, Fig. 4), Potentilla reptans, Ajuga reptans und Hieracium pilosella oberirdische Ausläufer hervorbringen, verlaufen diejenigen von Agropyron repens, Poa pratensis und Epilobium alsinifolium unterirdisch.

Es gibt Pflanzen, die in manchen Gegenden selten oder überhaupt nie Samen hervorbringen und sich daselbst nur durch ihre vegetativen Verbreitungseinheiten halten und ausbreiten. Dies ist in Mitteleuropa z. B. bei Acorus calamus, Saxifraga cernua, Lysimachia nummularia, Veronica filiformis und ganz besonders bei manchen Wasserpflanzen, wie der als Wasserpest verpönten Helodea canadensis, Lemna minor, Stratiotes aloides der Fall. Auch die tropische Eichhornia crassipes ist eine "Wasserpest". Infolge der starken vegetativen Vermehrung ist Fremdbestäubung und deshalb Fruchtbildung bei den genannten, meist selbststerilen Arten, nahezu unmöglich.

B) Viviparie

Namentlich unter den Monokotyledonen treffen wir Pflanzen, die zwar blühen, aber selten Samen bilden. An Stelle derselben entwickeln sie regelmässig kleine Laubsprosse oder Bulbillen, die wie Früchte abfallen und sich am Boden bewurzeln. Diese Erscheinung bezeichnet man als Viviparie. Die bekanntesten Vertreter sind jedenfalls Poa alpina f. vivipara und Poa bulbosa. Ebenfalls ausgeprägt ist die Erscheinung bei Deschampsia litoralis var. rhenana. Bei diesen Pflanzen wandeln sich die Aehrchen mit ihren Spelzen in kleine Tochterpflänzchen um, indem die Spelzen zu Laubblätter werden. Bei der bekannten Agave americana und A. rigida var. sisalana bilden sich aus einem verhältnismässig kleinen Teil der Blüten zwar Früchte mit Samen; die meisten wachsen aber ohne Befruchtung zu kleinen Pflänzchen aus und lösen sich an Stelle der Samen von der absterbenden Mutterpflanze ab. Kleine Zwiebeln, sogenannte Bulbillen, trifft man auf den Blütenständen von Allium scorodoprasum, A. vineale, A. carinatum, A. oleraceum, Lilium bulbiferum, Cardamine bulbifera, Polygonum viviparum usw. Die Blüten von Ranunculus ficaria fruchten ebenfalls selten; aber die Bulbillen bilden sich meistens ausserhalb der Blütenregion.

C) Polydiasporie

Viele Pflanzen bilden zwei- oder mehrerlei Formen von Verbreitungseinheiten aus. Diese können demselben oder verschiedenen Typen angehören. Handelt es sich um die Früchte, so bezeichnet man die Erscheinung als Heterokarpie. Aethionema heterocarpum z. B. erzeugt einsamige Früchte, die sich nicht öffnen und mehrsamige aus denen die Samen ausfallen. Calendula arvensis (Abb. 2) enthält im selben Körbchen sogar dreierlei Fruchtformen. Die äussern Früchte sind kahnförmig und auf dem Rücken stark stachelig, diejenigen aus der mittleren Region schwach kahnförmig, ohne Stacheln, und die innersten wurmförmig und stachellos. Bei der im wärmeren Mittel-

meergebiet heimischen Daucus aureus und bei andern Arten derselben Gattung



Abb. 2. Heterokarpie bei der Ackerringelblume (Calendula arvensis), Kahnfrucht, Ringelfrucht (Larvenfrucht) und Hakenfrucht (ca. 3x).

sind nur die äusseren Früchte von gut ausgebildeten Stacheln besetzt, bei den innern sind sie verkümmert.

Heterokarp sind auch wie schon ZOHARI (1937) erwähnt die meisten amphikarpen Arten.

Auch die Ausbildung von verschiedenen Teilfrüchten, sogenannte Heteromerikarpie, kommt vor. Sie tritt bei *Torilis nodosa* (Abb.3) besonders auffällig in Erscheinung. In der gleichen Frucht ist die nach aussen gekehrte Hälfte mit borstigen Stacheln bewehrt, die innere dagegen nur von kurzen, stumpfen Warzen besetzt.



Abb. 3. Heteromerikarpie bei Torilis nodosa. Aeussere Teilfrucht bestachelt, innere höckerig (4x).

Sogar Verbreitungseinheiten verschiedener organischer Zusammensetzung werden angetroffen. Die mediterrane Hedypnois cretica gibt zur Reifezeit nur die innern, pappustragenden Früchte des Körbchens frei, die äussern, pappuslosen Früchte werden von den Hüllblättern zurückgehalten und bilden mit dem Fruchtkörbchen und dem oberen aufgeblasenen Schaftstück desselben eine Verbreitungseinheit. Ebenso finden sich zuweilen bei Scandix und der verwandten Cyclotaxis in der Mitte jedes Döldchen ein bis mehrere Früchtchen, die auch zur Reifezeit nicht abfallen, sondern zusammen mit der ganzen fruchtreifen Pflanze vom Winde verweht werden. Noch komplizierter liegen nach SERNANDER (1906, S. 234) die Verhältnisse bei der afrikanischen Pflanze Fedia cornucopiae. Ihr reichverzweigter Fruchtstand ist regional gegliedert. Jede Region trägt besondere Fruchtformen. In der untern Region sitzen Früchte, die bei der Reife von den Blattachseln am Grund der Sprosse vollständig eingefasst werden. Sie lösen sich in Verbindung mit den strohartigen, verdickten, an den Knoten leicht abbrechenden Zweigstücken von der Mutterpflanze ab. In der oberen Region des Fruchtstandes kommen drei Grundformen von Früchten vor. 1. Solche mit einem Saum, der zwei nach aussen gebogene Flügel trägt und aus dem Kelch hervorgegangen ist. 2. Schalenfrüchte von gleicher organischer Zusammensetzung, aber verkümmerten Kelchzipfeln, von korkiger Beschaffenheit und mit zwei grossen Lufträumen. 3. Schmale kleine Früchte mit ölhaltigem Anhängsel. Zwischen allen drei Formen gibt es ausserdem Uebergänge.

Häufig entstehen die verschiedenen Verbreitungseinheiten nicht gleichzeitig, sondern die einfach organisierten folgen sekundär auf die komplizierten. So zerbricht die Aehre von Hordeum murinum zunächst in Teilstükke, die in ihrem oberen Teil drei Aehren tragen. Später fallen daraus Verbreitungseinheiten, die aus einer Karyopse, der Deck- und der Vorspelze bestehen, aus. Von den Wandersprossen von Seseli tortuosum und Eryngium campestre (Abb. 20) lösen sich während der Wanderung die Früchte ab und können noch weiter verbreitet werden.

Häufig sind Pflanzen, die gleichzeitig generative und vegetative Verbreitungseinheiten ausbilden. Zu diesen gehören Allium carinatum, Fragaria vesca, Potentilla reptans u. a.

Gelegentlich stösst die morphologische Erfassung der Verbreitungsein-

heiten auf erhebliche Schwierigkeiten und verlangt eingehende Untersuchungen. Eine wertvolle Studie über die Ausbildung von Verbreitungseinheiten lieferte z.B. CAMUS (1935) für die Gramineen.

2. Verbreitungsmittel

Die Notwendigkeit von speziellen Vorrichtungen für die Verbreitung der Keime führt zur Um- und Ausbildung von bestimmten Organen als sogenannte Verbreitungsmittel. An den Samen selber kann das äussere Integument zum Verbreitungsmittel ausgebildet werden. So verwandelt es sich bei Evonymus, Taxus und vielen Samen tropischer Pflanzen in einen saftigfleischigen Arillus, der von Tieren gerne verzehrt wird und dadurch die Verbreitung der Samen bewirkt. Bei den Rhododendron-Arten der Alpen, den meisten Orchideen und gewissen Strandpflanzen wiederum, bildet sich zwischen der Samenschale und dem Samenkern ein Luftraum, der das spezifische Gewicht des Samens wesentlich herabsetzt. Der Samenstiel, die Raphe, der Kamm oder der Mund (Mikropyle) mancher Samen entwickeln sich zu ölführenden Nabelschwielen die von Ameisen sehr begehrt werden. In der Regel haben alle diese zu Verbreitungsmitteln gewordenen Organe der Samen keinerlei Einfluss auf deren Weiterentwicklung mehr und dienen somit einzig und allein der Verbreitung derselben. Die Zapfen von Juniperus und Phyllocladus werden fleischig und locken dadurch ebenfalls Tiere an. Unter den Angiospermen wiederum gibt es zahlreiche Arten, bei denen alle Gewebeschichten der Fruchtwand bis zur Samenreife fleischig werden oder sonst eine starke Aenderung erfahren. Ihre Frucht verwandelt sich vielfach in eine Beere, indem die ganze Fruchtwand fleischig wird. Bei den Steinobstarten wird das Endocarp hart und übernimmt den Schutz des Samens, während sich das Mesokarp vergrössert und in eine saftig fleischige Schicht umwandelt, die von einem meist dünnen Epikarp gegen aussen abgeschlossen wird. Aus dem Epikarp gehen bei manchen Früchten auch Haarbildungen, Flügel, Drüsen, die Klebstoffe absondern, hakenartige Organe oder Schwimmvorrichtungen hervor. Die Geraniaceen, Pulsatillen und viele Rosaceen zeigen uns, dass

auch der Griffel nach dem Verblühen sich zu einem Flugapparat einer Haftoder Schleudervorrichtung umbilden kann. Ferner werden Kelche, Hoch- und
Vorblätter bei vielen Pflanzen, besonders bei Gramineen, zu Flugorganen,
nachdem sie ihre Bedeutung für die Blüte verloren haben. Bei Eryngium campestre (Abb. 20) dienen nach dem Absterben selbst die Laubblätter noch
als Verbreitungsmittel, und durch stark verlängerte, dünne Sprossachsen
werden auf vegetativem Wege entstandene Tochterpflanzen in der nähern
Umgebung der Mutterpflanze plaziert.

Ueber die Evolution von Verbreitungsmitteln ("dispersal organs") macht VAN DER PIJL (1972) wertvolle Angaben.

3. Bereitstellung der Verbreitungseinheiten für den Transport

Der Abtransport der Verbreitungseinheiten von den Mutterpflanzen wird in der Regel durch sowohl räumlich, als auch zeitlich günstige Bereitstellung derselben wesentlich erleichtert oder gar gefördert.

A) Räumliche Bereitstellung

Die meisten Pflanzen sind aerokarp,d.h. sie reifen ihre Früchte an den oberirdischen Sprossteilen. Unter ihnen überwiegen wiederum diejenigen, die sie an den Jahrestrieben tragen. Es gibt aber namentlich in den Tropen und Subtropen eine grosse Zahl kaulikarper Pflanzen, wie die Kaffeesträucher (Abb. 4) der Kakao- und der Judasbaum, deren Früchte wie bei dem bis in die Hochalpen vorstossenden Daphne mezereum (Abb. 5) am Stamm oder wie bei Cercis siliquastrum an älteren Aesten sitzen.

Eine interessante Erscheinung ist ferner die *Basikarpie* einiger Alpen-, Steppen- und Wüstenpflanzen, bei denen alle oder doch ein Teil




Abb. 4. Kaulikarpie beim Kaffeebaum (Coffea).(1/2 nat. Grösse)




Abb. 5. Kaulikarpie beim Seidelbast (Daphne mezereum). (1/2 nat. Grösse)

der Früchte direkt über der Erde oder in der Nähe der Hauptsprossachse sitzen. Vollkommen basikarp sind z. B. Carlina acaulis, Cirsium acaule, Ammochloa involucrata, viele Protea- Arten, nur partiell Emex spinosus und Centaurea melitensis (Abb. 6), die auch Früchte auf ihren verlängerten Sprossen hervorbringen.



Abb. 6. Basikarpie bei Centaurea melitensis (aus MüLLER-SCHNEIDER 1933). (1/4 nat. Grösse).

Die Verbreitungseinheiten können ferner mit der Umwelt direkt in Verbindung stehen oder in kapselartigen Behältern ruhen und recht verschieden auf der Mutterpflanze angeordnet sein. Darnach unterscheiden wir in Anlehnung an frühere Veröffentlichungen (MüLLER-SCHNEIDER 1933, MOLINIER und MüLLER-SCHNEIDER 1938) folgende Bereitstellungstypen:

- I. Gruppe: Pflanzen, deren Verbreitungseinheiten frei am Spross stehen oder hängen und deshalb von den Verbreitungsagentien direkt erfasst werden können.
- 1. Acer-Typus. Die Verbreitungseinheiten sind über den grössten Teil des aufrechten Sprosses verteilt, der hoch über die Krautschicht emporragt. (Acer, Fraxinus excelsior).
- 2. Taraxacum-Typus. Die Pflanzen gehören der Krautschicht an. Ihre Verbreitungseinheiten sind am oberen Ende des aufrechten Sprosses konzen-

triert. Häufig werden sie auch durch beträchtliche, postflorale Verlängerung des Fruchtträgers über die Karutschicht hinausgehoben (*Petasites*, *Pulsatilla*, *Tussilago*) (Abb. 18).

- 3. Sisymbrium-Typus. Die Verbreitungseinheiten bleiben wenigstens z. T. nach dem Abfallen der Fruchtklappen noch auf der aufrecht bis waagrecht stehenden Scheidewand der Schoten oder Schötchen sitzen (Lunaria, Lepidium).
- 4. Medicago-Typus. Bei diesem Typus sind die Verbreitungseinheiten über den grössten Teil des aufrecht stehenden oder nieder liegenden Sprosses verteilt (Rumex bucephalophorus (Abb. 42), Agrimonia eupatoria, Medicago marina).
- 5. Sorbus-Typus. Bei den hierher gehörenden Pflanzen ist die Verteilung der Verbreitungseinheiten auf dem Spross beliebig, sie sind aber dank leuchtender Farben weithin sichtbar (Magnolia, Prunus, Citrus, Ilex).
- II. Gruppe. Pflanzen, deren Verbreitungseinheiten bis zu ihrer Verbreitung in kapselartigen Behältern ruhen. Als Behälter funktionieren meist echte Kapseln, die aus der Fruchtwand hervorgehen. Oft aber bilden auch Teile der Blütenhülle, wie die persistierenden Labiatenkelche und die Vor- und Hochblätter, wie sie namentlich bei manchen Umbelliferen und speziell bei den Compositen zu finden sind, sogenannte biologische Kapseln.

Das Oeffnen der Behälter ist meist von den Witterungsverhältnissen abhängig. Am häufigsten werden die Oeffnungsbewegungen durch Austrocknung verursacht. Wenn sich die Behälter bei Befeuchtung mehr oder weniger schnell wieder schliessen und bei trockener Witterung erneut öffnen, wie das z. B. bei Silene vulgaris und Carlina acaulis der Fall ist, bezeichnet man die Erscheinung als Xerochasie*(ASCHERSON 1892). Gerade das Gegenteil der Xerochasie ist die Hygrochasie** (ASCHERSON 1892). Die hygrochastischen Behälter öffnen sich also bei Befeuchtung und schliessen sich

^{*} xeros = trocken, chainein = klaffen

^{**} hygros = feucht

beim Austrocknen wieder. Zunächst schien es, als ob die hygrochastischen Oeffnungsmechanismen nur seltene Ausnahmen wären. Je mehr sich aber die verbreitungsbiologischen Untersuchungen auf Steppen- und Wüstenpflanzen ausdehnen, um so mehr Pflanzen mit solchen Oeffnungsmechanismen werden bekannt (siehe ZOHARI 1930 und 1937, Müller-SCHNEIDER 1936, BRAUN-BLANQUET 1949, STRAKA 1955, IHLENFELDT 1960). Zu den bekanntesten Vertretern gehören: die Rose von Jericho (Anastatica hierochuntia) Odontospermum und Prunella. Es gibt aber z. B. auch Vertreter der Hygrochasie unter den Lepidium-, Iberis-, Astragalus-, Mesembryanthemum-, Salvia- und Plantago-Arten.

- 1. Plantago-Typus. Die Behälter bleiben bis zur Verbreitung der Verbreitungseinheiten geschlossen. Sie werden erst durch das Agens, das eine Art Deckel oder Haube abhebt, geöffnet (Anagallis arvensis, Plantago major).
- 2. Vicia-Typus. Die Behälter, welche die Verbreitungseinheiten einschliessen, öffnen sich, indem sie der Länge nach aufspalten und jene herausfallen lassen (Vicia, Lathyrus).
- 3. Fumana-Typus. Die Oeffnung des Behälters der Verbreitungseinheiten ist erdwärts gerichtet (Primula vulgaris, Helianthemum nummularium).
- 4. Silene-Typus. Die Verbreitungseinheiten lagern in nach oben sich öffnenden, becherförmigen Behältern, aus denen sie nur durch stärkere Erschütterungen oder Luftwirbel hinausbefördert werden können (Silene dioeca, Primula elatior, Campanula).
- 5. Orchis-Typus. Die Entleerung der Samenbehälter erfolgt durch schmale, seitliche Spalten (Abb. 7). Sie stehen meist aufrecht (Pyrola uniflora, Orobanche teucrii), können aber wie bei Epipactis palustris auch überhängen und leicht beweglich sein.
- 6. Salvia-Typus. Die Entleerung der Behälter erfolgt durch grosse, seitliche Oeffnungen. Bei manchen Pflanzen, so bei den Thymus- und Sideritis-Arten sind dieselben vielfach durch einen Haarkranz verschlossen, der verhindert, dass die Verbreitungseinheiten schon bei geringen Erschütterungen ausfallen.

Den aerokarpen Arten stehen die hydrokarpen und geokarpen gegenüber,




Abb. 7. Durch seitliche Spalten sich öffnende Fruchtkapsel des Frauenschuh Cypripedium calceolus. (nat. Grösse).

die ihre Samen im Wasser bzw. in der Erde reifen. Sie sind nur in verhältnismässig geringer Zahl vertreten. Hydrokarp sind Najas, Nymphoides peltata, Myriophyllum usw. Allgemein bekannt ist die Geokarpie der Erdnuss (Arachis hypogaea). Die Blütenstiele dieser Pflanzen verlängern sich nach dem Verblühen der Blüten beträchtlich und drücken die reifenden Früchte in die Erde, wo sie erst ganz ausreifen. Dasselbe geschieht auch bei Trifolium subterraneum (Abb. 8), Morisia hypogaea und Faktorovskya aschersoniana. ZOHARI (1937) hat gezeigt, dass sich bei Faktorovskya nur Samen bilden, wenn die Fruchtknoten mit der Erde in Berührung kommen können. Nach demselben Autor sind bei den Araceen Biarum angustatum und B. pyrami sowohl die Blüten als auch die Früchte während ihrer ganzen Entwicklung unterirdisch. Die Früchte der südafrikanischen Cucumis humifructus erreichen durch postflorale Verlängerung der Infloreszensachse sogar Tiefen bis zu 30 cm (STOPP 1958).

Es gibt auch amphikarpe Pflanzen. Sie bilden ober- und unterirdische Früchte aus. Zu ihnen gehören Vicia amphicarpa (Abb. 9), Pisum fulvum var. amphicarpum und Catananche lutea.

Oft kommt es vor, dass die Bildung oberirdischer Blüten unterbleibt und scheinbare Geokarpie ensteht. Bei *Emex spinosus* (MURBECK 1901) werden durch Kontraktion der Wurzeln die Früchte der untern Sprosspartie unter




Abb. 8. Geokarpie bei Trifolium subterraneum. (1/3 nat. Grösse).




Abb. 9. Amphikarpie. Vicia amphicarpa mit ober- und unterirdischen Früchten. (2/3 nat. Grösse).

den Boden gezogen. Die unterirdischen Früchte sind grösser oder etwas anders geformt als die oberirdischen.

Die vegetativen Verbreitungseinheiten werden ebenfalls z. T. über, z. T. unter der Erde ausgebildet. Dagegen sind keine Arten bekannt, die sie bis zur Verbreitung in eigens hiefür bestimmten Behältern zurückbehalten.

B) Zeitliche Bereitstellung

Während in den nördlichen und südlichen Gegenden der kalte Winter, in den subtropischen Steppen und Wüstengebieten die Trockenzeiten das Wachsen und Blühen verunmöglichen, kann die Verbreitung der Keime zu allen Jahreszeiten erfolgen. Doch ist zu beachten, dass die Verbreitungsverhältnisse sich im Laufe des Jahres fast überall stark verändern. In den gemässigten Zonen z. B. erleichtert der Laubfall im Herbst den Zutritt der Winde zu den Früchten vieler Bäume, die herrschenden Windströmungen wechseln ihre Richtung und Stärke, das fliessende Wasser versiegt oder gefriert, der Regen setzt aus oder fällt in Form von Schnee, und viele Tiere suchen andere Gegenden auf; ja die Kaltblüter unter ihnen verkriechen sich sogar mit dem Eintritt der Kälte. Weil aber immer Verbreitungsagentien vorhanden sind, erfolgt tatsächlich zu allen Jahreszeiten eine Verbreitung von Keimen.

Im Bereiche der gemässigten und kalten Klimazone reift die grösste Zahl der Pflanzen die Samen und Brutkörper im Sommer und Herbst. Während aber die einen ihre Verbreitungseinheiten nach der Reife sofort abgeben, gibt es andere, die sie oft noch lange auf sich behalten.

Die sofortige Abgabe der Keime wird als Tachysporie, die verzögerte als Bradysporie bezeichnet (SERNANDER 1901). Dank der Bradysporie erstreckt sich die Verbreitung der Keime bei vielen aussertropischen Arten bis tief in den Winter hinein. So können wir den ganzen Winter über Früchte von Ligustrum vulgare, Rosa canina, Lysimachia vulgaris, Fraxinus

excelsior usw. auf ihren Mutterpflanzen finden. Sie sind Wintersteher im Sinne SERNANDERS (1901 und 1927). Manche Alpenpflanzen, wie Gentiana nivalis, Sibbaldia procumbens, Arctostaphylos alpina, werden jedoch vom Schnee völlig zugedeckt, bevor alle ihre Samen verbreitet sind. Bei solchen Schneeschützlingen kann die Keimverbreitung erst nach der Schneeschmelze im Mai, Juni oder Juli wieder ihren Fortgang nehmen. Unterdessen hat in der Ebene im März und April der Winterblüher Hedera helix die Beeren gereift und bietet den Amseln (Turdus merula) damit die ersten frischen Beerenfrüchte des Jahres. Am Waldrand trägt der Wind jetzt auch die Früchte der Waldrebe (Clematis vitalba) und am Seestrand die Verbreitungseinheiten der Schilfpflanzen (Phragmites communis) weg. Von den Frühblühern reifen Populus tremula, Salix caprea, Erophila verna, Holosteum umbellatum und Tussilago farfara z. T. ihre Samen bzw. Früchte, schon bevor der April zu Ende geht, und bereits im Blütenmonat Mai ist die Zahl der Pflanzen mit neugereiften Früchten recht gross. Die Brutkörper dagegen lösen sich in der Regel erst in der 2. Jahreshälfte von den Mutterpflanzen ab.

III. VERBREITUNGSTYPEN UND IHRE WIRKSAMKEIT

Die Pflanzen nützen die Verbreitungsagentien auf prinzipiell verschiedene Weise. Während z. B. bei den einen die Verbreitungseinheiten sich mittels Haftvorrichtungen an Pelztiere anhängen, bieten andere Nahrung, die bewirkt, dass die Keime von den Tieren in den Darmkanal aufgenommen und mit dem Kote wieder ausgeschieden werden. Immer aber beschreiten viele Arten denselben, für sie eigentümlichen Weg, um die Verbreitung ihrer Keime zu erwirken und repräsentieren dadurch einen bestimmten Verbreitungstypus. Die Zahl der Verbreitungstypen ist gross, und es ist daher notwendig, sie nicht nur zu beschreiben, sondern auch zu klassifizieren.

Weil nun alle Vorkehrungen der Pflanzen für die Keimverbreitung sich in erster Linie nach dem Verbreitungsagens zu richten haben, fassen wir alle Verbreitungstypen, bei denen dasselbe Verbreitungsagens (s. 1.) wirksam ist, zu einer Klasse zusammen. Den wenigen wesensverschiedenen Verbreitungsagentien entsprechend gibt es daher folgende Verbreitungstypen-Klassen:

Biotische Klassen

- 1. Selbstverbreiter Autochoren
- 2. Mensch- und Tierwanderer Zoochoren (Anthropo-Zoochoren) 5
- 3. Durch die Zivilisatorischen Betätigungen der Menschen wandernde Pflanzen Hemerochoren 6

Abiotische Klassen

- 4. Mittelst der Schwerkraft wandernde Pflanzen Barochoren 7
- 5. Windwanderer Anemochoren⁸
- 6. Wasserwanderer Hydrochoren⁹

⁴ autos = selbst, choreo = ich wandere

⁷ baros = Schwere

⁵ zoon = Tier, anthropos = Mensch

⁸ anemos = Wind

⁶ hemer = zahm (kultiviert)

⁹ hydor = Wasser

Den Selbstwanderern oder Autochoren werden oft alle andern Klassen als Fremdwanderer oder Allochoren gegenübergestellt.

Unter den Verbreitungstypen selbst unterscheiden wir Haupt- und Untertypen. Bei den Vertretern eines Haupttypus erfolgt die Verbreitung der Keime auf prinzipiell übereinstimmende Weise. Die Haupttypen werden daher ebenfalls durch wissenschaftliche Ausdrücke benannt, und zwar allgemein durch Bezeichnungen, die nach Möglichkeit auf die Eigenart des Verbreitungsmodus hinweisen. So bezeichnen wir Zoochoren, deren Verbreitungseinheiten sich an Tieren verankern können, als Epichoren, und diejenigen, deren Keime einen Darmkanal zu passieren imstande sind, als Endochoren.

Die Unterscheidung der Untertypen beruht zumeist auf stark in Erscheinung tretenden, aber keinen speziellen Verbreitungsmodus bedingenden morphologischen Eigenheiten der Pflanzen.

Wenn wir jedoch den Verbreitungsmodus besonders hervorheben wollen, sprechen wir von autochorer, anemochorer, epi- und endochorer Verbreitung, bzw. von Autochorie, Anemochorie, Epi- und Endochorie usw.

Eine von DANSEREAU und LEMS (1957) veröffentliche Fassung der Verbreitungstypen bzw. Diasporentypen scheint uns zu einfach, um repräsentativ zu sein.

Selbstverbreiter (Autochoren)

Unter den Selbstverbreitern gibt es Selbstableger, die ihre Verbreitungseinheiten durch Wachstum und Wachstumsbewegungen direkt an den Keimplatz legen, ferner Selbststreuer, die sie von sich wegschleudern, wegstossen oder wegschnippen, und Kriecher, deren Verbreitungseinheiten Kriechbewegungen auszuführen imstande sind.

l allos = ein anderer

A. Selbstableger (Blastochoren) 1

Innerhalb offener Pflanzengesellschaften, wie wir sie auf Kiesplätzen, Schutt- und Geröllhalden, an Felsen und Mauern, besonders aber in den Steppen und Wüsten finden, beobachten wir, dass die fruktifikativen oder vegetativ-fruktifikativen Achsen vieler Pflanzen zunächst nicht aufwärts streben, sondern sich nach allen, oft auch nur nach einer Richtung dem Boden anschmiegen. Ein einziges Pflanzenindividuum deckt bald eine relativ grosse Fläche. Die abfallenden Verbreitungseinheiten können so in Entfernungen von 50, 100 und mehr Zentimeter vom Wurzelort der Mutterpflanzen zu Boden gelangen. Nach SERNANDER (1906, S. 318) bedecken Individuen von Stenhammaria maritima sogar kreisförmige Flächen von 1,5 bis 2 m Durchmesser. Wiederholt sich der Vorgang durch mehrere Generationen hindurch, so können die jüngsten Nachkommen schon recht weit von der Stammpflanze entfernt sein. Derselbe Verbreitungsmodus ist auch bei Polygonum aviculare zu beobachten. Bei besonders ausgeprägten Vertretern dieses Verbreitungstyps kommen noch geotrope Wachstumsbewegungen der Fruchtstiele hinzu. So verlängern sich die Fruchtstiele der zierlichen Mauerpflanze Linaria cymbalaria kurz vor der Fruchtreife stark und wenden sich der Mauer zu. Zuletzt schieben sie die Fruchtkapseln tief in die Mauerritzen hinein. Wenn diese sich öffnen, rollen die Samen direkt an den Keimplatz. Linaria spuria, Anagallis arvensis, Veronica persica und Veronica hederifolia verhalten sich ähnlich wie Linaria cymbalaria, ohne allerdings dieselbe Vollkommenheit zu erreichen. Selbstableger sind auch die geokarpen und amphikarpen Pflanzen wie Trifolium subterraneum (Abb. 9), deren unterirdisch ausreifende Samen durch Wachstum der Sprossteile, die noch vor der Keimung absterben, von der Mutterpflanze entfernt werden.

Durch Selbstablegung verbreiten sich ferner alle Pflanzen mit Ausläufern; denn sie entfernen ihre auf vegetativem Wege gebildeten Verbrei-

¹ blastano = ich wachse

tungseinheiten ebenfalls durch Verlängerung der Sprossachsen und durch Wachstumsbewegungen. Dass die Waldbeere (Fragaria vesca) mittelst ihrer Ausläufer ganze Wanderungen vollzieht, ist allbekannt. Im übrigen sind die Ausläufer je nach Pflanzenart und Standort der Mutterpflanzen recht verschieden lang.

Es wurden folgende Längen gemessen (z. T. nach KERNER 1898, S. 550):

	m
Saxifraga aizoon	0,04
Saxifraga cuneifolia	0,06
Viola odo r ata	0,13
Ajuga reptans	0,2
Hieracium pilosella	0,3
Lysimachia nemorum	0,4
Geum reptans	0,5
Lithospermum purpureo-coeruleum	0,56
Potentilla anserina	1,1
Ranunculus reptans	1,3 (12 Individuen)
Glechoma hederaceum	1,3
Rubus saxatilis	1,4
Potentilla repens	1,5 (12 Individuen)
Vinca major	2,0
Fragaria vesca	2,6 (10 Individuen)
Rubus caesius	3,2
Rubus bifrons	6,5
Phragmites communis	20,0

B. Selbststreuer (Ballochoren) 1

Die Verbreitungseinheiten der Selbststreuer, meist nackte Samen, liegen bis zum Moment der Ausstreuung zwischen lebenden oder toten Geweben, in denen mit fortschreitender Reife immer grössere Spannungsunterschiede entstehen. Schliesslich reissen diese an einer hierfür vorausbestimmten Stelle explosionsartig auf, die Spannungen gleichen sich blitzschnell aus und liefern Kräfte, die ein Fortschleudern, Fortschiessen, Fortschnippen oder Fortspritzen der Samen bewirken.

l ballo = ich werfe

a) Saftdruckstreuer

In lebenden Zellen kommen die Spannungen vorwiegend durch Turgor zustande. Dieser nimmt mit fortschreitender Reife der Samen immer zu, bis er die vorhandenen Widerstände zu überwinden vermag und durch Ingangsetzung besonderer Mechanismen die Ausstreuung der Samen bewirken kann. Unter den Streuvorrichtungen, die in Tätigkeit gesetzt werden, gibt es Schlag-, Schleuder-, Quetsch-, Saug-, Rückstoss- und Spritzmechanismen.

Einen eigentlichen Schlagmechanismus finden wir bei den Springkräutern (Impatiens) (Abb. 10, Fig. 6). Ihre Früchte sind schotenähnliche, fleischige, fünffächerige Kapseln, die in ihrem Innern ausserordentlich starke Scheidewände besitzen und an einem nach oben verbreiteten Mittelstrang, der Placenta, zwei Samen tragen. Sie buchten zur Reifezeit im oberen Teil, wo die Samen sitzen, aus und werden länglich keulenförmig. Der ausgebuchtete Teil der Fruchtwand bleibt dünn und unwirksam. Dagegen tritt im untern Teil, wo die Fruchtwand sich verdickt, eine sich allmählich steigernde Gewebespannung auf. Diese kommt dadurch zustande, dass die Aussenschicht, die durch ein Schwellgewebe gebildet wird, ein zunehmendes Ausdehnungsbestreben zeigt, dem aber eine innere, kollenchymatische Schicht zunächst Widerstand entgegensetzt. Die schwachen Längsverbindungen der Fruchtblätter, an denen sich ein zartes Trennungsgewebe aus rundlichen Zellen befindet, vermögen der starken Spannung schliesslich nicht mehr zu widerstehen und reissen auf. Dadurch fällt der Widerstand fort; die Schwellzellen, die mit ihrem grossen Durchmesser senkrecht auf der Widerlage stehen, suchen sich infolge ihrer Turgeszenz der Kugelgestalt zu nähern, sie verkürzen ihren grossen und vergrössern ihren kleinen Durchmesser. Infolgedessen rollen die einzelnen Fruchtblätter der Kapsel sich mit grosser Kraft nach innen ein und schlagen dabei so heftig an die Samen, dass diese wegfliegen.

Mit Hilfe eines Saugmechanismus streuen Cardamine impatiens und andere Cardamine-Arten ihre Samen aus. Ihre Schoten werden durch eine zarte Scheidewand, den Rahmen, in zwei Hälften geteilt. Die Samen sitzen an dünnen Stielchen zu beiden Seiten des Rahmens und füllen die Buchten der



Abb. 10. Selbststreuer. 1. Hornklee (Lotus corniculatus) (3/4 nat. Grösse).
2. Waldstorchschnabel (Geranium silvaticum) (3/4 nat. Grösse).
3. Stiefmütterchen (Viola tricolor) (3/4 nat. Grösse). 4. Sauerklee (Oxalis acetosella) (2x). 5. Spritzgurke (Ecballium elaterium) (2/3 nat. Grösse). 6. Kleinblütiges Springkraut (Impatiens parviflora) (2/3 nat. Grösse). 7. Dorstenia contrayerva (Einzelne Frucht, stark vergrössert). 8. Cyclanthera explodens.
1. - 3. Austrocknungsstreuer. 4. - 8. Saftdruckstreuer.

4. - 8. nach ULBRICH 1928.

Fruchtwand aus. Die Früchte springen zweiklappig auf, wobei sich die Klappen blitzschnell nach aussen aufrollen. Infolge der Aufrollung entsteht nach OVERBECK (1925) unter ihnen ein saugender Luftzug, der sich auf die vom Rahmen leicht ablösenden Samen überträgt und bewirkt, dass sie ausgestreut werden. Zum Teil bleiben (SCHNEIDER 1935, S. 66) die Samen infolge ihrer Klebrigkeit auch an den Klappen haften und werden durch die bei der aufwärts gerichteten Einrollungsbewegung auftretenden Zentrifugalkräfte ausgestreut. Die Klappen rollen sich nach aussen ein, weil die ebenfalls aussen gelegenen Schwellzellen nicht wie bei Impatiens senkrecht zur Widerlage stehen, sondern parallel zu ihr verlaufen. Erfolgt beim Ablösen der Fruchtklappen die Abrundung der Zellen, so verkürzen sie sich in der Längsrichtung und üben eine Zugkraft aus, die zur Einrollung der Fruchtklappen nach aussen führt.

Cyclanthera explodens (Ab. 10, Fig. 8), eine Pflanze des tropischen und andinen Südamerika, liefert ein Beispiel für einen vollkommenen Schleudermechanismus. An der asymetrischen Frucht dieser Pflanze springt zur Zeit der Reife ein etwa 1 cm breiter Streifen der Rückwand auf und schlägt sich von der Spitze beginnend nach aussen um. Dabei wird die Placenta aus dem Fruchtinnern herausgerissen und im grossen Bogen fortgeschleudert. Gleichzeitig lösen sich die diskusförmigen Samen von ihr ab.

Allgemein bekannt ist der Quetschmechanismus von Oxalis (Abb. 10, Fig. 4). Die Oxalis-Samen stecken in einer zur Reifezeit grünen, eiförmigen, fünffächerigen, durch fünf Längsrisse aufspringende Kapsel. Die Samenschale ist zweischichtig. Die äussere Schicht ist fleischig, die innere hart und gerippt. Die fleischige Schicht funktioniert als eigentliche Quetschvorrichtung. Sie besitzt aussen eine mächtige, glänzende Kutikula. Auf die Kutikula folgen dann grössere Zellen, die äusserst turgeszent sind und während des Verbreitungsvorganges sich blasenförmig abrunden. In der Jugend enthalten sie viel Stärke. Durch deren Verzuckerung entsteht nach GUTTENBERG (1926, S. 134) zur Zeit der Reife ein osmotischer Druck von 17 bis 18 Atmosphären. Auf sie folgt eine Lage Zellen, die über den Rippen und Tälchen der Hartschicht verschieden ausgebildet ist. Ueber den ersteren sind nur die äussern Tangentialwände dünn, über den letztern alle Wände dieser Zellen. Diese Schicht ist die Trennungsschicht und zer-

reisst beim Aufspringen. Die Spannung der Quetschschicht ist nicht nur durch das Ausdehnungsbestreben der Schwellgewebezellen bedingt, sondern auch durch das Kontraktionsbestreben der starken Kutikula. Diese folgt dem allgemeinen Wachstum nicht nach und ist schliesslich stark ausgedehnt. Die Spannung führt zunächst zum Einreissen der Aussenschicht der Samenschale an ihrer schwächsten Stelle. Diese befindet sich an der nach auswärts gekehrten Längsseite; denn hier ist die Kutikula am dünnsten, und darunter befindet sich eine Trennungsschicht aus lockeren, rundlichen Zellen. Die scharfen Kanten des eigentlichen Samens wirken bei der Rissbildung sicherlich mit. Nunmehr rollt sich die ganze fleischige Schicht plötzlich zurück und quetscht dabei den Samen hinaus. Die Stellung derselben ist dabei eine solche, dass sie ungehindert durch die Kapselspalten aus der Frucht treten können. Die Rauhigkeiten des Samens, die bei manchen Arten als Längsrippen, bei andern als Querrippen ausgebildet sind, erhöhen die Reibungsmöglichkeit zwischen der sich zurückrollenden Gewebeschicht und dem eigentlichen Samen und stellen gewissermassen eine Führung des letztern dar.

Aehnlich liegen die Verhältnisse bei *Biophytum*. Die Schwellschicht besteht bei diesen Samen aber nur aus einer einzigen Zellage.

Quetschmechanismen, freilich etwas anderer Art, finden wir ferner noch bei Lathraea clandestina und Dorstenia contrayerva (Abb. 10, Fig. 7).

Durch Rückstosswirkung werden nach GUTTENBERG (1926) die Früchte von Polygorum virginianum fortgeschossen. Sie sitzen mit kurzen Stielen in ährenförmiger Anordnung um die Hauptachse des Fruchtstandes. Zwischen der Frucht und ihrem Stiel ist eine eingeschnürte Gelenkzone erkennbar, die die Rissstelle bildet. Die Gelenkzone besteht aus grossen Parenchymzellen, die sich in einer zum Fruchtstiel senkrechten Ebene in den Mittellamellen voneinander trennen und gegeneinander verwölben. Es drücken also die Zellkuppen auf der Fruchtseite gegen den Stiel und diejenigen auf der Stielseite gegen die Frucht, ohne dass es zunächst zu einer vollständigen Wölbung der Kuppen kommen kann, weil die Epidermen, die fest verbunden bleiben, dies verhindern. Führt ein leicher Stoss zum Zerreisen der Epidermen, so wird die Wölbung der Parenchymzellen plötzlich vollständig, und die Frucht wird durch den Rückstoss 2 – 3 m weit fortgestossen. Hier liefert

also sogar die Verbreitungseinheit einen Teil der Bewegungsenergie, während sie sich bei den andern Selbststreuern passiv verhält.

Am leistungsfähigsten ist der Spritzmechanismus von der im Mittelmeergebiet heimischen Spritzgurke, Echallium elaterium (Abb. 10, Fig. 5). Die Früchte dieser Pflanze bestehen aus einer derben Wand und einem saftreichen Parenchym. Die Samen sitzen schräg nach oben gerichtet in sechs Längsstreifen an der Innenseite der Fruchtwand. Der Fruchtstiel dringt bis zum Parenchym vor und verschliesst die Frucht wie ein Zapfen, der auf einer Flasche sitzt. Im Parenchym steigert sich der Turgor zur Reifezeit der Samen stark. Er erreicht nach OVERBECK (1930, S. 166) bis 2,5 Atmosphären. Dadurch wird die Fruchtwand und der Ansatz des Fruchtstiels untter Druck gesetzt. Der Fruchtstiel wird schliesslich aus seiner Mündung gestossen, und der Inhalt der Frucht folgt prasselnd nach. Die Samen spritzen bis zu 10 und mehr Meter weit fort.

An der Grenze zwischen lebenden und toten Streuvorrichtungen stehen diejenigen der Arceuthobium-Arten, Arceuthobium oxycedri, eine mistelattige Schmarotzerpflanze des Mittelmeergebietes, hat beerenartige Früchte, die bei ihrer Reife vom Fruchtstiel abgestossen werden. Dann wird das Endokarp mit grosser Gewalt durch die entstandene Bruchfläche aus dem Mesokarp hinausgepresst. Nach den Untersuchungen HEINRICHERS (1915) liegt ein Quetschmechanismus vor, der sich aber von den andern dadurch unterscheidet, dass nicht Turgor, sondern Schleimbildung im Innern der Frucht den Spannungszustand herbeiführt. Die Quellungsenergie des Schleims bleibt auch in der "toten" Frucht erhalten. Das Ausquetschen der Samen (Endokarpien) kann deshalb auch an ihr noch beobachtet werden. In mancher Hinsicht besteht ferner eine gewisse Aehnlichkeit mit dem Spritzmechanismus von Echallium.

b) Austrocknungsstreuer

In toten Geweben entstehen Spannungen, die als Kräfte für die Ausstreuung der Samen dienen, hauptsächlich durch ungleiche Austrocknung der Zellen oder Zellmembranen. Die Austrocknung wird durch das Sättigungsdefizit der Atmosphäre, das zu bestimmten Tageszeiten, namentlich bei

grellem Sonnenschein, besonders gross ist, hervorgerufen. Sie wird bei vielen Früchten durch dunkle, lichtabsorbierende Farben erleichtert. Völlig schwarz sind z. B. die bei Austrocknung explosionsartig aufspringenden und sich einrollenden Früchte von Vicia sepium, Lathyrus pratensis, Cytisus scoparius und Geranium bohemicum.

Die trockenen Hülsen von Cytisus, Vicia, Lathyrus, Lotus (Abb. 10, Fig. 1) und andern Leguminosen springen plötzlich und mit grosser Gewalt auf. Darnach rollen sich die Klappen blitzschnell schraubig ein. Die Samen werden durch diese Bewegungen in verschiedener Richtung rasch vorwärts bewegt und schliesslich, weil die Bewegungen der Gewebe sich als Folge der Torsion selbst plötzlich bremsen, heftig abgestossen. Die genaue anatomische Untersuchung der Hülsenklappen durch GUTTENBERG (1926) ergab eine starke, aus dickwandigen Zellen bestehende äussere Epidermis. Auf diese folgt bei einigen Arten noch ein dünnes Hypoderm und darauf eine aus einer grossen Zahl von Faserlagen bestehende Hartschicht. An die Hartschicht schliesst sich die innere Epidermis an, die nur schwach ausgebildet ist. Die Zellen der äussern Epidermis allein oder in Verbindung mit einigen ihr anliegenden Zellagen (Caragana arborescens) verlaufen so steil-schräg, dass sie die Fasern der Hartschicht unter 90 Grad kreuzen. Die Epidermis besteht aus langgestreckten Zellen mit mächtig verdickten, deutlich tangential geschichteten Aussen- und Innenwänden. Die innere Hartschicht setzt sich zusammen aus einer grösseren Zahl von Faserlagen, deren prosenchymatische, stark verdickten und getüpfelten Elemente gleichsinnig schräg verlaufen, so dass sie mit der Fruchtachse einen Winkel von 30 bis 40 Grad einschliessen. Die innersten Fasern haben ausgesprochene Längsstruktur mit sehr steil schiefen Tüpfeln; die äussern lassen aus den schrägen oder fast quer orientierten Tüpfeln erkennen, dass sie sich mehr der Querstruktur nähern. Es herrscht also schon in der Hartschicht ein Krümmungsbestreben, da ihre innere Seite sich bei der Austrocknung in der Querrichtung stärker verkürzt als ihre äussere. Dass es nicht zu einer Querkrümmung, sondern zu einer schiefen Krümmung und damit zur Einrollung kommt, hat seine Ursache darin, dass die Fasern schräg verlaufen und dadurch die zur Faserrichtung senkrechte Krümmungsachse in gleichem Winkel schräg zur Fruchtachse liegt. Sowohl die Fasern der Hartschicht, als auch die Epidermiszellen, kontrahieren sich beim Austrocknen am meisten in querer Richtung. Die Kontraktion ist nun in der Hartschicht viel energischer, weil hier viel mehr Wände auftreten. Das Krümmungsbestreben der Epidermis (und des Hypoderms) verläuft senkrecht dazu und führt zu einer Abflachung der Klappe, die die Gesamtkrümmung erleichtert. Die Hartschicht funktioniert somit als Bewegungsgewebe und die äussere Epidermis als Widerstandsschicht.

Weniger auffällig als bei den genannten Pflanzen ist das Aufdrehen der Kapselklappen bei den Euphorbiaceen. Nach HILDEBRAND (1873) besteht der Streumechanismus bei vielen Euphorbiaceen und Rutaceen hauptsächlich darin, dass durch das Aufreissen der Kapselklappen von oben her, das beim Abspringen der Früchte eintritt, ein Druck auf die von ihnen bis dahin eingeschlossenen Samen von unten her ausgeübt wird. Die Früchte (Kokken) springen vom Mittelsäulchen ab, weil die Kapseln sich in der Längsachse verkürzen und dadurch heftig gegen dasselbe drücken.

Auch die Früchte von Buxus sempervirens schiessen die Samen beim Aufspringen fort, und die grossen 25fächerigen Früchte des tropisch-amerikanischen Sandbüchsenbaumes (Hura crepitans) zerspringen sogar mit starkem Geräusch.

Bei manchen Viola-Arten, so bei Viola tricolor (Abb. 10, Fig. 3), V. eliator, V. silvestris und V. canina, spaltet sich die Fruchtkapsel zunächst in drei kahnförmige Fächer auf, die eine waagrechte Lage einnehmen. Dabei strecken sich die vorher gekrümmten Klappen in der Längsrichtung. Gleich darauf nähern sie sich einander, schlagen ihre Breitseiten einwärts, bis ihr Rand stark auf den untern Teil der aufrecht stehenden Samen drückt und diese dadurch fortschnippt. Die Auswärtsbewegung der drei Kapselklappen kommt nach STEINBRINK (1883) durch Querkontraktion der äussern, horizontal verlaufenden Fasern der Kapselflügel zustande. Als Widerlager dienen ein mächtig entwickeltes Kollenchym an der Placenta, dessen Zellelemente senkrecht verlaufen und stark quellbar sind und die senkrechten Zellen der Innenepidermis an den Rissstellen der Klappen. Der Zusammenschluss der Klappenflügel erfolgt unter Wirkung einer starken Querkontraktion des Kollenchyms, wobei die Radialreihen durch ihre gleichsinnige Querkontraktion mitwirken.

Bei den durch Längsriss aufspringenden Kapseln von Montia rollen sich die Bänder nach innen gegen die Mittellinie ein, greifen unter die Samen und schnellen diese mit grosser Wucht davon. Nach ULBRICH (1928) haben auch Claytonia sibirica, Calandrinia menziesii und Polycarpon tetraphyllum in gleicher Weise funktionierende Streuvorrichtungen für ihre Samen.

Die Geranium-, Erodium- und Pelargonium-Arten wiederum verbreiten ihre Samen mittels wirksamen Schleudervorrichtungen. Die Früchte von Geranium sanguineum, G. colombinum, G. dissectum, G. silvaticum (Abb. 10, Fig. 2) u. a. spalten sich bei der Reife in fünf Teilfrüchte auf. Diese lösen sich dann von der Mittelachse der Frucht los, und zwar nur im untern Teil des samenhaltigen Fruchtfachs, das sich waagrecht stellt. Das Herausfallen der Samen wird zunächst durch einen Dornfortsatz, der am Grunde der Fruchtwandung entspringt, verhindert. Mit fortschreitender Reife und Austrocknung lösen sich dann die Grannen der Teilfrüchte plötzlich auch von der Mittelsäule los, rollen sich nach aussen uhrfederartig ein, bleiben aber an der Grannenspitze noch mit ihr verbunden. Bei der Einrollung der Grannen entstehen so Zentrifugalkräfte, die das Fortschleudern der Samen bewirken.

Aehnlich verläuft der Schleudervorgang bei den *Geranium*-Arten, deren Verbreitungseinheiten aus den Samen und den Fruchtklappen bestehen, oder die Teilfrüchte mitsamt den Grannen abspringen (siehe S. 17), wie dies auch bei *Erodium*- und *Pelargonium*-Arten der Fall ist.

c) Inbetriebsetzung und Wirksamkeit der Streuvorrichtungen

Die Verbreitungseinheiten der meisten Selbststreuer haben Kugel- oder Stromlinienform. Sie gleichen somit Geschossen, die dank ihrer Gestalt nur einen geringen Luftwiderstand zu überwinden haben. Bei dem mit einem Turgormechanismus ausgerüsteten Kleinblütigen Springkraut (Impatiens parviflora) habe ich beobachtet, dass das Ausstreuen der Samen zu jeder Tages- und Nachtzeit erfolgen kann. Damit stimmt die Feststellung GUTTENBERGS (1926, S. 139) überein, wonach die Gestalt und Orientierung der Zellen der aktiven Gewebe eine Gestaltsveränderung derselben ohne Wasser-

aufnahme ermöglicht, da das Gesamtvolumen sich nicht zu ändern braucht. Eine Pflanze, die ihre Samen bei Benetzung austreut ist von STOPP (1958) beschrieben worden. Es ist dies die südafrikanische Acanthaceae Barleria lichtensteiniana. Wenn ihre Fruchtstände nass werden, richten sich zunächst deren Hoch- und Tragblätter auf und spreizen auseinander. Gelangt nun auch noch Wasser auf die blossgelegten Kapseln, so wird dasselbe von den Mittellamellen des Trennungsgewebes gierig aufgesogen und das Zellgefüge an der Dehiszenzstelle immer mehr gelockert. Schliesslich reichen die Spannungskräfte der als Hebel wirkenden Kapselbasen aus, um die Kapsel zur Explosion zu bringen. Die Schleuderdistanzen sind jedoch gering. Möglicherweise dürfte Cyclanthera explodens ihre Samen auch bei feuchter Witterung ausstreuen, weil bei ihr die Schwellgewebe Wasser aufnehmen müssen, um turgeszent zu werden.

Für die Ingangsetzung der Austrocknungsmechanismen sind die Tageszeiten ungleich günstig. Mit dem Höhersteigen der Sonne nimmt an hellen Tagen die Austrocknungsintensität der Atmosphäre beständig zu und erreicht nach raschem Anstieg bis zum Mittag in den ersten Nachmittagsstunden den Höhepunkt. Von 16 Uhr an nimmt sie infolge Zunahme der Feuchtigkeit der Atmosphäre wieder ab. Früchte von Viola arvensis streuten nach eigenen Beobachtungen im Monat August von morgens 9 Uhr bis abends 19 Uhr Samen aus, wenn sie in trockenem Zustand von Sonnenstrahlen getroffen wurden.

In Schattenlagen von Chur vermögen vielfach Früchte von Euphorbia lathyris ihre mit einem Elaiosom ausgestatteten Samen überhaupt nicht auszustreuen. Infolgedessen kann an solchen Orten auch kein Samentransport durch Ameisen (siehe S.107) erfolgen.

Für die Feststellung der Streuweiten hat SCHNEIDER (1935) ein gut brauchbares Verfahren angewandt. Er hat die samenstreuenden Pflanzen eingetopft, auf ebenem Erdboden aufgestellt und durch Belegen desselben mit rauhen Tüchern ein elastisches Springen und Rollen der ausgestreuten Samen vermieden. Um dann eine genaue Uebersicht über die Verteilung der Aufschläge zu erhalten, teilte er die gesamte Fläche in Kreisringe von 25 cm Breite ein.

Wir haben bei Austrocknungsstreuern gute Ergebnisse erhalten, indem

wir Fruchtstände mit völlig ausgereiften Früchten abschnitten und in Flaschen, bei sonst gleicher Versuchsanordnung wie SCHNEIDER, aufstellten.

Es wurden bis heute folgende maximale Streuweiten ermittelt:

1. Saftdruckstreuer

	m	! = eigene Beobachtungen
Cardamine parviflora	1,2	HEJNY (1960)
- hirsuta	1,4	SCHNEIDER (1935)
- amara	1,7	SCHNEIDER (1935)
- impatiens	2,0	SCHNEIDER (1935)
- chenopodiifolia	2,2	SCHNEIDER (1935)
- pratensis	2,4	SCHNEIDER (1935)
Pilea spruceana	1,7	MOSEBACH (1932)
Pteroneurum graecum	2,1	SCHNEIDER (1935)
Oxalis europaea	2,2	!
- acetosella	2,3	MOOR (1940)
Corydalis sibirica	2,2	SCHNEIDER (1935)
Cyclanthera explodens	3,0	ULBRICH (1928)
Impatiens parviflora	3,4	SCHNEIDER (1935)
- roylei	6,3	RIDLEY (1930)
Lathraea clandestina	4,0	GUTTENBERG (1926)
Dorstenia contrayerva	5,0	OVERBECK (1924)
Ecballium elaterium	12,7	OVERBECK (1930)
Austrocknungsst	re	u e r
Geranium colombinum	1,5	KERNER (1898)
- rotundifolium	1,8	MüLLER-SCHNEIDER (1933)

2.

Geranium colombinum	1,5	KERNER (1898)
- rotundifolium	1,8	MüLLER-SCHNEIDER (1933)
- pyrenaicum	2,1	!
- palustre	2,5	KERNER (1898)
- silvaticum	2,7	:
- robertianum	6,0	RIDLEY (1930)
Montia fontana	2,0	ULBRICH (1928)
Mercurialis annua	2,9	!
- perennis	4,0	MURKERJE (Zit.nach
Euphorbia helioscopia	2,0	RIDLEY, 1930)
Alstroemeria psittacina	4,0	STAPF in ULBRICH (1928)
Viola arvensis	2,4	STAPF (1887)
- silvestris	4,1	:
- riviniana	4,6	ULBRICH (1928 und !)
- elatior	4,6	GROSS (1926) Zit. nach
- canina	4,7	ULBRICH (1928)
Lupinus digitatus	7,0	KERNER (1898)
Wistaria sinensis	9,0	GAMS in HEGI (IV. 3)
Acanthus mollis	9,5	KERNER (1898)
Hura crepitans	14,0	KERNER (1898)
Bauhinia purpurea	15,0	KERNER (1898)

KERNER (1881, S. 776) versuchte zu beweisen, dass die Entfernungen, auf welche die Samen ausgetreut werden, mit dem Gewicht derselben zunehmen. Die Zahl der bekannten Streudistanzen ist aber noch zu klein, um auf Grund dieser schon die Aufstellung eines derartigen Gesetzes verantworten zu können. Die Verschiedenheit der Streumechanismen spricht sogar dagegen.

In der freien Natur steht den Pflanzen in den wenigsten Fällen ein freies Streufeld zur Verfügung. Häufig tritt die Nachbarvegetation der Samenstreuung als grosses Hindernis entgegen. Wenn trotz diesen Umständen eine günstige Streuwirkung erzielt werden soll, muss die Flugbahn der Samen nach Möglichkeit über die Krautschicht zu liegen kommen. Mit Hilfe einer ebenfalls von SCHNEIDER (1935) angegebenen Versuchsanordnung lässt sich leicht nachweisen, dass bei vielen Pflanzen die Samen schon in geringer Entfernung von der Mutterpflanze grosse Höhen erreichen können und so einen Anstoss mit der Nachbarvegetation zu vermeiden mögen. Um eine eingetopfte Pflanze wird in spiraler Anordnung ein mit Schmierseife bestrichener Blechschirm aufgebaut. Die Unterkante des Schirmes wird am einen Ende 10 - 20 cm, am andern 1 m weit von der Pflanze entfernt. Durch das Aufstellen des Schirms in einer Spirale sind alle Zwischenentfernungen gegeben. Weil die Samen an der Schmierseife kleben bleiben, kann man die Höhe der Flugbahn an der betreffenden Stelle ablesen. In der Entfernung von 15 cm wurden von SCHNEIDER bei Cardamine hirsuta Ueberhöhungen über die Früchte von 50 cm gemessen.

Ueber die Abschusswinkel gibt eine andere Versuchsanordnung SCHNEIDERS Auskunft. Eine auf dem Boden stehende Pflanze wird nach zwei Seiten durch etwa 40 cm hohe, mit einem Haftmittel bestrichene Kartons abgeschirmt. Der eine Schirm wird in einer geringen Entfernung direkt auf den Boden gestellt, der gegenüber stehende 35 bis 50 cm darüber angebracht.

SCHNEIDER fand, dass bei Cardamine hirsuta die Samen unter verschiedenen Winkeln abgeschleudert werden. Steilschüsse können entstehen, wenn die Samen infolge Klebens an den Fruchtklappen einen Impuls nach oben erhalten. Flachschüsse, wenn die Samen allein durch die Wirkung des saugenden Luftstromes ausgetreut werden.

Die mit Klebstreifen ausgestatteten Teilfrüchte von Geranium robertianum und G. purpureum haften nach dem Abschleudern manchmal an Blättern von
in ihrer Nähe stehenden Sträuchern oder andern Gegenständen. Dadurch ist
es oft möglich an Ort und Stelle festzustellen wie hoch sie emporgeschleudert werden können. G. purpureum erreicht in Montpellier Höhen von bis zu
2 m.

Bei Oxalis acetosella, wo die Samen durch seitliche Spalten aus der Frucht austreten, wird dieselbe durch postflorale Verlängerung und Straffung des Fruchtstiels über das Blätterdach der Krautschicht hinausgehoben.

C. Kriecher (Herpochoren) 1

Die Verbreitungseinheiten vieler Gramineen, wie Avena pubescens, Aira, Deschampsia, Corynephorus, Triticum, Hordeum und Aegilops (Abb. 11), ferner von Pulsatilla, Trifolium stellatum, Scabiosa columbaria, Centaurea cyanus und Verwandten sind mit hygroskopischen Haaren oder Grannen ausgestattet und können deshalb bei Feuchtigkeitsveränderungen kriechende Bewegungen ausführen. Die Fortbewegung kommt dadurch zustande, dass bei der Austrocknung die Bewegungsorgane spreizen oder sich knieförmig aufbiegen und die Verbreitungseinheit in ihrer Längsachse verkürzen, sich bei Befeuchtung aber wieder strecken. Widerhaare oder Widerhaken verhindern ein Zurückgleiten in die frühere Lage, so dass der schwere, samenführende Teil der Verbreitungseinheit vorwärts geschoben wird. Häufige Feuchtigkeitswechsel bedingen eine ständige Fortbewegung derartiger Verbreitungseinheiten, bis sie durch ein unüberwindliches Hindernis aufgehalten werden oder in eine Bodenspalte einschlüpfen.

Zur kriechenden Fortbewegung kommt es gelegentlich auch bei den mit einem Bohrapparat ausgestatteten Verbreitungseinheiten von Erodium-, Sti-pa- und Aristida-Arten. Ihre Grannen sind knieförmig gebogen und unterhalb

l herpo = ich krieche




Abb. 11. Kriecher. Verbreitungseinheit von Aegilops ovata (nat. Grösse), daneben ein Stück einer Granne stark vergrössert.

des Knies schraubig gedreht. Sie drehen sich je nach dem Feuchtigkeitszustande bald auf, bald zu und werden dadurch länger oder kürzer. Findet
das Grannenende einen Widerstand, so wird auch hier der samenführende Teil
bei der Streckung der Verbreitungseinheit als Folge der Wasseraufnahme ein
Stück vorwärts geschoben und das Grannenende bei der nächsten Aufrollung
nachgezogen, weil Widerhaare nur eine Kriechbewegung in der Richtung der
Fruchtbasis gestatten. Die Aehrchen von Avena sterilis, die als Ganzes
abfallen, führen der schraubigen Drehungen ihrer Grannen wegen bei Feuchtigkeitswechsel sogar regelrechte Hüpfbewegungen aus. Ein solches Fruchtährchen hat zwei mit starker, knieförmiger Granne besetzte Spelzen. Bei
Aenderungen des Feuchtigkeitsgrades drehen sich die beiden Grannen in entgegengesetzter Richtung, kreuzen sich, drücken aufeinander und gleiten
schliesslich mit einem heftigen Ruck voneinander ab, was ein Emporspringen

der ganzen Verbreitungseinheit zur Folge hat.

Die Wege, die mit Hilfe hygroskopischer Organe von den Verbreitungseinheiten zurückgelegt werden, sind stets kurz. Die Kriechbewegungen der Verbreitungseinheiten sind daher meist nur ein Manövrieren am Keimplatz. Weil sie aber die Samen in eine für die Keimung günstige Lage bringen können, sind sie doch von Bedeutung.

2. Pflanzen, die durch die Schwerkraft wandern (Barochoren)

Ein Teil der Pflanzen behält die Verbreitungseinheiten in der Regel so lange auf sich, bis sie durch den Wind, das Wasser oder ein Lebewesen entfernt werden; die Barochoren jedoch lassen sie gleich nach der Reife zu Boden fallen.

Zu ihnen gehören viele Bäume mit auffallend schweren Verbreitungseinheiten, z. B. die Rosskastanie, die Eichen, die Walnuss und die Buche, sowie die meisten Vertreter der Mangrovevegetation.

Bei den Rosskastanien (Aesculus hippocastanum) fallen die teilweise geöffneten, schützenden Fruchtschalen vielfach mit dem Samen ab und öffnen sich dann erst beim Aufschlagen auf den Boden ganz. Sie bewahren so die Samen vor dem Zerschmettertwerden. Die elastischen Samen springen nach dem Aufschlag noch auf und rollen weg. In geneigtem Gelände können sie dadurch beträchtliche Strecken zurücklegen und die Ansiedlung der Art hangabwärts bewirken. Die Fruchtbecher der Buche (Fagus silvatica) öffnen sich erdwärts und lassen die dreikantigen, glatten Früchte hinausgleiten. Oft fallen aber auch die Fruchtbecher mitsamt den Früchten ab. Das Hypokotyl und die Wurzel der Keimlinge der Mangrovepflanzen Rhizophora, Bruguiera, Kandelia (Abb. 12) usw. nehmen mit der Zeit ganz ungewohnte Ausmasse an. (siehe Seite 14.) Sie werden z. B. bei Rhizophora mangle zusammen bis zu 50 cm lang, trotzdem die Frucht nur so gross wie eine Haselnuss ist. Die Keimlinge hängen schliesslich gleich Keulen von den Zweigen herab. Der grösste Querdurchmesser der Wurzel liegt dicht hinter

deren scharf zugespitztem Ende. Löst sich ein Keimling von der Mutterpflanze ab, so fällt er dank seiner Stromlinienform ohne wesentliche Fallverzögerung zur Erde und bohrt sich bei Ebbe tief in den Schlamm ein. Die
abgefallenen Keimpflanzen bewurzeln sich sofort und sind schon nach wenigen Stunden fest im Boden verankert. Nur eine geringe Grösse erreichen
bis zum Abfallen die Keimlinge von Avicennia officinalis (Verbenaceae),
die auch zu den Pflanzen der Mangrove gehört. Ihr Hypokotyl und die Keimblätter sind aber mit steifen Haaren ausgestattet, die eine Verankerung
im Schlamm ermöglichen und damit ebenfalls ungehindertes Weiterwachsen
sichern.



Abb. 12. Frucht von Kandelia rhedii. (Nach SCHIMPER 1898 2/3 nat. Grösse).

In Mitteleuropa treffen wir unter den Frühblühern viele barochore Arten an. Nonnea lutea und Symphytum officinale z. B. reifen ihre Früchte in hängenden Kelchen, aus denen sie direkt ausfallen. Bei Luzula pilosa, Ornithogalum umbellatum, Scilla bifolia (Abb. 13), Crocus albiflorus, Galanthus nivalis, Leucoium vernum, Narcisus poeticus, Asarum europaeum, Hepatica triloba und Pulmonaria officinalis verholzen die Stengel oder die Fruchtstiele nach dem Verblühen nicht, wie das sonst bei den meisten Kräutern und Stauden der Fall ist, verlängern sich aber postfloral noch

stark. Schliesslich vermögen sie den ständig schwerer werdenden Fruchtstand, der bei einigen Pflanzen aus einer einzigen Kapsel besteht, nicht mehr zu tragen, neigen zur Erde oder sinken gar um. Die Stengel von Crocus albiflorus und Scilla bifolia sterben zudem von hinten her ab. Wenn dann die Samenbehälter sich öffnen, rollen die Samen heraus, weil keinerlei Arretierungsvorrichtungen vorhanden sind. Manchmal werden sie sogar durch die Bewegungen der schrumpfenden Kapselwände hinausgestossen. Bei Asarum europaeum hat MOOR (1940, S. 93) beobachtet, dass bei trockener Witterung die Samen frei werden, indem die ganze Fruchtwand innert zwei bis drei Tagen zu Staub zerfällt.




Abb. 13. Scilla bifolia. Der schlaffe Stengel und die reifende Frucht sind auf den Boden gesunken. Ameisen holen die mit einem Oelkörper ausgestatteten Samen aus der sich öffnenden Frucht ab. (nat.Grösse).

Die viviparen Gräser Deschampsia litoralis var. rhenana, Poa bulbosa und Poa alpina f. vivipara setzen auf dieselbe Weise ihre an Stelle von Samen gebildeten Laubsprosse auf die Erde ab. Man kann oft beobachten, wie ihre Rispen sich unter dem Gewicht der Pflänzchen zur Erde neigen, besonders, wenn noch Regen oder Tau sie benetzt. Nach WEINZIERL (SCHRÖTER 1926) kann der abgebogene Halm von Poa alpina f. vivipara sich sogar

wieder aufrichten, wenn durch einen Gewitterregen ein Teil der Pflänzchen abgelöst wurde, und später durch das zunehmende Gewicht der verbliebenen Pflänzchen erneut zur Erde gebogen werden.

Die Barochorie sichert im allgemeinen nur die Ansiedlung der jungen Generation in der nächsten Nähe der Mutterpflanze und wäre daher für die Erhaltung und Ausbreitung der Art allein ungenügend. In den meisten Fällen ist sie denn auch nur die Vorbereitung für die Verbreitung der Samen durch fliessendes Wasser oder Bodentiere, die die Verbreitungseinheiten auf den Mutterpflanzen nicht erreichen könnten. Oft tritt sie auch als Notbehelf in Erscheinung, nämlich dann, wenn die üblichen Verbreitungsagentien versagen.

3. Windwanderer (Anemochoren)

Am grössten ist wohl die Zahl der Arten, deren Verbreitungseinheiten durch den Wind verbreitet werden. VOGLER (1901, S. 61) fand unter den eigentlichen Alpenpflanzen 59,5% Anemochoren und MüLLER-SCHNEIDER (1933, S. 461) unter der Garigueflora Südfrankreichs 51,1%. Die Häufigkeit der Windverbreitung ist verständlich, wenn wir bedenken, dass nahezu überall, wo Pflanzen wachsen, zu jeder Jahreszeit und in allen Richtungen des Raumes Luftbewegungen von verschiedenster Stärke erfolgen können. Ganz besonders wichtig für die Verbreitung der Verbreitungseinheiten sind die horizontalen Strömungen, aber auch den aufsteigenden Luftströmungen und den Wirbelbildungen, die in der Meteorologie als Turbulenz bezeichnet werden, kommt grosse Bedeutung zu. Die Horizontalströmungen herrschen in den meisten Gegenden in einer bestimmten Richtung vor. Im schweizerischen Mittelland ist es z. B. der Westwind, in Südfrankreich der aus Norden kommende Mistral, der vorherrscht. In weiten Gebieten Süd- und Ostasiens bestimmen die Monsune die Ausbreitungsrichtung der an Windverbreitung angepassten Pflanzen. Für die Tropen wiederum sind die Passate wichtig. Zudem hat jede grössere Landschaft ihre Lokalwinde.

Die Windstärke steigt mit der Erhebung vom Boden beträchtlich an. Nach HELLMANN (1915) betrug die mittlere Jahresgeschwindigkeit des Windes auf offenem Feld in Nauen bei 2 m Höhe 3,29 m/sek, bei 16 m 4,86 m/sek und bei 32 m 5,54 m/sek. Die windgepeitschten Küsten Nordirlands verzeichnen 7,4 m/sek, ungefähr soviel wie die Alpengipfel: Säntis (2440 m) 7,7 m/ sek, Sonnblick (3100 m) 7,5 m/sek. Der Pikes Peak (4308 m) registrierte 9,2 m/sek, der freistehende Mount Washington (1950 m) gar 15 m/sek im Jahresmittel. Von furchtbarer Gewalt sind die extremen Winde, die Orkane. Sie erreichen beispielsweise am Sonnblick Stundenmittel von 38,1 m/sek. Am Säntis verzeichnete der Windmesser am 27. Januar 1890 ein Tagesmittel von 32,5 m/sek; zwischen 13 und 14 Uhr betrug die Windgeschwindigkeit 46,1 m/sek. Ueber den Antillen erreichten Wirbelstürme sogar Geschwindigkeiten von über 55 m/sek. Derartige Windstärken sind imstande, ganze Baumstämme zu knicken oder zu entwurzeln, sowie Steinplatten vom gefrorenen Boden wegzureissen und in die Luft zu wirbeln (BRAUN-BLANQUET 1913, S. 53); denn mit der Zunahme der Geschwindigkeit steigt auch die Stosskraft des Windes. Bei einer Windgeschwindigkeit von 7 m/sek beträgt der Winddruck 6 kg pro m², bei 11 m/sek schon 15,2 kg und bei Höchstgeschwindigkeiten sogar bis 250 kg pro m². Allerdings weht der Wind nie gleichmässig. Die Windstärke ist vielmehr kurzen periodischen Schwankungen unterworfen. Sie kann sich innerhalb einer Minute sogar um mehr als 20 m/sek ändern.

Die Turbulenz ist dynamisch oder thermisch bedingt. Die dynamische Turbulenz verdankt ihre Enstehung der Reibung der horizontal bewegten Luftmassen an den zahllosen Hindernissen der Erdoberfläche; die thermische wird vor allem durch die Sonneneinstrahlung, die eine starke Erwärmung der untersten Luftschichten vom Boden aus zur Folge hat, hervorgerufen. Die Stärke der Durchwirblung nimmt ebenfalls mit der Höhe über dem Erdboden zu. SCHMIDT (1918, S. 326) entnehmen wir hierüber folgende Angaben:

Abstand über dem Erdboden 0,05 0,4 1,0 2 6 10 20 30 50 m Grösse des Austausches 0,09 0,48 1,0 1,7 4,2 6,3 11,0 15,2 22,9

Geschwindigkeiten von mehr als 1 m/sek werden erst in Höhen von 60 - 200 m erreicht. Gelegentlich konnten Aufwindgeschwindigkeiten bis zu

15 m/sek festgestellt werden. Unter Cumuluswolken reichen die Aufwinde bis zu 3000 m Höhe hinauf. Sie sind sogar bei 6000 m noch festgestellt worden. Um die Mittagszeit ist die Turbulenz im allgemeinen grösser als in der Nacht. Sie hängt ferner weitgehend von der Windgeschwindigkeit ab. Bei halb so starkem Wind sinkt sie annähernd auf die Hälfte.

Ausserdem spielt die Feuchtigkeit der Atmosphäre für den Transport durch den Wind eine wichtige Rolle. Trockenes Wetter erleichtert ihn wesentlich. Es kommt vor, dass bei Wirbelstürmen, sogenannten Tromben, selbst verhältnismässig schwere Gegenstände in grosse Höhen emporgetragen werden. Zum mindesten aber können leichte Körper, oder solche mit grossem Formwiderstand, die in ruhiger Luft eine geringe Sinkgeschwindigkeit besitzen, dank der Turbulenz hoch in die Lufthülle hinaufverfrachtet werden und sich in den Strömungen der freien Atmosphäre längere Zeit schwebend erhalten.

Die Verbreitung von Verbreitungseinheiten durch Luftströmungen wird durch Herabsetzung des spezifischen Gewichtes derselben und durch Vorrichtungen, die den Luftwiderstand erhöhen, erreicht. Das spezifische Gewicht wird durch lufterfüllte Hohlräume stark herabgesetzt, bleibt aber stets viel grösser als dasjenige der Luft. Der Luftwiderstand kann durch Oberflächenvergrösserung stark erhöht werden. Er hängt, wie folgende Zusammenstellung zeigt, aber auch von der Form der Körper ab.

Körperform		twiderstand Flächeneinheit		
Scheibe		1,0		
Kugel		0,4		
Halbkugel	a) in der Gegenwindrichtung hohlb) umgekehrt wie a	1,3 0,35		
Kegel	a) Spitze der Windrichtung entgegenb) umgekehrt wie a	0,6 0,2		
Stromlinienkörper				
	a) Spitze dem Wind zugekehrtb) umgekehrt wie a	0,2 0,04		

Die Scheibe und die hohle Halbkugel bewirken die grössten Luftwiderstände. Noch stärkeren Luftwiderstand erzeugen sogenannte Windfänge, Hohlräume, die bei der einströmenden Luft starke Wirbelbildung bewirken.

Die Verschiedenheit der Pflanzen in ihrer Gestalt und in ihren Lebensverhältnissen hat zur Folge, dass die Anpassungen an die Windverbreitung bei den einzelnen Arten oft stark voneinander abweichen. Während von vielen Pflanzen die Verbreitungseinheiten direkt vom Winde erfasst und frei durch den Luftraum getragen werden können, gibt es andere, deren Verbreitungseinheiten nur während kurzen Intervallen emporgehoben und daher meist nur über den Boden gerollt oder geschoben werden. Ferner besitzen manche Pflanzen ballistische Mechanismen, die durch Winddruckschwankungen in Tätigkeit gesetzt werden und dabei die Verbreitungseinheiten ausstreuen. Diesen Feststellungen entsprechend gruppieren wir die anemochoren Arten in Flieger (Meteorochoren)¹, Bodenläufer (Chamaechoren)² und Windstreuer (Boleochoren)³.

Im allgemeinen werden nur Samen, also keine vegetativen Verbreitungseinheiten, durch den Wind verbreitet.

A. Flieger (Meteorochoren)

Das Fliegen der Verbreitungseinheiten wird durch Vorrichtungen möglich, die die Sinkgeschwindigkeit im freien Luftraum erheblich verlangsamen. Sie bewirken oft auch, dass sie mit Aufwinden in Luftschichten hoch
über der Mutterpflanze aufsteigen können. Der Flugapparat geht vielfach
aus der Samenhaut hervor, häufiger jedoch aus Teilen der Frucht und der
Blütenhülle. Auch Hochblätter werden im Hinblick auf die Samenverbreitung
zu Flugorganen umgebildet. Dem Bau der Flugapparate selbst liegt bald das
Ballon-, bald das Federball-, bald das Schirm- oder das Flügelprinzip zugrunde.

¹ meteoros = in der Luft befindlich

² chamai = am Boden

³ bol = werfen

a) Ballonflieger (Cystometeorochoren) 1

Körper, die dank ihres geringen spezifischen Gewichtes genügend Auftrieb erhalten, um in höhere Luftschichten aufzusteigen, kommen zwar innerhalb der Pflanzenwelt nicht vor. Doch gibt es zahlreiche Arten, deren Verbreitungseinheiten lufterfüllte Räume enthalten, die das spezifische Gewicht stark herabsetzen. In Verbindung mit dem Prinzip einer grossen Oberfläche, kommen sogar Verbreitungseinheiten zustande, deren Fallgeschwindigkeiten wenig über denjenigen der grössten Wolkenteilchen, die (nach freundlicher schriftlicher Mitteilung von Dr. J. HäFELIN, Zürich) 14 cm/sek beträgt, liegen.

Als Ballonflieger betrachten wir beispielsweise die Verbreitungseinheiten der Baumwollarten (Gossypium) (Abb. 14, Fig. 3) und des Kapokbaumes (Ceiba pentandra), deren Samen mit einem allseitigen Haarkleid ausgestattet sind. Ihre Haare erreichen Längen bis zu 5 cm und schliessen infolge ihrer Dichtigkeit kleine Lufträume ein. Zudem sind beim Kapok auch die Samenhaare zum Teil mit Luft gefüllt. Bei Trockenheit spreizen die Haare in den reifen Kapseln auseinander und heben dadurch die Samen heraus, so dass der Wind sie erfassen und forttragen kann. Käufliche Samen mit 2,2 cm langen Haaren von Gossypium sanken in ruhiger Luft mit einer Geschwindigkeit von 2 m/sek.

Aehnliche, wenn auch weniger wirksame Haarhüllen, besitzen z. B. noch die Schliessfrüchtchen von Anemone hortensis und A. coronaria, beides Pflanzen der Mittelmeerflora.

Bei den Samen der meisten Orchideen (Abb. 14, Fig. 11), Burmanniaceen, vielen Saxifragaceen, Droseraceen (Abb. 14, Fig. 12), Nepenthaceen,
Gesneriaceen, Pyrolaceen, Ericaceen und Diapensiaceen, sind die Testa
oder deren Verlängerungen blasig aufgetrieben. Die Samen enthalten meist
keine Reservestoffe und nur einen reduzierten Embryo. Sie sind deshalb
auch sehr klein und ausserordentlich leicht. So wiegen diejenigen von

¹ Cyste = Blase

Stanhopea oculata 0,003 mg, Goodyera repens 0,002 mg und von Gymnadenia conopea 0,008 mg.

Auf Grund von Angaben BURGEFFs (1936) errechneten wir folgende Sinkgeschwindigkeiten von Orchideen-Samen:

	m/Sek.	m/Sek	: .
Epipogum nutans	0,02	Liparis loeselii 0,21	
Zeuxine reflexa	0,04	Coralorrhiza trifida 0,21	
Phajus flavus	0,05	Cypripedium calceolus 0,25	,
Angulosa ruckeri	0,12	Orchis latifolia 0,28	3
Coryanthes macrantha	0,14	Gymnadenia conopea 0,31	
Serapias cordigera	0,15	Paphiopedilum charles-	
Epipactis palustris	0,20	worthi 0,43	3

Die Arten mit der geringsten Sinkgeschwindigkeit sind terrestrische Orchideen der Tropen. Die Samen der terrestrischen Orchideen sind überhaupt im allgemeinen flugfähiger als diejenigen der Epiphyten. Manche von ihnen erreichen die Flugfähigkeit des Blütenstaubes von Windblütlern und können schon durch schwache Aufwinde emporgeführt werden. Den Samen der Epiphyten kommt aber der hohe Standort für den Windtransport zustatten.

Die Uebergabe der Samen aus der Kapsel an die Luft erfolgt in der Regel durch seitliche Spalten. Die Samen der erdbewohnenden Orchideen sind nach BURGEFF (1936) in hohem Masse unbenetzbar. Diese Unbenetzbarkeit erleichtert das Austrocknen nach Regenwetter und verhindert das Aneinanderkleben der Samen. Die Kapseln von Epipactis palustris hängen lose an den Stengeln, so dass der Wind sie bewegen und ausschütten kann. Bei den übrigen Orchideen Mitteleuropas stehen sie gewöhnlich steif aufrecht. Dazu sind die meisten xerochas, also nur bei trockenem Wetter offen. Bei den epiphytischen Orchideen der Tropen, wie Angraecum, Vanda, Papilionanthe, Saccolabium wird die Abgabe der Samen an den Wind durch hygroskopische Schleuderhaare, sogenannte Elateren, gefördert. Sie bilden ein Capilitium (Geflecht), das ähnliche Bildungen in den Mooskapseln, ferner im Fruchtkörper mancher Myxomyceten und Gasteromyceten entspricht und beim Austrocknen lebhafte Bewegungen ausführt. Die Elateren lockern die Samenmasse bei Trockenheit auf und befördern sie bei günstigem Flugwetter in die Luft. Bei den brasilianischen Orchideen Wullschlaegelia ulea hat ULE (1896, S. 256) festgestellt, dass die Blütenstiele nach der Befruchtung sich bis zu 10 cm verlängern. Viel stärker noch ist der postflorale Stengelzuwachs bei der Erdorchidee Disa steirsii.

b) Haarschirmflieger (Trichometeorochoren) 1

Häufiger als Pflanzen mit ballonartigen Flugvorrichtungen sind solche, deren Samen durch ein fallschirmähnliches Organ, das als Sinkbremse wirkt, durch die Luft getragen werden. Die Fallschirme der Pflanzen sind allerdings von anderer Konstruktion als diejenigen unserer Flieger. Statt geschlossene, mit Luftklappen versehene Halbkugeln, sind sie ausgebreitete, einfache oder verzweigte Haare in meist pinsel-, feder- oder scheibenförmiger Anordnung und wirken deshalb aerodynamisch wohl etwas anders. Jedenfalls ist neben der Stauwirkung auch die Reibung mit den Luftteilchen an der Verzögerung ihrer Sinkgeschwindigkeit stark beteiligt.

Einige Vertreter der Gesneriaceen mit winzigen Samen besitzen Flugapparate, die nur aus wenigen, aber sehr langen Haaren bestehen. Doch genügt schon der leiseste Lufthauch, um sie wegzutragen. Sie sind nach ULBRICH (1928) die Samen von Aeschynanthes grandiflorus (Trichosporum), einer epiphytisch lebenden Pflanze, aus dem tropischen Himalaya etwa 1 mm lang, linealisch und tragen 3 je 2 cm lange, weisse, seidig glänzende, einfache Haare, von denen 2 am Mikropylende und eines am Chalazaende des Samens entspringen. Die Haare bestehen aus mehreren Reihen langgestreckter Zellen, die an den Querwänden papillenartige Vorsprünge zeigen. Bei einigen Arten wachsen die Vorsprünge zu feinen, einzelligen Haaren aus. Die Flughaare erscheinen dann mehr oder weniger gefiedert. Die Arten der Sektion Haplotrichium besitzen an jedem Ende des Samens sogar nur ein Haar. Oft verhäkeln mehrere Samen mit ihren Flughaaren. Dadurch entstehen kleine Verbände, die in ähnlicher Weise, wie das bei manchen Meeresplanktonorganismen der Fall ist, eine gewisse Schwebefähigkeit besitzen.

Nach VAN DER PIJL (1972) sind auch die Bulbillen des tropischen

¹ trich = Haar

Gonanthus pumilus mit langen, als Flugapparat dienenden Haaren ausgestattet.




Abb. 14. Haar-Schirmflieger. 1. Same von Salix.(2x). 2. Frucht mit Spelzen und Teilstück der Aehrenachse von Phragmites communis. (2x).
3. Same von Gossypium. (nat. Grösse). 4. Frucht mit Pappus von Erigeron alpinus. (2x). 5. Frucht mit Pappus von Leontodon hispidus. (2x). 6. Frucht mit Pappus von Taraxacum officinale. (2x).
7. Frucht von Clematis alpina. (2x). 8. Frucht mit Deckspelze von Stipa joannis. (1 ½ x). 9. Frucht mit Haarschopf von Typha latifolia. (3x). 10. Frucht mit Kelchborsten und Aussenkelch von Scabiosa columbaria. (2x). 11. Same einer Orchis. (20x). 12. Same von Drosera rotundifolia. (20x).

(1. und 9. nach ULBRICH, 1928).

Manche Stipa-, Aristida- und Pulsatilla- Arten, Clematis vitalba, Geum montanum, G. reptans, Dryas octopetala und die Erodium-Arten aus der Sektion Plumosa haben Verbreitungseinheiten, deren Granne oder Griffel in einen langen Federschweif umgebildet ist (Abb. 14, Fig. 7 und 8).

Die Feder ist im Fluge gewöhnlich knie- oder schraubenförmig gebogen, wodurch der Luftwiderstand beim Sinken noch wesentlich erhöht wird.

Die Samen von *Ipomoea glandulifera (Convulvulaceae)* und die Früchte von *Heliocarpus americanus (Tiliaceae)* sind Beispiele für Verbreitungseinheiten, deren Flugapparate aus einem Haarkranz bestehen. Beim Fallen biegt sich derselbe leicht nach oben um.

Pinselartige Haarschöpfe tragen die Samen oder Früchte von Typha (Abb. 14, Fig. 9), Arundo donax, Phragmites communis, Eriophorum, Myricaria germanica, Asclepia-, Vincetoxicum-, Salix- und Populus-Arten (Abb. 14, Fig. 1 und 2). Aehnlich wirken die Kelchborsten und die Aussenkelche der Scabiosen (Abb. 14, Fig. 10). Auch unter den Valerianaceen und Compositen (Abb. 14, Fig. 4 und 5) sind solche Flugapparate anzutreffen. Oft wird wie bei Taraxacum (Abb. 14, Fig. 6) der Haarkranz oder das Haarbüschel von einem mehr oder weniger langen Fussstück getragen, was eine tiefe Schwerpunktslage bedingt und hohe Stabilität der Verbreitungseinheit während des Fluges sichert. Bei Hieracium, Eupatorium, Adenostyles, Leontopodium, Carduus und Crepis besteht der Pappus aus ein oder mehreren Reihen einfacher, glatter oder rauher Haare. Die Pappushaare von Antennaria und Cirsium dagegen sind federig. Dem Bau des Fallschirmes am nächsten




Abb. 15. Pappus vom Wiesenbocksbart (Tragopogon pratensis). (Aufn. CASPAR, 2x).

kommt der Pappus einiger Scorconerinae. Der grosse, ausgebreitet bis 4 cm im Durchmesser messende Pappus von Tragopogon pratensis (Abb. 15) besteht beispielsweise aus einer Reihe federiger Borsten, die durch ineinander gewebte feine Fiederhaare miteinander verflochten sind und wird von einem langen Fussstück getragen. Wie der Pappus von fast allen Valerianaceen und Compositen (Abb. 16) hat er zudem die Fähigkeit, sich in trockenem Zustande auszubreiten und bei Feuchtigkeit zusammenzulegen. Die Fiederhaare besitzen jedoch keine hygroskopischen Eigenschaften, sondern verschieben sich, wenn die Haarstrahlen sich beim Befeuchten zusammenlegen, in den Zwischenräumen derselben gleitend aufeinander. HIRSCH (1901, S. 19) hat bei den Pappusstrahlen von Tussilago die grösste




Abb. 16. Früchte von Huflattich (*Tussilago farfara*) mit bei Trockenheit entfaltetem, nach Benetzung geschlossenem Pappus. (Aufn. CASPAR, 2x).

Feuchtigkeitsempfindlichkeit gefunden. Das Zusammenlegen tritt bei der Befeuchtung schon nach wenigen Minuten ein. Die Bewegung erfolgt dank der Kontraktion polygonaler, kurvenförmig angeordneter Zellen am Grunde der Haare, bei den Cynareen und Inuleen aber durch dynamische Zellen im basalen Teil der Haare selbst.

Bei Carlina acaulis und anderen Cynareen sind auch die Hüllblätter des Körbchens feuchtigkeitsempfindlich und schliessen die Verbreitungs-

einheiten nach Art der xerochastischen Kapseln bei feuchtem Wetter ein.

Die Bereitstellung der Verbreitungseinheiten für den Flug erfolgt durch Spreizbewegungen der Haare bei der Eintrocknung. Sie treten aus dem Behälter heraus und sitzen ihm wie z. B. bei Cirsium (Abb. 17) lose auf. Schon schwache Aufwinde erfassen sie und tragen sie weg.




Abb. 17. Gewöhnliche Kratzdistel (*Cirsium vulgare*). Bereitstellung und Start der Verbreitungseinheiten. (Aufn. W. HARSTRICK-Bavaria; nat. Grösse).

Bei Silybum marianum trocknen die Hüllblätter nach und nach so stark ein, dass sie einen Druck auf die Früchte ausüben, bis diese schliesslich mit einem Ruck aneinander vorübergleiten und ein Stück weit aus der Hülle springen, um vom Windzug erfasst und fortgetragen zu werden. Allerdings ist die Frucht von Silybum schwer und daher die Bremswirkung des Pappus nicht sehr gross beim Sinken.

Wie die Austrocknungstreuer, so stehen also auch die Schirmflieger in enger Beziehung mit der Austrocknungskraft der Atmosphäre. Wenn die Luft an hellen Sommertagen infolge der Einstrahlung sich über dem Boden erwärmt, trocken wird und aufsteigt, führt sie die Verbreitungseinheiten, die ihre Flugapparate ausgebreitet haben, mit in die Höhe, wo sie dann oft in horizontale Luftströmungen gelangen. Sie sind eigentliche Thermikflieger, die wie die Segelflieger den durch die Einstrahlung entstehenden Aufwind abwarten, um in die Höhe zu steigen. Am eindrücklichsten können wir in Mitteleuropa dieses Naturgeschehen beobachten, wenn Ende April und im Mai längs den Seeufern, Flüssen und Bächen die Pappeln und Weiden ihre Samen reifen. Ihre, mit einem Haarschopf ausgestatteten winzigen Samen, treten dann zu Millionen mit sichtbarer Geschwindigkeit aus den infolge Eintrocknung aufspringenden Kapseln aus und werden durch die Luftströmungen davongetragen.



Abb. 18. Huflattich (*Tussilago farfara*) mit zur Zeit der Fruchtreife stark verlängertem Schaft. (Aufn. B.EICHENBERGER). (1/4 nat.Grösse).

Bemerkenswert ist ferner, dass die mit federschweif- oder schirmförmigen Flugvorrichtungen versehenen Verbreitungseinheiten der Frühblüher *Pulsatilla*, *Tussilago*, *Taraxacum*, *Petasites* u. a. durch postflorales Wachstum der Stengel hoch über die Krautschicht hinausgehoben und damit in günstige Windverhältnisse gebracht werden (Abb. 18).

Die Ermittlung der Sinkgeschwindigkeit bei einigen typischen Vertretern der Schirmflieger ergab folgende Ergebnisse:

	m/Sek.		m/Sek.
Eriophorum angustifolium	0,22	Eupatorium cannabinum	0,23
Salix repens	0,16	Cirsium arvense	0,26
Salix aurita	0,19	Inula salicina	0,27
Salix pentandra	0,24	Senecio vulgaris	0,28
Populus tremula	0,11	Cnicus lanceolatus	0,29
Epilobium montanum	0,18	Sonchus oleraceus	0,29
Epilobium hirsutum	0,19	Hypochoeris radicata	0,32
Epilobium palustre	0,16	Taraxacum officinale	0,33
Senecio silvaticus	0,21	Pulicaria dysenterica	0,36
Lactuca virosa	0.22		

c) Flügelflieger (Pterometeorochoren) 1

Bei vielen Pflanzen funktionieren ein bis mehrere Flügel oder ein Flügelsaum als Tragflächen der Verbreitungseinheiten. Sie bestehen meist aus einem Traggerüst und einer zwischen den Rippen desselben ausgespannten Flughaut. Die Verbreitungseinheiten sind vielfach massiger und schwerer als diejenigen vom Ballon- und Schirmtypus. Sie werden meist offen den Winden dargeboten und müssen durch sie losgerissen werden, was damit übereinstimmt, dass nur stärkere Winde imstande sind, sie wegzutragen. Wenn die Verbreitungseinheiten eingeschlossen sind, wie die Samen der meisten Coniferen, öffnen sich ihre Behälter durch xerochastische Klappen. Die Flugapparate kommen ausserdem nur zu voller Wirksamkeit, wenn die Verbreitungseinheiten aus grosser Höhe starten können. Mit Flügeln versehene Verbreitungseinheiten finden wir daher vorwiegend unter den Bäumen und Sträuchern. Als Beispiele aus der Krautschicht seien Heracleum sphondilium, Rumex alpinus und Biscutella levigata angeführt. Ihre

¹ pteron = Flügel

Fruchtstände ragen aber immerhin hoch aus der Krautschicht empor.

Viele Arten mit geflügelten Verbreitungseinheiten, so z. B. Acer pseudoplatanus, A. platanoides, A. campestre, Fraxinus excelsior, Humulus lupulus, Betula- und Alnus-Arten sind Wintersteher. Sie sind also auch nach dem Laubfall noch mit Verbreitungseinheiten behangen. Umgekehrt erfolgt bei Ulmus scabra die Verbreitung der geflügelten Früchte schon im Frühjahr, bevor das Laub sich voll entwickelt hat. In beiden Fällen wird durch die zeitliche Bereitstellung das Erfassen und damit auch der Transport der Verbreitungseinheiten durch die Winde wesentlich erleichtert.

Vom flugtechnischen Standpunkt aus können Gleitflieger, die wie ein Segelflugzeug durch die Luftmassen gleiten, und Dynamikflieger, bei denen die Verbreitungseinheit durch rasche Drehung um eine Horizontal- oder Vertikalachse Auftrieb erzeugt, unterschieden werden. Die Gleitflieger sind symmetrische Gebilde. Die Drehbewegungen der Dynamikflieger kommen dadurch zustande, dass der Schwerpunkt nicht in der Mitte liegt und deshalb bei keiner Lage der Verbreitungseinheit Stabilität vorhanden ist.

In bezug auf den feinern Bau, die Gestalt und die Anordnung der Flügel, sowie auch auf die exakte Mechanik des Fluges, weichen die einzelnen Arten immer wieder voneinander ab, und es hält schwer, sie zu klassifizieren. Wir müssen uns daher damit begnügen, eine kleine Auswahl aus der grossen Mannigfaltigkeit zu beschreiben. Dabei folgen wir vielfach DINGLER (1889).

Als kleine Segelflugzeuge können wir die Früchte von Alnus viridis, Betula pubescens, B. pendula (Abb. 19, Fig. 6) und verwandter Arten betrachten. Die eigentliche Frucht bildet den Rumpf des Flugzeuges. An ihm sitzen symmetrisch zwei Flügel. Beim Fluge finden beständige Oszillationen um die Gleichgewichtslage statt. Als Vorbild für die Segelflugzeuge dienten jedoch die viel grösseren Samen der Macrozanonia macrocarpa (Cucurbitaceae), einer Liane der tropischen Sundainseln. Sie werden aus einer halbkugeligen, dreiklappig sich öffnenden Frucht entleert. Ihr Kern ist nach ULBRICH (1928) breit-oval, 2,5 bis 3 cm lang und 2 bis 2,5 cm

breit; der Flügel misst in der Längsrichtung des Samens etwa 5 cm, der Quere nach ist er 13 bis 15 cm breit. Der Schwerpunkt des ganzen Samens liegt in der Mittellinie, aber nach vorn verschoben. Zudem sind die Flügel sanft nach oben gebogen. Wenn die Samen aus der Kapsel entleert werden, führen sie einen prachtvollen, spiraligen Gleitflug aus. Segelfliegersamen finden wir ferner auch zahlreich unter den Bignoniaceen und Rubiaceen (DINGLER, S. 329). Die Samen von Zanonia javanica haben eine Sinkgeschwindigkeit von 0,39 m/sek, diejenigen von Bignonia echinata von 0,173 m/sek. Die einsamigen Nüsse von Ulmus, Paliurus sind von einem breiten Flügelsaum umgeben (Abb. 19, Fig. 5). Ebenso die Samen des Schwalbenwurzenzians, Gentiana asclepiadea (Abb. 19, Fig. 7). Ihr Schwerpunkt liegt fast in der Mitte. Die Fläche der Verbreitungseinheit beträgt bei Paliurus spina-christi 250 - 300 mm², bei Ulmus scabra 200 mm². Sie sinken daher ebenfalls in langsamem, allerdings etwas schwankendem Gleitfluge zu Boden. In ruhiger Luft beträgt die Sinkgeschwindigkeit von Ulmus scabra 67 cm/sek.

Dynamikflieger sind die Früchte des Götterbaumes, Ailanthus glandulosa (Abb. 19, Fig. 3). Sie bestehen aus einem kleinen, linsenförmig zusammengedrückten Nüsschen und einem dieses rings umziehenden, nach zwei Richtungen sehr verlängerten, etwas unsymmetrischen Flügel. Der Schwerpunkt der Verbreitungseinheit liegt nicht ganz in der Längsmitte, sondern ist etwas gegen die breite, lanzettförmige Flügelhälfte verschoben, fällt aber fast genau in die Mitte des Nüsschens. Die breitere Flügelhälfte ist namentlich gegen ihr Ende zu, um einen Winkel von zirka 135 Grad schraubig um die Längsachse gedreht. Die gegenüberliegende Flügelhälfte ist mehr lineal, viel flacher und einzig gegen den Ansatzpunkt des Fruchtstiels etwas in der Fläche gekrümmt. Diese Krümmung ist nur eine Längskrümmung. Wenn gleichzeitig eine ganz geringe Drehung um die Längsachse damit verbunden ist, so hat dieselbe meist umgekehrten Sinn wie die Drehung der andern Flügelhälfte. Beim Fallen stellt sich die etwa 22 mg schwere Verbreitungseinheit horizontal und dreht sich um ihre Längsachse in der Richtung der Schraubenwindung. Sie fällt in einer Zylinderschraubenbahn zur Erde, rotiert also auch noch um ihre im Raum vertikale Schwerpunktachse.

Die Verbreitungseinheiten der Esche (Fraxinus excelsior) sind länglich lanzettliche, flach bikonvexe Nüsse, die sich in ihrer oberen Hälfte in einen etwas verbreiterten, lanzettlichen Flügel fortsetzen. Die Nüsse messen 21 mm x 6,5 mm x 2 mm. Die Flügel, sind 18 - 20 mm lang und an der breitesten Stelle 9 mm breit, entweder eben oder der Länge nach etwas schraubenförmig oder unregelmässig gekrümmt. Die ganze Verbreitungseinheit wiegt 100 mg. Der Schwerpunkt findet sich in der Regel 12 mm über dem untersten Ende. Wenn die Früchte 1,5 bis 2 m gefallen sind, beginnen sie sich normalerweise in raschem Tempo um ihre Körperlängsachse zu drehen und führen dazu noch Drehungen um eine, ihren Ort beständig wechselnde, im Raume senkrechte Schwerpunktachse aus. Nur stärkere Winterstürme vermögen sie vom Baume loszureissen.

Aehnlich verhalten sich beispielsweise noch die Früchte des aus Nordamerika stammenden Tulpenbaumes, Liriodendron tulipifera.

Vollkommene Dynamikflieger sind auch die Spaltfrüchte der Ahorne (Acer) (Abb. 19, Fig. 2). Sie bestehen aus einer plattgedrückten (Acer platanoides) oder kugeligen (Acer pseudoplatanus) Nuss mit einem mehr oder weniger langen, aussen geschränktem Flügel. Die Vorder- oder Eintrittskante der Flügel ist versteift, die Hinter- oder Austrittskante dünn. Zwischen steifen Adern ist eine dünne Füllung. Das Profil ist stromlinienförmig. Der Schwerpunkt liegt asymetrisch, gegen die Nuss und die schwerere Vorderkante hin verschoben. Beim Fall aus natürlicher Stellung am Baum erfolgt nach DINGLER (1889) nach 35 cm Fallraum der Uebergang zur Rotation. Innerhalb eines weitern Fallraumes von 30 cm geht die anfangs steil vor sich gehende Rotation in fast horizontale Lage über. DINGLER stellte beim Experimentieren mit Verbreitungseinheiten von Acer platanoides auch fest, dass nach 88 cm Fallraum die Längsachse mit der Horizontalen einen Neigungswinkel von 7 Grad bildet und die Querachse gleichzeitig 2 - 3 Grad gegen die Horizontale geneigt ist, und zwar mit tieferer Vorder- und höherer Hinterkante. Die Neigung der Querachse darf unseres Erachtens dem Anstellwinkel der Flugzeugflügel in Parallele gesetzt werden. Die Drehgeschwindigkeit beträgt 16 Umgänge pro Sekunde (Abb. 19, Fig. 1, 4 und 9). Durch die rasche Drehung dürfte, wie am Flugzeugflügel, auf der Flügeloberfläche ein Unterdruck (Sog) und unter dem Flügel ein Ueberdruck enstehen. Die Schränkung des Flügels erhöht den aerodynamischen Nutzeffekt. In dieser Hinsicht ähnlich gebaut sind die Verbreitungseinheiten der Fichte (*Picea excelsa*), der Waldföhre (*Pinus silvestris*), der Hainbuche (*Carpinus betulus*) und der Linden (*Ti-lia*).




Abb. 19. Flügelflieger. Fig. 1, 2, 3, 4, 8 und 9 Drehflieger (Dynamikflieger), Fig. 5, 6 und 7 Gleitflieger. 1. Same der Fichte (Picea excelsa); 2x. 2. Teilfrüchtchen des Bergahorns (Acer pseudoplatanus); 1x. 3. Frucht des Götterbaumes (Ailanthus glandulosa); 1x. 4. Frucht mit Hüllblättern der Hainbuche (Carpinus betulus); 1x. 5. Frucht der Bergulme (Ulmus scabra); 3/4 nat. Grösse. 6. Frucht der Hängebirke (Betula pendula); 5x. 7. Same des Schwalbenwurzenzians (Gentiana asclepiadea); 5x. 8. Frucht mit Perianth von Rumex intermedius; 2x. 9. Früchte mit Hochblatt von der Sommerlinde (Tilia platyphyllos); 3/4 nat. Grösse.

Einen mehrflügligen Typus repräsentieren Rumex acetosa, Rumex intermedius (Abb. 19, Fig. 8) und Verwandte. Ihre Verbreitungseinheiten führen in der Luft ebenfalls rasche Drehungen aus.

d) Flugweiten und Verbreitungsgrenzen

Es ist schon oft versucht worden die Flugweiten fliegender Verbreitungseinheiten festzustellen. Im Felde können aber grosse Flugstrecken mit Sicherheit nur unter ganz besonders günstigen Umständen ermittelt werden. So berichten BOUGET und DAVY DE VIRVILLE (1926) über einen Sturm, der Früchte und Samen von Linden, Erlen, Birken, Eschen, Ahorn, Fichten und Kiefern über grosse Entfernungen vertrug, die sich leider nicht genauer bestimmen liessen. Nur für Abies konnten die nächsten fruchtenden Bäume in einer Entfernung von 7 - 8 km festgestellt werden. Wohl verbürgt scheinen uns auch die folgenden Angaben über Flugweiten:

Pinus silvestris	2,0 km	(BIRNER in FIRBAS 1935)
Betula	1,6 km	(SCHWEDHELM in FIRBAS 1935)
Acer spec.	4,0 km	bei 1000 m Höhendifferenz (BEAUVERD
Acer pseudoplatanus		bei 1000 m Höhendifferenz
Fraxinus excelsior	0,5 km	(FIRBAS 1935) (Braun-Blanquet 1913)

Theoretisch sind die Flugweiten der Verbreitungseinheiten nach SCHMIDT(1918) um so grösser, je grösser die Windgeschwindigkeit ist. Sie nehmen ferner umgekehrt proportional mit dem Quadrat der Sinkgeschwindigkeit zu. Sinkt eine Verbreitungseinheit zehnmal so langsam wie eine andere, so wird sie also durch die Luftströmungen hundertmal so weit weggetragen. Während aber viele Verbreitungseinheiten, namentlich diejenigen mit ballon- oder schirmartigen Flugapparaten im Stadium der Verbreitungsbereitschaft kaum mehr festgehalten werden, müssen diejenigen der meisten Wintersteher unter den Flügelfliegern vom Winde regelrecht losgerissen werden. Die fliegenden Verbreitungseinheiten treten also bei ganz verschiedenen Windgeschwindigkeiten an die Luft über, was aber bis heute nicht genauer untersucht worden ist. Infolgedessen ist bei der Auswertung rein mathematisch erfasster Flugdistanzen noch grosse Vorsicht

geboten. SCHMIDT (1918) hat immerhin versucht, die mittleren Verbreitungsgrenzen, worunter er die Distanz, die 1/100 der Verbreitungseinheiten erreichen kann, versteht, für eine Anzahl Arten zu berechnen. Unter Annahme einer mittleren Durchwirblung der Luft von A = 20 (g.cm.sek.) und einer Windgeschwindigkeit von 10 m/sek erhielt er folgende Ergebnisse:

	Sinkge-	-	Mittle	re
Art	schwind	digkeit	Verbre:	itungsgrenze
	cm/Se	ek.	kı	m
Lycoperdon (Sporen)	0,	,047	470	000
Polytrichum (Sporen)	0	,23	19	000
Lycopodium (Sporen)	1,	,76		330
Papaver somniferum	500	(Winds	treuer)	0,004
Pitcairnia flavescens (Bromel.)	110			0,1
Pitcairnia imbricata	30			1,1
Cynara scolymus	83			0,15
Asterocephalus spec.	380			0,007
Taraxacum officinale	10	(33!)		10,2
Hieracium spec.	20			2,5
Ptelea trifoliata	150			0,045
Eccremocarpus scaber	100			0,1
Cochlospermum orehocense	137			0,054
Bignonia echinata	19-32			2,8-1,0
Calosanthes indica	35-97			0,8-0,11
Zanonia javanica	37			0,74
Betula pendula	25			1,6
Aspidosperma	67			0,13
Acer platanoides	107			0,09
Acer pseudoplatanus	107			0,09
Machaerium angustifolium	100			0,1
Picea excelsa	5 7			0,31
Abies alba	106			0,09
Pinus silvestris langfl.	43			0,55
Pinus silvestris breitfl.	83			0,15
Carpinus betulus	120			0,07
Cedrela brasiliensis	47			0,46
Liriodendron tulipifera	125			0,065
Fraxinus excelsior	200			0,025
Ailanthus glandulosa	91			0,12
Bignonia unguis	111			0,08
Tecoma stans	106			0,09
Entada	187			0,03
Combretum spec.	300			0,011
Halesia tetraptera	330			0,009

Die doppelte Distanz der mittleren Verbreitungsgrenze wird nach Angaben desselben Autors (S. 327) nur selten überschritten. Unter Voraussetzung derselben Windgeschwindigkeit können weitere Verbreitungsgrenzen durch folgende Proportion berechnet werden:

$$X = \frac{vg \cdot sb^2}{sx^2}$$

wobei Vg eine bekannte, X die gesuchte Verbreitungsgrenze bedeutet. Für Sx ist die Sinkgeschwindigkeit der Verbreitungseinheit, für die die Verbreitungsgrenze gesucht wird, und für Sb die Sinkgeschwindigkeit der Verbreitungseinheit, für die die Verbreitungsgrenze schon bekannt ist, einzusetzen.

Wenn ein Same erst bei höherer Windgeschwindigkeit vom Wind weggetragen wird, steigt auch seine mittlere Flugweite, und zwar in zweifacher Weise, einmal rein wegen der grösseren Windgeschwindigkeit, die die Samen in der gleichen Zeit weiter verträgt, dann aber auch wegen des erhöhten Austausches, der schon an und für sich die Flugdauer und die Flugweite in gleichem Masse steigert. Wenn also ein Same statt bei 5 m/sek erst bei 10 m/sek Windgeschwindigkeit an die Luft übertritt, dann wird er rund die vierfache Verbreitung finden (siehe SCHMIDT 1918, S. 325/26).

Beachtenswert ist ferner, dass die Verbreitungseinheiten der Wintersteher unter den meteorochoren Sträuchern und Bäumen vielfach gegen Tierfrass weitgehend geschützt sind. So bilden bei den Fichten (Picea excelsa) und manchen andern Coniferen die Zapfenschuppen ein gewisses Hindernis, um zu den Samen zu gelangen und bei der Waldrebe (Clematis vitalba) erschwert das lange, federschweifförmige Flugorgan das Verzehren der Früchte durch Vögel. Auch die Früchte der Ahornarten (Acer) mit ihren grossen, steifen Flugorganen sind als Futter nicht beliebt. Die Eschenfrüchte (Fraxinus) wiederum scheinen durch unangenehme Stoffe vor Frass geschützt zu sein.

B. Bodenläufer (Chamaechoren)

Die zur Reifezeit abfallenden Früchte von Colutea arborescens, Medicago scutellata, Medicago orbicularis, sowie die Früchte von verschiedenen Astragalus- und Oxytropis-Arten sind walzen- oder kugelförmig und enthalten grosse Lufträume. Sie sind trotzdem zu schwerfällig, um sich lange in der Luft halten zu können. Weht ein starker Wind, so bringt er sie aber in rollende oder hüpfende Bewegung und treibt sie vor sich her. Es scheint dann, als laufen oder springen sie über den Boden hin. Dasselbe geschieht mit den kahnförmigen Früchten von Calendula (Abb. 2) und den in einem kugelförmigen, aufgeblasenen Kelch eingeschlossenen Hülsen von Anthyllis vulneraria, sowie mit den Fruchtständen von Hedypnois cretica. Bei Hedypnois bilden die zusammenneigenden Hüllblätter einen grössern Luftraum, und das sich mit dem Körbchen ablösende Schaftstück ist im obersten Teil aufgeblasen. Die Fruchtzweige von der Fedia cornucopiae (Valerianaceae) vergrössern sich bis zur Fruchtreife wesentlich, nehmen dazu strohartige Beschaffenheit an, brechen letzten Endes auseinander und werden vom Wind über den Boden hingetrieben. In den Steppen und Wüsten trocknen viele Pflanzen zu dürren Mumien aus, ohne dass sie dabei ihre ursprüngliche Form einbüssen. Zudem haben ihre oberirdischen Sprossteile meist Schirm- oder Kugelform. Sie bieten darum dem Wind eine grosse Angriffsfläche dar. Schliesslich reissen heftige Winde sie vom Boden los und treiben sie vor sich hin, bis sie auf ein Hindernis stossen. Unterwegs verlieren sie allmählich ihre Samen und Früchte, und zwar besonders dort, wo sie an Unebenheiten des Weges einen heftigen Ruck oder Stoss erleiden. In der russischen Steppe sind es nach KERNER (1898) Centaurea diffusa, Rapistrum perenne, Salsola kali und andere vertrocknende Pflanzen, die als sogenannte Burriane auf diese Weise transportiert werden. Im Oktober brechen die Herbststürme die vertrockneten Mumien um und wirbeln sie vor sich her. Sie humpeln dann als sogenannte Steppenhexen in wildem Tanz über die Ebene, bis nach Wochen der Wind abflaut und der Schnee sie begräbt. Im Mittelmeergebiet und in Nordafrika sind es Phlomis herba-venti, Seseli tortuosum, Eryngium campestre und

Anastatica hierochuntica, letztere bekannt als Rose von Jericho, die auf gleiche Weise wandern.




Abb. 20. Bodenläufer. Schirmförmiger, oberirdischer Spross des Feldmannstreu (Eryngium campestre), der als Ganzes vom Winde fortbewegt wird. (Aufn. CASPAR; 1/6 nat. Grösse).

Eigene Beobachtungen ergaben, dass die ausgetrockneten Sprosse des Feldmannstreu, Eryngium campestre, (Abb. 20), bei einer Windgeschwindigkeit von 3 - 4 m/sek in Bewegung geraten.

Besonders eigenartig ist die Chamaechorie beim Sanddorn(Hippochaë rhamnoides ssp. fluitans). Er reift saftige, orangefarbige Beeren. Im bündnerischen Rheintal (siehe auch HAGER, 1916) und auch andernorts werden
aber diese Beeren von den Vögeln in der Regel verschmäht. Wir treffen
sie im Frühling immer noch auf den Sträuchern. Sie sind dann meist ganz
ausgebleicht. Der Saft der fleischigen Frucht ist ausgeflossen, die
zähe, äussere Fruchthaut ist zwar noch vorhanden, doch zwischen Samen

und Haut befinden sich jetzt Lufträume. Der bald eintretende Föhnwind trocknet die Früchte vollends und bringt sie zu Fall. Auf dem Kies- und Sandboden der offenen Uferzone geraten die leichtgewordenen, schülferigen Früchte beim Winde in rollende Bewegung und werden nicht selten dem Flussufer zugeführt, wo sie ins Wasser gelangen, schwimmen und irgendwo wieder ans Ufer gespült werden. Es scheint, dass bei Hippophaë rhamnoides ssp. fluitans wie übrigens auch bei Physalis alkekengi, deren Beeren die Tiere in der Schweiz ebenfalls verschmähen, die Verbreitung in Umstellung begriffen ist, indem an Stelle der Tiere der Wind und das fliessende Wasser diese Funktion übernehmen.

Vergessen wir ferner auch nicht, dass bei fast allen Pflanzen, die sowohl vegetative als auch generative Verbreitungseinheiten ausbilden, die Verbreitung derselben auf verschiedene Weise erfolgt.

C. Windstreuer (Boleochoren)

Unter den Caryophyllaceen, Papaveraceen, Primulaceen, Scrophulariaceen, Orobanchaceen, Campanulaceen und beispielsweise auch unter den Compositen gibt es viele Arten, deren Samen, Früchte oder Teilfrüchte körnchen- oder feilspanförmig sind und selbst über keine oder nur unvollkommene Vorrichtungen für die Windverbreitung verfügen, jedoch mittelst ballistischer Mechanismen (KERNER 1898) durch den Wind ausgestreut werden können. Der Ausstreuungsmechanismus wird in der Regel durch einen zur Zeit der Fruchtreife sich versteifenden Stengel oder Schaft und einem bis mehreren von ihm getragenen kapselartigen Behälter gebildet. Der Träger des Behälters ist ausserordentlich elastisch. Wird er durch einen Stoss aus der Gleichgewichtslage gebracht, so schnellt er zurück und bewirkt, dass im Moment der Umkehr der Bewegung infolge des Behaarungsvermögens die zuoberst liegenden Verbreitungseinheiten wie aus Streubüchsen ausgestreut werden und der Wind sie noch ein Stück weit mit sich fortreisst. Auch Windwirbel, die sich in den Samenbehältern bilden, helfen vielfach mit, die Samen daraus zu entfernen. Trotz der bisweilen auffallenden Kleinheit ist das Gewicht der Verbreitungseinheiten im Verhältnis zu ihrer Oberfläche recht gross und bewirkt ein schnelles Sinken in der Luft.

Zu den Windstreuern sind auch manche Cruciferen wie Draba aizoides und Arabis corymbiflora zu stellen. Ihre Samen bleiben nach dem Abfallen der Fruchtklappen meist noch auf der Scheidewand sitzen und erhalten insbesondere durch Windstösse Impulse zur Fortbewegung.

DINGLER (1889, S. 64) stellte bei den 0,554 mg schweren, kegeligen, an der Oberfläche rauhen Samen von Papaver somniferum bereits eine Sinkgeschwindigkeit von 5 m/sek fest. 0,344 mg schwere Mohnsamen sanken bei seinen Versuchen mit einer Geschwindigkeit von 3,8 m/sek bei 6 m Fallhöhe. Somit vermögen nur kräftige Windstösse solche Samen noch mit sich fortzureissen. Dabei können dann aber die bei vielen Arten vorhandenen Rauhigkeiten der Oberfläche und eventuell auch die spezielle Form sich in günstigem Sinne auf die Verbreitung auswirken.

Ein weitverbreiteter Windstreuer ist Bellis perennis (Abb. 21), das zu den verhältnismässig wenigen Compositen gehört, deren Früchte keinen Pappus tragen. Seine Früchte sitzen vor der Verbreitung an der postfloral sich noch stark verlängernden, spitzkegelförmig endenden Blütenstandachse, die aus dem Körbchen emporragt. Das weite, flachgründige Körbchen verhindert ein direktes zu Bodenfallen der Früchte und stellt sich dem Luftstrom entgegen. Der Schaft ist nach der Blüte wesentlich erstarkt und elastisch geworden. Durch heftige Windstösse, seltener durch Tiere, die vorbeistreifen, wird er in Schwingung versetzt und streut die Früchte aus; zum Teil werden sie allerdings auch durch Luftströme allein schon weggeführt.Im allgemeinen gehören sonst insbesondere Pflanzen mit Kapselfrüchten wie Papaver, Silene, Primula, Campanula u.a. zu den Windstreuern.

Die Mohnfrucht (*Papaver*) z. B. ist eine kugelige oder zylindrische Kapsel, die einen gelappten Narbendeckel trägt. Sie ist unvollkommen mehrkammerig und öffnet sich zur Reifezeit unter dem Deckel durch so viele Löcher, als Kammern vorhanden sind. Gleichzeitig wölben sich die Narbenlappen empor, bis sie mit der Aussenwand der Frucht etwa einen




Abb. 21. Windstreuer. Massliebchen (Bellis perennis). Fruchttragender Stengel versteift. (nat. Grösse).

Winkel von 90 bis 100 Grad bilden. Auf der Unterseite tragen sie einen Kiel, der als Fortsetzung der Samenleiste nach vorn allmählich ausläuft. Die Lappen der Narben werden dadurch zum Windfang und lenken die Luftströme in die Fächer, aus denen sie dann die netziggrubigen, bei Papaver somniferum 0,55 mg schweren körnchenförmigen Samen herausblasen und forttragen. Schon durch Einblasen von Luft mit dem Munde können die Samen bis 2 m weit ausgestreut werden. Die langen, postfloral versteiften Fruchtstiele sind zudem sehr elastisch und unterstützen das Ausstreuen der Samen durch den Wind noch durch ihre Schüttelbewegungen. Die Samen werden einzeln und je nach der Windrichtung bald nach der einen, bald nach der andern Seite verbreitet. Wenn Regen die Kapsel befeuchtet, so

verschliessen sich die Poren und öffnen sich erst bei trockenem Wetter wieder.

Bei den Silene-Arten und vielen andern Caryophyllaceen, ferner bei Primula elatior, P. farinosa und Verwandten versteift sich der Schaft postfloral ebenfalls; die Kapseln öffnen sich aber durch Zähne. Diese sind zudem imstande, xerochastische Bewegungen auszuführen. Die Kapseln bleiben auch bis zur Samenverbreitung von den Kelchen umhüllt, die noch als Windfänge dienen können. Wirksame Windfänge finden wir ferner bei manchen Gentianaceen, so bei Gentiana bavarica, deren Kapseln sich aber bei Befeuchtung nicht schliessen.

Besonders beachtet zu werden verdienen die hängenden, als Streuvorrichtungen ausgebildeten Kapseln mancher Campanula-Arten, weil sie sich
im Gegensatz zu den andern Kapselfrüchten am Boden öffnen, der bei ihnen
nach oben gewendet ist. Dadurch wird das blosse Ausfallen der Samen verhindert. Ihre Porenklappen führen ebenfalls xerochastische Bewegungen
aus, und auch Windfänge, die durch postflorale Vergrösserung der Kelchzipfel enstehen, sind vorhanden.

Windfänge besitzen ferner noch die durch einen Deckel sich öffnenden Kapseln von Hyoscyamus niger und Hyoscyamus albus, sowie die Kapseln mancher Begonia-Arten (Abb. 22). Die reifen Früchte der als "Gottesauge" bekannten Zimmerpflanze Begonia semperflorens z. B. hängen an langen, fadenförmigen, etwas starren Stielen von den Zweigen herab. Trotzdem sie




Abb. 22. Windstreuer. Geflügelte, aber sich von der Mutterpflanze nicht ablösende Begonia-Frucht. (nat. Grösse).

drei nach verschiedenen Richtungen abstehende Flügel tragen, lösen sie sich nicht von der Mutterpflanze los. Einer der Flügel ist nach aussen gerichtet und wesentlich länger als die andern. Jeder Windstoss bringt



Abb. 23. Windstreuer. Stengelloser Enzian (Gentiana clusii) in Blüte und in Frucht. Nur die Blüten sind meist stengellos, die Früchte werden dem Wind ausgesetzt. Stengel elastisch. (3/4 nat. Grösse).

infolgedessen die Frucht in schaukelnde Bewegung und bewirkt, dass die winzigen, mit kleinen Stacheln besetzten Samen durch die Längsspalten der Frucht ausgeschüttelt und dem Wind übergeben werden. Erwähnt zu werden verdient ferner noch, dass es auch unter den Windstreuern Arten wie Gentiana kochiana, G. clusii (Abb. 23) und Primula farinosa gibt, die ihre Stengel postfloral stark verlängern.

Die Streuweiten der Verbreitungseinheiten betragen, sofern sie nicht noch speziell an die Windverbreitung angepasst sind, normalerweise nur wenige Meter. Ausnahmen sind bei heftigen Stürmen möglich. Doch liegen hierüber keine sichern Beobachtungen vor. Die zuerst von KENNGOTT (siehe VOGLER 1901) veröffentlichen Angaben über den Transport von Salzkristallen vom Mittelmeer oder gar von der Sahara bis zum Gotthard stimmen nicht. Bergamasker Hirten haben das Salz im Gotthardgebiet ausgestreut (P. VOGLER schriftlich durch E. SULGER BüEL).

4. Wasserwanderer (Hydrochoren)

Das Wasser wird von den Pflanzen hauptsächlich als fliessende oder strömende Masse, aber auch in Form von fallenden Regentropfen als Verbreitungsagens genützt. Die fliessenden Wassermassen sind meist reich an Energie; die den Regentropfen innewohnende Fähigkeit, Arbeit zu leisten, ist immer gering, nimmt aber, wie die folgende Tabelle zeigt, mit dem Durchmesser der Tropfen zu.

Energie der auf die Erde aufschlagenden Regentropfen (Mitgeteilt von der Schweiz. Meteorologischen Zentralanstalt in Zürich)

Durchmesser	Masse	Fallgeschwindigkeit	Energie
mm	g	m/Sek.	Erg
4	0,0335	735	9 050
5	0,0654	830	22 500
6	0,1131	900	45 800
7	0,1795	980	86 000

Der Durchmesser der grössten Regentropfen beträgt 7 mm. Er wird jedoch nur selten erreicht. Bei einem gewöhnlichen Regenschauer misst er nur etwa 5 mm. Tropfen von weniger als 4 mm Durchmesser vermögen im allgemeinen noch kein Ausstreuen der Verbreitungseinheiten zu bewirken.

Das fliessende Wasser kann horizontal vielfach grosse Distanzen zurücklegen und trägt zum mindesten alles mit sich fort, was schwimmen kann. Die Regentropfen bewegen sich mehr oder weniger in vertikaler Richtung, und es ist notwendig, dass ihre Kräfte durch geeignete Vorrichtungen umgesteuert werden.

Die bei der Verbreitung der Keime wirksamen Erscheinungsformen des Wassers sind somit in ihrem Wesen und ihren Wirkungsmöglichkeiten verschieden und fordern jede ihre besondern Anpassungen, wenn sie als Verbreitungsagentien wirken sollen. Daraus ergibt sich die Unterscheidung von nauto- und ombrochoren Pflanzen.

A. Schwimmer (Nautochoren)

Verbreitungseinheiten, die schwimmen, enthalten in der Regel Lufträume; viele besitzen zudem eine wasserundurchlässige Haut, oder sind
unbenetzbar. Die Unbenetzbarkeit ist meistens eine Folge starker Kutinisierung oder der Ausbildung eines Wachsüberzuges. Die Verhinderung des
raschen Eindringens von Wasser ist notwendig, um die Keimung und die im
Meerwasser enthaltenen tödlichen Salze aufzuhalten. Vielfach bilden
starke mechanische Elemente noch einen Schutz gegen das Abscheuern der
Schwimmvorrichtung und gegen den Angriff von Tieren. Die schwimmfähigen
Verbreitungseinheiten können daher recht umfangreich und schwer sein. So
wiegen die Schwimmfrüchte der Kokospalme (Cocos nucifera) meist über
500 g und diejenigen der doppelten Kokosnuss (Lodoicea seychellarum)
sogar bis 20 kg.

l naus = Schiff

² ombros = Regen

Allein dank ihrer Unbenetzbarkeit vermögen nach KOLPIN RAVN (1895) z. B. die Früchte von Ranunculus reptans, Myosotis palustris und Cirsium palustre zu schwimmen.

Die Luft tritt entweder in grossen Lufträumen, die als Schwimmblasen dienen, zwischen einer Hülle und einem Kern auf, oder sie befindet sich in den Zellen oder Interzellularräumen von speziell ausgebildeten Schwimmgeweben.

blasenförmige Schwimmvorrich-Eine besitzen z. B. die Nymphaea-Samen. Bei ihnen umgibt ein sackartiger Arillus den eigentlichen Samen als lockere Hülle. Aehnlich gebaut sind nach GUTTENBERG (1926) auch die Samen von Euryale und Victoria. Bei Nuphar dagegen lösen sich nach dem Zugrundegehen einer Aussenschicht die Carpellblätter voneinander ab. Diese schliessen neben den Samen eine Schleimmasse ein, die von grossen Luftblasen durchsetzt ist. Auch bei manchen Carex-Arten, so bei C. flava, C. vesicaria, C. elata und C. pseudocyperus (Abb. 24) schliesst der Fruchtschlauch grosse Luftblasen ein. Unter den Salzwasserpflanzen produzieren nach SCHIMPER (1891) Caesalpinia bonducella und einige Mucuna-Arten, Pflanzen der indomalayischen Strandflora, Samen mit grossen luftführenden Hohlräumen und ausserordentlich harten Schalen. Sie geben beim Schütteln ein klapperndes Geräusch von sich, das durch den harten Embryo, der die Samenschale nur sehr unvollständig ausfüllt, bedingt wird. Der Embryo, sowie auch Bruchstücke der Samenschale, sinken im Wasser sofort. Die Schwimmfähigkeit ist also nur durch den grossen leeren Raum bedingt. Ganz ähnlich wie die erwähnten Samen verhalten sich die nicht aufspringenden Hülsen von Pongamia und Derris, weil der Same die Frucht nur unvollkommen ausfüllt. Zum gleichen Typus gehören auch die mit einer steinharten Schale ausgestatteten Früchte von Heritiera litoralis und Samen von Vigna lutea, weil bei ihnen die Cotyledonen und das hypocotyle Glied der Samenschale dicht anliegen und einen grossen zentralen Hohlraum umfassen. Besonders bemerkenswert ist unter den Blasenschwimmern ferner noch die tropische Morinda citrifolia (Rubiaceae). Diese Pflanze besitzt eine saftige, einer Maulbeere vergleichbare, weisse Sammelfrucht, die von den Eingeborenen Indonesiens genossen wird. Die Frucht ist als Ganzes schwimmFähig. Ihre saftigen Gewebe gehen aber in kurzer Zeit zugrunde. Für die Verbreitung auf grössere Entfernung kommen nur die Steine in Betracht. Diese haben keulenförmige Gestalt und sind an ihrem breiten Ende mit einer relativ grossen, rundlichen Warze versehen. Beim Aufbrechen des Steines erweist sich die Warze als mit Luft erfüllt, während der einzige, kleine Same ein zweites schmales Fach vollständig ausfüllt. Hier ist somit ein besonderes Organ als Schwimmblase ausgebildet. Same und Schwimmblase sind gegen Angriffe von Tieren, Reibung auf dem Grunde usw., durch die sehr harte Schale, die aus faserförmigen, in den einzelnen Schichten ungleich gelagerten Steinzellen besteht, ausgezeichnet geschützt.

Mittelst Schwimmgeweben schwimmen in den europäischen Gewässern nach KOLPIN RAVN (1894 und 1895) Verbreitungseinheiten von Sparganium, Scheuchzeria palustris, Alisma plantago-aquatica, Sagittaria sagittifolia, Scirpus maritimus, Cladium mariscus, Calla palustris, Caltha palustris, Comarum palustre, Berula erecta, Cicuta virosa, Oenanthe aquatica und Menyanthes trifoliata. Bei allen diesen Pflanzen sind die Zellen des Schwimmgewebes luftführend. Dazu kommt noch Potamogeton natans, deren Verbreitungseinheiten mit einem Schwimmgewebe, das grosse Interzellularräume enthält, ausgestattet sind. Die anatomischen Untersuchungen von KOLPIN RAVN (1894) und OHLENDORF (1907) haben ferner gezeigt, dass bei Menyanthes trifoliata die Samenschale aus einer sklerenchymatischen Epidermis, deren Wände von verzweigten Tüpfelspalten durchzogen werden, besteht. Darüber befindet sich eine derbe Cuticula. Dann folgt bis zum Endosperm ein breiter Mantel luftführender, reichlich getüpfelter Parenchymzellen, die nur ganz kleine Interzellularspalten aufweisen. Die Samen von Scheuchzeria palustris und Iris pseudocorus (Abb. 24) sind ähnlich gebaut; letztere besitzen aber bastähnliche, prosenchymatische Epidermiszellen. Bei den Umbelliferen tritt das Schwimmgewebe als geschlossener Mantel (Berula) oder in getrennten Lagen (Cicuta) unter einer Aussenschicht in den Spaltfrüchten auf. Es ist frei von Interzellularen; die grossen Parenchymzellen sind daher abgeplattet, oft fast kubisch geformt. Bei den Samen von Lysimachia thyrsiflora und der Frucht von Scirpus maritimus wird die Epidermis zum Schwimmgewebe. Sie besteht aus grossen, radialgestreckten, luftführenden Zellen, die bei der erstgenannten Pflanze fast allein die Wand aufbauen, während bei *Scirpus* eine Lage längsorientierter Bastzellen folgt, der sich eine ebenfalls bastartige quergestreckte Epidermis anschliesst. Die Frucht von *Alisma* plantago-aquatica besitzt ein äusseres Schwimmgewebe, darunter eine



Abb. 24. Samen der nautochoren *Iris pseudocorus* (links) und *Pancratium maritimum* (rechts). (Aufn. CASPAR; nat. Grösse).

prosenchymatische Steinschicht. Aehnlich sind z. B. auch die Früchte von Sagittaria sagittifolia, Alnus glutinosa und Ranunculus sceleratus gebaut. Bei Sparganium ramosum besitzt die Fruchtschale aussen eine Bastzellage, es folgt das Schwimmgewebe, dann die sklerenchymatische Samenschale. Comarum palustre wiederum hat eine sklerenchymatische Fruchtschale; die Samenschale aber ist zart und als Schwimmgewebe entwickelt. Einen besonders eigentümlichen Bau zeigen die Verbreitungseinheiten einiger uferbewohnender Rumex-Arten, z. B. von R. hydrolapathum. Die Früchte dieser Pflanzen sind geflügelt. Die Flügel treten an den Längskanten auf. Sie entstehen aus drei bei der Fruchtreife sich vergrössernden, die Frucht umschliessenden Blütenhüllblättern. Diese haben an der Basis eine blasenartige Schwiele, die unter einer Epidermis ein Schwimmgewebe enthält. Es treten ein bis drei solcher Luftsäcke auf, die oft von beträchtlicher Grösse sind. Das Schwimmgewebe besteht aus kugeligen, dichtgestellten Parenchymzellen. Auch einige Carex-Arten nehmen in bezug auf ihre Schwimmvorrichtung eine besondere Stellung ein, und zwar Carex

paradoxa (Abb. 25, A), C. paniculata und C. diandra. Bei diesen Pflanzen ist der die Frucht umschliessende Fruchtschlauch nicht, wie bei der Mehrzahl der Arten, dünn, sondern durch ein im Innern auftretendes Schwimmgewebe verdickt. Dieses besteht nach WILCZEK (1892) aus einem ziemlich derbwandigen, stark getüpfelten, festgefügten Parenchym, dessen Mittellamellen verkorkt sind, während die übrigen Schichten Gerbsäure enthalten. Die Festigkeit des Schlauches wird durch zahlreiche Fibrovasalstränge und eine derbe, kutinisierte Epidermisaussenwand bewirkt. Ferner




Abb. 25. Längsschnitte durch Frucht und Schlauch von Carex-Arten.

A. Carex paradoxa. Schlauch mit luftführendem Schwimmgewebe.

B. C. pseudocyperus. Schlauch mit eingeschlossenem Luftraum.

(Nach KOLPIN RAVN; 8 x).

ist die Fruchtschale selbst sehr fest gebaut. Hier sind auch die Samen von Nymphoides peltata anzureihen, die verschiedene Schwimmeinrichtungen besitzen. Die eine besteht darin, dass die Schale des flachen Samens dem Kern nicht vollkommen anliegt und dadurch einen grösseren Hohlraum einschliesst, eine andere, dass rings um den scharfen Rand der Samen Epidermiszellen zu langen, lufterfüllten Schläuchen auswachsen. Diese Luftschläuche sind in regelmässiger Anordnung dicht von kreisrunden Tüpfeln durchsetzt, und am freien Ende treten Papillen auf. Die Tüpfel sind auch in den Aussenwänden der restlichen Epidermiszellen vorhanden. Ihre Bedeutung ist unbekannt, doch dürfte es sich wieder um die Schaffung von Festigkeit unter möglichst geringer Materialaufwendung handeln.

Die Haare bilden eine deutliche Schwebevorrichtung, denn wenn sie entfernt werden, sinken die Samen unter. Nach FAUTH (1903) trägt zudem die schwere Benetzbarkeit der Samen noch dazu bei, dass die Oberflächenspannung des Wassers nicht durch das höhere spezifische Gewicht überwunden wird.

Mit besonders mächtig ausgebildeten Schwimmgewebe sind die Früchte vieler Meeresstrandpflanzen ausgestattet. SCHIMPER (1891, S. 168/169) nennt folgende Beispiele: Cerebra odollam, Laguncularia racemosa, Nipa fruticans, Cocos nucifera (Abb. 26), Barringtonia speciosa und B. excelsa, Terminalia catappa, Conocarpus erectus, Scyphiophora hydrolphyllacea,




Abb. 26. Kokosnuss im Driftgut von Verlaten Eiland. 28.2.1931. (Aus ERNST 1934).

Guettarda speciosa, Tournefortia argentea, Wollastonia glabra, Scaevola koengii, Clerodendron inerme, Cynometra cauliflora, Lumnitzera racemosa und L. coccinea, Cordia subcordata, die Samen von Carapa moluccensis, C. obovata, Sonneratia und Pemphis acidula. Das Schwimmgewebe von Cerbera odollam, Laguncularia racemosa und Nipa fruticans weist grosse Interzellularräume auf; bei den Schwimmgeweben der übrigen Pflanzen schliessen die Zellen dicht oder nur mit winzigen Interzellularen. Die Zellwände sind dünn, oder doch nur mässig verdickt. Sie sind stets deutlich, meist sogar sehr dicht getüpfelt. Alle Schwimmgewebe sind für Wasser schwer, für Luft sehr leicht durchdringlich. Der Same der allgemein

bekannten Kokosnuss ist von einem steinharten Endokarp, von einem grobfaserigen Mesokarp und einem glatten Exokarp umhüllt. Auch das Schwimmgewebe der Barringtonia speciosa enthält sehr zähe Faserstränge. Bei den kugeligen Samen von Excoecaria agallocha ist das innere Integument als Schwimmgewebe ausgebildet, das äussere als steinharte Schale. Ebenso befindet sich auch das Schwimmgewebe bei Cycas circinalis innerhalb einer harten Samenschale. Calophyllum inophyllum und Ximenia americana verbreiten sich durch schwimmende Steinfrüchte. Nur wenige Arten, z. B. Sophora tomentosa besitzen einen schwammigen Samenkern.

Unter den Mangrovepflanzen gibt es viele, deren Keimlinge schwimmen. Obwohl sie keinen Schutz geniessen, scheinen sie gelegentlich doch recht weit zu gelangen.

Auch völlig ausgewachsene Wasserpflanzen wie Lemna, Spirodela, Wolffia, Stratiotes aloides und manche Utricularia-Arten schwimmen frei im Wasser und werden durch die Wellen und die Strömungen transportiert. Eichhornia crassipes, die Wasserhyazinthe aus dem tropischen und subtropischen Amerika, die häufig freischwimmend anzutreffen ist, fällt durch stark aufgetriebene Blattstiele auf, die als Schwimmblasen dienen.

Das fliessende Wasser verbreitet ferner namentlich die vegetativen Verbreitungseinheiten der Wasserpflanzen. Diese enthalten häufig auch Luftlücken in ihren Geweben. Im Bodensee wurden z. B. Laubsprosse der Deschampsia litoralis var. rhenana und Turionen von Myriophyllum verticillatum freischwimmend angetroffen.

Häufig schwimmen auch solche Verbreitungseinheiten, die infolge ihrer Leichtigkeit und grossen Oberfläche normalerweise durch den Wind verbreitet werden, eine zeitlang im Wasser. Obwohl dasselbe meist rasch in sie eindringt, werden sie, wenn sie in ein Gewässer fallen, durch die Wellen an Land gespült. Zu ihnen gehören z. B. die Verbreitungseinheiten von Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior und Ulmus scabra.

Die Schwimmfähigkeit der Verbreitungseinheiten kann mehrere Tage, bei vielen Arten sogar Wochen oder Monate lang erhalten bleiben. Schon LINNE war das Vorkommen von Früchten und Samen ameri-

kanischer Pflanzen wie Cassia fistula, Anacardium occidentale, Cucurbita, Lagenaria, Entada scandens, Piscidia erythrina und Cocos nucifera in der Drift des norwegischen Strandes bekannt.

SCHIMPER (1891), GUPPY (1906), PRAEGER (1913) und andere haben Verbreitungseinheiten vieler Arten auf ihre Schwimmfähigkeit im Süss- oder Salzwasser geprüft und auch festgestellt, dass selbst bei langem Aufenthalt im Wasser die Keimfähigkeit der Samen erhalten bleibt. Diese Untersuchungen sind sehr wertvoll, können uns aber leider nicht genau über die wirkliche Schwimmdauer orientieren, weil im freien Gewässer eine Reihe von Faktoren, z. B. Tiere und Brandung, zerstörend auf die Schwimmeinrichtungen einwirken. Bei Verbreitungseinheiten von Süsswasserpflanzen wurden nach GUPPY u. a. (1906) experimentell folgende Schwimmzeiten festgestellt:

Art	Schwimmdauer in Monaten	Art	immdauer Monaten
Sparganium ramosum	n 12	Comarum palustre	12
Sp. simplex	6	Scutellaria galericulata	12
Potamogeton natans	s 12	Mentha pubescens	6 - 12
Sagittaria sagittifolia 12		Galium palustre	6 - 12
Iris pseudacorus	12	Con v olvulus sepium	33
	und länger		

Nach PRAEGER (1913) schwammen 15 Monate und länger:

Alisma plantago-aquatica	Carex panicea
Cladium mariscus	C. vulpina
Carex flava	C. canescens
C. gracilis (acuta)	Rumex conglomeratus
C. dioeca	R. crispus

Die Verbreitungseinheiten von Nuphar luteum sollen nach PRAEGER (1913, S. 18) nur 1 3/4 Wochen, und die Früchtchen von Ranunculus flammula nur 5 Tage im Wasser schwimmen.

Auf einer 3,5prozentigen Kochsalzlösung schwammen nach SCHIMPER (1891) Samen einer Canavalia aus Java nach 70 Tagen, von Hibiscus tiliae-cus nach 121 Tagen, und von Surina maritima sogar nach 143 Tagen noch. Achänien von Wollastonia glabra schwammen auf 3prozentiger Kochsalzlösung noch nach 20 Wochen, und die Steine von Calophyllum inophyllum noch nach 122 Tagen.

GUPPY (1906) fand bei den Verbreitungseinheiten der Meeresstrandpflanze Cakile maritima eine Schwimmdauer von 1 - 4 Wochen, bei denjenigen von Crithmum maritimum, einer Pflanze also, die ebenfalls den Strand
besiedelt, aber eine solche von 8 Monaten. Die Verbreitungseinheiten von
Crambe maritima schwammen nach GUPPY (1906), 1 - 4 Wochen, nach SERNANDER
(1901, S. 165) nur 13 Tage lang.

Für Wasser- und Strandpflanzen ist die Verbreitung der Verbreitungseinheiten durch fliessendes Wasser das Gegebene. Sie ermöglicht ihnen aber nur, sich innerhalb zusammenhängender Gewässer anzusiedeln. Diese Möglichkeiten sind in Meeren besonders gross und deshalb für die Erhaltung der Art auch ausreichend, für das Süsswasser jedoch oft eng beschränkt und allein nicht genügend. Die Nautochorie versagt stromaufwärts. Die Aufwärtsverbreitung mancher Wasserpflanzen wie Caltha palustris und Menyanthes trifoliata mit verhältnismässig grossen Samen, gehört noch heute zu den ungelösten Problemen. Auch der Florenaustausch zwischen getrennten Gewässern kann niemals durch die Kraft fliessenden Wassers erfolgen. Die Süsswasserpflanzen sind daher auf ergänzende Verbreitungsmöglichkeiten angewiesen (siehe S. 120).

B. Pflanzen, die mit Hilfe der Regentropfen wandern (Ombrochoren)

a) Regenschwemmlinge

Wenn wir eine Flüssigkeit in einen Teller giessen, in dem sich lose, spezifisch leichtere Gegenstände befinden, so werden diese hinausgespült. Auf gleiche Weise können Verbreitungseinheiten aus flachgründigen Behältern, die bei Regenwetter nach oben offen sind, gespült werden. Die Tropfen, die auf den Behälterboden aufschlagen, breiten sich blitzschnell über denselben aus und fegen die Verbreitungseinheiten weg.

Eine napfförmige Verbreitungsvorrichtung treffen wir z.B. bei der verbreiteten Sumpfpflanze Caltha palustris. Am Ende eines Blütenstiels stehen 5 - 8 Balgkapseln sternförmig und leicht aufwärts gerichtet zu-

sammen. Zur Reifezeit im Mai oder Juni öffnen sie sich an der nach oben gerichteten Bauchnaht. Das Oeffnen wird durch die Austrocknung eingeleitet, erfolgt aber erst bei Befeuchtung vollständig. Die völlig geöffneten Früchtchen schmiegen sich eng aneinander und bilden, weil sie aussen weiter sind als innen, eine verhältnismässig grosse, napfförmige Auffangvorrichtung für Regentropfen. Sobald Tropfen auf dem Grunde des Gefässes zerstieben, schwemmen sie die Samen mit Wucht aus den Kapseln.

Auch bei Sedum acre stehen die Balgkapseln, die stets in der Fünfzahl ausgebildet werden, sternförmig zusammen. Die Kapseln sind zudem auf der der Fruchtachse zugekehrten Hälfte breit geflügelt und schliessen dort eng zusammen. Bei Benetzung weichen die Kapselränder an der nach oben gerichteten Bauchnaht auseinander. In der Mitte des Fruchtstandes bildet sich eine Vertiefung, von der aus fünf Rinnen, in denen die kleinen, feilspanförmigen Samen liegen, radiär ausstrahlen. Das Regenwasser, das in den offenen, tellerförmigen Behälter fällt, wird durch die Rinnen nach aussen geleitet und spült dabei Samen hinaus. Beim Trocknen schliessen sich die Balgkapseln wieder und geben verbliebene Samen erst wieder bei der nächsten Benetzung frei. Aehnlich liegen die Verhältnisse bei Trigonella monspeliaca und manchen Astragalus-Arten wie bei Astragalus stella im Mittelmeergebiet (MüLLER-SCHNEIDER, 1936), sowie bei der aus dem nordwestlichen Nordamerika nach Europa eingewanderten Oenothera rosea. Auch die Kapseln der südafrikanischen Carpanthea pomeridiana öffnen sich bei Benetzung zu prachtvollen Sterngebilden (R. GöLDI schrift.).

Bei der Wüstenpflanze Astericus pygmaeus, ihrer Verwandten A. aquaticus und anscheinend auch bei Cichorium pumilum und andern Kompositen (siehe ZOHARI, 1937) neigen die Hüllblätter bei Trockenheit dachartig über dem Körbchenboden zusammen und schliessen die Früchte vollständig von der Aussenwelt ab. Nach Benetzung legen sie sich etwa innert 5 Minuten strahlenförmig in eine Ebene, so dass die Früchte darnach frei daliegen und der Regen sie wegschwemmen kann.

Die zweiklappig aufspringenden Früchte von Veronica serpyllifolia, V. scutellata, V. beccabunga, V. anagallis-aquatica, V. arvensis, V. chamaedrys und V. verna sind ebenfalls hygrochas und breiten bei Benetzung ihre Kapselhälften so flach aus, dass die Samen durch die auf-

schlagenden Regentropfen leicht weggefegt werden können.

b) Regenballisten

Am vollkommensten gelingt den Pflanzen die Ausnützung der lebenden Kraft der Regentropfen durch die von KERNER (1898) erstmals beschriebenen ballistischen Hebelmechanismen. So sitzen im Gegensatz zu Caltha palustris die ebenfalls sternförmig angeordneten Balgfrüchtchen von Eranthis hiemalis auf verholzten, hakenförmig gebogenen und äusserst elastischen Stielen. Sie öffnen sich ausserdem nur am äussern Ende der Bauchnaht, das dadurch zu einer Schaufel wird. Einfallende Regentropfen drücken die Schaufel und den Fruchtstiel nach unten. Sobald aber die Kraft der Regentropfen verbraucht ist, schnellen sie in ihre frühere Lage zurück und werfen durch ihre Bewegung die Samen aus. Bei einem heftigen Gewitter wurden sie nach Müller-Schneider (1936, S. 184) bis 40 cm weit ausgestreut und dann noch vom ablaufenden Regenwasser weggespült. Besonders zahlreich finden wir typische Regenballisten unter den Cruciferen und Labiaten. So haben Iberis pinnata (Abb. 27), I. umbellata und I. ciliata einen scheindoldigen Fruchtstand, bei dem im trockenen Zustande alle Fruchtstiele über dem Achsenende




Abb. 27. Fruchtstand von *Iberis pinnata*; a) benetzt, b) trocken. (Aus MOLINIER und MüLLER-SCHNEIDER 1938). (1/2 nat. Grösse).

zusammenneigen und ein geschlossenes Köpfchen bilden. Bei Benetzung senken sich die s-förmigen Fruchtstiele, bis die schaufelförmigen Fruchtstiele nahezu waagerecht stehen und ihre hohle Breitseite nach oben gerichtet ist. Schötchen und Stiel bilden jetzt formvollendete Turbinenschaufeln. Wenn Regentropfen auf sie fallen, biegen sie den elastischen Fruchtstiel nach unten, die Klappen lösen sich durch den Schock von der Scheidewand ab, und die Samen werden beim Zurückschnellen des Stiels in weitem Bogen weggeschleudert.




Abb. 28. Fruchtstand vom durchwachsenen Täschelkraut (Thlaspi perfoliatum). Früchte turbinenschaufelförmig. (Aufn. VONOW; 3/4 nat. Grösse).

Bei dem im Mai reifenden Täschelkraut, *Thlaspi perfoliatum* (Abb. 28), stehen die geflügelten Schötchen in Trauben. Der Fruchtstand ist hier nicht hygrochas wie bei *Iberis umbellata*; doch verblüfft uns auch diese Pflanze durch die Aehnlichkeit ihrer Früchte mit den Schaufeln von Freistrahlturbinen, auf die das Wasser aus grossen Höhen, aber in kleiner Menge fällt. Die einzelnen Schaufeln bestehen aus zwei Hohlräumen, die durch eine

scharfe Scheide, auf die der Wasserstrahl auftrifft, getrennt sind. Der Nutzeffekt solcher Freistrahlturbinen übersteigt 90 %. Es ist deshalb anzunehmen, dass ähnlich gebaute Früchte ebenfalls fast die ganze Kraft der fallenden Regentropfen aufzunehmen vermögen.

Bei dem im Sumpf wachsenden Scutellaria galericulata und auch bei S. columnae besteht der Fruchtstand aus meist paarig, einseitwendig angeordneten, zweigliedrigen Kapseln, die aus einem obern und aus einem untern, dicht anschliessenden Teil bestehen. Der untere Teil ist in der rückwärtigen Hälfte vertieft. Diese Vertiefung verläuft nach vorne zu in eine flache, quer abgeschnittene Rinne. Der obere Teil trägt einen hohlen Aufsatz und legt sich knapp an den untern an. In noch geschlossenem Zustande ist die Kapsel ein wenig nach aufwärts gerichtet. Beim fortschreitenden Eintrocknen erfolgt das Aufklaffen zuerst nur an dem vordern, schnabelartigen Rande, während rechts und links noch teilweise Kontakt besteht. Früchtchen für Früchtchen wird nun durch äussere Impulse, d. h. vor allem beim Aufschlagen von Regentropfen, herausgeschleudert, wobei die Röhre in einfachster Weise als Führung dient. Später fällt der obere Teil ganz ab, der untere senkt sich und sollte noch eines der rundlichen Früchtchen zurückgeblieben sein, so rollt es jetzt durch die schiefe Rinne zur Erde (KRON-FELD 1886).

Auch die Kelchoberlippe von Ocimum basilicum ist mit einem napfförmigen Auffangorgan für Regentropfen ausgestattet. Typische Regenballisten sind ferner Prunella vulgaris und ihre Verwandten, ferner Salvia viridis und Teucrium lamifolium. Prunella vulgaris, die am weitesten verbreitete von ihnen, hat scheinährige Fruchtstände. Die Kelche, in denen die Früchtchen stecken, sind im trockenen Zustand aufwärts gerichtet und schmiegen sich dachziegelartig der Achse an. Auch die Lippen liegen aufeinander, so dass die Früchtchen vollständig eingeschlossen sind. Werden sie benetzt, so lösen sich die Kelche von der Achse ab, indem die Stiele sich nach unten bis in die Waagrechte bewegen. Gleichzeitig klaffen auch die Lippen auseinander. Beide Bewegungen sind in etwa zwei Minuten beendet. Die Oberlippen, welche wannenförmig vertieft sind, fangen die Regentropfen auf. Durch diese werden die kurzen Stiele nach unten gebogen und streuen, ähnlich wie bei den Balgkapseln von Eranthis, beim Zurückschnellen die Samen

aus. Beim Trocknen bewegen sich die Kelche in ihre frühere Lage zurück.

c) Wirksamkeit der Verbreitung durch die Regentropfen

Die Verbreitungseinheiten der Ombrochoren werden durch die Regentropfen immer nur innerhalb der nächsten Umgebung der Mutterpflanze plaziert. Ein einziger Regenschauer bewirkt aber, dass sämtliche reifen Verbreitungseinheiten ausgestreut werden; denn die Dichtigkeit der fallenden Regentropfen ist dann gross genug, um alle Verbreitungsmechanismen einer Pflanze in Tätigkeit zu setzen. In Mitteleuropa sind im Sommer die Gewitterregen am wirksamsten, in Südeuropa die heftigen Herbstregen und in Nordafrika die Winterregen. Bekannt ist ferner die Heftigkeit der Monsun- und Tropenregen, und es ist anzunehmen, dass auch in den Gebieten, die ihrem Einfluss unterstehen, typische Vertreter der Ombrochoren aufzufinden sind.

Im Gegensatz zu den Nautochoren spielt bei den Ombrochoren der Standort der Pflanze innerhalb einer Gegend auf die Wirksamkeit der Verbreitungsvorrichtungen nur eine geringe Rolle. Wasserpflanzen und Pflanzen
trockener Standorte werden in gleicher Weise vom Regen erreicht. Das
fliessende Wasser kann jedoch, wie z. B. bei Caltha palustris, die Weiterverbreitung der Verbreitungseinheiten bewirken, während an trockenen
Standorten infolge der gleichzeitigen Durchfeuchtung der Erde meist sofort
die Keimung eingeleitet wird.

Die Verbreitungsdistanzen sind durchwegs kurz. Sie bleiben sogar hinter denjenigen der Selbststreuer zurück; doch liegen hierüber erst wenige Beobachtungen vor. Der Verfasser stellte fest, dass bei einem heftigen Regenschauer die Samen von Eranthis hiemalis bis 40 cm, diejenigen von
Thlapsi perfoliatum bis zu 80 cm weit ausgestreut wurden (MüLLER-SCHNEIDER 1936). Bei gewissen Mesembryanthemen aber werden die Samen schon bei
einer Tropfengrösse, die einem mittleren europäischen Regenguss entspricht,
2 m und noch weiter verbreitet (IHLENFELDT 1959).

d) Strömungsschwemmlinge (Bythisochoren)

Von Bächen, Flüssen und Strömen werden insbesondere bei Hochwasser mehr oder weniger regelmässig Verbreitungseinheiten oft weit ins Tal hinabgetragen, wo sie dann innerhalb der Vegetationslücken der Ufer leicht Fuss fassen und während einer Vegetationsperiode oder auch länger gedeihen können. Das spezifische Gewicht spielt bei dieser Art des Transportes eine untergeordnete Rolle. Nach SCHRÖTER (1926) wächst z. B. das Alpenleinkraut (Linaria alpina) auf dem Linthdelta am Walensee bei 424 m, am Bodensee bei 396 m und im Wallis bei 380 m. An der Etsch wurde es bei Salurn, 220 m und am Isonzo bei Görz, 88 m ü. M., noch festgestellt. Im Churer Rheintal und Domleschg treten nach VOLK und BRAUN-BLANQUET (1938) im flussbegleitenden Myricario-Chondrilletum Braun-Blanquet 1938 Erucastrum nasturtiifolium, Gypsophila repens, Linaria alpina, Campanula cochleariifolia, Poa alpina, Chrysanthemum halleri, Trifolium thalii, Astragalus alpinus und gelegentlich noch andere Arten als sogenannte Alpenschwemmlinge auf. Impatiens glandulifera ist nach LHOTSKA und KOPECKY (1966) an den tschechoslovakischen Flusssystemen der Svitava, Svratka und oberen Odra als Strömungsschwemmling zu betrachten. Aufgrund von eingehenden Untersuchungen des Driftgutes am Mittellauf des Kongo kam STOPP (1956) jedoch zum Schluss, dass der fluviatilen Hydrochorie (Bythisochorie) keine nennenswerte Bedeutung zukommt.

5. Tierwanderer (Zoochoren)

Wir kennen die grosse Bedeutung der Tiere für die Bestäubung der Blüten. Sie werden durch leuchtende Farbe, starke Düfte und kräftige Nahrung angelockt, oder finden Schutz zwischen den Blütenorganen. Gestalt und Anordnung der Blütenteile, oft sogar besondere Mechanismen, bedingen ihre

l bythis = sinken

Berührung mit dem Blütenstaub. Die Pollenkörner selbst sind von klebriger Masse überzogen oder von kleinen Warzen, Stacheln, Zäpfchen, Häkchen oder Leisten bedeckt, mittelst denen sie an den Tieren, insbesondere an den Insekten haften können.

Durch die gleichen Mittel vermögen viele Pflanzen sich auch die Verbreitung der Samen, seltener der vegetativen Verbreitungseinheiten durch Tiere zu sichern. Sie bieten wiederum Nahrung, bringen Haftvorrichtungen hervor und sorgen durch geeignete Bereitstellung der Verbreitungseinheiten für Kontakt mit den Agentien. Weil die Samen und die Brutkörper aber kompliziertere und massigere Gebilde sind als die Pollenkörner, erfordern sie auch mehr Kraft für ihren Transport. Die Tiere, die an ihrer Verbreitung teilnehmen, sind daher grösstenteils kräftigere Lebewesen als diejenigen, die die Bestäubung besorgen. Zu ihnen gehören namentlich viele Vögel und Säugetiere. Ferner wirken manche Reptilien, Fisch- und Schnekkenarten bei der Verbreitung der Keime mit. Auch die am Boden lebenden Ameisen sind stark genug, um Verbreitungseinheiten von Pflanzen zu transportieren. Für die fliegenden Insekten jedoch sind sie meist zu schwer. Nur grosse Arten wie z. B. die Wanderheuschrecken (Pachytilus migratorius) kommen für deren Transport in Frage. Auch die Regenwürmer sollten diesbezüglich noch näher untersucht werden.

Die Vielgestaltigkeit, die verschiedenen Lebensgewohnheiten und die vorzügliche Eignung einer grossen Zahl von Tieren für die Verbreitung der Pflanzen, führten zu einer entsprechenden Mannigfaltigkeit der Anpassungen bei den zoochoren Arten. Daraus ergeben sich naturgemäss auch Schwierigkeiten für das Erfassen, Beschreiben und Einteilen derselben aufgrund bestimmter Prinzipien.

Aufgrund der systematischen Zugehörigkeit der Agentien unterscheidet man Mammalioch oren (HEINTZE 1932), Ornithoch o-ren (Spinner ex HEINTZE 1932), Sauroch oren (BORZI 1911), Ich tioch oren (HEINTZE 1932), Myrmekoch oren (SERNANDER 1906) und Gastropodoch oren (MüLLER-SCHNEI-DER 1963) je nachdem Säugetiere, Vögel, Reptilien oder Schnecken den Transport der Samen bewirken. Weil unter den Säugetieren der Tropen die Flughunde eine wichtige Rolle als Samenverbreiter spielen, wurde von

VAN DER PIJL (1957) auch der Ausdruck der Chiropterochor e n geschaffen. SERNANDER (1927) fasst diejenigen Arten, deren Diasporen von Mäusen verschleppt werden, unter dem Begriff Glirozusammen. Weil auch Lumbriciden Samen transportieren (siehe choren S.132) können, müsste man der Vollständigkeit halber auch noch den Begriff Lumbricidochoren einführen. Diese Einteilung der zoochoren Arten gibt jedoch nur eine Uebersicht über die Agensgruppen, die an der Verbreitung der Verbreitungseinheiten beteiligt sind. Ueber die Verbreitungsmodi und die Anpassungen der Pflanzenarten im Hinblick auf die Verbreitung gibt sie keine Hinweise. Zudem ist es heute noch unsicher, ob es Pflanzen gibt die z. B. nur durch Säugetiere, Vögel, Reptilien oder Schnecken verbreitet werden. Einzig die mit einem Elaiosom ausgestatteten Myrmekochoren werden anscheinend nur oder hauptsächlich durch Ameisen transportiert.

Wir ziehen es deshalb vor, die Einteilung der Zoochoren aufgrund der verbreitungsbiologischen Anpassungen sowie der Verbreitungsmodi vorzunehmen und unterscheiden:

A. Pflanzen, deren Verbreitungseinheiten nur zufällig der Vernichtung durch die Agentien entgehen (Dysochoren)¹

Die Verbreitungseinheiten der Pflanzen, die dysochor verbreitet werden, enthalten reichlich Nährstoffe in Form von Fetten, Eiweiss oder Kohlehydraten und bilden deshalb wichtige Nahrungsquellen für die Tierwelt. Weil die Tiere ihren Inhalt benötigen, zerstören sie dieselben zwar meist, wenn sie sich ihrer bemächtigen, doch geht ihnen besonderer Umstände wegen dabei oft auch ein Teil verloren. Tiere, die mit Vorliebe ihre Nahrung auf den Fruchtständen selbst abholen, streuen bei ihrer Tätigkeit einen Teil der Samen in der Nähe der Mutterpflanze aus, indem sie sie umherschmeissen und die Fruchstände erschüttern. Auf diese Weise können

l dys = miss

beispielsweise Birken- (Betula), Erlen- (Alnus) und Distel- (Carduus)
Samen durch die Distelfinken (Carduelis carduelis), Breitwegerichsamen
(Plantago major) und Grasfrüchte durch den Bluthänfling (Carduelis cannabina), Gänsefuss- (Chenopodium album) und Brennesselsamen (Urtica dioeca)
durch den Feldsperling (Passer montanus) verbreitet werden. Auch manche
Wasservögel, z. B. die Enten (Anas), verzehren viele Verbreitungseinheiten und verbreiten sie dabei.

Viele Tiere, namentlich die Ernteameisen des Mittelmeergebietes (Aphaenogaster und Messor), die Spechtmeise (Sitta europaea), die Häher (Garrulus und Nucifraga), gewisse Spechte (Dryobates major), Eichhörnchen (Sciurus vulgaris), der Siebenschläfer (Glis glis), die Haselmaus (Muscardinus avellanarius), die Waldmaus (Apodemus silvaticus), der Hamster (Cricetus cricetus) und die Taschenratte (Geomys bursarius) verzehren die Samen meist nicht am Ort, sondern tragen sie an einen sichern Platz, um sie in Ruhe bearbeiten und speisen zu können, oder für nahrungsarme Zeiten aufzustapeln. Der Wegtransport und die Aufstaplung der Samen führt dann öfters zu deren Verbreitung, weil sie in den Verstecken vergessen werden oder infolge von Störungen aufgegeben werden müssen. Namentlich die Häher transportieren viele Samen oder Früchte im erweiterungsfähigen Schlund und würgen sie dann wieder aus, um sie unter Wurzeln und Steinen zu verstecken. Die Spechtmeise steckt sie in Rindenspalten oder Mauerritzen (Abb. 29). Eichhörnchen benützen vielfach Höhlungen unter Baumwurzeln als Versteck. Der Hamster trägt seine Ernte wie die Ernteameise in den Bau ein. Er verfügt sogar über besondere Backentaschen zur vorübergehenden Aufnahme der Nahrung. Bei drohender Gefahr entleert er sie, um das Gebiss zum Kampfe brauchen zu können. In den Tropen verhalten sich manche Affen, wie Makaken und Paviane, ähnlich und tragen dadurch auch zur Verbreitung der Samen bei.

Die Ernteameisen (Messor) wurden in der Garrigue von Montpellier und Umgebung beim Eintragen von Verbreitungseinheiten folgender Pflanzen beobachtet: Aegilops ovata, Ae. triaristata, Avena bromoides, A. barbata,
Scleropoa rigida, Stipa gallica, Muscari neglectum, Iris chamaeiris, Cerastium pumilum, Alyssum calycinum, mehrere Medicago- und Trifolium-Spezies, Trigonella monspeliaca, Scorpiurus subvillosus, Ornithopus com-

pressus, Hippocrepis unisiliquosa, Erodium cicutarium, Helianthemum salicifolium, Cistus monspeliensis, C. albidus, Fumana ericoides, F. viscida,




Abb. 29. Durch den Kleiber (Sitta europaea) in Baumrinde eingeklemmte Früchte der Hasel (Coryllus avellana) und der Sonnenblume (Helianthus annus). (Aufn. NIESTLE-BAVARIA; 1/2 nat. Grösse).

Euphorbia segetalis, Sideritis romana, Thymus vulgaris, Rosmarinus officinalis, Bellis silvestris, Tyrimnus leucographus, Carduus pycnocephalus, Hedypnois cretica und Crepis nemausensis (Müller-Schneider 1933). Weitere Samentransporte durch Ernteameisen beobachtete z. B. auch SERNANDER (1906). Die Samen komplizierter Verbreitungseinheiten werden in der Regel erst im Nest von ihren Hüllen befreit und die Abfälle in Form von regelrechten Müllhaufen ausserhalb des Nestes deponiert. Wenn der Bau den Ameisen nicht mehr zusagt, ziehen sie mit ihrer ganzen Habe um, wobei wiederum Samen verloren gehen. Nach einem solchen Umzug wurden vom Ver-

fasser (1933) auf einer 5 m langen Ameisenstrasse 54 *Medicago*-Samen gefunden, die alle den Tieren verloren gegangen sein mussten, weil die Früchte dieser Pflanzen sich normalerweise nicht öffnen.

Es scheint, dass in Mitteleuropa die Rasenameise (Tetramorium caespitum) gelegentlich in ähnlicher Weise wie die Ernteameisen des Mittelmeergebietes bei der Verbreitung der Samen mitwirkt. In Altnau am Bodensee wurde sie an einer Moränenböschung während mehreren Wochen beim Eintragen der Verbreitungseinheiten von Setaria viridis, Poa trivialis, Hypericum perforatum, Linaria minor, Senecio vulgaris und Sonchus asper beobachtet (MüLLER-SCHNEIDER 1932). Am 22.8.1931 wurden daselbst bei sonnigem Wetter von 16.05 - 16.20 Uhr 32 Verbreitungseinheiten eingetragen.

ESCHERICH und LUDWIG (1898) stellten in ihren Nestern Verbreitungseinheiten von Panicum sanguinale und Stellaria media fest. Nach STäGER
(1929) legt sie im Süden wie die Messor-Arten eigentliche Samendepots an.
Er konnte aber auch am Ober-Aletschgletscher in fast 2000 m Höhe noch in
zahlreichen Nestanlagen dieser Ameise bedeutende Ansammlungen von Samen
der hochalpinen Kleeart Trifolium thalii feststellen.

Ausser Messor und Tetramorium stapeln in den Mittelmeerländern und Teilen Asiens auch einige Arten der Gattung Pheidole Samen als Vorräte in ihren Nestern auf.

In Amerika (Texas) sind Pogonomyrmex barbatus und Ephebomyrmex imberbiculus Ernteameisen. Pogonomyrmex barbatus sammelt nach COOK (zit. in SAYO 1922) mit Vorliebe die Verbreitungseinheiten der Nadelgräser Aristida obligantha und A. stricta. Ferner auch diejenigen von Buchloë dactyloides, Panicum, Crozon, Paspalmum, Polygonum, Evanogrostis, Euphorbiaceae, Malvaceae usw.

Eine ganze Anzahl europäischer Vögel und Säuger verschleppt und speichert mit grosser Vorliebe die nährstoffreichen Samen bzw. Früchte der Arve (*Pinus cembra*), Walnuss (*Juglans regia*), Hasel (*Corylus avellana*), Buche (*Fagus silvatica*), Edelkastanie (*Castanea sativa*) und der Eichen-(*Quercus*) Arten (Abb. 30). Die speziellen verbreitungsökologischen Verhältnisse diese Pflanzen sind folgende:




Abb. 30. Depot einer Waldmaus (*Apodemus silvaticus*) in einer Zwergspechthöhle. Inhalt: 28 Bucheckern, 6 Eicheln und 17 Haselnüsse. (Aufn. NIESTLE-BAVARIA; 2/3 nat Grösse).

Pinus cembra. - Die Zapfen lösen sich mitsamt den Samen im Frühjahr von den Zweigen ab, werden zum Teil aber schon im Herbst von den Tieren auf den Bäumen abgeholt. Die Samen sind im Gegensatz zu denjenigen der europäischen Pinus-Arten gross und tragen nur einen kleinen Flügelrest. Der eigentliche, kurze Flügel bleibt mit der Fruchtschuppe verbunden und löst sich auch bei der Samenreife nicht ab. Das Gewicht der Samen beträgt 0,20 bis 0,25 g. dasjenige der Samen von Pinus silvestris dagegen samt Flügel nur 8 bis 9 mg. Die Schale ist bis 2 mm dick, holzig, hart und glattwandig, und der Same gleicht daher einer Nuss. Sein Keimling ist in eine dicke Schicht ölreichen Endosperms eingebettet. Ferner ist die An-

wesenheit von Stärke, die den übrigen Nadelholzsamen fehlt auffällig. Als Verbreiter wirken hauptsächlich der Mensch, das Eichhörnchen (Sciurus vulgaris), die Haselmaus (Muscardinus avellanarius), der Grosse Buntspecht (Dryobates major) und der Nusshäher (Nucifraga caryocatactes). Der Nusshäher trägt bis 60 Samen in seinem Schlund fort, würgt sie wieder aus und legt im Herbst unter Steinen Vorräte davon an. Ausserdem trifft man oft weggeworfene Zapfen, die noch unversehrte Nüsschen enthalten. Im Norden sind sie die Hauptnahrung der Zobel (Mustela zibellina).

Juglans regia. - Als Verbreitungseinheit löst sich die kugelige, glatte, einsamige, 6 - 7 g schwere Steinfrucht von der Mutterpflanze ab. Ihre Schale besteht aus einem unregelmässig sich ablösenden, anfänglich grünen, später braunen, zähfleischigen Exokarp, und einem steinharten, runzeligen Endokarp von bis zu 2 mm Dicke. Das Endokarp ist ölreich und enthält auch Eiweiss. Die Reife erfolgt von Ende September bis Ende Oktober. Als Verbreiter wurden, abgesehen von Menschen, Eichhörnchen, Mäuse, Siebenschläfer, Raben- und Nebelkrähen (Corvus) beobachtet.

Die Rabenkrähen fliegen zuweilen mit einzelnen Nüssen im Schnabel weg, um sie über hartem Grund fallen zu lassen, auf dem dann die Schalen zerbrechen und die begehrten Nusskerne freigeben. Selbst beobachtete derartige Transporte erfolgten von einem Baum zum nächsten, rund 200 m entfernten, Bahnkörper.

Auch die zu den Juglandaceen gehörenden nordamerikanischen Hickory-Bäume produzieren harte Nüsse, deren Kerne bei den Menschen und manchen Tieren beliebt sind.

Corylus avellana. - Ende August bis Mitte Oktober fallen die Früchte aus dem Fruchtbecher aus. Sie sind eiförmige Nüsse mit glatter, holziger Schale. Ihr Gewicht beträgt durchschnittlich 0,72 g. Sie enthalten viel fettes Oel, aber auch Stärke und Eiweiss. Wichtige Verbreitungsagentien sind die Menschen, Eichhörnchen, Mäuse, Siebenschläfer, Häher und Kleiber. Ein Nusshäher transportiert 8 - 15 Nüsse pro Flug und unter günstigen Umständen rund 4'000 Stück pro Tag.

Fagus silvatica. - Die Verbreitungseinheit ist eine einsamige, dreikantige, rotbraune, reichlich ölhaltige Nuss von 0,25 g Gewicht. Ihre Fruchtwand ist eine zähe, lederartige Schale. Die Reife erfolgt im September und Oktober. Als Verbreiter wirken ausser den Menschen z. B. Eichhörnchen, Wildschweine, Schlafmäuse, Waldmäuse, Ringeltauben, Buntspechte, Berg- und Buchfinken, Kernbeisser und Kleiber.

Castanea sativa. - Die glattwandigen, schweren, stärkereichen Trockenfrüchte fallen mit der Cupula von Ende September bis Mitte Oktober von
den Bäumen ab. Diese öffnet sich im Oktober. Die Verbreitung erfolgt
hauptsächlich durch Menschen, Eichhörnchen, Siebenschläfer, Mäuse, Krähen, Rabenkrähen und Häher, sowie gelegentlich auch durch Wildschweine.

Quercus robur. - Die Verbreitungseinheit ist eine eiförmige bis zylindrische Nuss mit glatter, lederartiger Fruchtwand und einem grossen
Embryo. Sie wiegt 1,5 bis 2,5 g und reift Ende September oder im Oktober.
Eichhörnchen, Saatkrähen, Spechte, Eichelhäher, Spechtmeisen, Kleiber und
Ringeltauben holen die Früchte auf den Bäumen ab. Der Eichelhäher trägt
dabei auf einmal bis 8 Stück in seinem Schlund fort. Was nicht abgeholt
wird, fällt auf den Boden und wird gelegentlich noch von Mäusen, Wildschweinen und Enten verschleppt.

In Amerika legt auch ein Teil der Sammel- und Bindespechte Vorräte an. Der Rotkopfspecht (Melanerpes erythrocephalus), dessen Nahrung zur Hälfte aus Eicheln und andern Früchten besteht, benützt natürliche Höhlungen als Verstecke und tarnt sie. Der Eichelspecht (Melanerpes formicivoris) hackt Löcher, sogenannte Eichelbecher, in die Rinde von Eichen und Nadelbäumen um die Vorräte unterzubringen.

Ferner sind viele Arten mit fleischigen Früchten nicht nur endo(siehe S.122) sondern auch dysochor. So befinden sich in den Depots von
Waldmäusen (Apodemus silvaticus) neben Nüssen und Getreidekörnern nicht
selten auch Steinkerne von Prunus-Arten; in den afrikanischen Tropen bemächtigen sich die Menschen und Schimpansen z. B. der nährstoffreichen
Samen der Brotfruchtbäume (Treculia).

Die starken Schalen, die die Samenkerne all dieser Pflanzen schützend umgeben, leisten den Tieren, die sie verzehren wollen, erheblichen Widerstand und zwingen sie, sie wegzutragen, um sie in Ruhe bearbeiten zu können. Was beim Transport und beim Aufbrechen entwischt, ist für sie meist

schwer wieder auffindbar und wird aufgegeben, besonders, wenn der Anfall an Nahrung auf einmal so gross ist, dass es sich nicht lohnt, einzelne Samen aufzusuchen.

Die Spechtmeise wirkt auch als gute Verbreiterin von Sonnenblumen, Helianthus annuus. Sie versteckt die pappuslosen, mit einem faserreichen, spröden Perikarp ausgestatteten Früchte dieser Kulturpflanze in Mauerritzen und Rindenspalten, wo sie oft aufgehen.

Auch Samen, deren Verbreitung hauptsächlich durch den Wind erfolgt, können gelegentlich auf dysochorem Weg verbreitet werden. So tragen der Fichtenkreuzschnabel (Loxia curvirostra), der Grosse Buntspecht (Dryobates major) und das Eichhörnchen samenhaltige Zapfen der Fichte (Picea excelsa), und der Föhrenkreuzschnabel (Loxia pityopsittacus) solche von Pinus fort und lassen sie oft fallen, bevor sie dieselben aller Samen beraubt haben. 34 Fichtenzapfen, die ein Grosser Buntspecht während der Monate Januar, Februar und März im Jahre 1952 in Chur zu einem etwa 60 m entfernten Birnbaum getragen hatte, konnten noch 1545 Samen entnommen werden.

Eine andere Möglichkeit zur Verbreitung von als Nahrung dienenden Samen ist die, dass sie ab und zu den Darmkanal ihres Verzehrers in noch keimungsfähigem Zustande wieder verlassen können, wie beispielsweise Untersuchungen von KEMPSKI (1906) zeigen. Er machte bei Fütterungsversuchen folgende Feststellungen:

1. Lithospermum arvense.

Abgang beim Huhn 4 %, davon Keimung bei 25 %; Abgang bei der Wachtel 4 %, davon Keimung bei 27 %.

2. Rumex acetosella.

Abgang bei einer Taube 4 %, davon Keimung bei 22 %.

Im Kot von zwei Haussperlingen, denen er verschiedene Sämereien gefüttert hatte, fand er keimfähige Samen von Rumex acetosella und Chenopodium album. Aehnliche Untersuchungsergebnisse verdanken wir auch W. E. COLLINGE (siehe RIDLEY 1930, S. 440). Im allgemeinen pressen die Kegelschnäbler aber die Körner im Schnabel, bis die Schale springt und der Samenkern frei wird. Durch den Darmkanal kann wohl nur unverdaut hindurch,

was zufällig ohne diese Vorbehandlung im Schnabel in den Magen gelangt. Auch die Verbreitung der Samen durch Tauben und Hühnervögel mit dem Kot erfolgt in der Regel nur zufällig. Sie schlucken zwar die Samen ganz, zertrümmern sie aber normalerweise im hiefür speziell ausgebildeten Kaumagen. Von eigentlicher endochorer Verbreitung (siehe Seite 115) darf hier noch kaum gesprochen werden.

Wir erwähnen ferner noch, dass z. B. Vögel, die noch unversehrte Samen oder Brutkörper im Schlund oder Kropf haben, auf ihrer Wanderung Raubtieren zum Opfer fallen können. So fand RIDLEY (1930, S. 497) eine tote Taube mit keimenden Eicheln im Kropf. Von den vegetativen Verbreitungseinheiten sind insbesondere die Bulbillen von Polygonum viviparum häufig in Kröpfen von Schneehühnern (Lagopus) festgestellt worden.

Bei der dysochoren Verbreitung handelt es sich wohl um einen allein durch die Umstände gegebenen Verbreitungsmodus. Spezielle Verbreitungsmittel scheinen dafür nicht ausgebildet zu werden. Immerhin fallen manche Verbreitungseinheiten durch die starken Schutzhüllen auf, die den Keimling und die Reservestoffe einschliessen.

der Dysochorie hat sich In bezug auf die Wirksamkeit ergeben, dass sie wenigstens bei vielen grossamigen Arten vollkommen genügt, um ihnen ihr Areal zu sichern und sofern die Verhältnisse es gestatten, auch zu vergrössern. Besonders eindrücklich zeigt uns dies die Besiedlung des Gebietes an der obern Waldgrenze in den Alpen mit Arven (Pinus cembra). Der Förster hat grosse Mühe sie daselbst anzusiedeln; wo aber der Nusshäher (Nucifraga caryocatactes) sich ihrer Samen in Menge bemächtigen kann, breitet sie sich ohne Zutun des Menschen schnell und sicher aus. Von der Unmenge der Samen, die die Arvenbäume in einem Samenjahr hervorbringen, kann ohnehin nur ein kleiner Teil aufkommen, deshalb spielt es wie bei den Pollenkörnern der windblütigen Pflanzen keine Rolle, wenn ein grosser Teil im Dienste der Verbreitung der Art geopfert werden muss. Der Schaden, der durch die Vorliebe des Vogels für die Arvennüsschen entsteht, erweist sich im Artenleben nur als ein scheinbarer und wird durch die Sicherung der Verbreitung mehr als aufgewogen.

Während durch die Ernteameisen, die körnerfressenden Kleinvögel, die

Spechtmeisen und die kleinen Säuger im allgemeinen nur eine Verbreitung der Samen in der nähern Umgebung der Mutterpflanzen erfolgt, tragen die grösseren Vögel und Säugetiere sie oft mehrere hundert Meter, ja sogar Kilometer weit fort. Die besten direkten Beobachtungen über Samentransporte durch Vögel verdanken wir SCHUSTER (1950). Im Herbst 1949 hatte er am Vogelsberg in Deutschland Gelegenheit, das Sammeln der Eicheln durch die Eichelhäher genau zu verfolgen. Sie entfalteten vom 20. September bis zum 25. Oktober daselbst eine äusserst rege Sammeltätigkeit. Vom frühen Morgen bis zum späten Abend flogen sie in einem etwa 37 ha grossen Eichenwald ununterbrochen zu und ab, um Eicheln zu holen, wegzutragen und wiederzukommen. Sie begannen am Morgen bereits zwischen 6.30 und 7 Uhr damit und sammelten bis etwa 18 Uhr abends, also während zirka 11 Stunden pro Tag. In der Stunde fanden durchschnittlich 180, bei Spitzenleistungen bis zu 260 Abflüge statt. Daran waren etwa 65 Vögel beteiligt. Ein einzelner Vogel trug mindestens 5 - 6 Eicheln auf einmal im Schlunde fort. Rechnet man mit einer Sammelzeit von 30 Tagen, so wurden in diesem Zeitraum aus dem erwähnten Eichenbestand mindestens 300'000 Eicheln weggetragen. Die Durchschnittsleistung des einzelnen Vogels betrug somit rund 4600 Eicheln. Der weitaus grössere Teil der Vögel erhob sich hoch in die Luft und steuerte Wäldern zu, die in der Luftlinie bis zu 4 km entfernt waren. Bei Flugstrecken von 4 km benötigen die Vögel für zwei Hin- und Rückflüge einschliesslich des Aufenthaltes am Sammel- und Versteckplatz nicht ganz eine Stunde, so dass selbst auf diese verhältnismässig grosse Distanz noch ein ausgiebiger Transport festgestellt werden konnte. Voraussetzung für eine so weite Verbreitung scheint allerdings das Vorkommen anderer Waldgesellschaften in der entsprechenden Entfernung zu sein.

SUTTER und AMMANN (1953) beobachteten Transporte von Arvennüsschen durch Nusshäher aus dem Oberengadin ins südliche Bergell über Distanzen von 10 - 12 km und SWANBERG (1951) konnte feststellen, dass die schwedischen Nusshäher nur in 86 von 100 Fällen auf der Suche nach versteckten Haselnüssen (Corylus avellana) erfolgreich waren. KRäMER (1967), der ein Eichhörnchen (Sciurus vulgaris) beim Plündern der Verstecke in einem Fichtenwald des schweizerischen Mittellandes beobachten konnte, sah, dass nur 11 von 17 Grabungen erfolgreich waren und untersuchte darauf die 6

Stellen, an denen es nichts gefunden hatte. An zweien davon fand er nichts, an dreien stiess er etwas tiefer oder dicht daneben auf Bucheckern (Fagus-Früchte) und an der sechsten auf einen Kieferzapfen. Nach CAHALANE (1942) fanden amerikanische Eichhörnchen (Sciurus niger rufiventer) im Laufe eines Winters 99 % der selbst vergrabenen Nüsse wieder. Bei Waldmäusen (Apodemus silvaticus) konnten Transportdistanzen bis zu 50 m und bei Gelbhalsmäusen (Apodemus flavicollis) bis zu 80 m festgestellt werden (MOHR 1950). Ernteameisen sammeln im Umkreis von bis zu 100 m Verbreitungseinheiten ein.

Es scheint jedoch, dass nicht alle Tiere, die sich des nahrhaften Inhalts gewisser Samen bemächtigen, auch wesentlich zu deren Verbreitung beitragen. Der Palmendieb (Birgus latro), ein Einsiedlerkrebs, der auf die Kokospalmen klettert und mit seinen kräftigen Scheren Kokosnüsse abschneidet, öffnet dieselben am Ort wo sie hingefallen sind. Er kann sie höchstens etwas verschieben, niemals aber wegtragen. Auch Tiere wie das Wildschwein (Sus scrofa) und das Rotwild (Cervidae) sind vermutlich als Verbreitungsagentien der Dysochoren wenig wirksam. Ja, es scheint bei manchen Arten, als wollten sie ihnen ihre Samen verbergen, indem sie diese durch das fallende Laub bald tarnen und zudecken.

B. Mundwanderer (Stomatochoren) 1

a) Verbreitungseinheiten mit Oelkörper

Schon MOGGRIDGE, LAGERHEIM, KUNTZE, LUNDSTRÖM und ROBERTSON (SERNANDER 1906, S. 4) haben beobachtet, dass gewisse Ameisenarten wie Lasius niger, L. fuliginosus und Myrmica rubra, Samen mit grossen Nabelschwielen eintragen.LAGERHEIM stellte dann als erster Oel in den Anhängseln von Viola-Samen fest und vermutete, dass dasselbe auf die Ameisen anlockend wirke.

¹ stoma = Mund

In der Folge hat besonders SERNANDER (1901 und 1906) durch zahlreiche Experimente die grosse Bedeutung der ölhaltigen Anhängsel für die Verbreitung der Samen durch Ameisen bewiesen. Er führte für sie die Bezeichnung Oelkörper oder Elaiosomen ein.

Nach BRESINSKY (1963) enthalten sie mit wenigen Ausnahmen Fett, Zukker und Rizinolsäure. Ausserdem meist noch die Vitamine B₁ und C. Verhältnismässig selten ist auch etwas Stärke vorhanden. Kein Fett enthalten z. B. die Elaiosomen von Melica nutans, Luzula campestris und Veronica hederifolia, keinen Zucker diejenigen von Carduus nutans, Polygala amarella, Viola elatior und V. lutea. Die Rizinolsäure bewirkt die eigentliche Anlockung der Ameisen. Um die Wirkung der Elaiosomen als Verbreitungsmittel zu prüfen, legte SERNANDER von vielen Pflanzen Verbreitungseinheiten mit und ohne Elaiosomen auf Ameisenstrassen und beobachtete, wie aus den folgenden Beispielen hervorgeht, den Abtransport derselben.

 Experiment mit Samen von Chelidonium majus und Helleborus foetidus, ausgeführt am 5.9.1900 im Botanischen Garten von Uppsala mit Formica rufa (1901, S. 264 und 265).

			Uebi	riggel	oliebe	n:		
nachmittags (Std.,Min.)	1,47	1,48	1,50	1,52	1,53	1,55	1,58	
Chelidonium majus,								
Samen mit Oelkörper	10	6	4	4	4	2	2	
Chelidonium majus,	10	10	10	10	0	7	-	
Samen ohne Oelkörper Helleborus foetidus,	10	10	10	10	9	7	7	
Samen mit Oelkörper	10	7	5	4	1	1	0	
Helleborus foetidus,								
Samen ohne Oelkörper	10	8	6	5	1	0	0	
Helleborus foetidus,	- 0							
Oelkörper allein	10	10	6	4	0	0	0	
nachmittags (Std.,Min.)	1,59	2,0	2,2	2,3	2,10	2,35	2,55	3,31
Chelidonium majus,								
Samen mit Oelkörper	1.	1	1	0	0	0	0	0
Chelidonium majus,	_	_			_	20	2	
Samen ohne Oelkörper Helleborus foetidus,	6	5	4	4	3	1	1	0
Samen mit Oelkörper	0	0	0	0	0	0	0	0
Helleborus foetidus,	ŭ		J	J	Ū	Ü	•	v
Samen ohne Oelkörper	0	0	0	0	0	0	0	0
Helleborus foetidus,								
Oelkörper allein	0	0	0	0	0	0	0	0

 Experiment mit Samen von Moehringia muscosa und Helleborus purpurascens, ausgeführt am 27.5.1903 bei Genua mit Lasius cf. niger. Bewölkt, kühl, Boden vom Regen durchtränkt (1906, S. 43).

Uebriggeblieben:

nachmittags(Std.,Min)	4,52	4,53	4,54	4,55	4,58	4,59	5,0	5,1	5,4	5,5	6,2
Moehringia muscosa, Samen mit Oelkörper	10	10	8	5	4	3	2	1	1	0	0
Moehringia muscosa, Samen ohne Oelkörper	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Helleborus purpurascens Samen	, 10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Es wurden zwar bei den vielen Versuchen SERNANDERS vereinzelt auch Verbreitungseinheiten noch weggetragen, von denen er die Elaiosomen entfernt hatte. Diejenigen ohne Oelkörper scheinen aber dem Ameisenvolk keinerlei Nutzen mehr zu bieten, denn schon SERNANDER selbst (1906) stellte fest, dass Samen von Corydalis nobilis, C. intermedia, Chelidonium majus, Viola suavis, V. pubescens, Rosmarinus officinalis, Veronica hederifolia die kein Elaiosom mehr besassen, durch Lasius niger-Arbeiterinnen wieder aus dem Nest entfernt wurden.

Ferner konnte der Verfasser beobachten, wie eine Camponotus cruentatus-Arbeiterin eine Teilfrucht von Rosmarinus officinalis aus dem Nest beförderte (MüLLER-SCHNEIDER 1933) sowie ausgebeutete Samen von Chelidonium majus durch Myrmica rubra und solche von Scilla bifolia und Veronica hederifolia in besonders grosser Zahl durch Lasius emerginatus-Arbeiterinnen aus dem Nest trugen, nachdem sie die Elaiosomen abgetrennt hatten. Vor einem Nesthaufen von Formica rufa in 3 - 9 m Entfernung, von Lasius emerginatus ausgebeutete Samen wurden bald ergriffen, vom Nest noch weiter weggetragen und auch seitlich der Ameisenstrassen fallen gelassen (MüLLER-SCHNEIDER 1971).

Als Beispiele von Pflanzen, deren Verbreitungseinheiten mit einem Elaiosom ausgestattet sind (Abb. 31 und 32), seien noch genannt: Melica nutans, M. uniflora, Carex digitata, C. ornithopoda, Luzula pilosa, L. forsteri, Colchicum autumnale, Ornithogalum umbellatum, Galanthus nivalis, Asarum europaeum, Moehringia muscosa, Helleborus foetidus, Hepatica

triloba, Corydalis cava (Abb. 31), C. solida, Polygala vulgaris, P. monspeliaca, Euphorbia peplus, E. characias, Viola odorata, Primula vulgaris, Symphytum bulbosum, Borago officinalis, Nonnea lutea, Pulmonaria maculosa, Ajuga reptans, A. iva, Lamium album, L. maculatum, Melampyrum arvense, M. silvaticum, Veronica agrestis, V. polita und Centaurea montana.



Abb. 31. Same mit weissem, gekrümmten Elaiosom von Corydalis cava.

Noch auf einer der beiden Fruchtklappen sitzend. (Aufn. CASPAR, 2x).

In morphologischer Hinsicht sind die Elaiosomen, wie insbesondere SERNANDER (1906) dargetan hat, bei den einzelnen Arten verschiedenen Ursprungs. Bei der nordischen Puschkinia fehlen eigentlich differenzierte Elaiosomen; aber die Zellwände der dünnen Samenschalen sind mit Oel imprägniert. Viola odorata, Chelidonium majus, Luzula pilosa, Primula vulgaris und verschiedene Euphorbia-Arten besitzen ölhaltige Samenschwielen. Bei den Früchten von Hepatica triloba ist die Basalpartie, und bei Parietaria lusitanica die Basis des Perigons als Elaiosom ausgebildet. Bei Ajuga reptans, Lamium album, Myosotis sparsiflora bilden sich Teile

der Blütenachse oder des Blütenstiels, und bei Carex digitata die Basis des Utriculus zum Elaiosom um. Das Elaiosom von Melica nutans geht vermutlich aus einem Teil der Infloreszenz hervor. VAN LEEUWEN (1927) entdeckte sogar zwei tropische, epiphytisch lebende Orchideenarten, nämlich Acriopsis javanica und Dendrochilum pallideflavescens, die durch Ameisen verbreitet werden. Die Samen von Dendrochilum sind viel grösser als diejenigen von anderen epiphytischen Orchideen; an beiden Seiten sind sie lang ausgezogen, das eine Ende ist kolbenförmig angeschwollen, und die Zellen dieses Teiles sind mit sehr grossen Oeltropfen dicht gefüllt. In den übrigen Zellen befinden sich Oeltropfen, aber diese sind klein und nur gering an Zahl.




Abb. 32. Verbreitungseinheiten von Mundwanderern mit Oelkörper.

1. Samen von Puschkinia scilloides (nur Zellwände der Samenschale mit Oel imprägniert(6x). 2. Same von Luzula pilosa (1 1/2x).

3. Same von Primula vulgaris (4x). 4. Frucht von Hepatica triloba (4x). 5. Frucht mit anliegender Blütenhülle von Polygonum capitatum (4x). 6. Frucht von Myosotis sparsiflora (8x). 7. Teilfrucht von Lamium maculatum (5x). 8. Frucht mit Perigon von Thesium alpinum (3x). 9. Frucht mit Fruchtschlauch von Carex montana (5x). 10. Frucht mit Spelzen und Rachis von Melica nutans (2 1/2x). (Nach ULBRICH, 1928).

Ausser durch die Ausbildung von Elaiosomen zeichnen sich die stomatochoren Pflanzenarten noch durch weitere Eigentümlichkeiten aus. meisten blühen und fruchten frühzeitig im Jahr, also zu einer Zeit da ihre Verbreitungsagentien die regste Tätigkeit entfalten. Herbstblüher wie Colchicum autumnale und Cyclamen europaeum (s.S.113) reifen ihre Früchte te erst im Sommer des folgenden Jahres und erreichen so den nötigen Kontakt mit den Ameisen. Ferner sind viele Arten primär autochor, so manche Viola-, Euphorbia- und Mercurialis-Arten, oder barochor wie Scilla bifolia, Hepatica trilobia, Primula vulgaris, Ornithogalum umbellatum und andere. Die reifen Verbreitungseinheiten werden somit den Ameisen direkt auf den Boden gelegt und sind ihnen dadurch leicht zugänglich. Kaum sind sie abgefallen oder haben sich die Kapseln geöffnet, so werden sie auch schon von den mit einem feinen Geruch-, Geschmack- und Tastsinn ausgestatteten Tierchen gewittert und abgeholt. Pflanzen deren Früchte mit einem Elaiosom ausgestattet sind, aber nicht auf den Boden abgelegt oder ausgestreut werden, sind z. B. Lamium album und L. purpureum. Trotzdem werden auch ihre Früchtchen von den Ameisen gefunden. Sie klettern an den Stengeln hoch und ziehen dieselben mühsam aus den glockenförmigen, aufrecht-waagrecht stehenden Kelchen.

Die Verbreitung der Samen erfolgt dadurch, dass die des Elaiosoms beraubten Verbreitungseinheiten wieder aus dem Nest entfernt werden. Sie werden aber auch oft schon auf dem Transport zum Nest aufgegeben oder gehen zwischen Erdteilchen und Mauerritzen verloren, wo sie dann keimen können. STäGER (1924) hat zudem festgestellt, dass die Oelkörper mancher Thesium-Früchte von den Ameisen schon unterwegs verzehrt werden.

b) Verbreitungseinheiten mit Pulpa

Auf prinzipiell dieselbe Weise wie bei den Pflanzen, die Oelkörper bilden, erfolgt die Verbreitung der Samen bei einer kleinen Zahl von Arten mit fleischigen Verbreitungseinheiten. So gibt es innerhalb der Gattung Thesium sowohl Arten wie Th. alpinum und Th. pyrenaicum, deren Verbreitungseinheiten mit einem Oelkörper ausgestattet sind, als auch solche,

wie Th. rostratum mit gelben, saftigen Steinfrüchten. Auf die Früchte von Th. rostratum sind die Ameisen ebenfalls erpicht. Dasselbe gilt auch für die gelben bis orangefarbigen Beeren von Daphne striata. In den Kapselfrüchten von Cyclamen europaeum hingegen sitzen die klebrigen, bei Formica-Arten beliebten Samen auf einer erbsengrossen, pulpaartigen, orangefarbigen Placenta (Abb. 33), die auch abgetragen wird (MüLLER-SCHNEIDER 1963).




Abb. 33. Längsschnitt durch eine offene Frucht von Cyclamen europaeum. P: Placenta = Elaiosom. (4x).

Nach ULE (ULBRICH 1928, S. 112) besitzen die Ameisenepiphyten des Amazonasgebietes ebenfalls kleine beerenartige Früchte. Ihre Samen werden von den Ameisen gesammelt und in sogenannten Ameisengärten kunstge-

recht ausgesät und hochgezogen. ULE konnte feststellen, dass die Zusammensetzung der Gärten je nach Ameisenart verschieden ist. Die Ameise Camponotus femoratus baut Gärten, welche die Grösse eines Kürbis erreichen können und aus folgenden Pflanzen bestehen: Den Araceen Philodendron myrmecophilum, Anthurium scolopendrinum var. poiteauanum, den Bromeliaceen Streptocalyx angustifolius und Aechmea spicata, der Piperacee Peperomia nematostachya, der Gesneriacee Codonanthe uleana und von Phyllocactus phyllanthus. Kleinere, aber eleganter gebaute Gärten stellen die Azteca-Arten (A. traili, A. ulei und A. olitrix), die meist auf niederen Bäumen und Sträuchern leben, her. Ihre Gärten enthalten folgende Pflanzen: Philodendrom myrmecophilum, die Bromeliacee Nidularium myrmecophilum, die Feige Ficus paraënsis, die Solonacee Marckea formicarum und Ectozoma ulei und die Gesneriacee Codonanthe formicarum.

In diesen Ameisengärten sind 14 Pflanzenarten festgestellt worden, von denen nach ULBRICH (1928) nur zwei, nämlich Phylocactus phyllanthus und Peperomia nematostachya wohl auch an andern Stellen vorkommen, während die übrigen 12 Arten ausschliesslich nur in den Ameisengärten zu finden sind. Auch KUNTZE (1877) erwähnt schon, dass in Südamerika die Ameisen die Samen von Carica papaya verschleppen. LOCK gibt 1904 (ULBRICH 1928, S. 114) einen kurzen Bericht über die Verbreitung der Samen von Turmera ulmifolia, woraus hervorgeht, dass die Ameisen durch den Arillus der Samen angelockt werden, und WINKLER (ULBRICH 1928, S. 115) beobachtete, wie die fleischigen Arillargebilde an den Samen der Bligthia-Arten und anderer Sapindaceen stets von Ameisen abgenagt waren. Von den javanischen Stomatochoren tragen die Rubiaceen Myrmecodia echinata und Hydnophytum formicarum Beerenfrüchte. Die Zellen ihrer Samenschalen und des weichen Fruchtfleisches enthalten nach VAN LEEUWEN (1929) ebenfalls reichlich Oeltropfen.

Im Gegensatz zu den farbenprächtigen, fleischigen Verbreitungseinheiten, die hauptsächlich durch Vögel und Säuger verbreitet werden (siehe
S. 123), sind die Elaiosomen oder beerenartigen Früchte weiss, oder gelb
bis orange gefärbt, was mit dem Fehlen des Farbsinnes bei den Ameisen im
Zusammenhang stehen dürfte, indem für das Ergreifen derselben einzig
Helligkeitsunterschiede von Bedeutung sind.

Als Verbreitungsagentien sind bei den mitteleuropäischen Pflanzen hauptsächlich Lasius-, Formica-, Camponotus- und Myrmica-Arten tätig. Das Elaiosom von Chelidonium majus, Corydalis, Melampyrum und Veronica scheint vollständig verzehrt zu werden. Bei Carex und Thelygonum bleibt nach SERNANDER (1906, S. 386) ein mehr oder weniger durchbrochenes Häutchen zurück. Harte Elaiosomen, wie diejenigen von Melica, scheinen unregelmässig, aber immer tief und kräftig angegriffen zu werden.

Die Stomatochorie bewirkt nur einen Samentransport auf verhältnismässig kurze Distanz, ist aber, weil die Samen dabei unversehrt bleiben, sehr ergiebig. SERNANDER (1906, S. 203) beobachtete Samentransporte durch Lasius niger-Arbeiterinnen aus einer Entfernung von 15 m und durch Formica rufa aus Entfernungen bis zu 70 m. Er errechnete ferner die Zahl der von einem mittleren Waldameisenstaat (Formica rufa) während eines Sommers transportierten Verbreitungseinheiten auf mindestens 36'480.

c. Darmwanderer (Endochoren und Hemiendochoren) 1

Der hervorragende Pflanzengeograph DE CANDOLLE vertrat in seinem bekannten Werk "Géographie botanique raisonnée" (1855) noch die Ansicht, dass Samen, die in den Darmkanal eines Tieres gelangen, in der Regel zugrunde gehen. Nach ihm haben,insbesondere KERNER (1898), DORPH-PETERSEN (1904), HEINTZE (1916), SALZMANN und SCHENKER (1946) und der Verfasser (1934, 1945 und 1948) von sehr vielen Pflanzen keimfähige Samen im Kot von Tieren nachgewiesen. Neben unscheinbaren Verbreitungseinheiten, denen besondere Anlockungsmittel fehlen, werden solche, die saftiges Fruchtfleisch bieten und durch grelle Farben und z. T. auch durch intensive Gerüche auffallen, in den Darmkanal aufgenommen und transportiert. Wir können daher Darmwanderer ohne und Darmwanderer mit speziellen Anlockungsmitteln unterscheiden.

¹ endon = drinnen

a) Verbreitungseinheiten ohne besondere Anlockungsmittel

Herbivore Haustiere, wie Schafe, Ziegen, Rinder, Dromedare, Pferde, Rentiere u. a., sowie das weidende Wild, nehmen zur Zeit der Samenreife mit dem Futter unabsichtlich grosse Samenmengen in ihren Darmkanal auf und scheiden sie zum Teil nach vielen Stunden in keimungsfähigem Zustand mit dem Kot wieder aus. Weil sie keinerlei augenfällige Verbreitungsmittel besitzen, sind sie schwer feststellbar. Man kann sie nur durch Analyse des Kotes und nachfolgende Keimfähigkeitsprüfung ausfindig machen. Dazu wird am besten frisch abgesetzter Kot geschlämmt und der Rückstand nach Verbreitungseinheiten durchsucht. Soll speziell für eine bestimmte Pflanze festgestellt werden, ob sie endochor verbreitet wird, so kann man einem Tiere eine grosse Zahl von ihren Verbreitungseinheiten verfüttern und sie aus dem Kot wieder zu gewinnen suchen.

DORPH-PETERSEN (1904, S. 51 - 53) verfütterte einer Kuh 100'000 Samen von *Plantago lanceolata* und 600'000 Früchte von *Chrysanthemum*. Davon keimtem 58, bzw. 72 % gegen 89, bzw. 94 % bei den Kontrollsaaten.

KEMPSKI (1906, S. 147) experimentierte in gleicher Weise mit Rindern und Schafen, indem er ihnen Unkrautsamen verfütterte und erhielt folgende Ergebnisse:

5	cnai		RI	n a
Keim- fähigkeit vorher	Abgang (Durch- schnitt)	Keim- fähigkeit nachher		Keim- fähigkeit nachher
8	ક	8	8	8
68	47	22	55	6
8	36	0	46	0
95	25	54	47	36
0	26	0	26	0
4 6	12	0	8	0
32	19	26	24	22
0	44	0	49	0
10	20	7	19	5
23	14	0	25	0
97	74	11	78	7
26	49	24	0	0
72	59	13	43	5
98	55	7	44	3
	Keim- fähigkeit vorher % 68 8 95 0 46 32 0 10 23 97 26 72	Keim-fähigkeit Abgang fähigkeit (Durch-vorher schnitt) % % 68 47 8 36 95 25 0 26 46 12 32 19 0 44 10 20 23 14 97 74 26 49 72 59	Keim-fähigkeit Abgang Keim-fähigkeit vorher schnitt nachher % % % 68 47 22 8 36 0 95 25 54 0 26 0 46 12 0 32 19 26 0 44 0 10 20 7 23 14 0 97 74 11 26 49 24 72 59 13	Keim-fähigkeit Abgang Keim-fähigkeit Abgang fähigkeit (Durch-garden) fähigkeit (Durch-garden) vorher schnitt) nachher schnitt) % % % % 68 47 22 55 8 36 0 46 95 25 54 47 0 26 0 26 46 12 0 8 32 19 26 24 0 44 0 49 10 20 7 19 23 14 0 25 97 74 11 78 26 49 24 0 72 59 13 43

Namen der Kräuter	Keim- fähigkeit vorher	Abgang (Durch- schnitt)	Keim- fähigkeit nachher	Abgang (Durch- schnitt)	Keim- fähigkeit nachher
	8	%	%	8	8
Plantago lanceolata	56	48	41	5 7	38
Polygonum aviculare	11	44	3	66	2
Polygonum lapathifolium	39	57	28	61	26
Raphanus raphanistrum	17	27	19	32	18
Rumex acetosa	86	23	17	37	12
Rumex acetosella	76	80	54	73	25
Sinapis arvensis	72	62	29	7 5	23
Vicia hirsuta	40	48	11	64	8

Weissklee- (*Trifolium repens*) Samen, die einen Pferdedarm durchwandert hatten, keimten nach MüLLER-SCHNEIDER (1938, S. 87) unter Einschluss aller defekten Samen zu 71 %, solche aus Rinderkot zu 38 %.

Ueber den wirklichen Umfang und die Bedeutung der endochoren Samenverbreitung durch Weidetiere geben aber hauptsächlich Untersuchungen von
Kot freilebender Tiere Aufschluss. Die im abgesetzten Kot vorhandenen
Samenmengen sind innerhalb Mitteleuropas und wohl auch anderer Gebiete
gleicher Breite besonders im Herbst recht beträchtlich. Der Verfasser
erhielt z. B. folgende Untersuchungsergebnisse:

I. H i r s c h . 330 am 24. September 1940 auf der Alp Grimels im Schweizerischen Nationalpark gesammelte Gagel¹ enthielten (MüLLER-SCHNEIDER 1948, S. 8):

Gramineae	2 Verbreitungseinheiten
Cerastium caespitosum	4 Samen
Potentilla cf. aurea	1 Frucht
Trifolium repens	24 Samen
- badium	1 Same
Gentiana campestris	48 Samen
- cruciata	4 Samen
Veronica spec.	3 Samen
Myosotis alpestris	1 Frucht
Galium pumilum	3 Früchte
Nicht bekannt	7 Verbreitungseinheiten
Total	98

Ausser von *Gentiana campestris*, dessen Samen sehr schwer keimen, konnten von allen Arten Keimlinge erhalten werden.

II. R i n d . Kot von der Mittenbergweide bei Chur vom 1. Oktober 1944. Untersuchte Menge: 500 g (MüLLER-SCHNEIDER 1945, S. 257)

	Anzahl der Samen (intakt)	Keimlinge bis 1.VI.1945	bis 1.VI.1945 gesund
Agrostis tenuis	29	18	7
Cynosorus cristatus	16	6	Ô
Poa annua	12	2	0
Festuca rubra	9	7	1
Lolium perenne	3	3	Ō
Carex spec.	4	1	3
Urtica dioeca	219	143	58
Rumex obtusifolius	2	1	0
Polygonum viviparum	2 (Bul		0
Chenopodium bonus-henricus	1	1	0
Cerastium caespitosum	5	5	0
Ranunculus montanus	4	3	0
Trifolium pratense	15	15 (har	rt) 0
- montanum	1	1 "	0
- repens	42	40 "	0
Lathyrus pratensis	1	1	0
Linum catharticum	13	1	9
Helianthemum nummularium	29	22 (ger	ritzt) 0
Carum carvi	3	3	0
Prunella vulgaris	7	3	4
Veronica officinalis	11	9	0
Plantago lanceolata	14	3	6
- major	61	53	0
Centaurea jacea	2	0	0
Unbekannte Samen	2	1	0
Total	507	342	88

In Rinderkot von schweizerischen Voralpenweiden wurden von SALZMANN (1939), SALZMANN und SCHENKER (1946), und MüLLER-SCHNEIDER (1945 und 1948) hauptsächlich Samen von folgenden Pflanzen in noch keimungsfähigem Zustande vorgefunden: Phleum alpinum, Poa annua, P. pratensis, P. trivialis, P. alpina, Lolium perenne, Carex verna, Luzula campestris, Colchicum autumnale, Rumex obtusifolius, Chenopodium bonus-henricus, Silene dioeca, Cerastium caespitosum, Ranunculus montanus, R. acer, Medicago lupulina, Trifolium pratense, T. repens, T. badium, T. montanum, Anthyllis vulneraria, Linum catharticum, Helianthemum nummularium, H. alpestre, Carum carvi, Prunella vulgaris, Veronica officinalis, V. arvensis, V. serpyllifolia, Plantago major, P. lanceolata, Galium pumilum. Ferner wurden vielfach Samen von Gentiana campestris festgestellt, die einen absolut gesunden Eindruck machten, aber nicht zur Keimung gebracht werden konnten.

HEINTZE (1915, S. 254), fand im Rentierkot keimfähige Samen von Poa pratensis, Phleum alpinum, Carex (C. irrigua, C. lachenalii u. a.), Rumex acetosa, Ranunculus repens, Sibbaldia procumbens, Alchemilla alpina, Potentilla erecta, Rubus chamaemorus, Astragalus alpinus, Menyanthes trifoliata, Viola biflora und Empetrum nigrum.

Auch Schmarotzerpflanzen, wie Cuscuta epithymum werden durch weidendes Vieh verbreitet (KüHN und HOHFLEISS in HEGI, V/3).

In den Alpen ziehen die Ziegen- und oft auch die Schafherden vom Frühjahr bis zum Winterbeginn, also auch zur Zeit, da am meisten Samen reifen, jeden Tag von der Talsohle aus über die steilen Weiden und Gräte und zerstreuen dabei ihren samenhaltigen Kot über weite Flächen. Im Mediterrangebiet finden Schafherdenwanderungen zwischen den Winterweiden im Tiefland und den Sommerweiden im Gebirge - Transhumance - statt, die die Endochorie stark fördern. Aber auch die Dromedare, die Trampeltiere, die Lamas, die Pferde, die Esel, die Elefanten usw. dürften in ihren Weidegebieten an der Endochorie grossen Anteil haben.

Ueber die Bedeutung der weidenden Wildtiere als endochore Samenverbreiter vermögen uns (wie schon aus der oben mitgeteilten Hirschkotanalyse hervorgeht) Untersuchungen des Verfassers (1948), die im Schweizerischen Nationalpark durchgeführt wurden, einigen Aufschluss zu geben. Die Hirsche verbreiten daselbst die Samen von Luzula multiflora, Chenopodium album, Ranunculus montanus, Cerastium caespitosum, Silene vulgaris, Potentilla aurea, Trifolium, Medicago lupulina, Anthyllis vulneraria, Veronica, Helianthemum, Gentiana cruciata, Plantago alpina und Galium pumilum, die Gemsen diejenigen von Chenopodium album, Silene vulgaris, Sagina saginoides, Ranunculus montanus, Sibbaldia procumbens, Hippocrepis comosa, Trifolium div., Anthyllis vulneraria, Helianthemum- und Veronica-Arten. In Murmeltierkot wurden keimfähige Früchtchen von Ranunculus montanus, und im Schneehasenkot Verbreitungseinheiten von Luzula spadicea, Cerastium pedunculatum, Sibbaldia procumbens, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum und Veronica bellidioides festgestellt. Je mehr Futter eine Wildart für ihre Ernährung bedarf, um so umfangreicher dürfte auch die Zahl der Pflanzen sein, die durch sie auf endochorem Wege verbreitet werden. Eine im fruchtenden Zustand besonders beliebte Pflanze scheint

Chenopodium album zu sein. Ihre Samen wurden in Menge im Schaf-, Ziegen-, Hirsch- und Gemskot gefunden.

Weil die Wildtiere vielfach schnelle Tiere sind, sich z. T. innerhalb eines grossen Gebietes bewegen und die Samen lange im Darmkanal behalten, können sie diese auf grossen Distanzen verschleppen.

Näher geprüft zu werden verdient auch die endochore Verbreitung von Samen der Wasser- und Sumpfpflanzen, und sogar von Ackerunkräutern durch Vögel. DE VRIES (1940) hat nämlich in Entenexkrementen keimfähige Samen von Carex oederi, C. arenaria, Trifolium spec., Glaux maritima, Heleocharis palustris und Empetrum nigrum angetroffen, während KERNER (1891) berichtet, dass im Darmkanal der Ente normalerweise alle Samen zerstört werden und nur bei zwangsweiser Ueberfüllung des Magens einige Samen abgingen.

Schon DARWIN schreibt in einem seiner Werke "Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl", dass auch Süsswasserfische Samen und Früchte von Land- und Süsswasserpflanzen verschlingen. HOCHREUTINER (1899) verfütterte daher Verbreitungseinheiten von Potamogeton oblongus, Alisma plantago-aquatica, Sagittaria sagittifolia, Menyanthes trifoliata und andern Pflanzen an Fische, wie Cyprinus auratus, Leuciscus rutilus und Perca fluviatilis, und konnte deren Ausscheidungen keimfähige Samen entnehmen. Endochorie dürfte ferner durch die als Verzehrer höhere Wasserpflanzen bekannte Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus) und den chinesischen Graskarpfen (Ctenopharyngodon idella) erfolgen. Ebenso scheint es, dass Meerespflanzen wie Zostera marina und Posidonia oceanica durch gewisse Meerfische endochor verbreitet werden. Durch die Endochorie ist wohl vielen Wasserpflanzen die Möglichkeit gegeben, sich auch gegen Strömungen auszubreiten, was durch Schwimmvorrichtungen nicht möglich ist.

Anmerkung: DARWIN erwähnt in seinem berühmten Werk "Die Entstehung der Arten", dass er aus Heuschreckenkot, der ihm aus Madeira zugestellt wurde, Samen gewinnen konnte, aus denen 7 Graspflanzen hervorgingen, die zu 2 Gattungen gehörten. Weitere Untersuchungen in dieser Hinsicht sind vermutlich seither nicht unternommen worden, obwohl Endochorie durch Heuschrecken, insbesondere Wanderheuschrecken, für die Ausbreitung gewisser Pflanzen von Bedeutung sein könnte.

Die Frage nach den besonderen Eigenschaften, die Samen und einsamigen Trockenfrüchten ermöglichen, den Darmkanal eines Tieres unbeschadet zu passieren, kann noch nicht befriedigend beantwortet werden. Diejenigen von vielen Chenopodiaceen, Leguminosen, Geraniaceen, Malvaceen, Cuscutaceen und Cistaceen z. B. sind hartschalig. Ihre Schalen schliessen so dicht, dass sie erst nach Beschädigung derselben rasch quellen und keimen können. Die Quellung ist aber vielfach sowohl in Vogel-, als auch in Säugetierdärmen eine Vorstufe der Verdauung. Bei Verbreitungseinheiten wie den Früchten von Ranunculus bildet jedenfalls die Fruchtwand einen starken Widerstand gegen das Eindringen der Verdauungssäfte. Vielleicht sind es einfach die Hüllen, die allgemein dem Schutz des Keimes und der Reservestoffe dienen, die diese Verbreitung ermöglichen. Festgehalten zu werden verdient ferner die Eigentümlichkeit, dass bei vielen dieser Darmwanderer die Verbreitungseinheiten im reifen Zustande noch fest an der Mutterpflanze fixiert sind (Abb. 34). Die Trifolium repens-und T. montanum-Samen




Abb. 34. Sibbaldia procumbens (3x) und Trifolium repens (3/4 nat. Grösse). Die Verbreitungseinheiten werden auch nach der Samenreife noch auf der Mutterpflanze festgehalten.

gelangen dadurch massenhaft ins Emdfutter oder bleiben lange auf der Weide stehen und können so während langer Zeit von den Weidetieren mit dem Futter in den Darmkanal aufgenommen werden. Auch Helianthemum alpestre und Sibbaldia procumbens, die von Gemsen und Rentieren verbreitet werden, geben ihre Verbreitungseinheiten nach der Reife nicht frei. Von Sibbaldia

procumbens kann man im Frühjahr neben blühenden Trieben meist noch Fruchtstände mit den Früchten vom Vorjahr finden. Bemerkenswert ist ferner, dass auch Arten wie Urtica dioeca und Ranunculus montanus, die die Weidetiere im saftgrünen Zustand meiden, in Menge mit Kot verbreitet werden. Beide frisst das Vieh im wasserarmen Zustand viel lieber als frisch. Zudem sind infolge starker Uebernutzung der Weiden die Tiere im Spätherbst gezwungen, auch weniger zusagendes Futter zu nehmen. Durch diese Umstände ist gesorgt, dass von den erwähnten Pflanzen besonders viele reifen Samen in den Darmkanal von den Weidetieren gelangen und sie ausgiebig verbreitet werden.

b) Verbreitungseinheiten mit Anlockungsmitteln

Während den Samen der krautigen Steppen-, Weiden- und Wiesenpflanzen die Möglichkeit, in den Darmkanal eines Tieres zu gelangen, allein schon durch die Beschaffenheit ihrer Sprossteile in hohem Masse gegeben ist, benötigen diejenigen der Sträucher und Bäume und der Stauden des Waldes hierfür ein besonderes Mittel. Dieses besteht in der Ausbildung von fleischigen Geweben, die die Samen ganz oder teilweise einhüllen und vor allem gewissen Schnecken, Reptilien, Vögeln, Säugetieren und z.T. auch den Menschen zur Ernährung dienen. Mit den fleischigen Geweben gelangen gleichzeitig auch die Samen in den Darmkanal. Der Verdauungsprozess löst das Fruchtfleisch auf und legt den Inhalt frei. Die Auflösung des Fleisches ist für die Fortentwicklung der Samen sogar förderlich, weil es keine andere Funktion hat als den Transport der Samen zu vermitteln.

Es erfüllt somit eine ähnliche Aufgabe wie der Nektar bei den auf Tierbestäubung eingestellten Blüten. Die Verbreitungseinheiten gleichen sich als Folge der fleischigen Beschaffenheit, auch wenn sie grosse morphologische Unterschiede aufweisen, sehr stark. Die einfachste Form finden wir bei den Magnolien. Diese Pflanzen erzeugen Samen, deren äussere Haut fleischig ist. Die Samenschale von Ginkgo und Cephalothaxus differenziert sich in einen fleischigen, gefärbten Aussenmantel (Exotesta), in eine innere, stark verholzte Steinschicht (Mesotesta) und eine zarte innerste Schicht (Endotesta). Bei Taxus und Evonymus sind die Samen teil-

weise oder ganz von einem aus der Mikropyle hervorgegangenen Samenmantel (Arillus) umhüllt. Die häufigsten Formen fleischiger Verbreitungseinheiten sind aber die Beere und die Steinfrucht. Die Beere ist eine Frucht, deren Wand vollkommen fleischig ist und meist eine grössere Zahl Samen enthält, wie das bei der Tomate (Solanum lycopersicum) und der Tollkirsche (Atropa belladonna) der Fall ist. Bei den in der Regel einsamigen Steinfrüchten besteht die Fruchtwand aus einem häutigen Exokarp, einem fleischigen Mesokarp und einem harten Endokarp. Manchmal sind auch noch Teile der Achse und der Blütenhülle an der Bildung des Fruchtfleisches beteiligt. Dadurch entstehen Scheinfrüchte wie der Apfel. Zudem können zwei oder mehrere fleischige Früchte zu einer Sammelfrucht zusammenwachsen. Als Beispiel nennen wir die Hagebutten der Rosen, die aus einer Anzahl Steinfrüchtchen bestehen, die im fleischig gewordenen Achsenbecher eingeschlossen sind. Eine Brombeere (Rubus) vereinigt sämtliche Steinfrüchte eines Fruchtstandes, und bei der Erdbeere (Fragaria) stecken eine Menge Nüsschen im fleischig gewordenen Blütenboden. Die Feigen (Ficus carica) wiederum sind nichts anderes als fleischige Fruchtstände. Ausser dem Fruchtfleisch werden noch besonders harte Schalen zum Schutze der Samenkerne gegen mechanische und chemische Einwirkungen ausgebildet. Sehr starke Schalen besitzen vor allem die grossen Samen, die Gefahr laufen, mechanisch zerkleinert zu werden. Zu ihnen gehören diejenigen von Ginkgo, Vitis, Citrus, Crataegus, Mangifera indica u. a. Die Früchte verdanken ihren Namen dem harten Endokarp, das den Samen schützt. Bis zum Eintreten der Reife sind die Verbreitungseinheiten unauffällig und das Fruchtfleisch ungeniessbar, so dass die Samen geschont bleiben. Sobald dieselbe eintritt, erfolgt die Anlockung der Tiere wie bei den zoophilen Blüten durch leuchtende Farben und z.T.auch durch starke Düfte. Von den Lockfarben wiegt aber nicht wie bei den Blüten Weiss und Gelb, sondern im allgemeinen Rot vor, das nach BUDDENBROCK (1952) für die meisten Insekten nur einen geringen, für den Menschen, viele Säugetiere und Vögel hingegen einen hohen Reizwert besitzt. Ausser Teilen des Samens und der Frucht können auch andere Teile des Fruchtstandes leuchtend gefärbt sein. Bei Evonymus europaea und E. latifolia sind Kapsel und Stiel karmin- oder purpurrot, der Arillus des heraushängenden Samens orangerot gefärbt, bei Physalis alkekengi schliesst der aufgeblasene Kelch die orangefarbige Beere völlig ein und

ist ebenfalls orange oder mennigrot gefärbt. SCHRÖTER (1926, S. 229) macht speziell auf die Erhöhung der Auffälligkeit von fleischigen Früchten durch Kontrastfarben aufmerksam. Die Stiele der blaubereiften Parthenocissus inserta-Beeren sind karminrot gefärbt und auch die Blätter nehmen im Spätherbst diese Farbe an. Ebenso kontrastieren die schwarzen Früchte der Alpenbärentraube (Arctostaphylos alpina) und der blauen Heidelbeeren (Vaccinium myrtillus) mit den im Herbst leuchtendrot sich verfärbenden Blättern. Bei der grün bleibenden Arctostaphylos uva-ursi und der Preiselbeere (Vaccinium vitis-idaea) dagegen sind die reifen Früchte rot.

Rot leuchten nach BüNNING (1956) auch die an den geöffneten Hülsen hängenbleibenden Samen des tropischen Korallenbaumes (Adenanthera). Manche Vogelarten sammeln und schlucken sie reichlich, können sie infolge der harten Schalen aber nicht verdauen. Die Geniessbarkeit wird in diesem Fall nur vorgetäuscht.

Viele Arten mit farbig leuchtenden Beerenfrüchten gibt es ferner bei den Kakteen. Wo sie sich wohlgeschützt in den Axillen bilden wie beim Korallenkaktus (Mammilaria prolifera) werden sie bei der Reife aus denselben hinaus an die Oberfläche geschoben. Ausserdem ist bemerkenswert, dass viele Arten, nicht aber diejenigen der Gattung Opuntia, die Stachelbüschel (Glochiden) zur Reifezeit abstossen.

Manche mit reifen, saftigen Früchten behangene Sträucher und Bäume, wie z. B. Sorbus aucuparia (Abb. 37), Pyracantha coccinea und Ilex aquifolium sind nicht weniger prächtig als zur Blütezeit.

Der Mensch verzehrt z. B. die Wildfrüchte von Fragaria vesca, Sorbus aria, Rubus-, Prunus- und Vaccinium-Arten und trägt dadurch gelegentlich zu deren Verbreitung bei. Von 70 Walderdbeer-(Fragaria vesca) Nüsschen, die nach 38 Stunden aus einem menschlichen Darm ausgeschieden wurden, keimten 45, und von Heidelbeersamen, die einen 36-stündigen Darmaufenthalt hinter sich hatten, 84 % (MüLLER-SCHNEIDER 1934, S. 247 und S.248).

Gross ist die Zahl der Säugetiere, die saftig-fleischige Verbreitungseinheiten verzehren und dadurch Endochorie bzw. Hemiendochorie bewirken. Ausschliesslich nur Fruchtfresser sind aber einzig die Flughunde

(Megachiroptera) und gewisse Blattnasen (Phyllostomatoidae) des tropischen Amerika. Sie weisen diesbezüglich besondere Anpassungen im Schädel- und Zahnbau auf. Verhältnismässig lange und gut ausgebildete Eckzähne und kleine Schneidezähne dienen zum Ergreifen und Oeffnen der oft zähen Schalen der Früchte. Abgeplattete Backenzähne zerquetschen dann das Fruchtfleisch. Der Flughund (Hypsignathus monstrosus), der sich speziell von Feigen ernährt, hält dieselben mit seinen breiten Lippen luftdicht fest, schneidet sie mit den Vorderzähnen an und holt den Inhalt durch sehr kräftige Saugbewegungen heraus. Dieses Saugen wird nach DOBDON und MAT-SCHIE (aus BöCKER 1937, S. 111) durch eine ganz eigenartige Vergrösserung des Kehlkopfes ermöglicht, der aus dem Halsgebiet durch den Brustkorb bis an das Zwerchfell heranreicht. Viele Arten, wie z. B. Pteropus giganteus, quetschen die Früchte nur aus um den Fruchtsaft aufzunehmen und spucken darnach das Fruchtfleisch mitsamt den Samen aus. VAN DER PIJL (1957) fand allein in Indonesien 180 Pflanzenarten deren Samen durch Chiropteren verbreitet werden. Er stellte ferner auch fest, dass die Früchte, die von Flughunden verzehrt werden, meist verhältnismässig gross sind, vielfach auch grosse Samen oder Steinkerne enthalten, zähe Schalen besitzen und starke Düfte aussenden. KULZER (1963) konnte denn auch nachweisen, dass die Nil-Flughunde (Rousettus aegyptiacus), die bis in den Mittelmeerraum und damit am weitesten nach Norden vorgedrungen sind, dank ihres ausgezeichneten Geruchsinnes die Nahrung selbst bei völliger Dunkelheit rasch auffinden. Sie fallen vor allem über die Verbreitungseinheiten der Maulbeerfeigenbäume (Ficus sycomorus) her.

Ausser den Flughunden und gewissen Fledermäusen spielen Affen, Halbaffen, manche Raubtiere, Wildschweine, Nabelschweine, Tapire, Elephanten
und noch viele andere Tiere der Tropen und Subtropen als Verbreitungsagentien von endo- bzw. hemiendochoren Pflanzen eine wichtige Rolle. Die
Affen verbreiten Samen ausser mit dem Kot besonders auch durch das Transportieren von Diasporen mit den Händen, im Maul oder in den Backentaschen (Makaken, Paviane) und anschliessendes Verlieren oder Ausspeien der
harten Teile beim Verzehren.

Die Orang Utans lieben z. B. die stacheligen, kopfgrossen Früchte des Durian (Durio zibethinus) und die orangeartigen Früchte der Mango-

stane (Garcinia mangostana), die Schimpansen Wildfeigen (Ficus) und Papayas vom Melonenbaum (Carica papaya), die Gorillas ebenfalls Wildfeigen, ferner Pygeum-Kirschen. Die Gelada (Theropithecus gelada) der Semienberge Aethiopiens wurden beim Verzehren der Hagebutten von Rosa abessinicum beobachtet. Die Saimiri-Aeffchen wiederum lieben wilde Kaffee- (Coffea), Lysiloma- (Nephelium litchi) und Guave- (Psidium guajava) Früchte.

EDDY (1961) fand im Kot von Nabelschweinen (*Pecari tajaca*), die im Süden Arizonas vorkommen, Samen von *Opuntia*, *Ferocactus wilizeni* und *Carnegica gigantea*.

Ob die Samen oder Steinkerne mit dem Kot oder durch den Mund ausgeschieden werden, hängt von der Grösse ab, wobei hauptsächlich die zweitgrösste Ausdehnung entscheidend wirkt. Orangenkerne werden von den Schipansen ausgespuckt oder zerkaut. Orang Utan und Gorilla schlucken im Zoogelegentlich Zwetschgensteine (Prunus domestica). Bei den Elephanten, die z. B. Früchte der Dumpalme (Hyphaene cariacea) ganz schlucken, passieren feste Körper bis zu 5 cm Durchmesser. Zootiere schieden unzerkaute Aepfel ganz wieder aus (Wärter BEHRENS, Zoo Basel).

Die mit einem besonders guten Riechorgan ausgestatteten Erdferkel (Orycteropus afer) finden selbst die bis 30 cm unter der Erdoberfläche reifenden Früchte der Gurke (Cucumis humofructus) noch (siehe GALPIN in STOPP 1958).

Auch in den gemässigten und kalten Klimazonen spielt die Endo- bzw. Hemiendochorie durch Säugetiere eine wichtige Rolle bei der Verbreitung der Samen.

Der tschechische Biologe TURCEK (1964) fand in der Winterlosung von Feldhasen (*Lepus europaeus*) unbeschädigte, lebensfähige Samen von 8 verschiedenen Gehölzarten. Von über 4320 untersuchten Kotstücken enthielten rund 10 % 714 gesunde sowie 106 teilweise beschädigte Samen folgender Pflanzen:

Wacholder (Juniperus)	2
Holzapfel (Pyrus malus ssp. silvestris)	1
Gemeiner Weissdorn (Crataegus oxyacantha)	79
<pre>Eingriffliger Weissdorn (Crataegus monogyna)</pre>	41
Heckenrose (Rosa spec.)	578

Schlehdorn (Prunus spinosa)	6
Vogelkirsche (Prunus avium)	3
Gelber Hartriegel (Cornus mas)	4

Die Hasen lesen die abgefallenen Früchte vom Schnee auf. Der Autor nimmt daher an, dass die Tiere diese Früchte nicht aus Hunger verzehren, sondern als Abführmittel benützen, um die im Winter verlangsamte Darmtätigkeit anzuregen. Der Schneehase (Lepus borealis) frisst nach BIRGER (1907, S. 13) die Früchte von Rubus chamaemorus und von Vaccinium myrtillus (siehe auch S. 119). Die 1 mm x 1,2 mm grossen Nüsschen der Walderdbeeren (Fragaria vesca) und die etwas kleineren Samen von Vaccinium myrtyllus und V. vitis-idaea passieren selbst den Darmkanal von Waldmäusen (Apodemus silvaticus) zu einem grossen Teil in noch keimungsfähigem Zustand (Müller-Schneider 1973).

Von frisch aus dem Kot eines gefangen gehaltenen Gartenschläfers (Eliomys quercinus) ausgelesenen Samen bzw. Früchten keimten:

Ficus carica	64	von	100
Fragaria ananassa	38	von	150
Fragaria vesca	96	von	100
Rubus idaeus	34	von	50
Vaccinium myrtillus	90	von	100
Solanum dulcamara	27	von	50
Solanum lycopersicum	24	von	24
	27	von	50

Die Früchte von Rubus idaeus keimten erst nachdem sie den Winter über dem Frost ausgesetzt waren. Die Ungekeimten machten den Eindruck, dass sie nach einer weiteren Frosteinwirkung auch noch gekeimt hätten. Von Solanum duleamara schienen ebenfalls 7 Samen noch völlig gesund zu sein (MüLLER-SCHNEIDER 1973) (Abb. 35). Der Siebenschläfer (Glis glis) und die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) lieben ebenfalls saftig fleischige Diasporen als Ergänzung der Nahrung. Das Eichhörnchen (Sciurus vulgaris) wurde beim Aussaugen von Stachelbeeren (Ribes uva-crispa) beobachtet. Es ernährt sich nach BIRGER (1907) auch von Rauschbeeren (Empetrum nigrum), sowie nach STACHROWSKIJ in OGNEW (1959) von Sorbus aucuparia-, Vaccinium vitis-idaea- und Symphoricarp albus- Diasporen. Die Zobel (Mustella zibellina) tragen ebenfalls zur Verbreitung von Sorbus aucuparia und Vacci-

nium vitis-idaea bei. Im Kot eines Steinmarders (Martes foina) befanden sich die Samen von Misteln (Viscum album). Der Dachs (Meles meles), ein Allesfresser, verbreitet Prunus avium und Vitis vinifera. Bären (Ursus arctos alpinus) wurden ehemals in der Schweiz beim Verzehren der Früchte von Vitis vinifera und Sorbus aucuparia beobachtet. Nach KROTT (1961) ernten diese ausserdem die Beeren von Ribes, Rubus idaeus, Rubus spec., Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus und Lonicera. In Fuchskot konnten Früchtchen von Rubus idaeus, R. tomentosus und Fruchtsteine von Prunus domestica und P. avium festgestellt werden.



Abb. 35. Ueberreste von Kirsche (Prunus avium) und Apfel (Pirus malus) nach der Nutzung durch Garten- und Siebenschläfer (Eliomys quercinus und Glis glis). Die Samen sind unversehrt. (Aufn. BRAUN, nat. Grösse).

In den Bergtälern naschen die Ziegen die fleischigen Verbreitungseinheiten von Rosa, Crataegus, Berberis vulgaris, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare und Sambucus nigra. Der Liguster hat so mit Recht auch den Namen "Geissbeeri" erhalten. Im Rentierkot hat HEINTZE Rubus- und Vaccinium-Samen vorgefunden. Auch der Elch frisst fleischige Früchte. Die Füchse befriedigen ihr erhöhtes Nahrungsbedürfnis im Herbst, wenn ihnen der Winterpelz wächst, durch massenhaften Genuss von Vogelbeeren, Trauben, Preisel- und Heidelbeeren (Sorbus aucuparia, Vitis vinifera, Vaccinium vitis idaea und V. myrtillus. Sie lieben auch die Kirschen (Prunus avium). Weil ihr Kieferapparat für das Zerdrücken der Beeren aber nicht geeignet ist, verlassen diese oft sogar in völlig unversehrtem Zustand den Darmkanal wieder.

Zu den wichtigsten Verbreitungsagentien der Pflanzen mit fleischigen Verbreitungseinheiten gehören überall auch die Vögel. Sie sind im allgemeinen Augentiere mit nur schwach entwickeltem Geschmack- und Geruchsinn. Eine Ausnahme bilden die auf Neuseeland lebenden, flugunfähigen Kiwis (Apteryx), die eigentliche Nachttiere sind. Bei ihnen ist das Riechvermögen gut entwickelt. Sie dürften vermutlich ähnlich wie die Flughunde stark riechende "Früchte" leicht finden und verzehren. In den Tropen sind nach BöCKER (1937) die Fruchttauben (Duculinae), die indoaustralischen Mistelfresser (Dicaeidae), die afrikanischen Helmvögel (Turacus), die Bananenfresser (Musophagidae), sowie einige Tanagriden und Tyranniden Südamerikas eigentliche Fruchtspezialisten. Die Fruchttauben schlucken sogar Früchte mit verhältnismässig grossen Steinen und würgen dieselben nach dem Ablösen des Fruchtfleisches wieder aus. Nach STRESEMANN (1927 -1934) gibt es auch einige Arten, die Steinkerne von Muskatnüssen (Myristica fragrans) bis zu einer Grösse von 12,5 mm x 25 mm unversehrt durch den After wieder abgeben. Beim Verschlucken der Früchte treten die Aeste ihrer Unterkiefer ähnlich wie bei den beuteverschlingenden Schlangen heraus. Die dünne Hülle der Muskatnuss wird durch die eigentümliche Beschaffenheit der Magenwand abgelöst, der Kern bleibt unversehrt. In Westafrika beteiligt sich nach MERTENS (1948) sogar der daselbst vorkommende Geierseeadler (Gypsiheirax angolensis), ein Raubvogel, als eifriger Vertilger der Oelpalmenfrüchte an der Samenverbreitung.

Innerhalb Europas wirken namentlich Drosseln, Stare, Dohlen, Krähen, Rotkehkchen und Seidenschwänze durch Endochorie als Samenverbreiter. Als zahnlose Tiere Schlucken die Vögel die pillenförmigen Verbreitungseinheiten ganz. Verhältnismässig grosse Samen werden wieder ausgewürgt, kleinere passieren den Darmkanal und werden oft schon nach 20 bis 30 Minuten wieder ausgeschieden. Untersuchungen von DESSELBERGER und STEINACHER (BÖCKER 1937, S. 176) haben ergeben, dass bei den fruchtfressenden Dicaeiden der Muskelmagen, der für den Durchgang der Samen eine grosse Gefahr bedeuten würde, aus dem Verdauungsweg ausgeschaltet ist und nur noch als Anhängsel erscheint. Bei den fruchtfressenden Tanagriden, wie Euphonia violacea, sind der Muskelmagen und die Reibplatten zurückgebildet und infolgedessen dünnwandig und erweiterungsfähig, so dass selbst grosse Samen

und Steinkerne durchwandern können. Auch den Darmkanal der Drosseln, Stare und Rotkehlchen passieren die Samen meist ohne Schaden zu nehmen und im Darmkanal der Krähenvögel gehen nach KERNER (1898, S. 617) nur weichschalige Samen zugrunde. Kirschkerne von 15 mm Durchmesser passieren unbeschädigt.

Von den Reptilien sind Krokodile, Schildkröten und Echsen an der Endochorie mancher Pflanzen beteiligt. Krokodile sollen z. B. wie viele andere Tiere vom Duft der Durio-Früchte (siehe S. 132) angelockt werden BECCARI (1885). RIDLEY (1930) berichtet, dass auf Borneo Schildkröten die Früchte des Baumes Durio testitudinarum verzehren und nach DARWIN (1909) verspeist auf den Galapagos-Inseln Testudo nigra die sauren Beeren des Guayanita-Baumes. RICK und BOWMAN (1961) fütterten Riesenschildkröten (Testudo elephantopus porteri) mit Galapagos-Tomaten (Lycopersicum esculentum var. minor) und erhielten mit den nach 11 - 12 Tagen mit dem Kot ausgeschiedenen Samen ausgezeichnete Keimungsergebnisse. Sogar Steinchen von über 1 cm Durchmesser passierten den Darm der Versuchstiere. Die in Europa oft als Haustiere gehaltenen Griechischen und Maurischen Schildkröten (Testudo graeca und T. hermannii) verzehren Süsskirschen (Prunus avium) sowie die Früchte des Moschuskrautes (Adoxa moschatellina) und schlucken dabei auch deren Steinkerne. Ferner wurden Beeren in den Därmen von amerikanischen Leguanen gefunden. Die Eidechse (Ambryrhynchus demarlii) verbreitet nach DARWIN ebenfalls die Samen des Guayanita-Baumes. Ferner verspeisen nach BORZI (1894) Eidechsen auch Früchte von Opuntia-Arten.

Endochorie durch Schnecken erfolgt bei Fragaria vesca, Rubus idaeus und Vaccinium myrtillus. Bei Fütterungsversuchen mit Arion empiricorum und Helix pomatia (MüLLER-SCHNEIDER 1934) wurden auch Samen von Paris quadrifolia, Rubus caesius, Atropa belladonna, Solanum dulcamara, S. nigrum und S. lycopersicum in den Darmkanal aufgenommen und nach 10 - 12 Stunden mit dem Kot wieder ausgeschieden. Von diesen Pflanzen besitzt Paris quadrifolia die grössten Samen, sie messen 2 mm x 4 mm. Die Erdbeeren locken die Schnecken zweifellos durch ihren starken Duft. Zudem ist ihre Oberfläche rauh und erleichtert das Abrapseln des Fruchtfleisches und der Nüsschen diesen Tieren wesentlich.




Abb. 36. Moschuskraut (*Adoxa moschatellina*) mit reifen Früchten. (nat. Grösse).

Die gelblichgrünen, steinfruchtartigen, säuerlich schmeckenden Früchte des Moschuskrautes (Adoxa moschatellina) (Abb. 36) duften in reifem Zustand ebenfalls nach Erdbeeren. Während der Fruchtbildung biegt sich der saftiggrüne Köpfchenteil allmählich um, bis die Früchte nahezu oder ganz der Erde aufliegen. Oft rollt er sich sogar spiralig ein. Als Verbreitungsagentien wurden ebenfalls Schneckenarten, nämlich Arianta arbustorum, Cepaea nemoralis und C. hortensis festgestellt. Von 28 Samen, die deren Darm passiert hatten, keimten in ersten Frühjahr 21, im zweiten 3 und im dritten noch einer (Müller-SCHNEIDER 1967 und 1971).

Auch die Regenwürmer (Lumbricidae) verbreiten Samen auf endochorem Weg. Schon BECCARI (1890) stellte fest, dass Samen deren Darm passieren. Neuerdings haben nun RILL und SAGAR (1973) den Nachweis erbracht, dass viele Samen von Poa trivialis, Trifolium repens und Bellis perennis nach dem Passieren eines Darmes von Lumbricus terrestris noch keimen.

Durch die Bewegung der Regenwürmer in der Erde dürften insbesondere viele Samen in eine günstige Lage für die Keimung gelangen. Ferner besteht die Möglichkeit, dass Samen enthaltende Regenwürmer in den Darm eines Vogels, Maulwurfs, Igels oder eines andern Tieres geraten und infolgedessen auch über grosse Strecken transportiert werden.

Die Unterschiede in der Grösse der harten Samen und Steinkerne, in der Beschaffenheit,im Geschmack und im Geruch des Fleisches haben zur Folge, dass die fleischigen Verbreitungseinheiten ungleich begehrt werden. Grössere Samen oder Steinkerne können von Kleintieren überhaupt nicht in den Darmkanal aufgenommen werden. Jede Pflanzenart hat daher innerhalb einer Gegend einen bestimmten Verzehrerkreis. Umfassende Beobachtungen hierüber fehlen uns allerdings noch. Wertvolle Angaben findet man bereits bei HEINTZE (1916), SCHUSTER (1930) und noch anderen Autoren.

Von den tropischen Früchten sind diejenigen des Zibetbaumes (Durio zibethinus) bei vielen Tieren besonders beliebt. Dank ihres penetranten Geruchs werden sie von denselben schon aus grossen Entfernungen wahrgenommen. Noch fehlen aber eingehendere Aufzählungen tierischer Agentien von endo- und hemiendochoren Tropenpflanzen.

In Mittel- und Nordeuropa sind beispielsweise die Heidelbeeren

(Vaccinium myrtillus) bei vielen Tieren sehr begehrt. Sie reifen in mittleren Lagen im August, sind blau bereift, saftig-fleischig und von süsssäuerlichem Geschmack. Ihre Samen messen in der grössten Ausdehnung 1 -1,5 mm. Ausserdem sind sie sowohl vom Boden her, als auch aus der Luft leicht erreichbar. Als Verzehrer wurden festgestellt: Schnecken (Arion ampiricorum, Helix pomatia), Stockente (Anas platyrhynchos), Brachvogel (Numenius aquata), Waldschnepfe (Scolopax rusticola), Bekassine (Capella gallinago), Hühnervögel (Lyrurus tetrix, Tetrao urogallus, Alectoris graeca, Lagopus mutus), Tauben (Columba livia, C. palumbus), Rabenvögel (Corvus corax, C. cornix, Pica pica, Garrulus glandarius, Nucifraga caryocatactes), Star (Sturnus vulgaris), Drosseln (Turdus merula, T. pilaris, T. viscivorus, T. ericetorum, T. torquatus), Heidelerche (Lulula arborea), Rotkehlchen (Erithacus rubecula), Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla), Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros), Schneehase (Lepus timidus), Waldmaus (Apodemus silvaticus), Rötelmaus (A. flavicollis), Gartenschläfer (Eliomys quercinus), Fuchs (Vulpes vulpes), Brauner Bär (Ursus arctos), Marder (Martes), Hausziege (Capra hircus) und Mensch (Homo sapiens). Von diesen kommen allerdings einige Vogelarten als Agentien, die eventuell nur Dysochorie bewirken, in Frage.

Aehnlich wie bei Vaccinium myrtillus liegen die Verhältnisse bei der Walderdbeere (Fragaria vesca) und ihren Verwandten, sowie bei manchen Rubus- und Ficus-Arten. Beliebt sind ferner die Früchte von Sambucus nigra, Sorbus aucuparia und von Prunus avium. Der holzige Kirschkern misst im Duchmesser 8 - 12 mm und wird von Star, Dachs, Fuchs und Menschen meist geschluckt, nicht aber von Kleintieren.

Im allgemeinen haben die Pflanzen mit kleinen Samen und Steinkernen die grössten Chancen von vielen Tierarten auf dem Weg über den Darmkanal transportiert zu werden.

Wie weit zwischen manchen Früchten und Tieren gegenseitige Beziehungen bestehen, ist noch wenig erforscht. Eigentliche Vogelfrüchte sind wohl die Beeren von Viscum. Die Samen des Pfaffenhütchens (Evonymus europaea) werden mit grosser Vorliebe vom Rotkehlchen (Erithacus rubecula) gefressen und nach Ablösung des Samenmantels als Gewölle wieder ausgewürgt.

Die Stare sind besonders begierig auf die Kirschen, und die Amsel ist nebst ihnen das Hauptverbreitungsagens des Holunders (Sambucus nigra). Von der Vorliebe für die Wacholderbeeren (Juniperus) hat die Wacholderdrossel ihren Namen. Der Seidenschwanz (Bombycilla garrulus) stellt sich dort ein, wo die Vogelbeeren (Sorbus aucuparia) reichlich reifen. Ferner haben nach BANNERMANN in GRZIMEK (1969) manche Grüntauben (Treror) ihre Verbreitungsgrenze dort, wo es keine wilden Feigen mehr gibt. Ganz speziell aufeinander angewiesen sind wohl die afrikanische Gurke (Cucumis homofructus) und das Erdferkel (siehe S.126 und MEEUSE 1958). Die Pflanzen liefern Nahrung und Wasser, die Tiere anderseits sorgen für die Verbreitung der Samen und erleichtern durch den Dung deren Aufkommen. ULBRICH (1928, S. 83) weist auf die vielen Kaulikarpen unter den tropischen Bäumen und Sträuchern hin. Weil ihre Früchte direkt am Stamm oder an älteren Aesten hängen, können sie selbst von schweren Säugetieren, wie den Affen, leicht erreicht werden. Nach MILDBRAED (ULBRICH 1928, S. 82) finden wir besonders unter den Aristolochiaceen, Moraceen, Menispermaceen, Anonaceen, Sapindaceen, Euphorbiaceen, Sterculiaceen, Sapotaceen, Elenaceen, viele kaulikarpe Arten.

Den fleischigen Verbreitungseinheiten, die hauptsächlich von Vögeln verzehrt werden, fehlen markante Gerüche, was damit übereinstimmt, dass bei diesen Tieren das Geruchsempfinden, mit wenigen Ausnahmen, schwach entwickelt ist.

Von Bedeutung sind ferner die Zeiten der Reife und der Verbreitung der Verbreitungseinheiten. Während in den Tropen viele Bäume und Sträucher fast das ganze Jahr reife Früchte tragen, reifen sie in den gemässigten Zonen hauptsächlich im Sommer und Herbst. Die Reife der harzigen Efeu- (Hedera helix) Beeren beginnt in Mitteleuropa jedoch schon im März. Im Sommer folgen auffällig viele süsse oder süss-säuerliche Verbreitungseinheiten, z. B. diejenigen der Erdbeeren (Fragaria), Kirschen (Prunus), Johannisbeeren (Ribes), Brombeeren, Himbeeren (Rubus) und Felsenmispel (Amelanchier ovalis) nach. Wenn dann im Herbst und Spätherbst die Fröste den grössten Teil der Kerbtierwelt töten oder in schützende Winkel verscheuchen, werden die fleischigen Früchte und Scheinfrüchte für die Vögel zu einer immer wichtigeren Nahrungsquelle. Schliesslich bekommen die

Zu ihnen gehören innerhalb Mitteleuropas nebst andern Pflanzen Juniperus communis, J. sabina, Maianthemum bifolium, Viscum album, Cotoneaster integerrima, C. tomentosa, Sorbus aucuparia, S. aria, Crataegus, Rosa, Prunus spinosa, Ilex aquifolium, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Solanum dulcamara und Viburnum opulus. Die hängenden Vogelbeeren (Sorbus aucuparia) sind selbst nach starken Schneefällen noch erreichbar (Abb. 37), weil sie vom Schnee nur bedeckt, aber niemals zugedeckt werden können. Bei den meisten Winterstehern ist das Fruchtfleisch von mehliger,



Abb. 37. Vogelbeerbaum (Sorbus aucuparia) als Wintersteher. (Nach einer käuflichen Photo).

schwammiger oder lederartiger Beschaffenheit und oft von herbem Geschmack. Die Geniessbarkeit wird bei einigen durch Frosteinwirkung verbessert. So werden die Hagebutten meist erst, nachdem der Frost sie weich gemacht hat, von den Vögeln angenommen. Wir Menschen finden die Mehlbeeren (Sorbus aria), die Holzbirnen (Pirus piraster), die Preiselbeeren (Vaccinium vitis-idaea) und die Früchte der wilden Dattelpalmen (Diospyros virginiana) schmackhafter, nachdem diese dem Frost ausgesetzt waren. Die Mispeln (Mespilus germanica) sind sogar erst geniessbar, wenn sie in Gärung übergegangen sind.

Die Amseln in Chur verzehrten nach MüLLER-SCHNEIDER und LENGGENHAGER (1959) während der Jahre 1955 - 1958 die Verbreitungseinheiten der Erdbeeren und der wichtigsten Sträucher und Bäume in der aus Abbildung 38 ersichtlichen Reihenfolge und Häufigkeit.

Nur während Notzeiten, z. B. bei kaltem Winterwetter und starken Schneefällen wurden auch die Früchte von Ribes sanguineum, Prunus spinosa, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Viburnum opulus und Symphoricarpos albus verzehrt und deren Samen verbreitet.

Der Mensch und die Säugetiere behalten die Samen meist viele Stunden, ja sogar tagelang im Darmkanal und können sie somit viele Kilometer weit verschleppen. Flughunde und Braunbären z. B. legen in einer Nacht 40 - 50 km zurück, um zu saftig-fleischigen Früchten zu gelangen. Auch Wasserund Küstenvögel können die Samen gewisser Pflanzen mehrere Tage im Darm mit sich tragen, und eventuell erst viele Kilometer von ihrem Ursprungsort mit dem Kot in noch keimungsfähigem Zustand wieder ausscheiden. Dies gilt nach DE VLAMING und PROCTOR (1968) für Cyperacae-, Potamogeton- und Sagittaria-Arten sowie nach PROCTOR (1968) auch für Convolvulus arvensis, Malva parviflora, Prunella vulgaris, Lepidium virginicum, Chenopodium album, die nach vielen Stunden dauerndem Aufenthalt im Darm eines Regenpfeifers (Chardarius vociferus) noch in grosser Zahl zu keimen vermochten. Rhus glabra und Malva parviflora keimten auch nach dem Passieren des Darmes eines amerikanischen Zwergstrandläufers (Erolia minuta). Selbst Vögel wie die Drosseln(Turdus), die Samen und Steinkerne oft in weniger als einer Stunde wieder ausscheiden, tragen dieselben oft weit fort, wenn sie grosse Strecken zurücklegen müssen, um genügend Nahrung




Abb. 38. Schema der zeitlichen Verbreitung der Samen der wichtigsten Sträucher und Bäume durch Amseln in Chur.

zu finden. Die Zugvögel entleeren aber meistens ihren Darmkanal bevor sie zu grossen Dauerflügen starten. Gebirgsvögel wie die Alpendohlen (Pyrrhocorax graculus) sind für die Ueberwindung der Höhen besonders wichtig. So stiessen wir Ende August 1952 auf dem Calandagipfel, 2808 m ü. M., auf Exkremente von Alpendohlen, die reichlich Früchtchen von Himbeeren (Rubus idaeus) enthielten. Da die Früchte dieser Pflanzen über 1900 m nicht mehr reifen, mussten sie mindestens 900 m emporgeflogen worden sein. Ganz besonders günstig für die Verbreitung von Samen auf grosse Distanz sind natürlich Tierwanderungen, wie sie z. B. die Rentiere ausführen und wie sie durch den Vogelzug gegeben sind. Normalerweise bewegen sich die Tiere aber innerhalb eines bestimmten Wohnbezirks, ihrem sogenannten Territorium. So entfernten sich die Dachse im Beobachtungsgebiet von NEAL (1948) im Cinigre Wood (England) gewöhnlich nicht weiter als etwa 2 km von ihrem Bau. Als Territoriumsgrösse gibt RIEDER (1940) für das Reh in Baselland 535 a an, und für den Elefanten im Albert-Nationalpark (Kongo) soll sie nach HUBERT (zit. nach HEDIGER 1949) 8 km² betragen. Die Ziegenherden der Bündner Gemeinden entfernen sich nicht selten bis zu 5 km von ihren Dörfern und überwinden Höhenunterschiede von 1500 und mehr Meter. Die Reptilien und die Schnecken, die die Samen ebenfalls lange im Darmkanal behalten, kommen aber ihrer Langsamkeit wegen meist nur für die Verbreitung in der nächsten Umgebung der Mutterpflanze in Betracht.

Es gibt auch Pflanzen, deren saftige Verbreitungseinheiten von den Tieren verschmäht, oder nur selten verzehrt werden. Zu ihnen gehört in Graubünden beispielsweise Hippophaë rhamnoides ssp. fluviatilis. Dieser Strauch bleibt in der Regel bis zur nächsten Vegetationsperiode mit seinen orangefarbigen, zuletzt ausgebleichten Beeren beladen. Die etwas grösseren Früchte der an den Meeresküsten wachsenden Unterart rhamnoides dagegen, sollen bei den Staren (Sturnus vulgaris) und noch andern Vogelarten sehr beliebt sein. Man konnte ferner in Mitteleuropa bis heute keine freilebenden Verzehrer der Früchte von Majanthemum bifolium, Actaea spicata und der aus China eingeführten Berberis wilsoniae ausfindig machen, und es muss angenommen werden, dass auch sie nicht beliebt sind. Vielleicht handelt es sich bei den einheimischen Arten um Fälle, wo die Verzehrer selten geworden oder gar ausgestorben sind. Wir wissen ja, dass

in den Alpen einst auch der Braunbär ein wichtiger Verbreiter verschiedener Beerenpflanzen war. Mit seinem Verschwinden haben diese ein wichtiges Verbreitungsagens verloren. Die dornige Berberis wilsoniae hingegen ist durch die Menschen auch ausserhalb des Bereiches ihrer tierischen Verbreitungsagentien angesiedelt worden.

D. Anhafter (Epichoren) 1

Wasser- und Sumpfpflanzen, aber auch Steppen- oder Ackerpflanzen, werden häufig verbreitet, indem Wasser, besonders aber feuchter Schlamm, durch ihre Adhäsionskraft die Verbreitungseinheiten an Tiere anheften, die sich an solchen Orten aufhalten, und oft auch zwischen weit entfernt liegenden Sümpfen und Gewässern die Verbindung herstellen. Die folgende Liste enthält Pflanzen, deren Verbreitungseinheiten KERNER (1898, S. 621) im Schlamm, den er von den Schnäbeln, den Füssen und dem Gefieder von Schwalben, Schnepfen, Bachstelzen und Dohlen ablöste, häufig vorfand:

Glyceria fluitans
Cyperus flavescens
Cyperus fuscus
Heleocharis acicularis
Isolepis setacea
Scirpus maritimus
Juncus bufonius
Juncus compressus
Juncus articulatus
Roripa amphibia
Roripa islandica

Roripa silvestris
Elatine hydropiper
Lythrum salicaria
Samolus valerandi
Anagallis minima
Glaux maritima
Centaurium pulchellum
Limosella aquatica
Lindernia pyxidaria
Veronica anagallis-aquatica

Es sind hauptsächlich Pflanzen mit kleinen Samen, die auf diese Weise verbreitet werden. Je kleiner die Verbreitungseinheit, um so eher wird sie jedenfalls von wandernden Tieren, namentlich Vögeln, unbemerkt mitgetragen.

Grössere Verbreitungseinheiten können im allgemeinen nur an Tieren

l epi = obendrauf

haften und durch sie verbreitet werden, wenn sie mit speziellen Haftvorrichtungen ausgestattet sind. Ausserdem kommen für sie in der Regel nur Pelztiere als Verbreitungsagentien in Frage.

Als Haftvorrichtungen wirken Drüsenhaare, die Klebstoffe absondern, Schleim der aus der Samenhaut oder der Fruchtwand austritt, haken- oder gar widerhakenförmige Haarbildungen und Emergenzen, sowie spitzige Dornen. So sind die einjährigen Hornkräuter Cerastium pumilum und C. semidecandrum und der Einjährige Steinbrech Saxifraga tridactylites über und über mit klebrigen Haaren besetzt und können von vorbeistreifenden Tieren ganz mitgeschleppt werden, wobei die Samen unterwegs dann aus den Kapseln fallen, zum Teil aber auch an den klebrigen Sprossteilen hängen bleiben. Mit Hilfe von Drüsenhaaren haften ferner die Früchte der zierlichen Waldpflanze Linnaea borealis und des Tropenunkrautes Siegesbeckia orientalis. Bei Salvia glutinosa ist der mit den Früchtchen sich ablösende Kelch mit klebrigen Drüsenhaaren besetzt. Mittelst klebrigen Schleimes, der bei der Benetzung aus der Samenhaut austritt, heften sich z. B. die Samen von Juncus tenuis vorbeistreifenden Tieren an. Bei Benetzung quellen sie aus den Fruchtkapseln heraus, so dass sie mit den Tieren auch wirklich in Berührung kommen können.

Mit spitzigen Dornen sind die Früchte von *Tribulus terrester*, *Zygo-phyllum cornutum* und des nordamerikanischen Steppengrases *Cenchrus tribuloides* ausgestattet. Sie haften damit sogar an den Hufen der Weidetiere, und man nennt sie deshalb auch Trampelklet ten.

Recht häufig sind Pflanzen, deren Verbreitungseinheiten mit hakenförmigen Kletterorganen ausgestattet sind. So bildet sich namentlich bei manchen Ranunculaceen und Rosaceen der Griffel nach dem Verblühen zu einem Haken um und erhält dadurch eine neue wichtige Aufgabe. Dies ist z. B. bei Ranunculus lanuginosus, Geum urbanum und G. rivale der Fall. Sehr gut haften die Früchte mancher Medicago-Arten (Abb. 39). Sie sind sogar mit vielen, meist reihenweise angeordneten Haken besetzt, die aus der Fruchtwand hervorgegangen sind. Dank hornartig gekrümmter Auswüchse, die aus dem Griffel und dem Endokarp hervorgehen, und den grossen Kämmen auf dem Rücken kommen die Früchte des "Gemsenhorns", Ibicella lutea (Proboscidea) mit argentinischer und brasilianischer Wolle bis in die Schweiz




Abb. 39. Verbreitungseinheiten mit Klettvorrichtungen von Medicago disciformis (links), Xanthium strumarium (Mitte) und Medicago tribuloides (rechts). (Aufn. CASPAR; 3x).




Abb. 40. Frucht von *Ibicella lutea*, eine sogenannte Trampelklette. (Aufn. CASPAR, 3/4 nat. Grösse).

(Abb. 40). Die Verbreitungseinheiten von Agrimonia eupatoria besitzen Hüllblätter, die zur Reifezeit der Früchte zu hakenförmigen Kletterorganen umgeformt sind, und bei Rumex bucephalophorus (Abb. 42) tragen die Perianthblätter, die mit der Frucht abfallen, an ihren Rändern Haken. Auch bei den Kompositen-Gattungen Xanthium (Abb. 39) und Arctium funktionieren hakenförmige Hüllblätter als Verbreitungsmittel. Die Früchte von Galium odoratum, G. aparine und Circaea, sowie die Samen von Nymphoides peltata wiederum sind mit hakenförmigen Haargebilden ausgestattet.

Widerhakenförmige Verbreitungsmittel besitzen beispielsweise die Früchte der *Bidens-*Arten sowie von *Cynoglossum officinale*, *Lappula* (Abb. 41) und von der tropischen *Pavonia schimperiana*.




Abb. 41. Frucht vom stacheligen Igelsamen (Lappula myosotis) mit Widerhaken. (Aufn. TRABER; 5x).

Einen besonderen Untertypus der Epichoren bilden ferner die sogenannten S c h ü t t e l k l e t t e n . Bei ihnen sind nicht die Verbreitungseinheiten mit Haftvorrichtungen versehen, sondern die Fruchtstände und oft auch noch andere Sprossteile. Ihre Stengel sind wie diejenigen der Windstreuer elastisch. Die Haftorgane bewirken, dass der Spross sich an vorbeistreifenden Tieren verankert, und wenn diese sich losreissen, die verbogenen Stengel heftig zurückschnellen. Dabei werden die reifen Verbreitungseinheiten in weitem Bogen ausgestreut. Typische Vertreter der Schüttelkletten sind Dipsacus silvester und Leonurus cardiaca, Pflanzen,

die hauptsächlich an Wegen und auf Lagerplätzen wachsen. Ihre Verbreitungseinheiten selbst entbehren besonderer Haftvorrichtungen.

Unvollkommen und eigenartig erscheint uns die Epichorie bei Daucus carota. Die Früchtchen dieser Pflanze tragen zwar mehrere Reihen widerhakenförmiger Stacheln, die bei Gelegenheit anhäkelnd wirken; aber die Art und Weise, wie sie den Verbreitungsagentien dargeboten werden, erinnert an die Windstreuer unter den Anemochoren. Ihr Stengel versteift sich nämlich während der Fruchtreife und wird sehr elastisch, und die Doldenstrahlen führen hygroskopische Oeffnungs- und Schliessbewegungen aus. Sie neigen bei feuchtem Wetter einwärts, so dass ein vogelnestartiger Behälter entsteht, der die Verbreitungseinheiten völlig einschliesst. Wenn die Dolden sich infolge Austrocknung erneut öffnen, bleiben die Früchte der Randdöldchen an denjenigen der innern Döldchen hängen. Alle Früchte haben sich nun in der Mitte der Dolde zusammengeballt und kommen daher nur noch schwer mit vorbeistreifenden Tieren in Berührung. Es sind nun meist Windstösse, die sie von der Mutterpflanze entfernen.

Die vegetativen Verbreitungseinheiten sind bei einigen mexikanischen Walzenkakteen der Gattung Mammillaria und bei Remusatia vivipara, einem tropischen Arongewächs epichor. Bei Mammillaria sitzen die stacheligen Ableger lose auf dem Scheitel der Pflanzen und Remusatia trägt die mit Haken ausgestatteten Bulbillen auf dem oberen Teil des Stengels.

Als besondere Eigentümlichkeit ist bei den Epichoren noch zu erwähnen, dass bei fast allen die Verbreitungseinheiten auf den ganzen oder doch den grössten Teil des Sprosses verteilt sind (Abb. 42) und so lange auf der Mutterpflanze sitzen, bis ein Agens sie abstreift. Sie gehören daher fast ausnahmslos zu den Winterstehern. Im schweizerischen Mittelland kann man denn auch den ganzen Winter über Früchte von Rumex obtusifolius, Geum urbanum, G. rivale, Agrimonia eupatoria, Sanicula europaea, Cynoglossum officinale, Lappula- und Arctium-Arten auf den Mutterpflanzen antreffen.

Der Transport der Diasporen kann vereinzelt, aber auch in grossen Mengen erfolgen. Bei Hunden und Katzen konnte beobachtet werden, dass sie in ländlichen Gegenden manchmal reichlich mit Früchten von Galium aparine behangen nach Hause kommen. Die Tiere einer im Hinterrheintal wandernden



Abb. 42. Vergleich der Anordnung der Verbreitungseinheiten beim meteorochoren Rumex intermedius (links) (½3 nat. Grösse, Frucht 2x); und beim epichoren Rumex bucephalochorus (rechts) (3/4 nat. Grösse, Frucht 4x).

Schafherde führten massenhaft Arctium-Diasporen mit sich. AGNEW und FLUX (1969) die in Kenya die Pelze von 369 Hasen (Lepus capensis) auf anhaftende Verbreitungseinheiten untersuchten, fanden auf 160 derselben insgesamt deren 810. Sie gehörten 17 Arten an. Die häufigsten waren Tragus berteronianus, Achyranthes aspera, Papalia lappacea, Boerhavia repens, Harpachne schimperi und Themeda triandra.


Die Distanzen, die die epichoren Verbreitungseinheiten zurücklegen können, sind sehr gross. Sie erstrecken sich über die ganzen Bewegungs-räume der Tiere, die als Verbreitungsagentien in Frage kommen. Weil sie dieselben nicht wie die Endochoren automatisch wieder verlassen, profitieren sie am meisten von den Wanderungen, wie sie durch die Transhumance und das Nomadenleben gegeben sind. Dazu kommt, dass sie auch von den grossen Raubtieren unter den Säugern transportiert werden, die nach HEDIGER (1949) viel grössere Gebiete durchstreifen als die Pflanzenfresser.

In den Bündneralpen erreichen auf Dungstellen und Gemsbalmen Lappula deflexa und Myosotis silvatica gelegentlich Höhen von rund 2400 m ü. M., in den Semienbergen Aethiopiens, wo die struppigen Gelada-Affen herdenweise bis auf die höchsten Gipfel steigen, traf der Verfasser noch das epichore Galium cf. aparine auf ca. 4100 m ü. M. an.

E. Aussergewöhnliche Zoochorie

Einige seltene Fälle von Zoochorie lassen sich unter keinem der geschilderten Verbreitungstypen unterbringen. Die Pflanzen, die es betrifft, zeigen denn auch keine spezifische Anpassungen in bezug auf den Verbreitungsmodus. Ihre Diasporen werden transportiert, weil sie oder andere Teile der Pflanze sich zufällig noch für bestimmte Zwecke eignen, die bei der Ausbildung ihrer Verbreitungsmittel kaum mitgewirkt haben. So tragen die Murmeltiere (Marmota marmota) dürre Halme mitsamt den Fruchtständen der Gräser Deschampsia caespitosa und Phleum alpinum in ihren Bau ein. Türkentauben (Streptopelia decacto) konnten beim Transport von mit Fruchtzäpfchen behangenen Birkenzweigen (Betula pendula) beobachtet wer-

den. Ferner kleiden Birkenzeisige (Carduelis flammea) ihre Nester oft mit Samen von Weiden (Salix) bzw. deren Haaren aus. Zwei grosse Nester von Schwanzmeisen (Aegithalos caudatus), die der Verfasser von Dr. H. Jungen, Zürich, aus Baden AG erhielt, sind aus fast lauter Früchtchen und Früchtchenständen von Waldreben (Clematis vitalba) gebaut (Abb. 43). Beim



Aufn. 43. Hauptsächlich aus Früchten der Waldrebe (Clematis vitalba) gebautes Nest von Schwanzmeisen (Aegithalos caudatus). (Aufn. RHEINHARDT; 1/3 nat. Grösse).

Transport der vielen hundert Früchtchen, die mit einem behaarten, verlängerten Griffel ausgestattet sind, ist den Vögeln zweifellos auch die eine oder andere Einheit verloren gegangen. Ausserdem wurde beobachtet, dass Formica-Arten Verbreitungseinheiten von Larix decidua, Rhinanthus und Taraxacum in grosser Zahl als Nestmaterial eintrugen.

Zur Verbreitung von Samen führen regelmässig auch die eigenartigen Sitten der Laubenvögel(Ptilonorhynchinae).Die Männchen der Rotlaubengärtner (Amblyornis subalaris) in Neuguinea z. B. bestreuen den Hof ihrer Laube, der Paarungsstätte, mit Blüten und roten Beeren und der Seidenlaubvogel (Ptilonorhynchus violaceus), ein Malervogel, sammelt Beeren, um ihre farbigen Säfte als Malerfarbe zu gebrauchen.

 Pflanzen, die dank der zivilisatorischen Betätigungen der Menschen wandern (Hemerochoren)¹

Die Verbreitungsmittel vieler zoochorer Arten bewirken auch die Verbreitung ihrer Samen durch den Menschen. Es werden z. B. viele Wildfrüchte gegessen und an den Kleidern Verbreitungseinheiten von Epichoren mitgeführt. Der Transport der Verbreitungseinheiten erfolgt dabei ebenso wie durch die Tiere. Wir werden daher in solchen Fällen den Menschen ohne weiteres zusammen mit den tierischen Agentien aufzählen, oder, wo erwünscht, die Pflanzen, die es betrifft, als Anthropo-Zoochoren bezeichnen können.

Der Mensch beteiligt sich aber noch durch seine zivilisatorischen Tätigkeiten, wie den Anbau von Kultur- und Zierpflanzen, den Handel und Verkehr mit Gütern, Altmaterial und Erde in besonderer Weise an der Verbreitung von Samen und vegetativen Verbreitungseinheiten. Wir unter-

hemeros = zahm (kultiviert)
Nach JALAS (1955), an Stelle der "Anthropochoren" in der l. Auflage.

scheiden:

A. Pflanzen, deren Verbreitungseinheiten absichtlich gesteckt oder gesät werden (Ethelochoren)¹

Zu ihnen gehören Pflanzen, die besonderen Nutzen bringen wie die Getreidearten, der Lein und der Flachs, Obstbäume, Kokos-, Dattel- und Oelpalme, Oliven-, Kaffee-, Kakao- und Baumwollbaum, sowie die Gemüse- und Zierpflanzen.

Viele Pflanzen haben unter dem Einfluss des Menschen spezielle Umwandlungen erfahren, die ganz besonders auch die Frucht- und Samenbildung und damit die Verbreitung der Samen betreffen. Bei den gezüchteten Obstarten z. B. erscheinen grössere, saftigere und wohlschmeckendere Früchte als bei den Wildlingen. Ferner werden nutzbare Samen wie der Leindotter ($\mathcal{C}\alpha$ melina) vergrössert und in reicherer Menge hervorgebracht. Daneben ist die Verkümmerung der natürlichen Ausstreu- und Verbreitungsvorrichtungen der Samen und Früchte eine häufige Kulturpflanzeneigentümlichkeit. So öffnen sich nach THELLUNG (1930, S. 21) die vielsamigen trockenen Kapselfrüchte des Leins (Linum usitatissimum) bei der Wildform (L. angustifolium) und einer nicht sehr hoch gezüchteten Kulturform (var. humile = crepitans, Springlein) spontan. Ebenso bei der Wildform (ssp. setigerum) und einer Kulturform (ssp. nigrum) des Schlafmohns (Papaver somniferum), bei denen die Frucht mit Poren aufspringt. Bei den hochgezüchteten Formen dieser Kulturpflanzen (L. usitatissimum var. vulgare = Dreschlein) und (P. somniferum ssp. hortense = Schliessmohn) bleibt jedoch die Kapselfrucht bei der Reife geschlossen, so dass kein Samenverlust durch spontanes Ausfallen entsteht; die Früchte müssen vielmehr zur Erlangung der Samen durch Anwendung von Gewalt, wie Dreschen, künstlich geöffnet werden.

Ferner ist bei allen Kulturformen der Getreidearten die Gliederung

l ethelo = ich will

der Fruchtstandachsen zurückgebildet oder gänzlich verschwunden. Die Früchte fallen erst im Stadium der Voll- oder Ueberreife oder gar nicht spontan ab, was dem Menschen ermöglicht, bei rechtzeitiger Ernte mit den Garben den vollen Körnerertrag einzuheimsen. Erst beim Dreschen wird durch Anwendung mechanischer Gewalt der Zerfall des Fruchtstandes und die Isolierung der einzelnen Körner bewirkt. Auf dieser Stufe stehen gewisse, nicht sehr hoch gezüchtete Kulturformen aus den Gattungen Avena, Triticum und Hordeum wie Avena byzantina, Mittelmeerhafer, A. strigosa, Rauh- oder Sandhafer, Triticum monococcum, Einkorn, T. dicoccum, Emmer, T. spelta, Spelz oder Korn, Hordeum distiction, H. vulgare und H. hexastichon. (Einkorn und Emmer werden heute kaum mehr angebaut.) Oft geht schliesslich die Entwicklung noch weiter in dem Sinn, dass auch die Blütenspelzen auf der Aehrenachse fest sitzen bleiben, und statt die Körner fest einzuhüllen, bei der Reife auseinanderweichen und die Körner wenigstens beim Dreschen nackt ausfallen lassen. Alle die genannten Kulturpflanzen werden mehr oder weniger ausschliesslich nur durch den Menschen verbreitet.

Im Bestreben die Käufer immer besser zu bedienen, gelang es sogar kernlose Bananen-, Apfel-, Weinreben (Korinthen)- und Gurkensorten zu züchten. Ihre Leerfrüchtigkeit (Kenokarpie) hat aber zur Folge, dass sie nur noch vegetativ künstlich durch Okulieren oder Pfropfen erhalten und vermehrt werden können. Es gibt sogar kaum veränderte Pflanzen, die auch nur noch dort aufkommen wo der Mensch sie hinbringt, wie der Ginkgobaum (Ginkgo biloba) und der Alexandriner Klee (Trifolium alexandrinum), die anscheinend nirgends mehr wild vorkommen.

B. Pflanzen, die als artfremder Bestandteil von Saatgut wandern (Speirochoren) 1

Ihre Verbreitungseinheiten gelangen infolge besonderer Anpassung oder Uebereinstimmung in bezug auf Form, Grösse, Reife oder Dehiszenz der Früchte in das Saatgut von Kulturpflanzen und werden deshalb mit demselben ausgesät.

Die Samen des gefürchteten Kleewürgers Cuscuta epithymum gehören beispielsweise zu den häufigsten Verunreinigungen des Rotkleesaatgutes (Trifolium pratense) und finden sich oft auch unter den Samen anderer Futterpflanzen. Nach STEBLER und SCHRÖTER (1902) gehören ferner die Verbreitungseinheiten von Setaria glauca, Chenopodium album, Rumex obtusifolius, R. crispus, R. acetosella, Coronilla varia, Daucus carota, Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, Cirsium arvense und Cichorium intybus zu den gewöhnlichsten Verunreinigungen der für die Aussaat gewonnenen Rotkleesamen. Der Beschaffenheit der Saat der Kulturpflanzen entsprechend wechseln auch die Verunreinigungen. Im mitteleuropäischen Weisskleesaatgut (Trifolium repens) trifft man hauptsächlich Verbreitungseinheiten von Geranium pusillum, Barbaraea vulgaris, Lepidium campestre, Alyssum calycinum, Rumex acetosella, Spergula arvensis, Cerastium caespitosum, Stellaria graminea, Prunella vulgaris, Plantago major, P. lanceolata und Anthemis arvensis. Avena fatua, Bromus sterilis, B. commutatus, Ranunculus arvensis, Sanguisorba, Medicago lupulina, Lithospermum arvense, Melampyrum arvense und Galium aparine wiederum sind häufige Verunreinigungen der Esparsette (Onobrychis sativa). Europäisches Saatgut von Wiesenschwingel (Festuca pratensis) enthält insbesondere Verbreitungseinheiten von Dactylis glomerata, Alopecurus pratensis, A. geniculatus, Poa trivialis, Bromus mollis, Deschampsia caespitosa, Chrysanthemum leucanthemum, Crepis taraxacifolia, C. biennis usf.

¹ speiro = ich säe

Ausserdem wechseln die Verunreinigungen auch mit der Herkunft des Saatgutes und ermöglichen diese zu bestimmen. So erwähnen STEBLER und SCHRÖTER (1902) als Verunreinigungen des amerikanischen Rotklees Ambrosia elatior, Plantago aristata, Panicum capillare, Plantago rugelii, Potentilla norvegica, Digitaria ischaemum, Hederma pulegioides, Euphorbia preslii, Amaranthus retroflexus, Sida spinosa, Paspalmum ciliatifolium, Physalis lanceolata, Cuphea viscosissima, Rumex obtusifolius, R. crispus, Polygonum persicaria, Echinochloa crus-galli, Setaria glauca, S. germanica, S. italica und Phleum pratense.

Amaranthus retroflexus ist heute ein auch in Europa weit verbreitetes Unkraut.

Das chilenische Rotkleesaatgut enthält als Verunreinigung Cuscuta racemosa, Ammi visnaga, Medicago denticulata und Melilotus indicus.

Im italienischen und südfranzösischen Saatgut finden sich als spezifische Verunreinigungen Centaurea solstitialis, Picris echioides, Arthrolobium scorpioides, Torilis nodosa. Dazu im französischen Rotklee noch Silene venosa, S. vulgaris, S. gallica, Tunica prolifera, Xeranthemum foetidum, Lactuca saligna, Linaria elatine und Verbena officinalis.

Rotkleesaat aus Oesterreich und Ungarn enthält: Anthemis austriaca, Centaurea maculosa, Bupleurum tenuissimum, Nigella arvensis, Delphinium consolida, Lythrum hyssopifolia, Lepidium campestre, Hibiscus trionum, Glaucium corniculatum, Plantago arenaria, Prunella laciniata, Sideritis montana, Ballota nigra, Salvia verticillata, Stachys germanica und Coronilla varia. (Siehe auch HEINISCH 1955).

Selbst Fälschungen des Saatgutes werden vorgenommen und können zur Verbreitung von Samen führen. So wurden die Luzernensamen (Medicago sativa) schon öfters mit Samen von Medicago lupulina und andern Medicago-Arten verfälscht.

Schon beim Transport von Gütern werden vielfach Samen ausgestreut. SCHNYDER (1924) schreibt: "Uebervolle Getreidesäcke platzen auf oder freche Spatzen picken Löcher in sie. Das Getreide rieselt samt Beimengen durch die Wasserrinnen der Wagen auf den Bahnkörper und wird so fast kunstgerecht ausgesät. Die sich ergebenden Abfälle in den Wagen oder

Schuppen werden über die Rampen hinuntergewischt oder zur Abraumstelle verbracht. Getreidelagerhäuser und Mühlen sammeln die "Wischeten" und verkaufen sie als Hühnerfutter. Wo die fremden Samen günstige Keimbedingungen finden, gehen sie auf und bilden eine "Adventivflora". Auch mit Südfrüchten, ganz besonders aber mit Wolle, werden viele Samen transportiert und ausserhalb ihres eigentlichen Verbreitungsareals angesiedelt. Davon zeugt z. B. PROBSTs Wolladventivflora Mitteleuropas (1949).

Besonders bemerkenswert ist jedoch, dass auch bei manchen Unkräutern ähnliche Erscheinungen wie bei den Kulturpflanzen, die sie begleiten, festgestellt werden können. Durch besondere Anpassungen nutzen auch sie vielfach die Verbreitungsmöglichkeiten, die durch die Betreuung der Kulturpflanzen durch den Menschen gegeben sind. Schöne Beispiele sind aus phylogenetischen Gründen hauptsächlich unter denjenigen Arten zu finden, die alte Kulturpflanzen, wie den Lein oder Flachs, begleiten. Auffallend ist vor allem, wie eine gleichzeitige Aussaat der Unkrautsamen mit den Samen der Kulturpflanzen erreicht wird.

CINGER (aus THELLUNG 1930, S. 49) stellte bei Camelina sativa (sens. lat.), dem Leindotter, fest, dass die Unterarten dieser Pflanzen sich nach Lebensdauer, Behaarung, Härte und Oeffnungsenergie der Fruchtklappen und der Grösse der Früchte und Samen in folgende Reihen bringen lassen:

Kleinarten	microcarpa	pilosa	sativa s.str.	alyssum (linicola)
Härte der Fruchtklappen	hart		>	weich
Oeffnungsenergie der Frucht	gross	do.	> kleiner	fast 0
Fruchtgrösse	klein		<	gross
Samengrösse	klein		<	gross

C. microcarpa ist eine wildwachsende Steppenpflanze und geht auch als Unkraut in die Wintersaaten über. C. pilosa ist ein typisches Unkraut der letzteren und wird in Südrussland zuweilen als "Winterdotter" kulti-

viert. C. sativa (sens. str.) ist Kulturpflanze und Unkraut in Sommersaaten. C. alyssum schliesslich ist ausschliesslich Flachsunkraut. Hier trat somit im Lauf der Entwicklung der Unterarten durch Vergrösserung der Samen bei der ssp. alyssum eine weitgehende Angleichung derselben an diejenigen der Kulturpflanze C. sativa (sens. str.) ein. Je ähnlicher die Unkrautsamen denjenigen der Kulturpflanzen sind, die sie begleiten, um so grösser ist ihre Chance, mit diesen wieder ausgesät zu werden. Auch bei dem mit dem Flachs wachsenden Spergula maxima liegen ähnliche Verhältnisse vor. Ferner verdient hier die Gartenkresse (Lepidium sativum) erwähnt zu werden. Sie verwildert leicht aus der Kultur und findet sich ausserdem in Aegypten und manchen Gebieten Europas als Flachsunkraut. Flachsunkraut und Kulturpflanze (L. sativum var. vulgare) zeichnen sich von den Wildformen durch grössere Früchte und Samen aus, die sich denjenigen des Flachses nähern. Vergrösserte Samen gegenüber den wildwachsenden Verwandten besitzt auch noch die Kornrade (Agrostemma githago). Die Bedeutung dieses Merkmals der Kornrade dürfte jedoch nicht in einer Angleichung der Samen etwa an Getreidekörner zu suchen sein, sondern in dem Umstand, dass die Samen zufolge ihrer Grösse schwer aus der unvollkommen sich öffnenden Kapselfrucht ausfallen. Eine Angleichung der Verbreitungseinheiten durch Verkleinerung liegt bei Lolium remotum, einer ausschliesslich als Flachsunkraut auftretenden Pflanze vor. Während bei dem Getreideunkraut Lolium temulentum die abfallenden Verbreitungseinheiten 5,5 - 6 mm lang und oft begrannt sind, messen diejenigen von L. remotum nur 3 - 4 mm und sind stets unbegrannt. Sie stimmen daher in ihren Dimensionen recht gut mit den 3 - 4 mm langen Leinsamen überein.

Bromus secalinus und die verwandte Bromus grossus (multiflorus), zwei Getreideunkräuter, besitzen eine verhältnismässig zähe Aehrchenspindel, die sich erst spät und unvollkommen zergliedert und die fruchtreifen Blüten ausfallen lässt, während bei den verwandten, wiesenbewohnenden Arten B. racemosus und B. commutatus die Aehrchen in reifem Zustand leicht in die einzelnen Blüten zerfallen. Es werden also in der Regel die Fruchtstände der Ackerbewohner unversehrt mit dem Getreide eingeheimst und erst durch den Drusch gewaltsam zum Zerfall gebracht, wodurch sie auch wieder ins Saatgut gelangen. Es ist gewiss kein Zufall, dass gerade bei Bromus

secalinus als alleinige Art des näheren Verwandtschaftskreises die Grannen oft verkürzt und selbst vollständig verkümmert sind; denn die Pflanze wächst sehr oft unter unbegrannten Getreidevarietäten, wie dem Spelzweizen. Zähe Aehrenspindeln wurden auch bei den als Unkräuter auftretenden Roggen- und Haferformen beobachtet. Polygonum lapathifolium besitzt als Unkrautpflanze der Flachsfelder eine besondere Unterart ssp. leptocladum, deren Hauptmerkmal darin besteht, dass die Gliederung unter der Blütenhülle zurückgebildet ist und die Scheinähren deshalb bis zur Reifezeit ganz unversehrt bleiben, während sie bei den übrigen Unterarten frühzeitig zufolge der erwähnten Gliederung des Fruchtstiels an der Spitze zerfallen. Auch das Klettenlabkraut (Galium spurium) bildet in den Flachsfeldern eine besondere Rasse (var. leiospermon) aus, die sich durch den Verlust der natürlichen Ausstreu- und Verbreitungsmittel auszeichnet. Während bei den übrigen Rassen die Frucht frühzeitig in zwei Teilfrüchte zerfällt und in der Regel mit Hakenborsten versehen ist, bleibt sie nach THELLUNG (1930, S. 57) bei dem Flachsunkraut bis zur Reife ganz und ist kahl.

Weitere Beispiele für die Angleichung der Unkrautsamen an diejenigen der Kulturpflanze finden wir nach THELLUNG (1930, S. 58) auch innerhalb der Gattung Rhinanthus. Die Samen bei den ursprünglichen, wiesenbewohnenden Sippen sind von einem der Windverbreitung dienenden, häutigen Flügelrand umzogen, der bezeichnenderweise den ackerbewohnenden Sippen Rhinanthus alectorolophus ssp. buccalis, und Rh. major ssp. apterus fehlt. Auch hier ist leicht ersichtlich, dass die flügellosen Samen als Angleichung an die Getreidekörner aufgefasst werden müssen, da sie von den Reinigungsmassnahmen viel weniger leicht erfasst werden können als die geflügelten. Dazu kommt noch, dass auch die Ausstreuvorrichtungen der ackerbewohnenden Rhinanthi eine Rückbildung erfahren haben, indem bei dem Winterroggen-Unkraut Rh. apterus die Fruchtklappen sich weniger weit öffnen als bei den Wiesensippen und der Kelch am Rücken nicht zerreisst.WIDDER (1939) stellte ferner fest, dass bei Rhinanthus buccalis die Samen sich nicht von der Placenta ablösen.

Die in der Landwirtschaft auftretenden Saatgutunkräuter werden allerdings in der Gegenwart durch die ständig sich verbessernde Technik der Saatgutreinigung an der Verbreitung mehr und mehr gehindert.

C. Pflanzen, deren Verbreitungseinheiten mit andern Gütern transportiert werden (Agochoren)¹

Mit Mist und Jauche gelangen oft Samen von Trifolium repens und Rumex obtusifolius, die den Darm eines Haustieres passierten, wieder ins Feld. Ferner werden mit Wolltransporten vielfach epichore Verbreitungseinheiten wie z. B. manche Medicago-Früchte weithin verfrachtet (siehe PROBST 1949). Von besonderer Art ist ausserdem die Agochorie von Sonchus asper und S. oleraceus (Abb. 44 und 45). Die Früchte tragen wie diejenigen der meisten Kompositen einen gut ausgebildeten Pappus, der ihnen die Verbreitung durch den Wind ermöglicht. Die Pappusstrahlen bestehen wie diejenigen von Taraxacum aus langgestreckten Zellen. Diese sind jedoch am Fuss der stärkeren Strahlen so stark nach aussen umgebogen, dass sie in Form eines rückwärts gebogenen Dornes aus der Oberfläche heraustreten und anhäkelnd wirken. Feuchtigkeit, namentlich Regen, drückt vielfach die Pappusstrahlen auf den Körbchenboden. Bei Berührung verankern und verfilzen sich nun alle innerhalb eines Körbchens zu einem ringförmigen Gebilde, das, wenn die Früchte sich vom Boden abgelöst haben, an den Zweigen der Mutterpflanze hängen bleibt. Erfolgt bei andauernd trockenem Wetter eine Verbreitung der Früchte durch den Wind, so heften sie sich mittelst den anhäkelnd wirkenden Pappusstrahlen an die ersten Hindernisse, auf die sie stossen. Solche Hindernisse sind zur Hauptsache die sie begleitenden Kulturpflanzen mit ihren übrigen Unkräutern. Es ist daher leicht, auf einem von Sonchus oleraceus und S. asper besiedelten Brachland oder Acker an fast allen Pflanzen verankerte Früchte der genannten Arten zu finden. Diese werden durch die Menschen beim Bearbeiten des Ackers weiter verbreitet. Sie gelangen durch sie in den Kompost, in

l ago = ich führe mit

die Scheunen, in die Ställe und schliesslich oft wieder auf Kulturland. Sonchus oleraceus ist nach CHRIST (1923, S. 145) eine aufgegebene Kulturpflanze, S. asper, das sie begleitende Unkraut. Beide sind vermutlich von der ursprünglich reinen Anemochorie zur Hemerochorie übergegangen.




Abb. 44 und 45. Gänsedistel (Sonchus oleraceus).

Abb. 44. Frucht mit einigen Pappushaaren (7x).

Abb. 45. Teile eines Pappushaares (ca. 30x). Im untersten

Teilstück des Haares links sind die Auswüchse hakenartig

abwärts gebogen.

Die Rosskastanie (Aesculus hippocastanum) und die Eichen (Quercus) sind agochor indem Kinder ihre Samen bzw. Früchte dank ihrer Grösse und Beschaffenheit als Spielzeug benützen. Ferner werden Fichtenäste mit Zapfen zum Schmuck der Häuser, sowie Schneeball- und Stechpalmenzweige (Viburnum opulus und Ilex aquifolium) ihrer rotleuchtenden Beeren wegen als

winterlichen Grabschmuck verwendet.

* * *

Hemerochorie ist erst durch die menschliche Kultur möglich geworden. Die spezifischen Verbreitungsanpassungen, wie sie namentlich bei den Speirochoren unter ihnen vorkommen, gehören daher zu den phylogenetisch jüngsten.

Dank des grossen Verkehrs und mannigfaltigen Güteraustausches zwischen den Menschen aller Kontinente bestehen für die Hemerochoren die besten Aussichten für die Erreichung der für sie günstigen Siedlungsgebiete. Natürliche Verbreitungsschranken wie Gebirge, Meere und Wüsten bestehen für sie nicht mehr. Ihretwegen gibt es um Wohnstätten, Verkehrszentren und auf Lagerplätzen die Adventivflora, wie sie SCHNYDER (1924), PROBST (1949) und andere Autoren schildern.

Dem Spezialisten fällt es nicht schwer aus den Adventivpflanzen eines Bahnhofs oder Fabrikareals auf den Hauptverkehr desselben zu schliessen. Einem Wechsel des Hauptverkehrs folgt bald eine entsprechend veränderte Vegetation. SCHNYDER (1924) erwähnt über 140 Adventivpflanzen, die vor 1915 mit Getreide und Sämereien aus dem Osten in den Bahnhof Buchs kamen. Die häufigsten waren Echinochloa crus-galli, Tragus racemosus, Phalaris canariensis, Bromus arvensis, Chenopodium glaucum, Ch. vulvaria, Atriplex oblongifolia, Ranunculus arvensis, R. sardous, Lepidium spec. div., Erysimum repandum, Berteroa incana, Bunias orientalis, Vicia villosa, V. dasycarpa, Euphorbia virgata, Asperugo procumbens, Anchusa officinalis, Salvia verticillata, Inula britannica, Anthemis spec. div., Matricaria suaveolens, Chrysanthemum maritimum, Centaurea spec. div., Lapsana communis, L. intermedia und Crepis foetida. Während des ersten Weltkrieges kamen aber dann mit den Zitronentransporten und der Gefangenenpost aus Italien hauptsächlich mediterrane Pflanzen an, z. B. Cynosorus echinatus, Scleropoa rigida, Bromus madritensis, Brachypodium distachy on, Rumex bucephalophorus, Medicago scutellata, Trifolium angustifolium, Coronilla scorpioides, Calendula arvensis, Hedypnois cretica, Centaurea algeriensis und Lactuca serriola.

IV. NAH- UND FERNVERBREITUNG

Wie die Angaben bei den geschilderten Verbreitungstypen zeigen, bestehen in bezug auf die Distanzen, die die Agentien mit den Samen zurücklegen, grosse Unterschiede. Es kann Nah- oder Fernverbreitung bzw. Topound Telechorie (ZOHARI 1962) zustande kommen. Die Grenze zwischen denselben ist künstlich und wird bei 100 m angenommen (MüLLER-SCHNEIDER und LHOTSKA 1971). Nur Nahverbreitung erfolgt im allgemeinen bei den Autochoren, Barochoren, Boleochoren, Ombrochoren und Stomatochoren. Bei den Endochoren, Epichoren, Meteorochoren und Hemerochoren dagegen kommt Fernverbreitung verhältnismässig oft vor. So ist TAYLOR (1954) überzeugt, dass die auf den Macquarie-Inseln wachsenden Pflanzenarten Camprosoma pumila und Stilbocarpa polaris epichor durch Vögel angesiedelt wurden, trotzdem die Distanz bis zu den am nächsten gelegenen Auckland-Inseln 650 km misst.

V. VERBREITUNG DURCH ZWEI ODER MEHRERE WESENSVERSCHIEDENE AGENTIEN (DIPLO- UND POLYCHORIE)

Nicht nur von Art zu Art, sondern sogar bei ein und derselben Pflanze kann eine Verbreitung der Samen durch in ihrem Wesen völlig verschiedene Agentien erfolgen. Seit ULBRICH (1928) bezeichnet man diese Erscheinung als Diplo- bzw. Polychorie. Dabei können sich die Agentien in ihrem Wirken gegenseitig ergänzen, oder aber völlig unabhängig voneinan-

¹ topos = Ort

tele = fern

der den Transport der Samen besorgen. Die Entwicklung von zwei oder mehreren Verbreitungsagentien auf eine Verbreitungseinheit führt häufig zu einer wesentlichen Verlängerung der Transportdistanz oder zu einem günstigeren Keimplatz. So haben die Verbreitungseinheiten der meisten anemochoren Pflanzen ein geringes spezifisches Gewicht und vermögen dadurch auch kürzere oder längere Strecken zu schwimmen. Wenn sie nach der Luftreise in ein Gewässer niedersinken, tragen daher die Wellen und Strömungen sie noch fort. Namentlich die Samen der an Ufern wachsenden Weiden und Erlen, oder die Früchte von Eschen- und Ahornbäumen fallen oft zu einem grossen Teil ins Wasser. Durch die Wellen werden sie dann ans Ufer gespült, wo sie vielfach ein günstiges Keimbett finden.

Auch unter den ombrochoren Pflanzen sind viele, deren Verbreitungseinheiten schwimmen können. Zu ihnen gehören z. B. Scutellaria galericulata und Caltha palustris. Wenn der Regen ihre Samen ausgestreut hat,
trägt das abfliessende Wasser sie dank ihres geringen spezifischen Gewichtes noch ein Stück weit fort. Aehnlich verhält es sich auch bei den
Barochoren der Mangrove-Vegetation. Die Keimlinge, die während der Flut
ins Wasser fallen, werden, wenn sie nicht sinken, von der Strömung fortgetragen und irgendwo wieder an Land gespült.

Recht gross ist namentlich die Zahl der barochoren und autochoren Arten, deren Verbreitungseinheiten, sobald sie auf den Boden gelangt sind, durch Ameisen weiter transportiert werden, weil sie auch mit einem Oelkörper ausgestattet sind, Barochorie und Autochorie sind geradezu notwendige Voraussetzungen für die stomatochore Verbreitung durch Ameisen. Die Kombination Barochorie-Stomatochorie treffen wir bei Ormithogalum umbellatum, Scilla bifolia, Borago officinalis usw., autochor und stomatochor sind vor allem viele Euphorbia- und Viola-Arten.

Die Früchte von *Prunella vulgaris*, die vielfach durch fallende Regentropfen ausgestreut werden, sondern bei Benetzung Schleim ab, der sie auf ihrer Unterlage festklebt. Im geschlossenen Vegetationsteppich der Wiesen und Weiden bleiben sie daher nach ihrer Ausstreuung durch die Regentropfen oft an Blättern von Kräutern kleben und werden mit ihnen, vielfach aber auch schon mitsamt den Fruchtständen, von Weidetieren in den Darmkanal aufgenommen. Keimversuche mit *Prunella*-Früchten aus Tier-

kot haben ergeben, dass sie tatsächlich auch endochor verbreitet werden können.

Bei einigen Trifolium-Arten wiederum kommt häufig Endochorie und Hemerochorie vor. Speziell die Verbreitungseinheiten von Trifolium repens bleiben auch nach der Reife noch auf der Mutterpflanze fixiert und gelangen dadurch massenhaft ins Emdfutter. Wenn der Bauer dann den Mist und die Jauche aufs Feld führt, sät er damit eine Menge Kleesamen aus, weil diese dank ihrer Hartschaligkeit den Durchgang durch die Därme der Tiere und den Aufenthalt im Dünger überstanden haben.

Die mit zwei klebrigen Haaren ausgestatteten Früchte von Geranium robertianum bleiben nach dem Ausschleudern vielfach an Blättern und Zweigen der Begleitpflanzen hängen. Fallen deren Blätter ab, so trägt manchmal der Wind sie fort; oft jedoch transportiert der Mensch die Früchte wie diejenigen von Sonchus oleraceus und S. asper (siehe S. 155) mit Unkräutern und Kehricht weiter.

Die Fälle von Polychorie, bei denen die Verbreitungsagentien völlig unabhängig voneinander wirken, sind ebenfalls nicht selten. Zahlreiche Gramineen, Rumex-Arten und Leguminosen sind sowohl anemochor, als auch endochor oder hemerochor. Ferner wurden keimfähige Samen von Lotus- und Geranium-Arten, die alle Selbststreuer sind, vereinzelt aus dem Kot von Weidetieren ausgelesen. Die Samen dieser autochoren Pflanzen können freilich nur unter ganz besonders günstigen Umständen endochor verbreitet werden; denn auf ihre Reife erfolgt bald die Ausstreuung, die sie den Weidetieren entzieht. Gelangen sie aber vor der völligen Reife in den Darmkanal eines Tieres, so quellen sie und gehen zugrunde. Immerhin kann durch diese kleine Möglichkeit zur endochoren Verbreitung ab und zu ein Samentransport auf grosse Distanz zustandekommen.

Die in saftiges Fleisch eingebetteten Samen sind normalerweise endochor. Namentlich bei den grossen unter ihnen kommt aber auch Dysochorie vor. Während z. B. Amseln (Turdus merula) von den Verbreitungseinheiten der Eibe (Taxus baccata) nur den Arillus nützen und den Samen in keimungsfähigem Zustand wieder von sich geben, stellt die Spechtmeise (Sitta europaea) nach STäGER (1910) nur den Samen nach und verschmäht den Aril-

lus.

Bei einer kleinen Gruppe von Pflanzen kommt Polychorie sogar durch die Ausbildung verschiedener Verbreitungseinheiten, sogenannte Polydiasporie (siehe S. 20) zustande. Das bekannteste Beispiel liefert die heterokarpe Calendula arvensis. Ihre bestachelten Randfrüchte werden durch Pelztiere, die kahnförmigen Früchte aus der Mitte des Körbchens durch den Wind, und die innersten, wurmförmigen Früchte durch die Schwerkraft verbreitet. Dazu kommt, dass auch die Ernteameisen z. B. Messor barbarus, die schmalen Innen- und Aussenfrüchte mit Vorliebe sammeln.

Auch der Meerkohl (Crambe maritima) bildet nach STRAKA (1959) verschiedene Diasporen aus. Die einen bestehen aus dem rundlichen, oberen Glied (Stylarglied) der Frucht, die andern sind dürre, abgebrochene Teile des Fruchtstandes. Die im Durchmesser meist 8 mm messenden Stylarglieder sind nauto- und chamaechor, die Fruchtstandteile vor allem chamaechor. Dadurch ist sowohl die Verbreitung durch den Wind über den Strand, als auch durch die Meeresströmungen gesichert.

Die Polychorie ist entgegen früheren Annahmen bei sehr vielen Arten festzustellen. Sie ist von grosser Bedeutung, denn je mehr Möglichkeiten einer Pflanze für die Verbreitung ihrer Keime offen stehen, um so sicherer dürfte es ihr gelingen, den Raum zu besiedeln, in dem sie konkurrenzfähig ist.

VI. HEMMUNG UND BEENDIGUNG DER VERBREITUNG

Eine eigentliche Hemmung der Keimverbreitung bedingt die von MURBECK (1920) näher untersuchte Synaptosper mie. Sie besteht darin, dass normalerweise zwei oder mehrere Samen bis zur Keimung zusammengehalten bleiben, während die meisten Pflanzen primär oder doch sekundär einsamige Verbreitungseinheiten bilden. Die Verkoppelung der Sa-

men kann durch die Indehiszenz mehrsamiger Früchte oder Teilfrüchte bedingt sein. Namentlich die Früchte der meisten Medicago-Arten, wie M. disciformis, M. minima, M. orbicularis, M. scutellata, ferner diejenigen von Scorpiurus sulcatus, Hippocrepis multisiliquosa, H. unisiliquosa, Onobrychis caput-galli, Biserrula pelecinus, Cerinthe major sowie die mehrsamigen Teilfrüchte von Tribulus terrestris fallen als Ganzes ab und öffnen sich nicht. Wir treffen oft Früchte dieser Pflanzen, aus denen gleichzeitig 2 - 3 Keimlinge herauswachsen. Die Verbreitungseinheiten der Wüstenpflanze Neurada procumbens bestehen sogar aus 10 einsamigen Früchten, die miteinander und mit dem Hypanthium verwachsen sind. Die 2 - 4 gegen den Grund des Stieles gerichteten Karpide haben viel kürzere Griffel als die andern und enthalten unvollkommen entwickelte Samen; die 6 übrigen, langgriffligen Karpide aber enthalten vollkommene Samen. Obgleich sich die Karpide schliesslich in ihrem obersten, freien Teil der Bauchnaht entlang öffnen, bleiben die Samen in der Frucht eingeschlossen. Von Trifolium cherleri fallen die ganzen Fruchtköpfe zusammen mit 2 bis 3 dicht gestellten Involucralblättern gleich nach der Fruchtreife ab, und jeder Same bleibt von einer besondern, aus den Blütenteilen gebildeten Hülle umschlossen. Bei Xanthium sind die beiden in den weiblichen Köpfchen befindlichen Früchte gemeinsam von miteinander verwachsenen und verholzten Hüllblättern umgeben und bleiben deshalb ebenfalls bis zur Keimung beisammen. Die Verbreitungseinheiten von Aegilops ovata wiederum sind nichts anderes als der ganze fertile Teil der Aehre, der niemals in seine Teile zerfällt.

Als weitere Beispiele für synaptosperme Arten können vor allem auch noch Avena sterilis, Echinaria capitata, Rumex vesicarus, Beta macrocarpa, Salsola kali, Paronychia argentea, Statice echioides, Tragus racemosus und Lygaeum spartum angeführt werden.

Einige Pflanzen sind nur unvollkommen synaptosperm, so Zygophyllum cornutum. Die Frucht dieser nordafrikanischen Pflanze besteht aus fünf mehrsamigen Karpiden, die sich oben in bogig auswärts gekrümmte Hörner verlängern, welche die gleiche Länge wie der übrige Teil der Frucht erreichen können. Weil sich die Placenten bis in die Hörner hinauf fortsetzen, ist ein Teil der Samen in diesen eingeschlossen. Wenn die Frucht

nach der Reife unter Zurücklassung einer zentralen Säule abfällt, lösen sich die Karpide bloss in ihrem untersten Teil voneinander ab, weshalb nur die basal inserierten Samen herausfallen. Die Samen, welche sich in der obern Hälfte der Frucht und in den hörnerähnlichen Auswüchsen befinden, bleiben dagegen darin eingeschlossen. Hedypnois cretica öffnet die Fruchtkörbchen bei Eintritt der Reife und gibt die innern, mit einem Pappus ausgerüsteten Achänien frei. Die randständigen, pappuslosen Früchte aber werden von den Hüllblättern, die sie umschliessen, festgehalten. Schliesslich krümmen sich die Hüllblätter wieder einwärts, und das rundliche Körbchen, das noch die randständigen Früchte enthält, bricht unterhalb des aufgeblasenen Stengelstückes ab. Die so gebildete Verbreitungseinheit wird vom Wind fortgerollt und zerfällt normalerweise nicht weiter. Aehnlich liegen die Verhältnisse bei Crepis foetida, nur dass bei dieser Pflanze die Randfrüchte, die festgehalten werden, auch einen Pappus tragen und das oberste Stengelstück nicht aufgeblasen ist.

Im weitern wird die Verbreitung der Samen bei manchen Pflanzen auch durch Basikarpie, Geokarpie und Amphikarpie behindert. In den Randzonen von Sandwüsten, wo jede kleine Erhebung über den Boden den Sand staut, der vom Wind transportiert wird, werden basikarpe Früchte meist schon begraben, bevor sie völlig ausgereift sind und die Samen ausgestreut werden konnten. Bei der basikarpen Pflanze Ammochloa involucrata springen die Früchte überhaupt nicht auf und lösen sich auch nicht ab. Amphikarpe Pflanzen entziehen einen Teil der Früchte den meist nur oberirdisch wirkenden Verbreitungsagentien, schützen sie dadurch aber vor klimatischen Gefahren. Es gibt aber unter ihnen auch solche, die eine Chance haben verbreitet zu werden. So ist die Erdnuss (Arachis hypogaea) nicht nur hemerochor, sondern je nach der Gegend in der sie wächst, auch dysochor durch Feldhühner, Krähen, Raben, Feldmäuse, Ratten, Stachelschweine, Schweine, Schakale und Paviane (siehe WüRTENBERGER 1917). Bei der geokarpen Cucumis homofructus (siehe S. 126) kommt sogar Endochorie vor.

Wenn Samen oder Brutkörper keimen, haben sie Ruhe nötig. Lagestörungen führen dann leicht zum Verderben. Vom Bergahorn (Acer pseudoplatanus), einem typischen Wintersteher der Montanstufe, vermischen sich z. B.

infolge der Verbreitung im Winter alljährlich Tausende von Früchten mit dem Schnee. In hohen Lagen vermögen sie darin im Frühjahr zu einem grossen Teil auch zu keimen und einige Zentimeter lange Keimwürzelchen durch ihn hindurch zu treiben. Schmilzt der Schnee weg, bevor die Wurzeln in die Erde eingedrungen sind, so verlieren die Keimlinge ihren Halt und kippen um. Dabei kommen sie, weil die Keimblätter noch von der geflügelten Fruchtschale zusammengehalten werden, vielfach so unglücklich zu liegen, dass ihre Wurzelspitze nach oben schaut und verdorren muss (MüLLER-SCHNEIDER 1941).

In der Regel gelangen die Keime durch Unwirksamwerden oder Verlust der Verbreitungsmittel zur Ruhe. Bei den Selbststreuern, Selbstablegern und Windstreuern entweichen die Samen ihren Verbreitungsapparaten. Die Flügel und Haarschöpfe vieler Haarschirm-und Flügelflieger fallen leicht ab, so z.B. bei Picea excelsa, Carpinus betulus und bei den Cirsium-Arten. Bei Crepis paludosa und manchen Hieracium-Arten sind die Pappushaare sehr brüchig. Wenn die, einen fallschirmartigen Flugapparat tragenden Früchte von Typha ins Wasser fallen, sprengt der Same durch Wasseraufnahme in 2 - 3 Tagen die Fruchtwand, fällt dann frei heraus und sinkt unter. Die Schwimmvorrichtungen der meisten Nautochoren nehmen allmählich Wasser auf oder werden durch die Reibung auf dem Strand abgenützt und unwirksam. Nach SCHIMPER (1891, S. 161), sind die Verbreitungseinheiten der Strandpflanzen, die in der indomalayischen Drift aufgefunden werden, manchmal sogar bis zur Unkenntnis abgerieben. Angespülte Kokosnüsse sind nicht selten nur noch von Resten ihrer Faserhülle bedeckt. Ferner werden die Verbreitungseinheiten der Drift oft auch von sich darauf ansiedelnden Tieren wie Sepincola oder Cirrhipedien zum Sinken gebracht. Bei der olivenartigen Schwimmfrucht von Posidonia oceanica zerreisst nach einiger Zeit das grüne Perikarp und löst sich auf, worauf die übrige Frucht ebenfalls untersinkt. Das Fruchtfleisch der saftigen Verbreitungseinheiten wird durch die Tiere verdaut oder verfault; ölhaltige Anhängsel werden abgenagt oder fallen beim Transport der Verbreitungseinheiten ab, und Kletterorgane zerbrechen oder verankern schliesslich die Samen im Keimbett.

Es gibt sogar Pflanzen, deren Samen mit eigentlichen Verankerungs-

mitteln ausgerüstet sind. So scheinen die Haken und Spiesse mancher Wasserpflanzen, z. B. diejenigen von Trapa natans und Ceratophyllum demersum eher Anker- als Kletterorgane zu sein; denn die Wassertiere eignen sich, wie auch ULBRICH (1928, S. 132) ausführt, infolge ihrer glatten Körperdecke nur schlecht für die Epichorie.

Recht wirksame Verankerungsmittel sind namentlich die Kriech- und Bohrapparate. Alle mit Kriechvorrichtungen und oft auch mit keilförmigem Grunde ausgestatteten Verbreitungseinheiten dringen leicht in Erdspalten ein, in denen sie dann festgehalten werden, weil ihre Haare oder Grannen spreizen, wenn man sie wieder herausziehen will. Hebt man die Zweige einer Pflanze vom Reiherschnabel, Erodium cicutarium, mit ausgereiften Früchten vom Boden ab, so findet man unter ihnen häufig einige Verbreitungseinheiten, die wie kleine Bohrer in der Erde stecken. Sie scheinen sich durch das Einbohren in die Erde der Weiterverbreitung entziehen zu wollen. Die unten stark zugespitzte Reiherschnabelfrucht ist lang begrannt. Frucht und Granne tragen zudem Haare, die nach hinten gerichtet sind. Bei Feuchtigkeitsveränderungen führt die Granne Torsionsbewegungen aus. Stösst sie auf ein Hindernis, so zwängt sie die Frucht in die Erde. Nach NOBBE (1876, S. 486) kann ein "Korn" von Erodium in zwei bis drei Tagen vollständig eingegraben sein. Noch kräftigere, aber ähnlich gebaute Bohrapparate besitzen manche Steppengräser wie Stipa und Aristida. Die nadelfeinen Spitzen ihrer Früchte ermöglichen, wie manche Forscher feststellen, zwar auch Epichorie. Sie kommen aber wenigstens bei den anemochoren Arten unter ihnen, erst in zweiter Linie als Kletterorgane in Betracht, weil sie bei diesen, solange sie auf der Mutterpflanze weilen, ganz in die Spelzen eingehüllt sind.

Ausser durch Haken und Bohrapparate werden sehr viele Samen durch Klebstoffe auf ihrem Keimbett befestigt. Unter ihnen sind die auf Bäumen parasitierenden Viscum- und Loranthus-Arten die bekanntesten. Aus ihren beerigen Verbreitungseinheiten wird der Vogelleim bereitet. Er umgibt die Samen auch dann noch, wenn sie aus dem Kropf oder Darmkanal der Tiere wieder ausgeschieden worden sind und klebt sie unverrückbar an Aeste und Zweige der Bäume an. Die Samen von Fumana ericoides, F. visceida, Helianthemum ellipticum, Linum angustifolium, L. grandiflorum,

Aethionema saxatile, Alyssum calycinum, sowie mehrerer afrikanischer Lythrum- und der meisten Plantago-Arten, ferner die Früchte von Rosmarinus officinalis (Abb. 46), Salvia sclarea, S. aegyptica, Dracocephalum thyrsiflorum, Hyssopus officinalis, Lavandula stoechas, Prunella vulgaris, P. laciniata und vieler anderer Labiaten, sowie mancher Compositen



Abb. 46. Durch Schleim in der Erde verankerte Früchte von Rosmarinus officinalis. (Aufn. MOHR; 5 x).

aus den Grex Anthemidae, Senecioniae und Inulae sondern bei Benetzung Schleim ab. MURBECK (1919), der die biologische Bedeutung dieser Schleimabsonderung (Myxospermie) näher untersuchte, kam zu der Ueberzeugung, dass der Schleim selten als Transportmittel wirke, dagegen die Verbreitungseinheiten meistens frühzeitig an der weitern Verbreitung hindere, indem er sie am Boden festklebe und dadurch zum günstigen Verlauf der Keimung wesentlich beitrage. Von der verankernden Wirkung des Schleims kann man sich leicht überzeugen, indem man schleimabsondernde Verbreitungseinheiten neben solchen, die keinen Schleim ausscheiden, auf ein nasses Tuch legt und nach einiger Zeit mit einem Fell oder Tuch leicht darüber streicht. Während die schleimigen Verbreitungseinheiten fest auf ihrem Untergrunde haften bleiben, werden die andern weggewischt

und haften infolge der adhärierenden Wirkung des Wassers lose am vorbeigestreiften Gegenstand. Man kann auch unschwer unter den Zweigen der genannten Pflanzen, Samen und Früchte finden, die durch ihren eingetrockneten Schleim nach allen Seiten mit der Erde verankert sind. Ferner sei noch bemerkt, dass die Verbreitungseinheiten dieser Pflanzen im Gegensatz zu denjenigen, die mittelst Schleim epichor verbreitet werden, nicht direkt mit den Tieren in Kontakt treten können, weil sie bis zur Ausstreuung in einem Kelch, Fruchtkörbchen oder in einer Kapsel eingeschlossen bleiben und der Schleim daher, solange sie noch auf der Mutterpflanze weilen, nicht anheftend wirken kann.

Vegetative Verbreitungseinheiten wie z. B. diejenigen von *Poa bul-bosa* und *Kalanchoë daigremontiana*, bilden, bevor sie abfallen, Würzelchen und verankern sich damit ebenfalls rasch in der Erde.

VII. DIE VERBREITUNGSSCHRANKEN

Die Verbreitung der Keime kann durch Schranken behindert oder aufgehalten werden. Für Arten, die nur über wenig wirksame Verbreitungsmittel verfügen, bilden breite Flüsse, Seen oder je nach Art ihrer Oekologie auch ausgedehnte Wälder schon ernsthafte Verbreitungshindernisse. Es gibt aber auch Verbreitungsschranken, über die selbst die besten natürlichen Vorrichtungen zur Verbreitung durch das Wasser, den Wind und die Tiere nicht hinweghelfen. So sind die weiten Ozeane für sämtliche Landpflanzen ohne die Hilfe des Menschen unüberquerbar, denn kein Wind weht mit gleichmässiger Stärke über sie, und kein Landtier vermag sie aus eigener Kraft zu überqueren. Nach RIDLEY (1930) tragen manche Inseln der Weltmeere während längerer Zeit nur Pflanzen, die durch die See angesiedelt werden. Auf der viele Kilometer vom nächsten Land entfernten Insel Diego Garcia waren von 36 dort gesammelten Pflanzen 26 durch die See, 11 wahrscheinlich durch den Menschen und eine

vielleicht durch Vögel angesiedelt worden. Auch GUPPY (1891) fand auf der 700 Meilen vom nächsten Land entfernten Insel Cocos-Keeling 14 durch die See herantransportierte Pflanzen, und nur 4 - 5, die nach seiner Meinung durch Anhaften an Vögel hergetragen wurden. Samen des Süsswassers, die mit den Strömen ins Meer gelangen, gehen zugrunde, und die Meeresströmungen, die Verbreitungseinheiten von Tropenpflanzen mit sich führen, enden zuletzt in gemässigten oder kalten Klimazonen. So sind die nicht selten an der norwegischen Küste angeschwemmten Früchte der im tropischen Amerika heimischen Leguminose Entada scandens zwar oft noch keimfähig, erliegen aber im Freien der Ungunst des dortigen Klimas. Gebirgswälle wie die Alpen oder der Himalaya, halten ebenfalls die Verbreitung vieler Pflanzen auf. In Europa bildeten beim Einbruch der Eiszeit die westost gerichteten Bergketten jeweilen eine fast unüberwindliche Verbreitungsschranke für das Ausweichen der arktotertiären Flora nach Süden. Diese Flora musste daselbst daher grösstenteils untergehen. Ganz im Gegensatz dazu konnte sie auf den ungefähr südost verlaufenden Gebirgszügen Nordamerikas und Ostasiens ausweichen und sich nach FURRER (1942, S. 106/107) bis heute erhalten. Auch grosse Wüsten sind für die Verbreitung von Pflanzenkeimen Hindernisse, weil Pflanzen gemässigter oder tropischer Klimate darin zugrunde gehen und die Verbreitungsdistanzen, die sie von einer Vegetationsperiode bis zur andern zurücklegen können, nicht ausreichen, um sie zu überspringen.

Heute hat nun der Mensch durch seinen alle Länder verbindenden Verkehr für die Pflanzen die ursprünglichen Verbreitungsschranken durchbrochen und eine neue Epoche in der Florentwicklung eingeleitet. Die Verbreitungsschranken wirken aber zum mindesten in der Entwicklung der Floren noch nach.

VIII. DIE WANDERUNGEN DER PFLANZEN

Wenn die Keime einer Art von einem neu gewonnenen Standort ausserhalb des bisherigen Areals erneut vorrücken, kommen eigentliche Pflanzenwanderungen zustande, wie sie z. B. vor und nach den Eiszeiten stattfanden. Allein schon die Zugehörigkeit der einzelnen Arten zu verschiedenen Verbreitungstypen bedingt aber eine ungleich rasche Einwanderung in ein für sie besiedelbares Gebiet. Wir haben bereits festgestellt, dass die Keime der Autochoren, Barochoren, Ombrochoren, Stomatochoren und z. T. auch der Dysochoren nur langsam vorrücken; denn die Verbreitungsdistanzen betragen bei ihnen meist nur wenige Meter, selten 70 bis 80 oder gar 100 m. Bei dysochorer Verbreitung durch Vögel und Säugetiere werden die Keime oft einige hundert Meter, oft sogar einige Kilometer weit transportiert. Dasselbe ist bei den Pterometeorochoren und Bodenläufern der Fall. Transporte über grosse Distanzen sind bei den Cysto- und Trichometeorochoren, Endochoren und den Nautochoren an grossen Gewässern möglich. Für die Hemerochoren aber scheint es heute überhaupt keine Begrenzung der Verbreitungsdistanzen mehr zu geben.

Die Zahl der nur auf Nahverbreitung eingestellten Pflanzen ist, wie aus der Häufigkeit der Polychorie hervorgeht, als gering anzunehmen.

Ausser von der Verbreitungsdistanz ist die Wandergeschwindigkeit der Keime hauptsächlich auch noch vom Fruchtbarkeitsalter (Mannbarkeitsalter bei Bäumen) abhängig. Pflanzen, deren Nachkommen schon im ersten Jahr blühen und fruchten, also die Einjährigen, können jedes Jahr um ihre Verbreitungsdistanz vorrücken. Bei ephemeren Arten wie Senecio vulgaris, Euphorbia peplus und andern, die in einem Jahr zwei oder mehrere Generationen hervorbringen, beträgt die Wandergeschwindigkeit sogar das Zwei- oder Mehrfache der Verbreitungsdistanz. Die perennierenden Kräuter und Stauden bilden in der Regel schon nach wenigen Jahren Samen.

Die Holzgewächse, speziell die Bäume, werden jedoch erst spät fruchtbar, wodurch ihre Wandergeschwindigkeit ganz wesentlich herabgesetzt wird. Sie können ihrem Mannbarkeitsalter entsprechend nur alle 10, 20, 30, eventuell alle 40 - 60 Jahre, wieder in grösserer Zahl um ihre Verbreitungsdistanz vorrücken.

Wenn man die Verbreitungsschranken ausser acht lässt, so kann man die Wandergeschwindigkeit einer Art theoretisch erfassen indem man die Verbreitungsdistanz durch das Mannbarkeitsalter dividiert. Leider stösst aber die Ermittlung der Verbreitungsdistanzen nicht selten auf erhebliche Schwierigkeiten. Dazu kommt, dass auch das Mannbarkeitsalter infolge der wechselnden Lebensbedingungen, unter denen die Arten vielfach wachsen, Schwankungen unterworfen ist. Wenn es nun infolgedessen bei den meisten Arten noch nicht möglich ist, die wirkliche Wandergeschwindigkeit sicher zu berechnen, so können doch schon brauchbare Vergleichswerte erhalten werden, wie an den mitteleuropäischen Waldbäumen gezeigt werden soll. Diese sind vorwiegend anemochor oder zoochor. Für die Berechnung der Wandergeschwindigkeit der anemochoren Bäume leisten die von SCHMIDT (1918) berechneten mittleren Verbreitungsgrenzen (siehe S. 56), die von 1 % der Samen erreicht werden, gute Dienste. Verdoppelt man sie, so werden sie nach SCHMIDT nur ganz ausnahmsweise überschritten.

	Verbreitungs- grenze	Mannbar- keitsalter	Wandergesch m pro	
		78 (5) (5)		
	in m	(Jahre)	einfach	doppelt
Salix caprea	8400	10-15	560 -840	1120 - 1680
Betula	1600	10-15	107 -160	214 - 320
Populus tremula	2500	20-40	63 -125	125 - 250
Pinus silvestris	370-550	10-20	19 - 55	37 - 110
Picea excelsa	310	30-50	6 - 10	12 - 20
Acer pseudoplatar	nus 90	40-50	1,8- 2,25	3,6- 4,5
Ulmus scabra	130	40-50	2,6- 3,2	5,2- 6,4
Carpinus betulus	70	20-30	2,3- 3,5	4,6- 7
Abies alba	90	30-70	1,3- 3	2,6- 6
Fraxinus excelsion	or 25	40-50	0,5- 0,6	1 - 1,2

Die dysochoren Arten werden im wesentlichen durch dieselben oder

durch gleich wirkende Verbreitungsagentien verbreitet. Ihre Wandergeschwindigkeiten stehen daher im umgekehrten Verhältnis zu ihren Mannbarkeitsaltern und ergeben folgende Reihenfolge:

	Mannbarkeitsalter in Jahren		
Corylus avellana	10 - 20		
Quercus robur	30 - 60		
Fagus silvatica	40 - 50		
Pinus cembra	50 -100		

Um die wirkliche Wandergeschwindigkeit zu ermitteln, ist es notwendig, die vermehrte Beobachtung von Verbreitungsdistanzen im freien Feld anzustreben. Das Absuchen von Schneefeldern im Frühjahr, die Untersuchung von wandernden Tieren auf anhaftende oder im Darmkanal vorhandene Verbreitungseinheiten dürfte gelegentlich wertvolle Feststellungen in dieser Hinsicht ergeben.

Auf Grund der Beobachtungen SCHUSTERs (siehe S. 106) können wir heute für die Eichen eine Wandergeschwindigkeit von bis zu 133 m pro Jahr annehmen. Ungefähr doppelt so rasch wandert infolge ihres viel kleineren Mannbarkeitsalters die Hasel, und noch schneller rücken die Weiden, Pappeln und Birken vor. Die Wandergeschwindigkeit der Buche und der Arve dürfte ungefähr diejenige der Eichen erreichen. Ferner ist zu beachten, dass von den S. 170 aufgeführten Pterometeorochoren Pinus silvestris und Picea excelsa die Diasporen oft auch durch Tiere verschleppt werden. Die übrigen genannten Bäume rücken langsamer vor.

Zweifellos spielt für die Wandergeschwindigkeit auch die Samenproduktion noch eine gewisse Rolle. Eine starke Birke produziert nach LEIBUNDGUT (1951, S. 149) jährlich nahezu 30 Millionen, eine Eiche in kühleren Lagen alle 5 - 6 Jahre nur 15000 Samen. Dementsprechend ist natürlich bei der Birke die Zahl der Samen, die überdurchschnittliche Verbreitungsdistanzen erreichen, viel grösser als bei der Eiche.

Will man die Wanderzeiten von einem bestimmten Ort zu einem andern ermitteln, so muss ferner auch den Verbreitungsschranken und der Möglichkeit der Verbreitung gewisser Pflanzen durch den Menschen (siehe auch

IX. BEDEUTUNG DER VERBREITUNGSBIOLOGIE FUER ANDERE ZWEIGE DER BOTANIK

Es ist von grossem Nutzen, Spezialgebiete der biologischen Forschung auch mit denjenigen Wissengebieten in Verbindung zu bringen, die ihre Ergebnisse auswerten können.

Die Verbreitungsbiologie erlangt nun insbesondere für die Florengeschichte, die Prähistorie, die Pflanzengeographie, die Pflanzensoziologie, die Biocönologie und die Land- und Forstwirtschaft in zunehmendem Masse an Bedeutung, weshalb wir ihren Beziehungen zu diesen Wissensgebieten noch speziell etwas nachgehen wollen.

1. Verbreitungsbiologie und Florengeschichte

Für die Erforschung der Floren-, speziell der nacheiszeitlichen Waldgeschichte, ist vor allem die Kenntnis der Wandergeschwindigkeit der Arten wichtig; denn sie gestattet festzustellen, ob in einem gewissen Zeitabschnitt die Einwanderung der Waldbäume aus einem angenommenem Refugium in ein bestimmtes Gebiet überhaupt möglich war, oder ob nach näheren Zufluchtsstätten gesucht, vielleicht aber auch mit längern Zeitabschnitten gerechnet werden muss. Wenn z. B. die waldgeschichtlichen Untersuchungen in Mittelschweden (FIRBAS 1935) für Pinus silvestris 205 - 262 m, für Betula odorata 205 - 262 m, für Betula pendula 194 m, für Alnus incana 179 - 229 m, für Ulmus scabra 194, und für Corylus avellana 128 - 194 m jährliche Verschiebung der Arealsgrenzen ergeben haben, so stehen dieselben nur bei Alnus, Betula und Corylus mit den bisherigen verbreitungsbio-

logischen Befunden einigermassen in Einklang; für *Pinus silvestris* und für *Ulmus scabra* sind sie zweifellos viel zu gross, um als wahrscheinlich angenommen werden zu können. Wir müssten den Kiefern häufige Verbreitungssprünge von 3 - 4 km, und den Ulmen sogar solche von 6 und mehr km zumuten. So weite Flugdistanzen liegen zwar im Bereich des Möglichen, gehören aber zu den seltenen Ausnahmefällen. Sollte sich jedoch die nacheiszeitliche Wiedereinwanderung dieser Waldbäume wirklich so rasch abgespielt haben, so dürfte man daraus folgern, dass auch den Ausnahmefällen der Samenverbreitung eine grosse Bedeutung zukommt. Manche Bäume hätten darnach nicht in geschlossener Front, sondern durch vereinzelte, vom Hauptareal weit entfernte Pioniere vom eisfrei gewordenen Gebiet wieder Besitz ergriffen.

Die Verbreitungsschranken bewirken vielfach das Vorrücken der Pflanzen in ein für die Besiedlung offenes Gebiet durch sogenannte Einfallspforten, durch die weder die Winde noch die Tiere aufgehalten werden. Als solche Eingangspforten in die Gebirge eignen sich vor allem die Flusstäler und im Kleinen auch die Passlücken. Die Schweiz hat beispielsweise einen kräftigen Einwanderungsstrom vom Donautal her über das Schaffhauserbecken und über Basel empfangen (NäGELI 1898 und 1900, BECHERER 1925).

Die Verbreitungsschranken können sich auch nach der einen oder andern Richtung verschieden auswirken. So waren in den Alpen und in ihrem Vorland die Wanderungsbedingungen für die Ab- und Zuwanderungen der Arten vor und nach den Eiszeiten verschieden. Die Abwanderung hatte in ein grösstenteils vegetationsbedecktes, ja sogar bewaldetes Gebiet zu erfolgen. Der Wald aber wirkte zweifellos für viele Arten als Verbreitungsschranke. Er war jedoch an manchen Stellen durch die Flussläufe mit ihren breiten Sand- und Schotterbänken durchbrochen. Diese bildeten die Tore, durch die Rasen- und Schuttpflanzen nach unten ausweichen konnten. Die Sandern eigneten sich als erstes Siedlungsland, von dem aus die Verbreitung zu gegebener Zeit weiter ging. Die Abwanderung vieler Alpenpflanzen konnte daher in besonders grossem Umfang durch das fliessende Wasser erfolgen, das, wie wir auf Seite 95 gesehen haben, Verbreitungseinheiten jeglicher Beschaffenheit mit sich führen kann. Bei der Wiedereinwanderung öffnete sich Neuland, auf das die Vegetation einfach nachrücken konnte.

Jetzt spielten die Verbreitungsvorrichtungen für die Wind- und Tierverbreitung eine viel wichtigere Rolle als bei der Abwanderung. Die meteorochoren Arten hatten im allgemeinen den Vortritt. Ihnen folgten die Endo-, Epi- und Dysochoren rasch nach.

Die jüngste Zeit brachte die Ueberwindung der Verbreitungsschranken durch die Hemerochorie. Es findet nun ein ständiger Florenaustausch zwischen selbst weit voneinander entfernten Ländern statt. Er verändert die Kulturpflanzenareale, die Segetal-Ruderalflora und bewirkt die Erstarkung des Neophytenelements. Seit 1960 haben sich nach LANDOLT (1975) allein in der Schweiz 19 Arten neu eingebürgert. In Mitteleuropa sind z. B. Oenothera biennis, Datura stramonium, Mimulus guttatus, sowie gewisse Solidago-, Erigeron-, Bidens- und Galinsoga-Arten nordamerikanischen Ursprungs. Aus Sibirien stammt Impatiens parviflora und breitet sich, wie der aus Südwestasien eingewanderte Ehrenpreis Veronica filiformis, immer noch weiter aus. Das Mittelmeergebiet empfing nebst anderen Arten Opuntia ficusindica und die Agave aus der Neuen Welt. Anderseits fanden von der Mittelmeerflora mehrere Arten, so Briza maxima, eine neue Heimat in Südamerika und Veronica persica hat von Europa aus Nordamerika, Yemen, das Kapland und Australien erobert.

2. Verbreitungsbiologie und Prähistorie

Chenopodium album und noch andere Unkräuter wie Polygonum convulvulus und P. lapathifolium werden vielfach als prähistorische Nutzpflanzen betrachtet (siehe NEUWEILER 1905 und VILLARET- von ROCHOW 1958). Das häufige Vorkommen von Chenopodium album-Samen in den Pfahlbauten überrascht aber nicht, wenn man bedenkt, dass die Pflanze zu den häufigsten Ruderalpflanzen und Ackerunkräutern gehört und reichlich Samen produziert, die im Herbst zum Teil im Kot von weidenden Haustieren, insbesondere von Schafen und Ziegen zu finden sind (siehe MüLLER-SCHNEIDER 1959). Dazu kommt, dass MESSIKOMMER (1883), der im steinzeitlichen Pfahlbau von Robenhausen am Pfäffikersee im Kanton Zürich Chenopodium-Samen in grosser Menge

entdeckte, dieselben stets in einer leichten, torfähnlichen Schicht, in der sich meist auch Exkremente von Schaf und Ziege befanden, vorfand. Es ist somit ratsam bei der Einreihung von Ruderalpflanzen und Ackerunkräutern zu den prähistorischen Nutzpflanzen grosse Vorsicht walten zu lassen, weil auch durch Tiere eine Anhäufung von Samen und Früchten erfolgen konnte.

3. Verbreitungsbiologie und Pflanzengeographie

Die Grösse des Artareals hängt zweifellos zum Teil von der Wirksamkeit der Verbreitungsvorrichtungen der Pflanze ab. Schon WARMING (1918, S. 377) wies darauf hin, dass für die geographische Verbreitung der Arten auch der Umstand wichtig ist, welche Art zufällig an einem Ort zuerst anlangt. SCHIMPER (1898) fand, dass die Strandpflanzen in der Regel ein um so grösseres Areal einnehmen, je besser ihre Samen und Früchte mit den auf dem Strand gegebenen Verbreitungsbedingungen, speziell den Meeresströmungen im Einklang stehen. Diese Feststellung stimmt aber heute nur noch zum Teil. Wurde doch die Kokospalme im Lauf der Zeiten in fast allen meeresnahen Tropengebieten absichtlich und unabsichtlich durch die Menschen angesiedelt. So strandete am 9. Januar 1878 ein mit Kokosnüssen beladenes Schiff vor der Küste Floridas und brach auseinander. Die Früchte wurden an den Strand gespült und von den Einwohnern zur Anpflanzung der Kokospalme benutzt. Schon ULBRICH (1928) schreibt deshalb mit Recht, dass die allermeisten Kosmopoliten ihre weite Ausbreitung dem Menschen verdanken.

Häufig stossen wir auch auf Pflanzenkolonien einer Art weit ausserhalb ihres eigentlichen Areals. Es kann sich dabei um Reliktstandorte aber auch um Neuansiedlungen handeln. Wenn wir z. B. in den Bergen Pflanzen in Höhen treffen, wo sie ihre Samen nicht mehr reifen können, so sind sie jedenfalls dank ihrer Verbreitungsagentien von unten her frisch eingewandert, stellen also Vorposten dar, die dem Klima vielleicht vorausgeeilt sind und bei entsprechenden Aenderungen desselben sich dauernd halten

und vielleicht auch ausbreiten können. Solche Vorposten konnten z. B. bei der Station Alp Grüm an der Berninabahn zwischen 2050 und 2090 m ü. M. beobachtet werden. Dort wachsen seit mindestens 15 Jahren Rosa pomifera und die Labkräuter Galium mollugo und G. verum ohne inzwischen einmal Früchte gereift zu haben. Umgekehrt finden wir auch im Tiefland Pflanzen die ihre Hauptverbreitung in der alpinen Stufe oder im hohen Norden haben (siehe S. 95). Wenn dann der Aussenposten weit ausserhalb der Verbreitungsgrenze liegt, darf in ihm ein Reliktstandort vermutet werden.

Besondere Aufmerksamkeit wird man auch der Keimverbreitung endemischer Arten schenken, wenn es gilt, ihre Zukunftsaussichten abzuwägen,
denn in einer Zeit wie der unsrigen, in der so viele Terrainveränderungen
vorgenommen werden, spielt die Mobilität der Arten für ihr Fortbestehen
eine grosse Rolle.

Die Verbreitungsbiologie liefert im weitern nützliche Beiträge für die Beschreibung der natürlichen Vegetationsgebiete.

So sind innerhalb der Flora Mitteleuropas Vorrichtungen, die die Verbreitung durch den Wind oder durch Tiere bewirken am häufigsten. Im Zusammenhang mit der Anemochorie spielen ferner bei der Bereitstellung der Verbreitungseinheiten für den Transport xerochastische Mechanismen eine wichtige Rolle. Unter den Zoochoren tritt gegenüber benachbarten Floren die verhältnismässig grosse Zahl der Stomatochoren, die durch Ameisen verbreitet werden, besonders stark in Erscheinung. Recht gut vertreten sind ferner die Nautochoren und die Ballochoren, während die Ombrochoren und unter den Anemochoren die Bodenläufer fast ganz fehlen. Wie schon früher (Seite 174) ausgeführt wurde, hat in neuerer Zeit die Hemerochorie einen besonders grossen Umfang angenommen.

Im alpinen Sektor verstärkt sich mit der Höhe über Meer nach VOGLER (1901) die Anemochorie noch wesentlich. Dafür nehmen die Zoochoren ab. Von ihnen steigen die Endochoren, die durch Weidetiere verbreitet werden, z. B. Sibbaldia procumbens und mehrere Carex-Arten, sowie Elyna myosuroides am höchsten. Eine beträchtliche Anzahl verbreiteter Ubiquisten erreicht durch Endochorie auf den Schaf- und Viehlägern der Alpen höchste Standorte. Zu ihnen gehören z. B.: Poa pratensis, Lolium perenne, Urtica

dioeca, Rumex arifolius, Chenopodium bonus-henricus, Cerastium caespitosum, Ranunculus acer, Alchemilla vulgaris, Trifolium repens, Veronica chamaedrys, V. serpyllifolia und Plantago major (siehe BECHERER 1951).

Auch die endochoren Arten mit saftig-fleischigen Verbreitungseinheiten werden mit zunehmender Höhe seltener, können aber, wie beispielsweise die Vaccinien noch in Menge auftreten. BRAUN-BLANQUET (schriftliche Mitteilung) hat samenhaltige Vogelexkremente noch auf dem 3400 m hohen Linardgipfel gefunden. Die Endochoren mit fleischigen Verbreitungseinheiten dürften daher in der Höhe weniger aus Mangel an Agentien, sondern viel eher, weil das Klima in den höchsten Vegetationsstufen die Lebensformen Baum und Strauch ausmerzt, wenige Vertreter aufweisen. Auch die durch die Ameisen transportierten Stomatochoren treten über der Waldgrenze stark zurück. STäGER (1932) konnte im Gebiet der Belalp (Wallis) in Höhenlagen von 2100 - 2400 m ü. M., d. h. bis ca. 300 m über der Waldgrenze, immerhin noch den Transport der Samen von Thesium alpinum, Melampyrum silvaticum, M. spec. Ajuga pyramidalis, Lathyrus montanus, Luzula pilosa, Trifolium thalii und Viola spec. durch Ameisen beobachten. Hiervon steigt Trifolium thalii bis in die Nivalstufe hinauf, dürfte aber dort oben kaum mehr durch Ameisen verbreitet werden. Von den Ombrochoren erreichen einzig einige Pedicularis-Arten die Nivalstufe, und von den Selbststreuern steigen nur Cardamine resedifolia, C. alpina, Lotus corniculatus, Viola biflora und Viola calcarata so hoch hinauf. Eigentliche, durch die Schneedecke nicht behinderte Wintersteher sind im Gebirge selten, aber bei vielen Arten nimmt die Verbreitung der Keimung nach dem Ausapern im Frühjahr ihren Fortgang. Zu bedenken ist ausserdem, dass die Samenproduktion der Alpenpflanzen, insbesondere derjenigen der Nivalstufe, im allgemeinen gering ist.

Als Besonderheit der arktischen Flora ist die Ausbildung verhältnismässig leichter Verbreitungseinheiten und die grosse Zahl der Windstreuer hervorzuheben (PORSILD 1920). Ferner treten nach PERTTULA (1941) in den Wäldern und Hainwiesen Finnlands viele Arten mit entschiedenem vegetativem Vermehrungs- und Wandervermögen auf.

Innerhalb der Mittelmeerflora, speziell aber in den weiten Steppen und Wüsten Afrikas, sind die Ombrochoren und Chamaechoren verhältnis-

mässig zahlreich. Parallel mit den Ombrochoren erweist sich ferner die als Hygrochasie bezeichnete Erscheinung als kennzeichnend für diese Gebiete. Während in Holland nur 9 Arten ihre Verbreitungseinheiten bei Befeuchtung freigeben, besitzt die Schweiz mit ihren mediterranen Einstrahlungen schon mindestens 16 hygrochastische Arten. Innerhalb der Flora von Montpellier konnten bis heute deren 24 festgestellt werden, und ZOHARI (1937) zählt für die Flora Palästinas 41 hygrochastische Arten auf. Die Ombrochorie in Verbindung mit Hygrochasie ist ausserdem unter den Mesembryanthemen Südafrikas häufig anzutreffen (siehe STRAKA 1955 und IHLENFELDT 1960).

Inselfloren weisen nicht selten eine auffallend hohe Zahl von zoochoren Arten auf. Aufgrund der Berechnungen von CHRISTIANSEN (1959), haben von den urwüchsigen Gefässpflanzen auf Helgoland 73,58 % durch Tiere,
16,34 % durch den Wind und 10,08 % durch die Meeresdrift die Insel erreicht.

Ausserdem treten synaptosperme, geokarpe, amphikarpe, basikarpe, heterokarpe Arten, sowie solche mit Bohr- und Kriechfrüchten und solche, deren Früchte oder Samen bei Benetzung Schleim absondern, auffallend häufig in den Steppen- und Wüstengebieten auf. Am besten ist dank der Arbeiten von MURBECK (1919 und 1920), ZOHARI (1937) und des Verfassers die geographische Verbreitung der Synaptospermie und der Schleimabsonderung (Myxospermie) dokumentiert. MURBECK (1920) hat innerhalb der nordafrikanischen Flora bei etwa 140 Arten Synaptospermie nachgewiesen. Gegen 100 dieser Arten reichen in die Sahara-Wüste hinein. Die Flora Palästinas zählt nach ZOHARI (1937) 11 % synaptosperme Arten, und diejenige von Montpellier nach eigenen Untersuchungen etwa fünfzig oder 2,5 %. Im Gegensatz hierzu kann MURBECK (1920) aus Fenno-Scandia nur 5 synaptosperme Arten nennen, von denen keine über 61° n. Breite hinausgeht. Zudem sind davon nur die Verbreitungseinheiten von Medicago minima, die auf xerotherme Standorte beschränkt ist, mehrsamig, während bei Circaea lutetiana und bei Agrimonia odorata, Beta maritima, Salsola kali sogar nur ein Teil der Verbreitungseinheiten mehr als einen keimfähigen Samen enthält. MURBECK (1919) berechnete ferner die Zahl der Arten, die aus ihren Samen oder Fruchtschalen bei Benetzung Schleim absondern, für Nordafrika auf 443 oder 11,1 %, für Skandinavien aber nur auf 50 oder 3,2 %. Von den 205 Arten der algerisch-tunesischen Sahara, welche nicht ausserhalb der Grenzen der eigentlichen Wüstenregion vorkommen, sondern nicht weniger als 40 oder 19,5 % bei Benetzung Schleim aus ihren Verbreitungseinheiten aus.

In den Tropen ist die Flora verbreitungsbiologisch noch wenig erforscht. Nach VAN DER PIJL (1972) und ENDRESS (1973) wachsen daselbst verhältnismässig viele Arten deren Samen mit einem Arillus oder einem fleischigen Integument ausgestattet sind. Ausserdem tritt die Kaulikarpie stark in Erscheinung, während sie in Nord- und Mitteleuropa nur durch den Seidelbast (Daphne mezereum) vertreten ist. In den Wäldern spielen die Dyso- und Endochorie durch Säugetiere eine grosse Rolle, denn von den vielen sich darin aufhaltenden Affen, Halbaffen, Fledertieren, Schweinen und Raubtieren sind die meisten auf saftig-fleischige oder nussartige Früchte erpicht. Damit in Zusammenhang steht wohl auch die Produktion von schweren und stark duftenden Früchten, die oft grosse, mit einem Arillus ausgestattete Samen enthalten. Die Vögel verbreiten daselbst meist die vielfach rot gefärbten kleineren Früchte. MORTON (1948), der im zentralasiatischen Urwald forschte, weist unter dem Titel "Der Urwald fliegt", auch auf die grosse Rolle der Verbreitung der Samen durch den Wind hin. Neben Arten mit geflügelten Samen wie Entada polystachia, Aspidosperma megalocarpon, Macrozanonia macrocarpa, Aristolochia grandiflora usw., fliegen daselbst die staubförmigen Samen der vielen epiphytischen Orchideen und die federleichten, mit einem aus 60 - 80 Haaren bestehenden Haarschopf ausgestatteten Tillandsien. Ausserdem gibt es noch viele Korbblütler die zum Typus der Trichometeorochoren gehören.

Untersuchungen von KEAY (1957) im nigerianischen Tropenwald ergaben, dass unter den ausgewachsenen Sträuchern, niedrigen Bäumen und Lianen keine Anemochoren vorkommen. Von den über die geschlossene Kronendecke hinaufragenden Baumarten aber 56,25 % anemochor sind. Nautochoren sind im Gebiet von Polynesien und an den tropischen Küsten von Südasien am zahlreichsten. In der nördlich temperierten Zone sind sie selten und auch längs der Küsten Südamerikas und Westafrikas nicht häufig.

Vergleicht man die ursprüngliche afrikanische Litoralflora mit derjenigen des tropischen Amerika, so zeigt sich eine auffallende Uebereinstimmung zwischen Westafrika und Westindien, während, abgesehen von den Ubiquisten, sich keine amerikanische Strandpflanze an der ostafrikanischen Küste zeigt. In Ostafrika finden wir eine etwas verarmte, aber rein ostindische Mangrove, in Westafrika eine reine amerikanische. SCHIMPER (1891), der als erster diese Feststellungen machte, führt als Ursache den Verlauf der tropischen Strömungen an. Die äquatoriale Strömung verbindet in gerader Linie die südlichen Inseln des Malayischen Archipels mit Madagaskar und der Mozambique-Küste über die Seychellen. Oestlich vom Kap der Guten Hoffnung biegt sie unter scharfem Winkel nach Südosten um, so dass ein Transport schwimmender Samen nach der tropischen Westküste verhindert wird, während einer Wanderung der Arten auf der Küste selbst klimatische Hindernisse entgegentreten. Auch die längs der Küsten verlaufenden Strömungen, die nach der Jahreszeit ihre Richtung wechseln, können zu einem Artenaustausch zwischen Ostafrika und Ostasien geführt haben. Für die tropische Mangrovevegetation ist ferner ganz speziell noch das starke Auftreten der Barochorie kennzeichnend.

4. Verbreitungsbiologie, Pflanzensoziologie und Biocönologie

Primäre Voraussetzung für die Bildung einer Pflanzengesellschaft ist das Sicheinfinden von lebenden Keimen, speziell von Samen innerhalb eines bestimmten Lebensraumes. Wenn Samen neuer Arten darin eintreffen, können nach der ersten Besiedlung im Lauf der Zeit auch eine Reihe von Wandlungen des Vegetationsteppichs, sogenannte Sukzessionen, aufeinanderfolgen, bis ein gewisser klimatisch bedingter Endzustand eintritt, der Klimax genannt wird. Je nachdem nun die Keime dieser oder jener Art früher oder später ankommen, wird der Wettbewerb um den Lebensraum und der Ablauf der Sukzessionen zum mindesten in bezug auf seine Geschwindigkeit sich verschieden gestalten. Es lohnt sich daher die Verbreitungsbiologie ganzer Gesellschaften zu studieren, wie dies bereits in einer Anzahl pflanzen-

soziologischer Arbeiten, u. a. in denjenigen von QUANTIN (1935), SOROCEA-NU (1936), MOLINIER und MÜLLER-SCHNEIDER (1938), BLONDEL (1941), POTTIER-ALAPETITE (1942), TSCHOU YEN-TCHENG (1949), MEDWECKA-KORNAS (1950), ZARZYCHI (1961) und KORNAS (1972) geschehen ist.

Durch die Errechnung der prozentualen Zugehörigkeit der Kenn- und stetigen Begleitarten zu den Verbreitungstypen erhält man das verbreitungsbiologische Spektrum einer Pflanzengesellschaft, das Einblick in die Oekologie derselben gibt. Oft werden mit Vorteil auch Angaben über die Oeffnungsmechanismen und die verbreitungshemmenden Vorrichtungen beigefügt, weil diese auch noch auf die klimatischen Faktoren, denen die Assoziation entspricht, hinweisen. Würden die zufälligen Arten mitberücksichtigt, so käme vielfach ein Ausgleich der verbreitungsbiologischen Besonderheiten mit andern Gesellschaften zustande; denn diese ergeben, für sich allein betrachtet, meist ein ganz anderes Verbreitungsspektrum als die Kenn- und steten Arten.

Initialstadien und Pflanzengesellschaften auf Rohböden wie das Brachypodietum ramosii Braun-Blanquet 1924 - Initialstatium auf Roterdeböden Südfrankreichs, und das Petasitetum paradoxi Beger 1922 (Abb. 47) der alpinen Kalkschutthalden, bestehen bis zu 4/5 aus anemochoren Arten. Auch im Myricario-Chondrilletum Braun-Blanquet 1938, der Pioniergesellschaft längs den Alpenflüssen, überwiegen die Anemochoren. Ihre nach VOLK und BRAUN-BLANQUET (1940) wichtigsten Kennarten, Epilobium fleischeri, Erigeron acer ssp. droebachiensis, Chondrilla prenanthoides, Myricaria germanica und Hieracium piloselloides, gehören alle zu den Schirmfliegern. Zu ihnen gesellen sich als Spezialität dieser Assoziation im Churer Rheintal und Domleschg noch eine grosse Zahl Alpenschwemmlinge (Bythisochoren) wie Anthyllis vulneraria, Erucastrum nasturtiifolium, Gypsophila repens, Linaria alpina, Chrysanthemum alpinum usw., die unabhängig von ihren normalen Verbreitungsvorrichtungen durch das zu Tal fliessende Wasser angeschwemmt werden. Auch unter den Begleitarten dieser Pflanzengesellschaft herrschen die Anemochoren und die Schwemmlinge vor. Die Anemochoren, insbesondere die Schirmflieger (Trichometeorochoren mit einem schirmförmigen Flugapparat), erweisen sich gleichsam als die schnelle Fallschirmtruppe der Landpflanzen, die von einem noch unbesiedelten Gelände zuerst Besitz ergreift. Auf sie folgen dann namentlich zoochore Arten nach (siehe MüLLER-SCHNEIDER 1964).

Dort, wo die Tiere lagern, unter überhängenden Felsen der Alpen, in der nähern Umgebung der Ställe und längs den Wanderstrassen der Weidetiere, bilden sich sogar fast rein zoochore Gesellschaften wie das Lappulo-Asperugetum Braun-Blanquet 1919 und das Matricario-Lolietum Tüxen 1937 aus. Das Lappulo-Asperugetum (Abb. 49) der sogenannten Felsbalmläger, wo das Kleinvieh lagert, enthält neben Endochoren auch viele Epichoren. Die Arten des Matricario-Lolietum (Abb. 48), einer Trittpflanzengesellschaft, die auf Feldwegen und Rasenplätzen der Siedlungen anzutreffen ist, werden zu nahezu 2/3 endochor und zu einem ganz kleinen Teil epichor verbreitet. Im übrigen spielt bei dieser Gesellschaft auch die Hemerochorie eine grosse Rolle.

Reich an endochoren Arten, die durch Weidetiere verbreitet werden, sind erwartungsgemäss auch manche Rasengesellschaften, so die Gold- und die Glatthaferwiese. Selbst in magern Rasen können endochore Arten zahlreich auftreten.

WALTER (1957), der auf einer längeren Forschungsreise durch Südwestafrika die Ursache der Verbuschung untersuchte, kam zum Schluss, dass die
starke Beweidung die Gräser schwächt, die dornigen Büsche jedoch nicht.
Letztere können daher ihre beim Weidevieh beliebten Früchte reifen. Die
Samen derselben passieren unbeschädigt den Darm der Tiere und die Kothaufen bieten ihnen zudem ein gutes Keimbett. Ebenso breitete sich auf der
Trimmiser Allmend bei Chur früher auch Berberis vulgaris durch die Ziegen
aus.

Die Anzahl der Hemerochoren einer Pflanzengesellschaft bringt deren Abhängigkeit von den menschlichen Tätigkeiten zum Ausdruck. Das Onopordetum acanthii Braun-Blanquet 1922, das Oedland in der Nähe von Höfen und Dörfern besiedelt, setzt sich z. B. mindestens zu einem Drittel aus Arten zusammen, die direkt oder indirekt durch Menschen angesiedelt werden. KORNAS (1972) zeigt, dass in den Getreide-Unkrautgesellschaften der Gorcach-Berge in Polen die Speirochoren deutlich vorherrschen. Ferner kann die in der Gegenwart äusserst wirksame Agochorie zur Ansiedlung von

Graphische Darstellung der Verbreitungsspektren einiger Pflanzengesellschaften





Abb. 47. Petasitetum paradoxi Beger 1922, 67 Arten.

Abb. 48. Matricario-Lolietum Tüxen 1937, 35 Arten.

Abb. 49. Lappulo-Asperugetum Br.-Bl. 1919, 28 Arten.



Anmerkung: Das Verbreitungsspektrum vom *Petasitetum paradoxi* Beger 1922 wurde auf Grund der Assoziationstabelle von JENNY-LIPS (1930, S. 186), dasjenige vom *Matricario-Lolietum* Tüxen 1937 und vom *Lappulo-Asperugetum* Br.-Bl. 1919 auf Grund von noch nicht veröffentlichten Tabellen von BRAUN-BLANQUET erstellt.

Schwebeflieger = Ballonflieger und Schirmflieger.

Adventivpflanzen führen, die in bestehende Pflanzengesellschaften eindringen und sich mittelst ihrer natürlichen Verbreitungsvorrichtungen darin ausbreiten. Solche Arten sind in der Schweiz z. B. die Goldruten (Solidago serotina und S. canadensis), die Sonnenhüte (Rudbeckia laciniata und R. hirta) und der Topinambur (Helianthus tuberosus) aus Nordamerika, der Verlotsche Beifuss (Artemisia verlotorum) aus Sibirien, das Kleinblütige und das Honigspringkraut (Impatiens parviflora und I. glandulifera) aus Sibirien bzw. Ostindien sowie der Spitze Knöterich (Polygonum cuspidatum) aus Japan. Diese fremdländischen Arten haben sich nach MOOR (1958) in der Aue der Birs bei Basel in jüngster Zeit zu einer neuen Pflanzengesellschaft, die er Impatienti-Solidaginetum Moor 1958 nennt, zusammengeschlossen und die ursprünglich dort gedeihende Cuscuto-Convulvuletum-Gesellschaft Tüxen 1947 verdrängt.

Für die Trockenrasen-Gesellschaften ist das verhältnismässig häufige Auftreten synaptospermer, myxospermer, geo-, amphi- und basikarper, sowie mit hygrochastischen Einrichtungen und mit Bohrapparaten ausgestatteten Arten charakteristisch.

Während im Brachypodietum ramosii Braun-Blanquet 1924 Südfrankreichs von 89 Arten 7 synaptosperm sind (4 Medicago spec., Hippocrepis comosa, H. ciliata und Hedyonois cretica) ist im Xerobrometum raeticum Braun-Blanquet 1915 von 83 Arten nur noch Medicago minima synaptosperm. Die Trockenstreuer sind in denselben Gesellschaften mit 9 bzw. 3 Arten vertreten. Im Gegensatz dazu befinden sich im Xerobrometum raeticum Braun-Blanquet 1915 mehr Arten mit xerochastischen Oeffnungsmechanismen als im Brachypodietum ramosii Braun-Blanquet 1924. In bezug auf die Häufigkeit der Hygrochasie besteht jedoch kein Unterschied. Im über der Waldgrenze auf Silikatuntergrund wachsenden Elynetum Braun-Blanquet 1919 aufgenommen von HARTMANN (1971) vertritt unter 68 Arten nur Viola calcarata die Trockenstreuer. Synaptospermie, Myxospermie und Hygrochasie kommen überhaupt nicht vor. Dagegen weisen rund 1/3 der Arten xerochastische Bewegungsmechanismen auf.

Dass in den Pflanzengesellschaften des Wassers die Nautochoren einen grossen Anteil haben, ist ebenfalls leicht begreiflich. In der Mangrove

treten dazu noch das Auskeimen der Samen auf der Mutterpflanze und die Barochorie als weitere Eigentümlichkeiten in Erscheinung. Ferner bilden fast alle Pflanzen der See- und Ufergesellschaften, wie z. B. die Nadelbinsenassoziation Heleocharetum acicularis Koch 1926 vegetative Verbreitungseinheiten aus, die sie durch Selbstablegung ansiedeln; der wechselnde Stand des Wasserspiegels gefährdet nicht nur die Bildung der Samen, sondern erschwert auch deren Ansiedlung auf dem überspülten Grund.

Am mannigfaltigsten ist in der Regel das verbreitungsbiologische Spektrum mehrschichtiger Waldgesellschaften, wie schon SERNANDER (1901 und 1906) erkannt hat.

Die Bäume der Hochwaldschicht der Fichten-, Föhren-, Erlen- und Ahornwälder sind anemochor. In der Hochwaldschicht der Kastanien-, Eichen-, Buchen- und Arvenwälder dagegen treten die Anemochoren auf Kosten der Dysochoren zurück. Nebst dem Wind bewirken hier kräftige Vögel, nämlich Häher, Spechte, Tauben und Krähen die Verbreitung der Samen. Die Bäume und Sträucher der Unterwald und Gebüschschicht produzieren die meisten fleischigen Verbreitungseinheiten. Zwischen ihren Zweigen und Aesten, wo sie gegen Unwetter und Feinde geschützt sind, verleben die beerenfressenden Kleinvögel einen grossen Teil ihres Daseins und verbreiten deren Samen auf endo- oder hemiendochorem Weg. In der Feldschicht treten dazu namentlich noch Säugetiere und Ameisen als Verbreitungsagentien auf. Hier herrscht eine grosse Mannigfaltigkeit an Verbreitungsvorrichtungen. Wir treffen anemochore, epichore, endochore, stomatochore und autochore Arten an. Arten mit hygrochastischen Oeffnungsmechanismen und solche mit verbreitungshemmenden Vorrichtungen sind selbst in den mediterranen Wäldern äusserst selten.

Der Verbreitungsmodus bedingt oft weitgehend auch die Soziabilität der Pflanzen innerhalb einer Gesellschaft. So bilden die Ballochoren vielfach Herden, weil sie ihre Samen in grosser Dichtigkeit um sich streuen. Die endochore Verbreitung durch Rinder fördert die Bildung bestimmter Populationen auf den Weiden.

Für die Biocönologie sind die Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Pflanzen und Tieren, wie sie durch die Zoochorie zum Ausdruck kommen, noch

speziell der Beachtung wert. Bei den Epichoren stellen wir nur eine einseitige Ausnutzung der Tiere durch Pflanzen fest. Es kann sogar vorkommen, dass die Tiere unter den in die Haut eindringenden Haftvorrichtungen zu leiden haben. Bei den Dyso-, Stomato- und Endochoren sind beide Partner voneinander abhängig. Die Tiere empfangen Nahrung und entfernen gleichzeitig die Samen von ihren Mutterpflanzen. In bezug auf die Unvollkommenheit dieser gegenseitigen Abhängigkeitsbeziehungen zeigen sich aber erhebliche Unterschiede. Bei den Dysochoren erfolgt die Verbreitung nur auf Kosten eines grossen Teils der arteigenen Samen. Diese werden von den Tieren ihres nährstoffreichen Inhalts wegen aufgesucht und transportiert. Nur wenige entgehen dabei der Gefahr zerstört zu werden. Die Samen der trockenfrüchtigen Endochoren bleiben vielfach ganz; dagegen erleiden die Sprossteile der Mutterpflanzen oft grossen Schaden. Höchste Vollkommenheit in den Abhängigkeitsbeziehungen zwischen zwei Organismen finden wir dagegen bei den Stomatochoren und den Endochoren mit Fruchtfleisch. Bei ihnen empfängt das Tier Nährstoffe, die die Pflanze, ohne irgendwelchen Schaden zu nehmen, abgeben kann, und es besorgt gleichzeitig die Verbreitung der Samen. Zwischen den beiden Partnern besteht gewissermasser eine freie Symbiose.

Die Zahl und die prozentuale Verteilung der Zoochoren innerhalb einer Lebensgemeinschaft wird dadurch zum wertvollen Zeiger für deren Organisationshöhe. Je mehr sie Stomatochoren und Endochoren mit Fruchtfleisch enthält, auf um so höherer Stufe steht sie vom verbreitungsbiologischen Standpunkt aus. Es sind gerade die soziologisch hochorganisierten Pflanzengesellschaften, die Wälder, in denen nicht nur die vielseitigsten, sondern auch die vollkommensten Abhängigkeitsbeziegungen zwischen Pflanzen und Tieren am zahlreichsten auftreten.

5. Verbreitungsbiologie und Land- und Forstwirtschaft

In der Land- und Forstwirtschaft ist die natürliche Ansiedlung von Pflanzen bald erwünscht, bald unerwünscht. Je nachdem wird man diese zu fördern oder zu bekämpfen suchen. Mindestens historisches Interesse verdient in diesem Zusammenhang die Anpflanzung des Nelkenpfefferbaumes (Pimenta vulgaris) auf Jamaika. Nach MORRIS (KEMPSKI 1906, S. 13) haben die Farmer Jamaikas die Beobachtung gemacht, dass sie sich das Anpflanzen der Pimentbäume ersparen können. Es genügt zur Anlage einer Nelkenpfefferplantage ein Stück Land in der Nähe einer bereits bestehenden Plantage urbar zu machen. Nach einem Jahr hat sich dann die ganze Fläche mit jungen Pimentbäumen bedeckt. Die Samen sind mit den Exkrementen der Vögel dahin gelangt und wurden beim Passieren des Tierkörpers für die Keimung günstig vorbereitet.

Sehr sinnreich machten sich auch die Schafzüchter Südafrikas die Endochorie zweier Mesembryanthemum-Arten zunutze. Nach LIVINGSTONE (KEMPSKI 1906, S. 15) folgen dort Mesembryanthemum edule und M. acinaciforme dem Eintrocknen des Landes auf dem Fuss nach, keimen hier und überziehen den Boden mit einer grünen, wohltätigen Pflanzendecke. Um diese nun so gleichmässig wie möglich zu bewerkstelligen, speichert der Kolonist grosse Haufen jener fleischigen Kräuter zusammen mit den reifen Früchten auf, überlässt sie den Schafherden zum Futter und hat dann die Freude, die unverdauten Samenkörner mit den Exkrementen der über die Steppe getriebenen Herden gleichmässiger verbreitet zu sehen, als es sonst möglich gewesen wäre. Ob solche Praktiken heute noch bestehen, entzieht sich leider unserer Kenntnis. CAMPELL (1950) aber hat gezeigt, dass in den Alpen die Verbreitung der Arve durch den Nusshäher (Nucifraga caryocatactes) für die Forstwirtschaft von erheblichem Wert ist. Unzählige Beispiele von Arvenverjüngungen weit über der obersten Wald- und Baumgrenze bilden nach diesem Autor den besten Beweis für die unschätzbare forstliche Leistung dieses Vogels, dessen Abschuss bis vor wenigen Jahren noch durch eine Prämie belohnt wurde.

Am Calanda gegenüber Chur wurde ferner beobachtet, dass Eichelhäher (Garrulus glandarius) Buchennüsschen in den Föhrenwald (Erico-Pinetum-silvestris Braun-Blanquet 1939) eintrugen. OLMSTED (1937) schildert, dass in Connecticut Schwarzeichen (Quercus velutina) viele Gebiete besiedeln, weil ihre Früchte durch Eichhörnchen weggetragen und vergraben werden.

Der waldbauliche Nutzen der Häher und Eichhörnchen wird jedoch vielfach auch bestritten. So kommt CAHALANE (1942) zum Schluss, dass die Fuchs-Eichhörnchen (Sciurus niger) 99 % der versteckten Eicheln und Hickory-Nüsse wieder finden und sie deshalb die Ausbreitung des Eichen-Hickory-Waldes verhindern, wenn sie zahlreich sind. Wenn aber von einer Eiche die 15000 Früchte produzierte, 150 weggetragene nicht verzehrt werden, so ist dies für die Ausbreitung der Art immer noch von grösserer Bedeutung, als wenn alle nur zu Boden fallen und unter der Krone liegen bleiben würden. Dort aber, wo nur wenige Bäume einer Art stehen und der Forstmann die Samen zur Aussaat benützen möchte, ist es verständlich, wenn er die Häher und Eichhörnchen als Schädlinge empfindet.

Der Kuriosität halber sei hier auch noch erwähnt, dass nach ROTTA (1966) Samensammler in den USA sich die Eichhörnchen zunutze machen um sich Saatgut von Nadelbäumen zu beschaffen. Die Sammler spüren deren Vorratskammern auf, die mit den besten Nadelholzzapfen, sorgfältig nach Baumarten sortiert, gefüllt sind. Die beraubten Speicher werden mit Mais und andern Körnern aufgefüllt.

Es hat sich ferner erwiesen, dass man nach Waldbränden und Bergstürzen in der subalpinen Stufe mit dem Anflug von Weidensamen aus grossen Distanzen rechnen darf und sich so das Pflanzen von sogenannten Vorbauhölzern, die für die Wiederbestockung sehr wichtig sind, weitgehend ersparen kann.

In der Nähe und zwischen den Rebarealen der bündnerischen Herrschaft fallen oft die vielen Holundersträucher (Sambucus nigra) auf. Weil die Stare (Sturnus vulgaris) gierig deren schwarze Beeren verzehren, helfen sie mit, dieselben von den kostbaren Weintrauben fernzuhalten.

Für die Verjüngung der Wiesen kommt dem bei der Emdfütterung im Hofdünger massenhaft vorhandenen Weissklee (*Trifolium repens*)-Samen grosse Bedeutung zu. Es ist bekannt, dass in Saatmischungen ausgesäter Weissklee bald verschwindet, und sofern eine Düngung mit Hofdünger erfolgt, in späteren Jahren durch den einheimischen Weissklee ersetzt wird. In Erkenntnis dieser Tatsache wird nach SALZMANN (1946, S. 43) schon vielfach der Weissklee nicht mehr in Saatmischungen aufgenommen, da dies offensicht-

lich einer Verschwendung gleich käme.

Soll die Unkrautbekämpfung wirksam sein, so muss schon die Einführung der Samen in die Kulturen verhindert werden, was wiederum nur möglich ist, wenn deren Verbreitungsmöglichkeiten bekannt sind. Viele Hemerochoren wie Cuscuta epithymum, Rumex obtusifolius, Agrostemma githago und andere werden heute durch weitgehende Reinigung des Saatgutes von den Aeckern und Kunstwiesen ferngehalten. Schwieriger ist schon, den Endochoren beizukommen. Bei langer Lagerung des Hofdüngers gehen sie zwar zu einem kleinen Teil zugrunde. Durch die auf den Weiden abgesetzten Exkremente des Viehs erfolgt aber nach eigener Erfahrung (Müller-Schneider 1945 und 1954) eine starke Ausbreitung von Urtica dioeca, Rumex und Chenopodium-Arten und von Plantago major. Auch den Anemochoren ist schwer beizukommen. Das beste Mittel, den Unkräutern Herr zu werden, ist immer noch die Verhinderung der Fruchtbildung.

Schliesslich sei noch darauf hingewiesen, dass die dem käuflichen Saatgut beigemengten Unkrautsamen es ermöglichen, dessen Herkunft zu bestimmen.

6. Einfluss der Samenverbreitung auf die Evolution

Die Erde selbst und damit auch die Lebensverhältnisse für alle sie bewohnenden Lebewesen verändern sich beständig. Dies gilt auch in bezug auf die Siedlungs- und Verbreitungsmöglichkeiten, die sich den Pflanzen bieten. Sie können, wie vor allem bei der Schilderung der Speirochoren gezeigt wurde, zu Neuanpassungen führen. Ausserdem wird durch die Begegnung von weit voneinander entfernten Sippen die Bildung neuer hybridogener Abkömmlinge gefördert.

SCHOLZ (1970) macht diesbezüglich auf die in Berlin und andernorts aus Nordamerika eingeführte Achillea lanulosa Nutt, die zum Formenkreis von A. millefolium L. gehört, aufmerksam. Sie ist in ihrem Stammland ähnlich formenreich wie die europäische A. millefolium und beteiligt sich heute bereits an der Evolution und Biotypenanreicherung der europäischen

Sippen des A. millefolium-Komplexes. Auf den Grasplätzen Berlins wurden denn auch bereits A. lanulosa-Hybriden festgestellt, die nicht eindeutig der fremdländischen oder der alteingesessenen bzw. einheimischen Art zugeordnet werden können.

Die hemerochoren Ankömmlinge bedrohen, ja verdrängen sogar manchmal die alteingesessenen Arten und Sippen. Anderseits aber können durch die Bereicherung des Genpools neue Sippen entstehen, die die einheimischen Gewächse an ökologischer und physiologischer Leistungsfähigkeit übertreffen, d.h. sich an die veränderten Lebensbedingungen besser anzupassen vermögen. So sind z. B. nach LANDOLT (1970) viele europäische Wiesenpflanzen hybridogene Abkömmlinge von mittel- und südeuropäischen Gebirgssippen und submediterranen Sippen.

Diese Hinweise mögen genügen, um die Verbreitungsbiologie (Diasporologie) der Blütenpflanzen als wertvolles Glied der botanischen Forschung erscheinen zu lassen, das trotz der schon reichlich vorhandenen Literatur noch sehr entwicklungsbedürftig ist.

Literatur

- AGNEW, A.D.Q. und FLUX, J.E.C., 1969: Plant dispersal by hares (Lepus capensis L.) in Kenja. Ecology, 51, 735 737.
- ASCHERSON, P., 1892: Hygrochasie und zwei neue Fälle dieser Erscheinung. Ber. d. Deutsch. Bot. Ges., 10, 94 114.
- BACKER, C.A., 1929: The problem of Krakatao as seen by botanist. Den Haag. 299S.
- BECCARI, O., 1878: Malesia, raccolta di osservazioni botaniche intorno alle pianti dell'arcipelago Indo-Malese e Papuano 1, Genova.
- -- 1885: Malesia, raccolta di osservazioni bitaniche intorno alle pianti dell'arcipelago Indo-Malese e Papuano 2, Genova.
- BEAUVERD, G., 1901: Quelques cas de dissémination des graines par le vent. Bull. Herb. Boiss.
- BECHERER, A., 1925: Beiträge zur Pflanzengeographie der Nordschweiz mit besonderer Berücksichtigung der oberrheinischen Floreneinstrahlung. Colmar. Diss. Basel. 106 S.
- -- 1951: Neue Höhenrekorde für Blütenpflanzen in den Alpen. Ber. Schweiz. Bot. Ges., 61, 274 279.
- BENL, G., 1937: Eigenartige Verbreitungseinrichtungen bei der Cyperaceengattung Gahnia, Forst. Flora, N. F. 131, 369 386.
- BERG, R. Y., 1954: Development and dispersal of the seed of *Pedicularis* silvatica. Nytt. Mag. Bot. 2, 1 60.
- -- 1969: Adaption and evolution in *Dicentra (Fumariaceae)*, with special reference to seed, fruit and dispersal mechanism. Nytt Mag. Bot.4, 49 75.
- -- 1966: Seed dispersal of *Dendromecon*: Its ecologie, evolutionary, and taxonomic significance. Amer. J. Bot. 53, 61 73.
- BIRGER, S., 1907: Ueber endozoische Samenverbreitung durch Vögel. Svensk. Bot. Tidskr.
- BLONDEL, R., 1941: La végétation forestière de la région du Saint Paul près de Montpellier. Mem. Soc. Vaudoise Sc. Nat. 46, 307 381.
- BÖKER, H., 1937: Einführung in die vergleichende biologische Anatomie der Wirbeltiere. 2. Jenå. 258 S.
- BORZI, A., 1894: Contribuzioni alla biologia del frutto. Contrib. Fisiol. Biol. Veget. 1, Messina.
- -- 1911: Ricerche sulla disseminazione della piante per mezzo di sauri. Mem. Soc. ital. Sci. nat. 3, 17.
- BOUGET, J. und DAVY DE VIRVILLE, A., 1926: La tempête du mois de décembre 1925 et l'aéronautique végétale. Rev. Gén. Bot. 38 Paris.
- BRAUN-BLANQUET, J., 1913: Die Vegetationsverhältnisse der Schneestufe in den Rätisch-Lepontischen Alpen. Neue Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges. 48.
- -- 1949: Premier aperçu phytosociologique du Sahara tunisien. Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique Nord 2.
- -- 1948, 1949, 1950: Uebersicht der Pflanzengesellschaften Rätiens. Vegetatio 1 u. 2.
- BRESINSKY, A., 1963: Bau, Entwicklungsgeschichte und Inhaltsstoffe der Elaiosomen. Bibl. Bot. Stuttgart, 126, 1 54.
- BUCHLI, M., 1936: Oekologie der Ackerunkräuter der Nordostschweiz. Beitr. Geobot. Landesaufn. Schweiz 19.

- BUDDENBROCK, W., 1952: Vom Farbensinn der Tiere. Kosmos, Stuttgart. 80 S.
- BüNNING, E., 1956: Der tropische Regenwald. Verständl. Wissenschaft 56. Springer Verlag Heidelberg. 118 S.
- BURGEFF, H., 1936: Samenkeimung der Orchideen und Entwicklung ihrer Keimpflanzen. Jena. G. Fischer, 312 S.
- CAHALANE, V. H., 1942: Caching and recovery of food by the Western Fox Squirrel. Journ. Wildl. Man. 6, 338 351.
- CAMPELL, E., 1950: Der Tammen- oder Nusshäher und die Arvenverbreitung. Bündnerwald 4 Chur, 3 - 7.
- CAMUS, A., 1935: Sur les caractères donnés par le mode de chute de l'inflorenscence des épillets ou des fleurs dans les Graminées de la flore française. Ann. Soc. Linn. Lyon 59, 1 - 28.
- CANDOLLE DE, A., 1855: Géographie botanique raisonnée, Paris.
- CHERMEZON, H., 1924: Sur la dissémination de quelques Cyperacées. Bull. Soc. Bot. France 31, 849 861.
- CHRIST, H., 1923: Der alte Bauerngarten, Basel.
- CHRISTIANSEN, W., 1959: Helgoland. Eine Nordsee-Insel mit atlantischer Flora. Kosmos Stuttgart 55, 128 132.
- CRUDEN, R. W., 1966: Birds as agents of long distance dispersal for disjunct groups of the temperate Western hemisphere. Evolution 20, 517 532.
- DAHLGREN, K.V.O., 1945: Nya meddelanden om Geranium bohemicum och Geranium lanuginosum. Botan. Not. 381 389.
- DANSEREAU, P. and LEMS, K., 1957: The grading of dispersal types in plant comminities and their ecological significance. Contrib. Inst. Bot. Univ. Montréal 71, 1 52.
- DARWIN, CH.,o.Ig.: Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl. Bearb. von H. SCHMIDT nach der Uebersetzung von J.V. Carus. 21. 25. Tausend, Leipzig.
- -- 1909: Reise eines Naturforschers um die Welt. Deutsch von H. SCHMIDT. Leipzig.
- DIELS, L., 1918: Pflanzengeographie. Sammlg. Göschen, Berlin und Leipzig. DINGLER, H., 1889: Die Bewegung der pflanzlichen Flugorgane. München, 342 S.
- DORPH-PETERSEN, K., 1904: Aarsberetning fra Dansk Frokontrol. Kopenhagen. EDDY, Th. A., 1961: Food and Feeding Patterns of the Collared Peccary in Southern Arizona. Journ. Wildl. Man. 25, 248 257.
- EINARSSON, E., 1973: Invasion of terrestial plants on the new volcanic island Surtsey. Ecology and reclamation of devasted Land, P. 3, 1, London, 253 270.
- ENDRESS, P. K., 1973: "Arillen" bei holzigen Ranales und ihre phylogenetische Bedeutung. Verh. Schweiz. Natf. Ges., 89 90.
- -- 1973: Arils and aril-like structures in woody Ranales. New Phytol.72, 1159 1171.
- ENGLER, A. und PRANTL, K., 1889 1912: Natürliche Pflanzenfamilien. 2. Aufl. Leipzig.
- ERNST, A., 1934: Das biologische Krakatauproblem. Viertelj. Naturf. Ges. Zürich, 1 187.
- ESCHERICH, K. und LUDWIG, A., 1898: Beiträge zur Kenntnis der Elsässischen Ameisenfauna. Mittlg.d. Philomatischen Gesellsch. in Elsass-Lothringen 1, Strassburg, 381 389.

- FAUTH, A., 1903: Beitrag zur Anatomie und Biologie der Früchte und Samen einiger einheimischer Wasser- und Sumpfpflanzen. Diss. Jena.
- FIRBAS, F., 1935: Ueber die Wirksamkeit der natürlichen Verbreitungsmittel der Waldbäume. "Natur und Heimat" 6, 9 S.
- FLEISCHER, E., 1929: Zur Biologie feilspanförmiger Samen. Bot. Arch. 26, 85 132.
- FURRER, E., 1942: Kleine Pflanzengeographie der Schweiz. 2. Aufl. Zürich.
- GLUTZ, U., 1956: Zur Vorratsanlegung des Tannenhähers. Ornith. Beob. ALA Winterthur, 53, 36 40.
- GRZIMEK G. B. et al., 1967 1974: Grzimeks Tierleben. Verlag Kindler, Zürich, 13 und 3 Bände.
- GUPPY, H.B., 1891: Dispersal of plants as illustrated by the flora of Cocos-Keeling. Victoria Institute.
- GUTTENBERG v., H., 1926: Die Bewegungsgewebe. In: LINSBAUER, Handbuch der Pflanzenanatomie 1, 2, 5. Borntraeger, Berlin.
- HAGER, P.K., 1916: Verbreitung der wildwachsenden Holzarten im Vorderrheintal, Kanton Graubünden, Erheb. über die Verbreitung der wildwachsenden Holzarten in der Schweiz. 3. Lieferg. 331 S.
- HARTMANN, H., 1956/57: Studien über die vegetative Fortpflanzung in den Hochalpen. Diss. Univ. Zürich 1955 und Jahresber. Naturf. Ges. Graub. 86, 3 168.
- HEDIGER, H., 1949: Säugetier-Territorien und ihre Markierung. Bijdragen Dierkunde 28.
- HEGI, G., 1906 1931: Illustrierte Flora von Mitteleuropa. München.
- HEINISCH, O., 1955: Das landwirtschaftliche Saatgut. 2. Aufl. Berlin, C 2.
- HEINRICHER, E., 1915: Beiträge zur Biologie der Zwergmistel, Arceuthobium Oxycedri, bes. zur Kenntnis des anatom. Baues u. d. Mechanik ihrer explosiven Beeren. Sitzgsb. Kais. Akad. Wiss. Math. Natw. Kl. Abt. I 124 Wien.
- HEINTZE, A., 1915: Om endozoisk fröspridning genom Skandinavisken dagjur. Bot. Not.
- -- 1916: Om endozoisk fräspridning genom trastar och andra sangfaglar. Svensk Bot. Tidskr. 10, 479 505.
- -- 1932 1935: Handbuch der Verbreitungsökologie der Pflanzen. Stockholm, 266S.
- HEINY, S., 1960: Oekologische Charakteristik der Wasser- und Sumpfpflanzen in den Slowakischen Tiefebenen. Verlag Slowak. Akad. Wissensch., Bratislava, 489 S.
- HELLMANN, G., 1915: Ueber die Bewegung der Luft in den untersten Schichten der Atmosphäre. Met. Zeitschr. 32, Braunschweig, 1 16.
- HILDEBRAND, F., 1873: Die Verbreitungsmittel der Pflanzen, Leipzig, 162 S.
- HIRSCH, A., 1901: Ueber den Bewegungsmechanismus des Compositenpappus. Diss. Berlin, 1 - 40.
- HLADIK, C. M. und HLADIK, A., 1967: Observation sur le rôle des primates dans la dissémination des végétaux de la forêt gabonaise. Biologia Gabonica 3, 43 58.
- HOCHREUTINER, G., 1899: Dissémination des graines par les poissons. Bull. Lab. Bot. Univ. Genève.
- HUTH, E., 1889: Die Verbreitung der Pflanzen durch die Exkremente der Tiere. Berlin.
- -- 1887: Die Kletterpflanzen mit besonderer Berücksichtigung ihrer Verbreitung durch Tiere. Bibl. Bot. Kassel, 1 36.

- HYLANDER, N., 1929: Diasporenabtrennung und Diasporentransport. Svensk Bot. Tidskr. 23, 183 - 218.
- -- 1946: Ueber Geokarpie. Bot. Not., 430 470.
- IHLENFELDT, H.D., 1959: Blumen der Wüste. Orion Zeitschr. Natur und Technik. München 6, 479 482.
- -- 1960: Entwicklungsgeschichtliche, morphologische und systematische Untersuchungen an Mesembryanthemen. Feddes Rep. 63, 1 104.
- -- 1960: Feddes Rep. 63, 1 104.
- -- 1967: Ueber die Abgrenzung und die natürliche Gliederung der *Pedalia-ceae* R. Br. Mitt. Staatsinst. Allg. Bot. Hamburg 12, 43 128.
- JALAS, J., 1955: Hemerobe und hemerochore Pflanzenarten. Ein terminologischer Reformversuch. Acta Soc. Fauna Flora Fennica 72, 1 15.
- JENNY-LIPS, H., 1930: Vegetationsbedingungen und Pflanzengesellschaften auf Felsschutt. Beih. Bot. Centralbl. 46.
- KEAY, R. W. J., 1957: Wind-dispersal species in a Nigerian forest. Journ. Ecol. 45, 471 478.
- KEMPSKI, E., 1906: Ueber endozoische Samenverbreitung und speziell die Verbreitung durch Tiere auf dem Wege des Darmkanals. Diss. Rostock u. Bonn, 1 172.
- KERNER, A., 1898: Pflanzenleben, 2. Aufl. Leipzig und Wien.
- KIRCHNER, O., LÖW, E. und SCHRÖTER, C., 1906 f.f.: Lebensgeschichte der Blütenpflanzen Mitteleuropas. Stuttgart.
- KOHLERMANN, L., 1950: Untersuchungen über die Windverbreitung der Früchte und Samen der Mitteleuropäischen Waldbäume. Forstw. Centralbl. 69, 606 624.
- KOLPIN RAVN, F., 1894: Om Flydeevn en hos Froene af vore Vand-og Sumpplanter. Bot. Tidskr. 19.
- -- 1895: Sur la faculté de flotter chez les graines de nos plantes aquatiques et marécageuses. Bot, Tidskr. 19.
- KORNAS, J., 1972: Distribution and dispersal ecology of weeds in segetal plant communities in the Gorce Mts. Acta Agrobot. 25, 5 67.
- KORSMO, E., 1911: Ueber die Fähigkeit der Samen den Verdauungskanal der Haustiere zu passieren, ohne die Keimkraft zu verlieren. Det. Biol. Selskab.
- KRäMER, A., 1967: Wie findet das Eichhörnchen seine Vorräte? Kosmos 2, (Stuttgart), 83 86.
- KROTT, P., 1962: Dichtung und Wahrheit über den Trentiner Alpenbären. Kosmos 58(Stuttgart), 142.
- KUHK, R. und SCHüTZ, E., 1959: Zur Biologie des Blesshuhns (Fulica atra) im Winterquartier. Die Vogelwarte 20, 144 158.
- KULZER, E., 1963: Ueber das Verhalten der Nilflughunde. Die Natur (Stuttgart) 71, 188 195.
- -- 1968: Der Flug des afrikanischen Flughundes Eidolon helvum. Natur und Museum (Frankfurt a. M.) 98, 5.
- KUNTZE, O., 1877: Die Schutzmittel der Pflanzen gegen Tiere und Wettergunst. Beilage z. Bot. Zeitg. Leipzig.
- LAGERHEIM, G., 1900: Ueber Lasius fuliginosus (Latr.) und seine Pilzzucht. Entomolog. Tidskr. Stockholm.
- LANDOLT, E., 1970: Mitteleuropäische Wiesenpflanzen als hybridogene Abkömmlinge von mittel- und südeuropäischen Gebirgssippen und submediterranen Sippen. Fed. Rep. 81, 61 - 66.
- -- 1975: Floristische und zytotaxonomische Arbeiten an der Flora der Schweiz zwischen 1960 u. 1972. Mem. Soc. Brot. 24, 777 798.

- LEEUWEN VAN, W. M., 1929: Kurze Mitteilung über Ameisen-Epiphyten aus Java. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 47, 90 99.
- LEIBUNDGUT, H., 1951: Der Wald eine Lebensgemeinschaft. Zürich, 223 S.
- LHOTSKA, M. und KOPECKY, K., 1966: Zur Verbreitungsbiologie und Phytoconologie von *Impatiens glandulifera* Royle an den Flusssystemen der Svitava, Svratka und oberen Odra. Preslia (Praha) 38, 376 - 385.
- -- 1968: Karpologie und Karpobiologie der tschechoslovakischen Vertreter der Gattung *Bidens*. Acad. Praha 78(10), 1 85.
- LINDROTH, C. H., 1970: Surtsey-Island Untersuchungen über terrestrische Biota. Schr. Naturw. Ver. Schleswig-Holst. Sonderbd. (Kiel), 11 - 19.
- LüDI, W., 1930: Die Methoden der Sukzessionsforschung in der Pflanzensoziologie. Handbuch der biolog. Arbeitsmethoden, herausgegeb. v. E. ABDERHALDEN, Abt. 11. Teil 5.
- LUDWIG, F., 1895: Lehrbuch der Biologie der Pflanzen. Stuttgart.
- LUNDSTRÖM, A., 1887: Die Anpassungen der Pflanzen an die Verbreitung durch Tiere. In: Nova Acta Soc. Sci. Ups., Ser. 3 13, Fasc. 2.
- MASSART, J., 1898: La dissémination des plantes alpines. Bull. Soc. Bot. R. Belgique 37.
- MEDWECKA-KORNAS, A., 1949: Biologie de la dissémination des associations végétales des rochers du Jura Cracovien. Bull. Acad. Pol. Sci. Lettres. Cl. Sc. Math. Nat. Sér. B. Sc. Nat. D. 151 173.
- MEEUSE, A. D. J., 1958: A possible case of independance between a mammal and a higher plant. Arch. neerl. Zoöl. (Leiden) 13, 314 318.
- MESSIKOMMER, H., 1883: Samen und Früchte auf dem Pfahlbau Robenhausen. Ber. Ethnogr. Ges. Berlin 15, 233 - 237.
- MILDBREAD, J., 1964: Die Schausamen von Paeonia corallina. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 67, 73 74.
- MOHR, Erna, 1950: Die freilebenden Nagetiere Deutschlands und der Nachbarländer. Jena.
- MOLINIER, R. und MüLLER-SCHNEIDER, P., 1938: La dissémination des espèces végétales. Rev. Gén. Bot. 50, 1 178.
- MOOR, M., 1940: Verbreitungsbiologische Beobachtungen im Eichen-Hainbuchwald. Verh. Natf. Ges. Basel 51, 90 98.
- -- 1958: Pflanzengesellschaften schweizerischer Flussauen. Mitteil. Schweiz. Anstalt forstl. Versuchsw. 34, 221 360.
- MORTON, F. R., 1948: Urwald. (Die Pflanzenwunder Mittelamerikas). Universum Verlagsges. Wien 104 S.
- MOSEBACH, G., 1932: Die Fruchtstielschwellung der Oxalidaceen und Geraniaceen. Jahrb. Wissenschaftl. Bot. 79.
- Müller-SCHNEIDER, P., 1932: Verbreitung von Pflanzen durch Tiere.Garbe, Basel 567 569.
- -- 1933: Verbreitungsbiologie der Garigueflora. Beih. Bot. Centralbl. 50, Abt. II, 396 469.
- -- 1934: Beitrag zur Keimverbreitungsbiologie der Endozoochoren. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 43, 241 252.
- -- 1935: Nachtrag zur Verbreitungsbiologie der Garigueflora. Beih. Bot. Centralbl. 54, Abt. B, 342 345.
- -- 1936: Ueber Samenverbreitung durch den Regen. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 45, 181 190.

- MüLLER-SCHNEIDER, P., 1938: Ueber endozoochore Samenverbreitung durch Säugetiere. Jahresb. Natf. Ges. Graub. 75, 85 88.
- -- 1941: Beobachtungen über die Keimung des Bergahorns (Acer pseudoplatanus L.) im Schnee. Jahresb. Natf. Ges. Graub. 77, 29 32.
- -- 1945: Untersuchungen über endozoochore Samenverbreitung durch das Rind auf der Mittenbergweide bei Chur. Verh. Natf. Ges. Basel 56, 251 260.
- -- 1948: Untersuchungen über endozoochore Samenverbreitung durch Weidetiere im Schweizerischen Nationalpark. Ergebn. Wissensch. Unters. Schweiz. Nationalparks 2,1 13.
- -- 1949: Unsere Vögel als Samenverbreiter. Der Ornith. Beob. 46, 120 123.
- -- 1954: Ueber endozoochore Samenverbreitung durch weidende Haustiere. Vegetatio (Festband J. Braun-Blanquet) 23 28.
- -- 1959: Ist Chenopodium album L. eine prähistorische Nutzpflanze. Ber. Geobot. Forschungsinst. Rübel, Zürich 1959, 124 125.
- -- und LENGGENHAGER, C., 1959: Aus dem Leben der Churer Amseln (Turdus merula L.) mit besonderer Berücksichtigung ihrer Rolle als Samenverbreiter. Jahresb. Natf. Ges. Graub. 88, 36 55.
- -- 1963: Neue Beobachtungen über die Samenverbreitung durch Ameisen. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 73, 153 160.
- -- 1964: Verbreitungsbiologie und Pflanzengesellschaften. Acta Bot. Croatica Vol. Extr. 79 87.
- -- 1967: Zur Verbreitungsbiologie des Moschuskrautes (Adoxa moschatellina). Vegetatio 15, 27 32.
- -- 1971: Aus der Verbreitungsbiologie der Blütenpflanzen (Vortrag). Mitt. Natf. Ges. Bern.NF. 28, 84 86.
- -- 1971: Beiträge zur Kenntnis der Samenverbreitung durch Ameisen. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 80, 289 297.
- -- 1974: Ueber die Rolle der Waldmäuse und Gartenschläfer als Samenverbreiter. Jahresber. Natf. Ges. Graub. 95, 19 29.
- MURBECK, S., 1919 1920: Beiträge zur Biologie der Wüstenpflanzen.

 I. Vorkommen und Bedeutung der Schleimabsonderung aus Samenhüllen.1-35.

 II. Die Synaptospermie. Lunds. Univ. Arskr. NF. Adv. 2, 15 (10), 17 (1), 1 53.
- NäGELI, O., 1898 und 1900: Ueber die Pflanzengeographie des Thurgaus. Mitt. Thurg. Natf. Ges. 13 und 14.
- NEAL, E., 1948: The Badger. London.
- NEUWEILER, E., 1905: Die prähistorischen Pflanzenreste Mitteleuropas. Bot. Exkursionen und pflanzengeograph. Studien in der Schweiz.6 Zürich. 111 S.
- NORDHAGEN, R., 1932: Verbreitungsbiologische Studien über einige europäische Amaryllidaceen. Bergens Museum Arbok Naturv. 5, 1 - 36.
- -- 1932: Ueber die Einrollung der Fruchtstiele bei der Gattung Cyclamen und ihre biologische Bedeutung. Beih. Bot. Centralbl. (A), 359 395.
- -- 1932: Zur Morphologie und Verbreitungsbiologie der Gattung Roscoea SM. Bergens Museum Arbok Naturv. 4, 1 57.
- -- 1936: Verbreitungsbiologische Studien über einige Astragalus- und Oxytropis-Arten. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 46, 307 - 337.
- ØDUM, S., 1965: Germination of Ancient Seeds. Dansk Bot. Arkiv. 24 (2), 1 70.
- OGNEW, S. J., 1959: Säugetiere und ihre Welt. Akad. Verlag. Berlin.
- OHLENDORF, O., 1907: Beiträge zur Anatomie der Früchte und Samen einheimischer Wasser- und Sumpfpflanzen. Diss. Erlangen.

- OVERBECK, F., 1925: Ueber den Mechanismus der Samenabschleuderung von Cardamine impatiens L. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 43, 469 475.
- -- 1930: Mit welchen Druckkräften arbeitet der Schleudermechanismus der Spritzgurke. Planta 10.
- -- 1934: Verbreitungsmittel der Pflanzen. Handwörterbuch der Natw. (2. Aufl.) 9, Jena 164 172.
- PASCHER, A. und POHL, F. (BECK v. MANNAGETTA): Frucht und Same (Fortpflanzung der Gewächse). Handwörterb. d. Natw. (2. Aufl.) 4, Jena.
- PFEIFFER, A., 1891: Die Arillargebilde der Pflanzensamen. Diss. Berlin und Leipzig. Bot. Ib. 13, 492 540.
- PERTTULA, U., 1941: Untersuchungen über die generative und vegetative Vermehrung der Blütenpflanzen in der Wald-, Hainwiesen- u. Hainfelsenvegetation. Helsinki 388 S.
- PIJL, L., van der, 1955: Sarcotesta, aril, pulpa and the evolution of the angiosperm fruit, I, II, Proc.. Ned. Acad. Wet (C) 58, 307 312.
- -- 1957: The dispersal of plants by bats. Acta Bot. Neerl. 6, 291 315.
- -- 1966: Ecological aspects of fruit evolution. Proc. Kon. Ned. Acad. Wet. (C) 69, 597 640.
- -- 1972: Principles of Dispersal in Higher Plants. Sec. Edition. Springer Verlag, Heidelberg, 163 S.
- PORSILD, A. E., HARINGTON, C.K. u. MULLIGAN, G. A., 1967: Lupinus arcticus Wats. Grown from seeds of Pleistocene Age. Science, 158, 113 114.
- PORSILD, M. A. E., 1920: Sur le poids et les dimensions des graines arctiques. Rev. Gén. Bot. 32.
- POTTIER-ALAPETITE, G., 1943: Recherches phytosociologiques et historiques sur la végétation du Jura central et sur les origines de la flore jurassienne. Comm. S.I.G.M.A. (Montpellier) 81.
- PRAEGER, R. L., 1913: Buoyancy of the seeds of some Britannic Plants. Scient. Proc. roy. Dublin Soc. 14, 13 62.
- PROBST, R., 1949: Wolladventivflora Mitteleuropas. Solothurn. 193 S.
- PROCTOR, V. W., 1968: Long distance dispersal of seeds by retention in digestive tract of birds. Science 160, 321 322.
- QUANTIN, A., 1935: L'Evolution de la végétation à l'étage de la chênaie dans le Jura méridional. Comm. S.I.G.M.A. (Montpellier) 37.
- RICK, C. M. und BOWMAN, R. I., 1961: Galapagos Tomatoes and Turtoises. Evolution 15, 407 417.
- RIDLEY, H. N., 1930: The dispersal of plants throughout the world. Ashford, Kent, 744 S.
- RIEDER, P., 1940: Unser Wild. Volksstimme von Basel-Land. Sonderdruck.
- RIKLI, M., 1904: Die Anthropochoren und der Formenkreis des Nasturtium palustre (Leys) DC. Bot. Centralbibl. 95.
- RILL, M. und SAGAR, G.R., 1973: Earthworms and Seeds, Nature (USA), 243, 482. RODE, W. W., 1913: Schutzeinrichtungen von Früchten und Samen gegen die Einwirkung fliessenden Meerwassers. Diss. Göttingen.
- RYTZ, W., 1936: Systematische, ökologische und geographische Probleme bei den Brassiceen. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 46, 517 544.
- SAJO, K., 1922: Krieg und Frieden im Ameisenstaat. Kosmos (Stuttgart) 22. Aufl.
- SALZMANN, R., 1939: Die Verbreitung keimfähiger Samen durch den Hofdünger. Schweiz. Landw. Monatsh., 40 44.
- -- und SCHENKER, P., 1946: Der Gehalt des Kuhkotes an keimfähigem Samen auf einer Weide der Voralpen. Alpenwirtschaftl. Monatsbl. 80, 1 6.

- SCHIPFERLI, A., 1965: Vom Seidenschwanz und seinen Wanderungen. Ber. Schweiz. Vogelwarte Sempach, 1 16.
- SCHIMPER, A. F. W., 1891: Die indo-malayische Strandflora. Jena.
- -- 1898: Pflanzengeographie auf physiologischer Grundlage. Jena.
- SCHMIDT, W., 1918: Die Verbreitung von Samen durch Blütenstaub durch die Luftbewegung. Oesterr. bot. Z. 67, 313 328.
- SCHNEIDER, S., 1935: Untersuchungen und Samenschleudermechanismen verschiedener Rhoeadales. Jahrb. Wiss. Botanik 81, 663 704.
- SCHNYDER, A., 1924: Beobachtungen über Pflanzenwanderungen im Alviergebiet. Jahrb. St. Gall. Natw. Ges. 60.
- SCHOLZ, H., 1970: Ueber Grassamenankömmlinge, insbesondere Achillea lanulosa Nutt. Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg. 107, 79 85.
- SCHÖNICHEN, W., 1923: Mikroskopische Untersuchungen zur Biologie der Samen und Früchte. Biol. Arbeitsh. Freiburg i. Br. 17, 1 48.
- SCHRÖTER, C., 1926: Das Pflanzenleben der Alpen. 2. Aufl. Zürich.
- SCHUSTER, L., 1930: Ueber die Beerennahrung der Vögel. Journ. Ornithologie 78, 273 - 301.
- -- 1950: Ueber den Sammelbetrieb des Eichelhähers (Garrulus glandarius). Die Vogelwelt (Berlin und München) 71, 9 17.
- SERNANDER, R., 1901: Den skandinaviska vegetationens Sprindningsbiologi. Berlin und Uppsala, 457 S.
- -- 1906: Entwurf einer Monographie der europäischen Myrmekochoren. Uppsala, 410 S.
- -- 1927: Zur Morphologie und Biologie der Diasporen. Nova Acta Reg. Soc. Sc. Upsaliensis, 104 S.
- SIMEON, U., 1928: Samenbildung und Samenverbreitung bei den in der Schweiz unterhalb der Waldgrenze wachsenden Pflanzen. Diss. ETH. Luzern, 139 S.
- SOROCEANU, E., 1936: Recherches phytosociologiques sur les pelouses mésoxerophiles de la plaine languedocienne (*Brachypodietum phoenicioides*). Comm. de la S.I.G.M.A. (Montpellier) 41.
- STäGER, R., 1910. Zur Verbreitungsbiologie von Taxus baccata L. Mittl. Natf. Ges. Bern.
- -- 1928: Samenverfrachtung durch Ameisen in der alpinen Stufe. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 37, 9 14.
- STAPF, O., 1887: Ueber die Schleuderfrüchte von Alstroemeria psittacina. Verh. Zool.-Botan. Ges. Wien 37.
- STEBLER, F. G., 1889: Samenfälschungen und Samenschutz. Bern.
- -- und SCHRÖTER, C., 1889: Die besten Futterpflanzen, I.- III. Teil. Bremen, Bern, Wien.
- STEINBRINK, C., 1883: Ueber einige Fruchtgehäuse, welche ihre Samen infolge von Benetzung freilegen. Ber. Dtsch. Bot. Ges. 1.
- STOPP, K., 1956: Botanische Analyse des Driftgutes vom Mittellauf des Kongoflusses, mit kritischen Bemerkungen über die Bedeutung fluviatiler Hydatochorie. Beitr. Biol. Planzen 32, 427 449.
- -- 1958: Die verbreitungshemmenden Einrichtungen in der südafrikanischen Flora. Bot. Stud. (Jena) 8, 103 S.
- STRAKA, H., 1955: Anatomische und entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen an Früchten paraspermer Mesembryanthemen. Nova Acta Leopoldina NF. 17, 125 190.
- -- 1959: Zur Ausbreitungs- und Keimungsökologie des Meerkohls (*Crambe maritima* L.) Schr. Naturw. Vereins Schleswig-Holstein. 29, 73 82.

- STRESEMANN, E., 1927 1934: Handbuch der Zoologie. Aves, Berlin und Leipzig.
- -- 1953: Lauben- und Balz der Laubvögel (*Ptilonorhynchidae*). Vogelwarte Stuttgart 16, 148 154.
- SUTTER, E. und AMMANN, F., 1953: Wie weit fliegen vorratssammelnde Tannenhäher. Ornitholog. Beob. 50, 89 - 90.
- SVEDELIUS, N. E., 1904: On the life history of *Enalus acoroides*. Ann. R. Bot. Gardens. Peradeniya 2.
- SWANBERG, P.O., 1951: Food storage, territory and song in the Thickbilled Nutcracker. Proc. 10th Int. Ornitol. Congr., 545 554.
- TAKHTAJAN, A., 1973: Evolution und Ausbreitung der Blütenpflanzen. G. Fischer Verlag, Stuttgart. 187 S.
- TAYLOR, B. W., 1954: An example of long-distance dispersal. Ecology 35, 569 572.
- TCHOU YEN-TCHENG, 1948/1949: Etudes écologiques et phytosociologiques sur les forêts riveraines du Bas-Languedoc. Vegetatio l.
- THELLUNG, A., 1930: Die Entstehung der Kulturpflanzen. Naturw. Landw. (München) 3 91.
- TREUB, M., 1888: Notice sur la nouvelle flore de Krakatau. Ann. Jard. Bot. Buitenzorg. 7, 213 223.
- TURCEK, F. J., 1964: Endozoische Verbreitung von Gehölzsamen durch den mitteleuropäischen Feldhasen (*Lepus europaeus* E. Pall). Biologia (Bratislava) 19, 7, 541 549.
- ULBRICH, E., 1939: Deutsche Myrmekochoren, Beobachtungen über die Verbreitung heimischer Pflanzen durch Ameisen. Berlin-Dahlem 60 S.
- -- 1928: Biologie der Früchte und Samen (Karpobiologie). Berlin 230 S.
- ULE, E., 1896: Ueber die Verlängerung der Achsengebilde des Blütenstandes zur Verbreitung der Samen. Ber. Dtsch. Bot. Ges. 14. 255 260.
- VILLARET von ROCHOW, M., 1958: Die Pflanzenreste der bronzezeitlichen Pfahlbauten von Valeggio am Mincio. Ber. Geobot. Forschungsinst. Rübel, Zürich 1957, 96 114.
- VLAMING, V. und PROCTOR, V., 1968: Dispersal of aquatic organisms: viability of seeds recovered from the droppings of captive killdeer and mallard ducs. Am. J. Bot. 55, 20 26.
- VOGLER, P., 1901: Ueber die Verbreitungsmittel der schweizerischen Alpenpflanzen. Flora 89, Ergänzungsbd. 137 S.
- VOLK, O.H., 1939: Soziologische und ökologische Untersuchungen an der Auenvegetation im Churer Rheintal und Domleschg. Jahresb. Natf. Ges. Graub. 76, 29 80.
- VRIES DE, V., 1939: Bijdrage tot de voedselbiologie van een 4-tal eendensoorten naar aanleiding van materiaal afkomstig van Vlieland en Terschelling. Limosa 12, 87 98.
- -- 1940: Bijdrage tot de transportbiologie van plantenzaden, naar aanleiding van material uit magen van eenden, afkomstig van Vlieland en Terschelling. Limosa 13, 113 118.
- WALTER, H., 1957: Die Verbuschung in Südwestafrika. Umschau (Frankfurt a. M.) 57, 196.
- WARMING, E. und GRAEBNER, P., 1918: Lehrbuch der ökologischen Pflanzengeographie. 3. Aufl., Berlin.
- WEBERBAUER, A., 1898: Beiträge zur Anatomie der Kapselfrüchte. Bot. Centralbl. 73, 1 52.
- WIDDER, F., 1939: Offene Fragen um Endemiten des Alpen-Ostrandes. Ber. Dtsch. Bot. Ges. 57, 139 147.

- WILCZEK, E., 1892: Beiträge zur Kenntnis der Frucht der Cyperaceen. Diss. Zürich, 37 S.
- WÜRTENBERGER, O., 1917: Die Erdnuss. Diss. Giessen.
- ZARZYCKI, K., 1961: Etude sur la végétation des dunes anciennes en Petite Camargue. Acta Soc. Bot. Poloniae. 30, 577 610.
- ZOHARI, M., 1930: Beiträge zur Kenntnis der hygrochastischen Pflanzen. Feddes Rep. Beih. 61, 85 96.
- -- 1937: Die verbreitungsökologischen Verhältnisse der Pflanzen Palästinas. Beih. Bot. Centralbl. 56, 155 S.
- -- 1962: Plant Life of Palestine, Israel and Jordan. Chronica Bot. 33, New York.
- ZöTTL, H., 1951: Experimentelle Untersuchungen über die Ausbreitungsfähigkeit alpiner Pflanzen. Phyton. (Ann. Rei Bot.) 3, 121 125.

Bestimmungsbücher für Samen und andere Diasporen

- BERGGREN, G., 1969 u. f.: Atlas of Seeds. Swedish Nat. Sc. research council Edit. Serv. Stockholm.
- BEIJERINK, W., 1947: Zaden Atlas der Nederlandsche Flora. H. Veenman & Zonen, Wageningen.
- KIFFMANN, R., 1952: Bestimmungsschlüssel der wichtigsten Ackerunkraut-Sämereien, Landbuch-Verlag, Hannover.
- -- 1955, 1956 und 1960: Bestimmungsatlas für Sämereien der Wiesen- und Weidepflanzen des mitteleuropäischen Flachlandes. Freising-Weihenstephan.
- HEINISCH, O., 1955: Samenatlas der wichtigsten Futterpflanzen und ihrer Unkräuter. Deutscher Bauernverlag. Berlin.
- HEGI, G., 1906 ff.: Illustrierte Flora von Mitteleuropa. J. F. Lehmann, München.
- HESS, H. E., LANDOLT, E. und HIRZEL, R., 1967 1972: Flora der Schweiz. Birkhäuser, Basel.
 - Nach dieser Flora richtet sich, so weit sie reicht, die Nomenklatur der in dieser Veröffentlichung genannten Pflanzenarten.

Zusammenstellung der griechischen Wortstämme und ihrer Bedeutung

aeril	im Bereich der Luft	karpos	Frucht
ago	ich führe mit	kaulos	Stengel (Stamm)
allos	ein anderer	kens	leer
anemos	Wind		
amphi	beidseitig	Lumbricus	Regenwurm
anthropos	Mensch	(lat.)	1.0901
autos	selbst	(140.)	
44000	561256	Mammalia (lat.)Säugetiere
ballo	ich werfe	mesos	mittlere
basis	Grundlage	meteoros	in der Luft befind-
baros	Schwere		lich
blastano	ich wachse	myrmecocystes	Ameisen
bios	Leben		
bol	siehe ballo	naus	Schiff
bradys	langsam		
bythis	sinken	ombros	Regen
Marie Carlos Control C		ornis	Vogel
chaino	ich klaffe	on the contract of contract of	
chamai	am Boden	peri	ringsum
choreo	ich wandere	pteron	Flügel
cyste	Blase	polys	viel
- Sec Sec. (2000)		•	
diaspeiro	ich säe aus	sauros	Echse
diplous	doppelt	soma	Körper
dys	miss	speiro	ich säe
		stoma	Mund
elaion soma	Oel-Körper	synapto	verknüpfen
endon	drinnen		
epi	obendrauf	tachys	schnell
ethelo	ich will	tele	fern
		topos	Ort
Gastropoda	Schnecken	trich	Haar
(lat.)			
glires	Nagetiere	xeros	trocken
ge	Erde		
		zoon	Tier
hemeros	zahm (kultiviert)		
herpo	ich krieche		
heteros	verschieden		
hemi-	halb		
hydor	Wasser		
hygros	feucht		
hypo	unten		

ichty Fisch

Sachregister

Abhängigkeitsbeziehungen 186 Abiotische Klassen von Verbreitungstypen 33 Achaene 15, 163 Ackerunkräuter 120 Adventivknospen 11 Adventivpflanzen (-flora) 151, 157, 184 Aerokarpie (aerokarp) 24, 28 Agochoren 155, 157, 182 Allochoren 34 Alpenflora 32 Alpenschwemmlinge 95, 181 Ameisen-Epiphyten 113 Amphikarpie (amphikarp) 21, 29, 30, 35, 163, 178, 184	Bastzellen 84 Beere 15 Biologische Kapsel 27 Bioteknose 15 Biotische Klassen der Verbreitungstypen 33 Blastochoren 35 Bodenläufer 56, 73, 74*, 169, 176 Bohrapparate 48, 165, 178, 184 Boleochoren 56, 75, 158 Brachypodietum ramosii 181, 184 Bradysporie 31 Brutknollen 17 Brutkörper 9, 11, 14, 17, 163 Brutzwiebeln 18 Bulbillen 18*, 20, 59, 105
Anemochoren 33, 53-80, 176, 179, 181, 185 Angiospermen 10, 23 Anhafter 139-145 Anlockungsmittel 122 Anthropozoochoren 33, 147 Arillus 15, 23, 82, 123, 160, 179 Auen 184 Ausläufer 19, 36 Austrocknungsmechanismen 45, 46 Austrocknungsstreuer 38*, 41, 45, 46, 64, 184 Autochoren 33, 34-50, 112, 158, 159, 169 Axillen 124	C Capilitium 58 Caruncula 9, 15 Caryopse 15, 22 Chalaza 59 Chamaechoren 56, 73, 74, 161, 177 Chiropterochoren 97 Cotyledonen 82 Cupula 103 Cuscuto-Convolvuletum 184 Cuticula 83 Cystometeorochoren 57-59, 169 D
Balgkapseln 89 Ballistische Mechanismen 56, 75, 91 Ballochoren 36, 176, 185 Ballonflieger 57, 65, 70 Barochoren 33, 50-53, 112, 158, 159, 169, 180, 185 Basikarpie (basikarp) 24, 26*, 163, 178, 184	Darmwanderer 115-139 Diasporen 14 usw. Diplochorie 158 Drift 88, 95 Dynamikflieger 66, 67, 68 Dysochoren 97, 103, 104, 105, 107, 158, 163, 170, 174, 179, 185, 186 E Elaiosom (Oelkörper) 108-112, 114, 115

* mit Abbildung

Elateren 58 Hemiendochoren 115, 185 Elynetum 184 Herpochoren 48-50 Embryo 9, 10, 14, 57, 82, 103 Heterokarpie 20, 21*, 29, 161 Emergenzen 140 Heteromerikarpie 21*, 178 endemische Arten 176 Hybriden (hybridogen) 189, 190 Endochoren 34, 115-139, 145, 158, Hydrochoren 33, 80-89 160, 163, 169, 174, 176, 177, Hydrokarpie 28, 30 179, 182, 186, 189 Hygrochasie 27, 28, 178, 184, 185 Endokarp 11, 23, 87, 102, 123, hygroskopisch 48, 50, 62, 143 140 Hypanthium 162 Endosperm 83, 101, 102 Hypoderm 42, 43 Endotesta 122 Hypokotyl 9, 10, 50, 51, 82 ephemer 169 Epichoren 34, 139-145, 147, 158, 165, 167, 182, 185, 186 Ichtiochoren 96 Epiderm 40, 42, 43, 83, 84 Impatienti-Solidaginetum 184 Epikarp 23 Indehiszenz 162 Epiphyten 58, 111 Integument 15, 23, 87, 179 Erico-Pinetum silvestris 187 Ethelochoren 148, 149 K Evolution 24, 189 Exokarp 87, 102, 123 Karpide 162, 163 Kaulikarpie (kaulikarp) 24, 134, Exotesta 122 179 F Kenokarpie 149 Kollenchym 43 Fernverbreitung 158 Kriecher 34, 48, 178 Flieger 56-80 Kriechvorrichtungen 165 Flügelflieger 65, 70, 164 Kryptogamen 9 Flugweiten 70, 72 Kulturpflanzen 150 Funiculus 15 Kutikula 39 Kutinisierung 81, 85 G Gastropodochoren 96 Lägergesellschaften 182 Generative Verbreitungseinheiten Lappulo-Asperugetum 182, 183* Laubsprosse 18*, 19, 20, 52, 87 14, 22, 75 Genpool 190 Luftwiderstand 55 Geokarpie 28, 29, 30, 163, 178, Lumbricidochoren 97 184 Glazialflora 6 M Glazialfundstätten 6 Mammaliochoren 96 Gleitflieger 66 Mangrove 10, 50, 87, 180 Glirochoren 97 Mannbarkeitsalter 169, 171 Glochiden 124 Matricario-Lolietum 182, 183* Gymnospermen 10 Mesokarp 23, 41, 87, 123 Mesotesta 122 Meteorochoren 56-80, 158, 174 Haarschirmflieger 59, 60*-65, 164 Mikropyle 59, 123 Haftvorrichtungen 96 Mundwanderer 107 Heleocharetum acicularis 185 Myricario-Chondrilletum 95, 181 Hemerochoren 33, 147-160, 163, 169, Myrmekochoren 96 174, 176, 182, 189, 190 Myxospermie 166, 178, 184

N		S
Nabe	elschwiele 23	Saatgut 150
8 WESSEWE	eiszeit 6	Saatgutfälschung 151
175 175.015	verbreitung 158	Saatgutreinigung 155
	Political production of the production of	Saatgutverunreinigung 150, 151
	cochoren 81-89, 94, 161, 164,169,	A 100 CONTRACTOR OF THE CONTRA
	6, 179, 184	Saftdruckstreuer 37, 38*, 46
	phyten 174	Salzwasserpflanzen 82
	ellus 10	Samenkern 123
Nutz	pflanzen 174	Sammelfrüchte 15, 123
-		Saprophyten 9
0		Sarkotesta 15
0e1k	örper (Elaiosom) 108, 110*-	Saugmechanismen 37
11	XTI	Saurochoren 96
	ochoren 81-94, 158, 169,	Schirmflieger 65, 70, 181
	6-178	Schlagmechanismus 37
V		Schleuderhaare, hygroskopische 58
	ordetum acantii 182	Schleudermechanismen 37, 44
Orni	thochoren 96	Schüttelkletten 142
		Schwimmfähigkeit 87
P		Schwimmblasen 82, 87
Papi	llen 85	Schwimmer 81
	siten 9, 165	Schwimmgewebe 83-87
	nchym 40, 41, 83, 85	Sclerenchym 84
	gon 110, 111	Segelflieger 66, 67, 83, 84
	karp 104, 164	Selbstableger 34, 35, 164
	sperm 10	Selbststreuer 34, 41, 44, 94, 160,
	sitetum paradoxi 181, 183*	164, 177
	1 27	Speichergewebe 10
	iergesellschaft 181	Speirochoren 150, 155, 157, 182,
	enta 37, 43, 113, 162	189
	enanalyse 6	Spritzmechanismus 37, 41
	chorie 158, 160, 161, 169	Steinfrucht 15
	diasporie 20, 161	
	florales Wachstum 15, 48, 51,	Steppenpflanzen 28
	, 65, 76, 77, 78, 80	sterile Arten 19
1000	enchymatisch 42, 83, 84	Stolonen 19
	ometeorochoren 65, 79, 169	Stomatochoren 107-112, 158, 159,
Pulp	a 112	169, 176, 177, 186
		Stossmechanismus 43
Q		Strandpflanzen 175, 180
Ouet	schmechanismus 37, 39, 40, 41	Streuvorrichtungen 44
Quet	scimecianismus 37, 39, 40, 41	Streuweiten 45, 46, 47
R		Strömungsschwemmlinge 95
K		Stylarglied 161
Raph	e 9, 23	Sukzessionen 180
Rege	nballisten 91, 93	Sumpfpflanzen 120
Rege	nschwemmlinge 89	Symbiose, freie 186
	ktpflanzen 6	Synaptospermie 161, 162, 178, 184
	stossmechanismus 37, 40	
	ralpflanzen 174, 175	T
		m-1
		Tachysporie 31
		Teilfrüchte 15

Telechorie 158
Testa 57
Thermikflieger 64
Tierwanderer 95-147
Topochorie 158
Trampelkletten 140, 141*
Trichometeorochoren 59-65, 169, 179, 181
Trockenrasengesellschaften 184
Tromben 55
Tropenwälder 179, 180
Turbulenz 53, 54, 55
Turgeszenz 37, 41, 44
Turgor (-mechanismen) 37
Turionen 18*, 87

U

Ubiquisten 176, 180 Unbenetzbarkeit 82 Unkrautsamen 116, 152-154, 156, 160, 174, 175, 189 Utriculus 111

V

vegetativ 11, 17, 22, 75, 149, 177 vegetative Verbreitungseinheiten 22, 31, 87, 95, 105, 143, 147 Verbreitungsagentien 12 Verbreitungsdistanzen 169, 170, 171 Verbreitungseinheiten 14, 16 usf. Verbreitungsgrenzen 70, 71, 72 Verbreitungsmittel 23 Verbreitungsschranken 167, 168 Verbreitungsspektren 181, 183, 185 Verbreitungstypen 33 Verbuschung 182 Viviparie 20, 52

W

Waldgesellschaften 185
Wandergeschwindigkeit 169-172
Wanderzeiten 171
Wassergesellschaften 184
Wasserpflanzen 120
Wasserwanderer 80-89
Windstreuer 56, 75-77, 79, 142, 143, 164, 177
Windwanderer 53-80, 87
Wintersteher 66, 70, 72, 135, 143, 177
Wüstenpflanzen 28

X

Xerobrometum raeticum 184
Xerochasie (xerochas) 27, 58, 63,
65, 78, 176, 184
Zoochoren 33, 34, 95-147, 170,
176, 178, 182

Verzeichnis der lateinischen Pflanzennamen

Α

Abies 70
- alba 71, 170
Acanthus mollis 46
Acer 15, 26, 68, 70, 71, 72
- campestre 66
- platanoides 66, 68, 71

* mit Abbildung

- pseudoplatanus 11, 66, 68, 69*, 70, 71, 87, 163, 165, 170
Achillea lanulosa 189, 190
- millefolium 189, 190
Achyranthes aspera 145
Acorus calamus 19
Acriopsis javanica 111
Actaea spicata 138
Adansonia digitata 16
Adenanthera 124

Anchusa officinalis 157 Adenostyles 61 Adoxa moschatellina 130, 131, 132 Anemone - coronaria 57 Aechmea spicata 114 - hortensis 57 Aegilops 48 - ovata 16, 49*, 98, 162 - nemorosa 9 - triaristata 98 Angelica archangelica 7 Aesculus hippocastanum 10, 11, Angraecum 58 Angulosa ruckeri 50, 156 Aeschynanthes grandiflorus 59 Anonaceae 134 Aethionema heterocarpum 20 Antennaria 61 - saxatile 166 Anthemidae 166 Anthemis 157, 166 Agave americana 20 - rigida var. sisalana 20 - arvensis 116, 150 - austriaca 151 Agrimonia eupatoria 27, 142, 143 Anthurium scolopendrium 114 Anthyllis vulneraria 16, 73, 118, - odorata 178 Agropyron repens 19 119, 181 Agrostemma githago 116, 153, 189 Arabis corymbiflora 76 Agrostis tenuis 118 Araceae 114 Ailanthus glandulosa 67, 69, 71 Arachis hypogaea 29, 163 Aira 48 Arctium 142, 143, 145 Ajuga iva 110 Arctostaphylos alpina 32, 124 - pyramidalis 177 - uva-ursi 124 - reptans 19, 36, 110 Arceuthobium ocycedri 41 Alchemilla alpina 119 Aristida 48, 60, 165 - vulgaris 177 - obligantha 100 Alisma plantago-aquatica 83, 84, - stricta 100 88, 120 Aristolochia grandiflora 179 Alismataceae 10 Aristolochiaceae 134 Allium 18 Artemisia verlotorum 184 - carinatum 20, 22 Arthrolobium scorpioides 151 - oleraceum 20 Arundo donax 61 - scorodoprasum 20 Asarum europaeum 51, 52, 109 - vineale 18*, 20 Asclepia 61 Alnus 66, 98, 172 Asperugo procumbens 157 - glutinosa 84 Aspidosperma 71 - incana 172 - megalocarpon 179 - viridis 66 Asteriscus aquaticus 90 Alopecurus geniculatus 150 - pygmaeus 90 - pratensis 150 Asterocephalus 71 Astragalus 28, 73, 90 Alstroemeria psittacina 46 - alpinus 95, 119 Alyssum calycinum 98, 150, 166 Amaranthus retroflexus 151 - stella 90 Ambrosia elatior 151 Atriplex hortensis 116 Amelanchier ovalis 134 - oblongifolia 157 Ammi visnaga 151 - patula 7 Ammochloa involucrata 26, 163 Atropa belladonna 123, 130 Anacardium 16 Avena 149 - occidentale 88 - barbata 98 Anagallis arvensis 28, 35 - bromoides 98 - minima 139 - byzantina 149 Anastatica hierochuntia 28, 74 - fatua 150

Buchloë dactyloides 100 - sterilis 49, 162 - strigosa 149 Bunias orientalis 157 Avicennia officinalis 51 Bupleurum tenuissimum 151 Burmanniaceae 57 B Buxus sempervirens 43 Ballota nigra 151 CBarbaraea vulgaris 150 Barleria lichtensteiniana Cactaceae 124, 143 Barringtonia excelsa 86 Caesalpinia bonducella 82 - speciosa 86, 87 Cakile maritima 7, 89 Bauhinia purpurea 46 Calandrinia menziesii 44 Begonia 78* Calendula 73 - semperflorens 78 - arvensis 20, 21*, 157, 161 Bellis perennis 76, 77*, 132 Calla palustris 83 - silvestris 99 Calophyllum inophyllum 87, 88 Berberis thunbergi 137 Calosanthes indica 71 - vulgaris 128, 182 Caltha palustris 83, 89, 91, 94, - wilsoniae 138, 139 159 Berteroa incana 157 Berula 83 Camelina 148 Beta macrocarpa 162 - alyssum 152, 153 - maritima 178 - microcarpa 152 Betula 17, 66, 69*, 70, 98, - pilosa 152 170, 172 - sativa 152, 153 - odorata 172 Campanula 28, 76, 78 - pendula 66, 71, 145, 172 - cochleariifolia - pubescens 66 Campanulaceae 75 Biarum angustatum 29 Camprosoma pumila 158 - pyrami 29 Canavalia 88 Bidens 142, 174 Caragana arborescens 42 Bignonia echinata 67, 71 Carapa obovata 86 - unguis 71 - moluccensis 86 Bignoniaceae 67 Carapanthea pomeridiana 90 Biophytum 40 Cardamine 37 Biscutella levigata 65 - alpina 177 Biserrula pelecinus 162 - amara 46 Blightia 114 - bulbifera 20 Boerhavia repens 145 - chenopodiifolia Borago officinalis 110, 159 - hirsuta 46, 47 Brachypodium distachyon 157 - impatiens 37 Briza maxima 174 - parviflora 46 Bromeliaceae 114 - pratensis 19, 46 Bromus arvensis 157 - resedifolia 177 - commutatus 150, 153 Carduus 61, 98 - grossus 153 - nutans 108 - madritensis 157 - pycnocephalus 99 - mollis 150 Carex 82, 84, 85, 118, 119, 176 - multiflorus 153 - acuta 88 - racemosus 153 - arenaria 120 - secalinus 116, 153, 154 - canescens 88 - sterilis 150 - diandra 85

Brugiera 14, 50

- pubescens 48

Cerinthe major 162 - digitata 109, 111 Chelidonium majus 108, 109, 110, - dioeca 88 - elata 82 - flava 82, 88 Chenopodiaceae 121 - gracilis 88 Chenopodium 174, 189 - irrigua 119 - album 11, 98, 104, 116, 119, - lachenalii 119 120, 136, 150, 174 - maritima 7 - bonus-henricus 118, 177 - montana 111* - glaucum 157 - oederi 120 - vulvaria 157 Chondrilla prenanthoides 181 - ornithopoda 109 - panicea 88 Chrysanthemum 116 - paniculata 85 - alpinum 181 - halleri 95 - paradoxa 85* - pseudocyperus 82, 85 - leucanthemum 150 - verna 118 - maritimum 157 - vesicaria 82 Cichorium intybus 150 - vulpina 88 - pumilum 90 Carica papaya 114, 126 Cicuta 83 Carlina acaulis 26, 27, 62 - virosa 83 Carnegia gigantea 126 Circaea 142 Carpanthea pomeridiana 90 - lutetiana 178 Carpinus betulus 69*, 71, 87, Cirsium 61, 63, 164 164, 170 - acaule 26 Caryophyllaceae 75, 78 - arvense 65, 150 Carum carvi 118 - palustre 82 Cassia fistula 88 - vulgare 63* Castanea sativa 100, 103 Cistaceae 121 Catananche lutea 29 Cistus albidus 99 Cedrela brasiliensis 71 - monspeliensis Ceiba pentandra 57 Citrus 27, 123 Cenchrus tribuloides 140 Cladium mariscus 83, 88 Centaurea 157 Claytonia sibirica 44 - algeriensis 157 Clematis vitalba 32, 60, 72, - cyanus 48, 116 146* - diffusa 73 - alpina 60* - jacea 118 Clerodendron inerme 86 - maculosa 151 Cnicus lanceolatus 65 - melitensis 26* Cochlearia officinalis 7 - montana 110 Cochlospermum orenocense 71 Cocos nucifera 81, 86*, 88 - solstitialis 151 Centaurium pulchellum 139 Codonanthe formicarum 114 Cephalotaxus 122 - uleana 114 Cerastium caespitosum 118, 119, Coffea 25*, 126 150, 177 Colchicum autumnale 109, 112, 118 fontanum Colutea arborescens - pendunculatum 119 Comarum palustre 83, 84, 88 - pumilum 98, 140 Combretum 71 Compositae 76, 166, 179 - semidecandrum 140 Ceratophyllum demersum 165 Conocarpus erectus 86 Cerbera odollam 86 Convolvulus arvensis 136 Cercis siliquatrum 24

- sepium 88

Corallorrhiza innata 58 - fuscus 139 Cordia subcordata 86 Cypripedium calceolus 29*, 58 Cytisus scoparius 42 Cornus mas 127 - sanguinea 128, 135, 136 Dactylis glomerata 150 Coronilla scorpioides 157 Daphne mezereum 24, 25*, 179 - varia 15, 150, 151 - striata 113 Coryanthes macrantha Datura stramonium 174 Corydalis 115 Daucus aureus 21 - cava 110* - carota 143, 150 - intermedia 109 Delphinium consolida 116, 151 - nobilis 109 Dendrochilum pallideflavescens 111 - sibirica 46 Derris 82 - solida 110 Deschampsia 48 Corylus arvellana 99*, 100, 102, .- caespitosa 145, 150 106, 171 - litoralis 20, 52, 87 Corynephorus 48 Diapensiaceae 57 Cotoneaster horizontalis 137 Digitaria ischeamum 151 - integerrima 135 Diospyros virginiana 136 - tomentosa 135 Dispsacus silvester 142 Crambe maritima 89, 161 Disa steiersii 59 Crataegus 123, 128, 135 Dorstenia contrayerva 38*, 40, 46 - monogyna 126 Draba aizoides - oxyacantha 126 Dracocephalum thyrsiflorum 166 Crepis 61 Drosera rotundifolia 60* - biennis 150 Droseraceae 57 - foetida 157, 163 Dryas octopetala 60 - nemausensis 99 Durio testitudinarum 130 - paludosa 164 - zibethinus 125, 132 - taraxacifolia 150 Crithmum maritimum 89 Crocus albiflorus 51, 52 Ecballium elaterium 38*, 41, 46 Crozon 100 Eccremocarpus scaber 71 Cruciferae 76 Echinaria capitata 162 Cucumis 16 Echinochloa crus-galli 151, 157 - humifructus 29, 126, 134,163 Ectozoma ulei 114 Cucurbita 16, 88 Eichhornia crassipes 19, 87 Cuphea viscosissima 151 Elaeagnus spinosa 137 Cuscuta epithymum 119, 150, 189 Elatine hydropiper 139 - racemosa 151 Elenaceae 134 Cuscutaceae 121 Elodea s. Helodea Cyas circinalis 87 Elymus arenarius 7 Cyclamen europaeum 112, 113* Elyna myosuroides 176 Cyclanthera explodens 38*, 39, Emex spinosus 26, 29 45, 46 Empetrum 7 Cyclotaxis 22 - nigrum 119, 120, 127 Cynara scolymus 71 Enalus acoroides 14 Cynareae 62 Entada 71 Cynoglossum officinale 142, 143 - polystachia 179 Cynometra cauliflora 86 - scandens 88, 168 Cynosurus cristatus 118 Epilobium alsinifolium 19 - echinatus 157 - fleischeri 181 Cyperaceae 136 - hirsutum 65

Cyperus flavescens 139

- montanum 65 Fragaria 123 - ananassa 127, 137 - palustre 65 Epipactis palustris 28, 58 - vesca 16, 22, 36, 124, 127, Epipogum nutans 58 130, 133, 134 Eranthis hiemalis 9, 91, 93, 94 Fraxinus excelsior 26, 31, 66, Ericaceae 57 68, 70, 71, 72, 87, 170 Erigeron 174 Fritillaria 18 - acer 181 Fumana 28 - alpinus 60* - ericoides 99, 165 - droebachiensis 181 - viscida 99, 165 Eriophorum 61 Fumaria officinalis 116 - angustifolium 65 Erodium 44, 48, 60, 165 G - cicutarium 99, 165 Gagea 18 Erophila verna 32 Galanthus nivalis 51, 109 Erucastrum nasturtiifolium 95, Galium - aparine 116, 142, 143, 145, 150 Eryngium campestre 16, 22, 24, - mollugo 176 73, 74* - odoratum 142 Erysimum repandum 157 - palustre 88 Eupatorium 61 - pumilum 117, 119 - cannabinum 65 - spurium 154 Euphorbia 15, 110, 112, 159 - vernum 176 - characias 110 Galinsoga 174 - helioscopia 46 Garcinia mangostana 126 - lathyris 45 Gentiana asclepiadea 67, 69* - peplus 110, 169 - bavarica 78 - preslii 151 - campestris 117, 118 - segetalis 99 - clusii 79*, 80 - virgata 157 - cruciata 117, 119 Euphorbiaceae 43, 100, 134 - kochiana 80 Euryale 82 - nivalis 32 Evanogrostis 100 Geraniaceae 23, 121 Evonymus 23, 122 Geranium 44, 160 - europaea 123, 133 - bohemicum 11, 16, 17, 42 - latifolia 123 - columbinum 16, 44, 46 Excoecaria agollocha 87 - dissectum 44 - molle 16 - palustre 46 Fagaceae 9 - phaeum 16 Fagus silvatica 11, 17, 50, 100, - purpureum 48 102, 107, 171 - pusillum 16, 116, 150 Faktorovskya aschersoniana 29 - pyrenaicum 46 Fedia cornucopiae 22, 73 - robertianum 16, 17, 46, 48, 160 Ferocactus wilizeni 126 - rotundifolium 16, 46 Festuca pratensis 150 - sanguineum 16, 44 - rubra 7, 118 - silvaticum 16, 38*, 44, 46 Ficus 126, 133 Gesneriaceae 57 - bengalensis ll Geum montanum 60 - carica 123, 127 - reptans 36, 60 - paraënsis 114 - rivale 140, 143 - sycomorus 125 - urbanum 140, 143

Gingko 15, 122, 123, 149 Honkenya peploides 7 Glaucium corniculatum 151 Hordeum 48, 149 Glaux maritima 120, 139 - distichon 149 _ hexastichon 149 Glechoma hederaceum 36 Glyceria fluitans 139 - murinum 22 Gonanthus pumilus 60 - vulgare 149 Goodyera repens 58 Humulus lupulus 66 Gossypium 57, 60* Hura crepitans 43, 46 Gramineae 160 Hydnophytum formicarum 114 Guayanita 130 Hyoscyamus albus 78 Guettarda speciosa 86 - niger 78 Gymnadenia conopea 58 Hypericum maculatum 17 Gypsophila repens 95, 181 - perforatum 100 Hyphaene cariacea 126 H Hypochoeris radicata Hyssopus officinalis 166 Halesia tetraptera 71 Haplotrichium 59 I Harpachne schimperi 145 Hedera helix 134, 137 Iberis 28 Hederma pulegioides 151 - ciliata 91 Hedypnois cretica 16, 22, 73, 99, - pinnata 91* 157, 163, 184 - umbellata 91, 92 Heleocharis palustris 120 Ibicella lutea 140, 141* - acicularis 139 Ilex 27 Helianthemum 119 - aquifolium 124, 135, 156 - alpestre 118, 121 Impatiens 37, 39 - ellipticum 165 - glandulifera 95, 184 - nummularium 28, 118 - parviflora 38*, 44, 46, 174, 184 - salicifolium 99 - roylei 46 Helianthus annuus 99*, 104 Inulae 166 - tuberosus 184 Inula britannica 157 Heliocarpus americanus 61 - salicina 65 Helleborus foetidus 108, 109 Ipomoea glandulifera 61 - purpurascens 109 Iris chamaeiris 98 _ Pseudacorus 83, 84*, 88 Helodea canadensis 19 Hepatica triloba 51, 109, 110, Isolepis setacea 139 111*, 112 Heracleum sphondylium 65 Heritiera litoralis 82 Juglandaceae 102 Hibiscus tiliaecus 88 Juglans regia 100, 102 - trionum 151 Juncus articulatus 139 Hieracium 61, 71, 164 - bufonius 139 - pilosella 19, 36 - compressus 139 - piloselloides 181 - tenuis 140 Hippocastanaceae 9 - trifidus 7 Hippocrepis Juniperus 23, 126, 134 - ciliata 184 - communis 17, 135 - comosa 119, 184 - sabina 135 - multisiliquosa 99, 162 - unisiliquosa 162 Hippophaë rhamnoides 74, 75, 138 Holosteum umbellatum 32

K	
	Liparis loeselii 58
Kalanchoë daigremontiana 19, 167	Liriodendron tulipifera 68, 71
Kandelia 50	Lithospermum arvense 104, 116,
- rheedii 14, 51*	150
	- purpureo-coeruleum 36
$oldsymbol{L}$	Lodoicea seychellarum 10, 17, 81
Tabiatas 166	Lolium perenne 118, 176
Labiatae 166	- remotum 153
Lactuca saligna 151	- temulentum 153
- serriola 157	Lonicera 128
- virosa 65	Loranthus 165
Lagenaria 88	Lotus 42, 160
Laguncularia racemosa 86	- corniculatus 38*, 177
Lamium album 110, 112	Lumnitzera coccinea 86
- maculatum 110, 111*	- racemosa 86
- purpureum 112	Lunaria 27
Lappula 142, 143	Lupinus arcticus 11
- deflexa 145	- digitatus 46
- myosotis 142*	Luzula campestris 108, 118
Lapsana communis 157	- forsteri 109
- intermedia 157	
Larix decidua 147	- multiflora 119
Lathraea clandestina 40, 46	- pilosa 51, 109, 110, 111*, 177
Lathyrus 28, 42	- spadicea 119
- montanus 177	Lycoperdon 71
- pratensis 42, 118	Lycopodium 71
Lavandula stoechas 166	Lygaeum spartum 162
Leguminosae 9, 121, 160	Lysimachia nemorum 36
Lemna 87	- nummularia 19
- minor 19	- thyrsiflora
Leontodon hispidus 60*	- vulgaris 31
Leontopodium 61	Lythrum 166
Leonurus cardiaca 142	- hyssopifolia 151
Lepidium 27, 28, 157	- salicaria 139
- campestre 150, 151	
- sativum 153	М
- virginicum 136	Machaerium angustifolium 71
Leucoium vernum 51	Macrozanonia macrocarpa 66, 179
Ligustrum vulgare 31, 128, 135,	Magnolia 27
136	Maianthemum bifolium 135, 138
Lilium bulbiferum 20	Malaxis paludosa 17
Limosella aquatica 139	Malvaceae 100, 121
Linaria alpina 95, 181	Malva parviflora 136
- cymbalaria 35	Mammilaria 143
- elatine 151	- prolifera 124
- minor 100	Mangifera indica 123
- spuria 35	Marckea formicarum 114
Lindernia pyxidaria 139	
Linnaea borealis 16, 140	Matricaria suaveolens 157
Linum angustifolium 148, 165	Medicago 27, 98, 100, 140, 151,
- catharticum 118	155, 162, 184
	- denticulata 151
- grandiflorum 165	- disciformis 141*, 162
- usitatissimum 148	- lupulina 118, 119, 150, 151

- marina 27 Najas 29 - minima 162, 178, 184 Narcissus poeticus 51 - orbicularis 73, 162 Nelumbium nuciferum 11 - sativa 151 Nepenthaceae 57 - scutellata 73, 157, 162 Nephelium litchi 126 - tribuloides 141* Neurada procumbens 162 Melampyrum 115, 177 Nidularium myrmecophilum 114 - arvense 110, 150 Nigella arvensis 151 - silvaticum 110, 177 Nipa fruticans 86 Melica 115 Nonnea lutea 51, 110 - nutans 108, 109, 111* Nuphar 82 - uniflora 109 - luteum 88 Melilotus albus 15 Nymphaea 82 - indicus 151 Nymphoides peltata 29, 85, 142 Menispermaceae 134 Mentha pubescens 88 0 Menyanthes trifoliata 83, 88, Ocimum basilicum 93 119, 120 Odontospermum 28 Mercurialis 112 Oenanthe aquatica 83 - annua 46 Oenothera biennis 174 - perennis 46 - rosea 90 Mertensia maritima 7 Onobrychis caput-galli Mesembryanthemum 28, 94, 178, - sativa 150 187 Opuntia 124, 126, 130 - acinaciforme 187 - ficus-indica 174 - edule 187 Orchidaceae 9, 10, 23, 57, 58, Mespilus germanica 136 111, 179 Mimulus guttatus 174 Orchis 28, 60* Moehringia muscosa 109 - latifolia 58 Montia 44 - maculata 17 - fontana 46 Origanum vulgare 15 Moraceae 134 Ornithogalum umbellatum 51, 109, Morinda citrifolia 82 112, 159 Morisia hypogaea 29 Ornithopus compressus Mucuna 82 Orobanchaceae 9, 75 Musaceae 10 Orobanche teucrii 28 Muscari neglectum 98 Oxalis 39 Myosotis alpestris 118 - acetosella 38*, 46, 48 - arvensis 116 - europaea 46 - palustris 82 Oxytropis 73 - silvatica 145 - sparsiflora 110, 111* - stricta 17 Myricaria germanica 61, 181 Paliurus spina-cristi 67 Myriophyllum 29 Palmaceae 10 - verticillatum 18*, 87 Pancratium maritimum 84 Myristica fragrans 15, 129 Panicum 100 Myrmecodia echinata 114 - capillare 151 - sanguinale 100 Papalia lappacea Papaver 76 - somniferum 71, 76, 77, 116, 148 Papaveraceae 75 - rugelii 151 Poa alpina 18*, 19, 20, 52, 95, Paphiopedilum charlesworthi Papilionanthe 58 118 Parietaria lusitanica 110 - annua 118 Paris quadrifolia 9, 130 - bulbosa 19, 20, 52, 167 Paronychia argentea 162 - pratensis 19, 118, 119, 176 - trivialis 100, 118, 132, 150 Parthenocissus inserta 124 Paspalmum 100 Polycarpon tetraphyllum 44 - ciliatifolium 151 Polygala amarella 108 Pavonia schimperiana 112, 142 - monspeliaca 110 Pedicularis 177 - vulgaris 110, 118 Pelargonium 44 Polygonum 100 Pemphis acidula 86 - aviculare 35, 117 - capitatum 111* Pereromia nematostachya 114 Petasites 27, 65 - convolvulus 174 Phajus flavus 58 - cuspidatum 184 Phalaris 16 - lapathifolium 117, 154, 174 - canariensis 157 - persicaria 151 Philodendron myrmecophilum 114 - virginianum 40 Phleum alpinum 118, 119, 145 - viviparum 19, 20, 105, 118 - pratense 151 Polytrichum 71 Phlomis herba-venti Pongamia 82 Phragmites communis 32, 36, 60* Populus 11, 61 - tremula 32, 65, 170 Phyllocactus phyllanthus 114 Posidonia oceanica 120, 164 Phyllocladus 23 Potamogeton 18, 136 Physalis alkekengi 75, 123 - natans 83, 88 - lanceolata 151 - oblongus 120 Picea excelsa 17, 69*, 71, 72, - polygonifolius 120 104, 164, 170, 171 Potamogetonaceae 10 Picris echioides 151 Potentilla anserina 36 Pilea sprucea 46 - aurea 117, 119 Pimenta vulgaris 187 - erecta 119 Pinus 101, 104, 105 - norvegica 151 - cembra 100, 101, 105 - repens 36 - silvestris 17, 69, 70, 71, 101, - reptans 19, 22, 36 170-173 Primula 76 Piperaceae 10 - elatior 28. 78 Pirus ll - farinosa 78, 80 - communis 137 - vulgaris 28, 110, 111*, 112 - malus 126, 137 Primulaceae 75 - piraster 136 Proboscidea 140 Piscida erythrina 88 Protea 26 Pisum fulvum 29 Prunella 28, 159 Pitcairnia flavescens 71 - laciniata 151, 166 - imbricata 71 - vulgaris 93, 118, 136, 150, 159, Plantago 28, 166 166 - alpina 117, 119 Prunus 27, 103, 124, 134 - avium 127, 128*, 130, 133, 137 - arenaria 151 - aristata 151 - domestica 126, 128 - lanceolata 116, 117, 118, 150

- major 28, 98, 118, 150, 177, 189

- spinosa 127, 135, 136 - canina 31, 137 Psidium guajava 126 - pomifera 176 Ptelea trifoliata 71 Rosaceae 23 Rosmarinus officinalis 99, 109, 166 Pteroneurum graecum 46 Rubiaceae 67, 114 Pulicaria dysenterica 65 Pulmonaria officinalis 51 Rubus 15, 123, 124, 128, 130, 133, 134, 137 - maculosa 110 Pulsatilla 23, 27, 48, 60, 65 - bifrons 36 Puschkinia 110 - caesius 36, 130 - scilloides lll* - chamaemorus 119, 127 Pygeum 126 - fruticosus 137 Pyracantha coccinea 124 - idaeus 127, 128, 130, 137, 138 Pyrola uniflora 28 - saxatilis 36 Pyrolaceae 9, 10, 57 - tomentosus 128 Rudbeckia Q - hirta 184 - laciniata 184 Quercus 100, 156 Rumex 84, 160, 189 - robur 11, 17, 103, 171 - acetosa 70, 117, 119 - velutina 187 - acetosella 104, 117, 150 - alpinus 65 R arifolius Ranunculus 121 - bucephalophorus 27, 142, 144*, - acer 118, 177 - arvensis 150, 157 - conglomeratus 88 - ficaria 9, 17, 20 - crispus 88, 150, 151 - flammula 88 - hydrolapathum 84 - lanuginosus 140 - intermedius 69*, 70, 144* - montanus 118-119, 122 - obtusifolius 118, 143, 150, 151, - repens 119 155, 189 - reptans 18*, 19, 36, 82 - vesicarius 162 - sardous 157 Rutaceae 43 - sceleratus 84 Raphanus raphanistrum 117 Rapistrum perenne 73 Saccolabium 58 Remusatia vivipara 143 Sagina linnaei 7 Rhinanthus 147, 154 - saginoides 119 - alectorolophus 154 Sagittaria sagittifolia 83, 84, - major 154 88, 120, 136 Rhizophora 14, 15, 50 Salix 60*, 61, 146 - mangle 50 - aurita 65 Rhododendron 23 - caprea 32, 170 Rhus glabra 136 - herbacea 11 Ribes 128, 134 - lapponum 6 - rubrum 137 - pentandra 65 - sanguineum 136 - repens 65 - uva-crispa 127 Salsola kali 73, 162, 178 Roripa amphibia 139 Salvia 28 - islandica 139 - aegyptiana 166 - silvestris 139 - glutinosa 140 Rosa 126, 128, 135 - sclarea 166 - abessinicum 126 - verticillata 151, 157

- viridis 93 - venosa 151 Sambucus nigra 128, 133, 134, - vulgaris 27, 119, 151 137, 188 Silybum marianum 63 Samolus valerandi 139 Sinapis arvensis 11, 117 Sanguisorba 150 Sisymbrium 27 Sanicula europaea 143 Solanum dulcamara 127, 130, 135 Sapindaceae 114, 134 - lycopersicum 16, 123,127, 130 Sapotaceae 134 - nigrum 130, 137 Saxifraga aizoon 36 - tuberosum 17 - amphibia 6 Solidago 174 - lapponum 6 - canadensis 184 - cernua 19 - serotina 184 - cuneifolia 36 Sonchus asper 100, 155, 156, 160 - tridactylites 140 - oleraceus 65, 86, 155, 156*, 160 Saxifragaceae 57 Sonneratia 86 Scabiosa columbaria 48, 60* Sophora tomentosa 87 Scaevola koengii 86 Sorbus 27 Scandix 22 - aria 124, 135, 136 Scheuchzeria palustris 83 - aucuparia 124, 127, 128, 133-Schoenoplectus setaceus 139 135*, 137* Scilla bifolia 51, 52*, 109, 112, Sparganium 83 159 - ramosum 84, 88 Scirpus maritimus 83, 84, 139 - simplex 88 Scleropoa rigida 98, 157 Spergula arvensis 150 Scorconerinae 62 - maxima 153 Scorpiurus subvillosus 98 Spergularia arvensis 11, 150 - sulcatus 162 Spirodela 87 Scrophulariaceae 75 - polyrrhiza 18 Scutellaria columnae 93 Stachys germanica 151 - galericulata 88, 93, 159 Stanhopea oculata 58 Scyphiophora hydrophyllacea 86 Statice echioides 162 Sedum acre 90 Stellaria graminea 150 Senecio silvaticus 65 - media 7, 100, 150 - vulgaris 65, 100, 169 Stenhammaria maritima 35 Senecioniae 166 Sterculiaceae 134 Serapias cordigera 58 Stilbocarpa polaris 158 Seseli tortuosum 16, 22, 73 Stipa 48, 165 Setaria germanica 151 - gallica 98 - glauca 150, 151 - joannis 60* - italica 151 Stratiotes aloides 19, 87 - viridis 100 Streptocalyx angustifolius 114 Sibbaldia procumbens 32, 119, 121*, Surina maritima 88 176 Swertia perennis 6 Sida spinosa 151 Symphoricarpos albus 127, 136 Sideritis 28 Symphytum officinale - montana 151 - bulbosum 110 - romana 99 Syringa vulgaris 11 Siegesbeckia orientalis 140 Silene 28, 76, 78 - dioeca 28, 118 Taraxum 26, 61, 65, 147, 155 - gallica 151 - officinale 60*, 65, 71

- maritima 7

Taxus 23, 122 Tyrimnus leucographus 99 - baccata 15, 137, 160 Temoca stans 71 Terminalia catappa 86 Ulmus 67 Teucrium lamifolium 93 scabra 66, 67, 69*, 87, 170, Thelygonum 115 172, 173 Themeda triandra 145 Urtica dioeca 98, 118, 122, 176, Thesium 112 189 - alpinum 111*, 112, 177 Utricularia 18, 87 - pyrenaicum 112 - rostratum 113 Thlaspi perfoliatum 92*, 94 Thymus 28 Vaccinium 124, 128 - vulgaris 99 - myrtillus 119, 124, 127, 128, Tilia 16, 17, 48, 69 130, 133 - platyphyllos 69* - uliginosum 119 Tillandsia 179 - vitis-idaea 124, 127, 128, 136 Torilos nodosa 21*, 151 Vanda 58 Tournefortia argentea 86 Verbena officinalis 151 Tragopogon pratensis 61*, 62 Veronica 115, 117, 119 Tragus racemosus 157, 162 - agrestis 110 - anagallis-aquatica 90, 139 - berteronianus 145 Trapa natans 165 - arvensis 90, 118 Treculia 103 - beccabunga 90 Tribulus terrester 140, 162 - bellidioides 119 Trichosporum 59 - chamaedrys 90, 177 - filiformis 19, 174 Trifolium 98, 119, 120, 160 - alexandrinum 149 - hederifolia 35, 108, 109 - alpinum 16 - officinalis 118 - angustifolium 157 - persica 35, 174 - badium 16, 117, 118 - polita 110 - cherleri 162 - scutellata 90 - dubium 15 - serpyllifolia 90, 118, 177 - montanum 118, 121 - verna 90 - pratense 118, 150 Viburnum opulus 135, 136, 156 - repens 117, 118, 121*, 132, 150, Vicia 28, 42, 117 155, 160, 177, 188 - amphicarpa 29, 30* - stellatum 48 - dasycarpa 157 - subterraneum 29, 30*, 35 - hirsuta 117 - thalii 95, 100, 177 - sepium 42 Trigonella monspeliaca 90, 98 - villosa 157 Tripleurospermum maritimum 7 Victoria 82 Triticum 48, 149 Vigna lutea 82 - dicoccum 149 Vinca major 36 Vincetoxicum 61 - monococcum 149 Viola 43, 107, 112, 117, 159, 177 - spelta 149 Tunica prolifera 151 - arvensis 45, 46 Turnera ulmifolia 114 - biflora 119, 177 Tussilago farfara 27, 32, 62*, 64*, - calcarata 177, 184 65 - canina 43, 46 Typha 61, 164 - elatior 43, 46, 108 - latifolia - lutea 108

- odorata 36, 110
- pubescens 109
- riviniana 46
- silvestris 43, 46
- suavis 109
- tricolor 38*, 43
Viscum 165
- album 128, 133, 135
Vitis vinifera 123, 128, 137

W

Wistaria sinensis 46 Wolffia 87 Wollastonia glabra 86, 88 Wullschlaegelia ulei 58 X

Xanthium 142, 162
- strumarium 141*
Xeranthemum foetidum 151
Ximenia americana 87

 \boldsymbol{z}

Zanonia javanica 67, 71 Zeuxine reflexa 58 Zostera marina 120 Zygophyllum cornutum 140, 162

Verzeichnis der deutschen Pflanzennamen

(Die vollständige Liste der Arten ist unter den lateinischen Namen zu finden.)

```
Eibe 160, 171
                                      Eiche (Eichel)
                                                      17, 100, 101, 105,
Agave 16, 174
                                        106, 171, 188
Alexandriner Klee 149
                                      Einkorn 149
Ahorn 69*
                                      Emmer 174
                                      Enzian, stengelloser 79*
Alpenleinkraut 95
Apfel 123, 149
                                      Erdbeere 124, 130, 132, 133, 134,
Arve 105, 106, 171, 187
                                        136
                                      Erdnuss 29, 163
                                      Erle 70, 159
Banane 149
                                      Esche 68, 70, 72, 159
Baobab 16
                                      Esparsette 150
Baumwolle 57, 148
Begonie 19
                                      F
Beifuss, Verlotscher
Bergahorn 69*
                                      Feige 114, 125, 126, 134
Bergulme 69*
                                      Feldmannstreu 74*
       17, 69*, 70, 171
                                      Felsenmispel 134
Birke
                                      Fichte 69*, 70, 72
Bocksbart 61*
                                      Flachs 148, 152
Brennessel 98
Breitwegerich 98
                                      Föhre 17, 69
Brombeere 123, 134
Brotfruchtbaum 103
Buche (Buchecker) 17, 50, 101, 107,
                                      Gänsedistel 156*
  171, 187
                                      Gartenkresse 153
                                      Gemshorn 140
D
                                      Getreide 149
Dattelpalme 148
                                      Gingkobaum 149
Distel 98
                                      Goldruten 184
Dumpalme 161
                                      Götterbaum 69*
Durian 125
                                      Gottesauge 78
                                      Guajanitabaum 130
E
                                      Guave 126
                                      Gurke 134, 149
Efeu 134
Edelkastanie 100
                                      H
Ehrenpreis 174
                                      Hafer 149, 154
                                      Hagebutten 123, 126, 136
                                      Hainbuche 69*
                                      Hängebirke 69*
* mit Abbildung
                                      Hasel (Haselnuss) 100, 101, 171
```

Heckenrose 126 Heidelbeere 124, 132 Hickory-Baum 188 Himbeeren 134, 138 Holunder 134, 188 Holzapfel 126 Holzbirnen 136 Honigspringkraut 184 Hornklee 38* Hornkraut 140 Huflattich 62*	Magnolie 27, 122 Mais 188 Mangostane 125 Mannstreu 74* Massliebchen 77 Maulbeerbaum 82 Maulbeerfeigenbaum 125 Meerkohl 161 Meersenf 7 Mehlbeere 136 Melonenbaum 126 Mispel 136 Mistel 128
Igelsame 142*	Mittelmeerhafer 149 Mohn 76, 148 Moschuskraut 131, 132
J	Muskatnuss 129
Johannisbeere 134	
Judasbaum 24	N
K	Nadelbinse 103, 185, 188 Nadelgräser 100
Kaffestrauch (Kaffee) 24, 25*, 126, 148	Nelkenpfefferbaum 187
Kabokbaum 57	0
Kakaobaum 24, 148	Olive 148
Kiefer 70, 107, 173	Orange 126
Kirsche, 126, 128, 130, 133, 134	Oelpalme 129, 148
Klee 117, 149, 150, 100 Klettenlabkraut 154	
Kokospalme (-nuss) 10, 81, 86*, 87,	P
107, 148, 164, 175	Palme 10
Korallenbaum 124	Papaya 126
Korallenkaktus 124	Pappeln 171
Korinthen 149	Pfaffenhütchen 133
Kornrade 153	Preiselbeeren 124, 136
Kratzdistel, gemeine 63*	
Kresse 153	R
Kryptogamen 9	Rauhafer 149
L i	Rauschbeere 127 Reiherschnabel 165
Labkraut 154	Roggen 154
Lein 148, 152, 153	Rose 123
Leindotter 148, 152 Leinkraut 95	Rose von Jericho 74
Lerchensporn, hohlknolliger 110*	Rosskastanie 50 Rotklee 150
Liguster 128	WOCKIEG IOO
Linde 17, 69*, 70	S
Luzerne 151	
Lysiloma 126	Sandbüchsenbaum 43 Sanddorn 74 Sandhafer 149

```
Z
Sauerklee 38
Schilf 32
                                      Zibethbaum 132
Schlafmohn 148
                                      Zwetschge 126
Schlehdorn 127
Schliessmohn 148
Schneeball 156
Schwalbenwurzenzian 67, 69*
Schwarzeiche 187
Sommerlinde 69*
Sonnenblume 104
Sonnenhut 184
Spelz 149
Springkraut 37, 44, 184
Springkraut, einblütiges
                        38, 44, 184
Spritzgurke 38*, 41
Stachelbeere 127
Stechpalme 156
Steinbrech 154
Stiefmütterchen
Storchschnabel 38
Т
Täschelkraut, durchwachsenes 92*
Tollkirsche 123
Topinambur
           184
Traube 128
Tulpenbaum 68
Ulme 69*, 173
Vogelbeere 128, 134, 135
Wachholder (-beere) 17, 126, 134
Walderdbeere 124, 133
Waldföhre 17, 69
Waldrebe 72, 146
Waldstorchschnabel 38
Walnuss 100
Walzenkakteen 143
Wasserpest 19
Wasserhyazinthe 87
Wegerich 98
Weide 146, 154, 171
Weintraube 188
Weissdorn 126
Weissklee 117, 150, 188
Wiesenbocksbart 61*
Wiesenschwingel 150
```

Winterroggen 154

Verzeichnis der deutschen und lateinischen Tiernamen

Aegithalos caudatus 146 Affen (Simiae) 125, 134, 179 Alces-alces 128 Alpendohlen (Pyrrhocorax graculus) 138 Alectoris graeca 133 Ameisen (Formicidae) 177, 185 Amblyornis subalaris 147 Amblyrhynchus demarlii 130 Amsel (Turdus merula), 32, 134, 136, 137, 160 Anas 98 - platyrhynchos 133 Anatidae 98, 120 Aphaenogaster 98 Apodemus flavicollis 107 - silvaticus 98, 101*, 103, 107, 127, 133 Apteryx 129 Arianta arbustorum 132 Arion empiricorum 130, 133	C Camponotus 115 - cruentatus 109 - femoratus 114 Capra hircus 133 Carduelis cannabina 98 - carduelis 98 - flammea 146 - hortensis 132 Cepaea nemoralis 132 Cervus elephas 107 Chardarius vociferus 136 Cirripedien 164 Columba livia 133 - palumbus 103, 133 Corvus 102 - corax 133 - frugilegus 103 Cricetus cricetus 98 Ctenopharyngodon idella 120
Azteca olitrix 114	Cyprinus auratus 120
- traili 114	D
- ulei 114	
B Bachstelze (Motacilla alba) 139 Bär, brauner (Ursus arctos), 128, 133, 136, 138 Bananenfresser (Musophagidae) 129 Bekassine (Gallinago gallinago) 133 Bergfink (Fringilla montifringilla) 103 Bindespechte (Centurus) 103	Dachs (Meles meles) 128, 133, 138 Dicaeidae 129 Distelfink (Carduelis carduelis) 98 Dohlen (Corvus monedula), 129, 139 Dromedar (Camelus dromedarius) 116, 119 Drosseln (Turdus) 129, 130, 133, 136 Dryobates major (Dendrocopos) 98,
Birgus latro 107 Birkenzeisig (Carduelis flammea) 146 Blattnasen (Phyllostomatoidae) 125 Bluthänfling (Linota cannabina) 98 Bombycilla garrulus 134 Brachvogel (Numenius aquata) 133 Buchfink (Fringilla coelebs) 103 Buntspecht, grosser (Dryobates major) 98, 102 - 104	Echsen (Lacertillia) 130 Edelhirsch (Cervus elaphus) 107, 118, 119, 120 Eichelhäher (Garrulus glandarius) 103, 106, 187

Eichelspecht (Melanerpes formici- voris) 103 Eichhörnchen (Sciurus vulgaris) 98, 102, 103, 104, 106, 127, 187, 188 Eidechse 130 Elch (Alces alces) 128	Glis glis 98, 102, 127, 128 Gorilla (Gorilla engena) 126 Graskarpfen (Ctenopharyngodon idella) 120 Griechische Schildkröte (Testudo graeca) 130
Elefant (<i>Elephas</i>) 119, 125, 126, 138 <i>Eliomys quercinus 126-128, 133</i> Elster (<i>Pica pica</i>) 133	Gypsiheirax angolensis 129 Grüntauben (Treror) 124
Enten (Anatidae) 98, 120 Equus asinus 119	н
Ephebomyrmex imberbiculus 100 Erdferkel (Orycteropus afer) 126, 134 Erithacus rubecula 133 Ernteameisen 98, 99, 105, 107, 161 Erolia minuta 136 Esel (Equus asinus) 119 Euphonia violacea 129	Häher (Garrulus u. Nucifraga) 98, 102, 103, 185, 187, 188 Halbaffen (Prosimea = Lemuroiden) 125, 179 Hamster (Cricetus cricetus) 98 Haselmaus (Muscardinus avellanarius) 98, 102, 127 Hasen (Lepus) 127, 145 Haushuhn (Gallus domesticus) 104
Feldhase (<i>Lepus europaeus</i>) 126	Hausrotschwanz (Phoenicurus ochru- ros) 133
Feldhühner 163 Feldsperling (<i>Passer montanus</i>) 98	Haussperling (Passer domesticus) 104
Fichtenkreuzschnabel (<i>Loxia</i> curvirosta) 104 Fische (<i>Pisces</i>) 120	Hausziege (Capra hircus) 133 Heidelerche (Lulula arborea) 133 Helix pomatia 130, 133
Fledertiere (<i>Chiroptera</i>) 179 Flughunde (<i>Megachiroptera</i>) 96, 124, 125, 129	Helmvögel (Turacus) 129 Heuschrecken 120 Homo sapiens 102, 133
Föhrenkreuzschnabel (Loxia pityopsit- tacus) 104 Formica 113, 115, 147 - rufa 109, 115	Huhn (Gallus gallus) 104 Hühnervögel (Galli) 105, 133 Hund (Canis familiaris) 143 Hypsignatus monstrosus 125
Fruchttauben (<i>Duculinae</i>) 129 Fuchs (<i>Vulpes vulpes</i>) 128, 133 Fuchs-Eichhörnchen (<i>Sciurus niger</i>)	I Igel (Erinaceus europaeus) 132
188 G	к
Galinago galinago 133 Garrulus glandarius 98, 133, 187	<pre>Katze (Felis catus) Kernbeisser (Coccothraustes cocco- thraustes) 103</pre>
Gartenschläfer (Eliomys quercinus) 127, 133 Geierseeadler (Gypsiheirax angolensis)	<pre>Kiwis (Apteryx) 129 Kleiber (Sitta europaea), 99*, 102, 103</pre>
129 Gelada (<i>Theropithecus gelada</i>) 126, 145	Kolkrabe (Corvus corax) 133 Krähen (Corvidae) 129, 130, 163,
Gelbhalsmaus (Apodemus flavicollis) 107 Gemse (Rupicapra rupicapra) 119-121 Geomys bursarius 98	185 Krokodile 130 Kuh (Bos taurus +) 116

L	N
Lagopus 105	Nabelschwein (Pecari tajaca) 125,
- mutus 133	126
Lama 119	Nebelkrähe (Corvus corone cornix)
Lasius 115	102
- emerginatus 109	Nucifraga caryocatactes 98, 102,
- niger 107, 109, 115	105, 133
- fuliginosus 107	Numenius aquata 133
Laubenvögel (Ptilonorhynchinae) 147	Nusshäher (Nucifraga caryocatactes)
Leguane (Iguaniden) 130	102, 105, 106
Lemming (Lemmus) 11	
Lepus borealis 127	0
- timidus 133	
- capensis 145	Orang-Utan (Symia satyrus) 125,
- europaeus 126, 127	126 (Findfords 1) 126
Leuciscus rutilus 120	Orycteropus afer (Erdferkel) 126
Loxia curvirosta 104	
- pityopsittacus 104	P
Lula arborea 133	Pachytilus migratorius 96
Lumbricus terrestris (Regenwurm) 132	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Lyrurus tetrix 133	Passer montanus 98
	Paviane (Cynocephalus) 125, 163
М	Pecari tajaca 126
	Perca fluviatilis 120
Makaken 125	Pferd (Equus caballus) 116, 119
Marder (Marthes foina) 128, 133	Pheidole 100
Marmota marmota 145	Phyllostomatoidae 125
Maulwurf (Talpa europaea) 132	Pica pica 133
Mäuse (Muridae) 102, 103, 163	Pogonomyrmex barbatus 100
Megachiroptera 125	Pteropus giganteus 125
Melanerpes erythrocephalus 103	Ptilonorhynchus violaceus 147
- formicivorus 103	Pyrrhocorax graculus 138
Meles meles 128	
Mensch (Homo sapiens) 102, 103, 123,	R
124, 133, 136, 139, 147-157, 160,	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
167, 168, 171, 175, 182	Rabenkrähe (Corvus corone) 102,
Messor 98, 100	103
- barbarus 161	Rabenvögel (Corvidae) 133, 163
Misteldrossel (Turdus viscivorus) 133	Rasenameise (Tetramorium caespi-
Mistelfresser, indomalayische	caespitum) 100
(Dicaeidae) 129	Ratten (Epimys) 163
Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla)	Raubtiere 179
133	Regenwürmer (Lumbricus terrestris)
Murmeltier (Marmota marmota) 119,	96
145	Regenpfeiffer (Chardarius vocife-
Muscardinus avellanarius 98, 102,	rus) 136
127	Reh (Capreolus capreolus) 138
Musophagidae 129	Rentier (Rangifer tarandus) 116,
Mustella zibellina (Zobel) 102, 127	119, 121, 128, 138
Myrmica 115	Reptilien 138
- rubra (ruginodis) 107, 109	Riesenschildkröten (Testudo ele-
	phantopus) 130

Star (Sturnus vulgaris) Rind (Bos taurus) 116, 117, 118 129, 130, Ringeltauben (Columba palumbus) 103 133, 134, 138, 188 Rötelmaus (Apodemus flavicollis) Steinmarder (Martes foina) 128 133 Rotfeder (Scardinius erythrophtalmus) Stockente (Anas platyrhynchos) 133 120 Streptopelia decaocto 145 Rotkehlchen (Erithacus rubecula) Sus scrofa 103, 107 129, 130, 133 Sylvia atricapilla 133 Rotkophspecht (Melanerpes erythroce-103 phalus) Rotlaubengärtner (Amblyornis subala-Tanagriden 129 147 ris) Tapir 125 Rotwild s. Edelhirsch 107 Taschenratte (Geomys bursarius) Rousettus aegyptiacus Tauben 104, 105, 133, 185 Tetrao urogallus 133 Testudo elephantopus porteri 130 Saatkrähen (Corvus frugilegus) 103 - graeca 130 Saimiri 126 - hermanni 130 Sammelspechte 103 - nigra 130 Scardinius erythrophtalmus 120 Tetramorium caespitum 100 Schaf (Ovis aries) 116, 119, 120, Theropithecus gelada 126 145, 174, 175, 187 Trampeltier (Camelus bactrianus) Schakal (Canis aureus) 163 119 Schildkröten (Testudinata) Treror (Grüntauben) 134 Schimpansen (Anthropopithecus tro-Turacus 129 103, 126 glodytes) Turdus 136 Schläfer oder Bilche (Muscardinidae) - ericetorum 133 103 - merula 32, 133, 160 Schnecken (Gastropoda) 96, 130, 132, - pilaris 133 138 - torquatus 133 Schneehase (Lepus timidus) 119, 127, - viscivorus 133 133 Türkentauben (Streptopelia decaocto) Schneehuhn (Lagopus mutus) 145 Schnepfen (Scolopacidae) 139 Tyrannidae (Tyranniden) 163, 179 Schwein (Sus) Schwalben (Hirundinidae) Schwanzmeisen (Aegithalos caudatus) Ursus arctos alpinus 128, 133 146 Sciurus niger rufiventer 107, 188 - vulgaris 98, 102, 103, 106, 127 Scolopax rusticola 133 Vulpes vulpes 133 Seidenlaubvogel (Ptilonorhynchus violaceus) 147 W Seidenschwanz (Bombycilla garrulus) Wacholderdrossel (Turdus pilaris) 129, 134 Sepincola 164 Wachtel (Coturnix coturnix) 104 Siebenschläfer (Glis glis) 98, 102, Waldameise (Formica rufa) 103, 127, 128 Waldmaus (Apodemus silvaticus) 98, Sitta europaea 98, 160 101*, 103, 107, 127, 133 Spechte (Picidae) 98, 103, 185 Waldschnepfe (Scolopax rusticola) Spechtmeise (Kleiber), Sitta europaea 133 98, 99, 103, 104, 106, 160 Stachelschwein (Hystrix)

Wanderheuschrecken (kein system. Begriff) 96 Wildschwein (Sus scrofa) 103, 107, 125

 \mathbf{z}

Ziege (Capra hircus) 116, 119, 120,
 128, 133, 138, 174, 175, 182
Zobel (Mustela zibellina) 102, 127
Zwergspechte (Picumninae) 101
Zwergstrandläufer (Eriola minuta) 136