Zeitschrift: Geographica Helvetica : schweizerische Zeitschrift für Geographie =

Swiss journal of geography = revue suisse de géographie = rivista

svizzera di geografia

Herausgeber: Verband Geographie Schweiz ; Geographisch-Ethnographische

Gesellschaft Zürich

Band: 13 (1958)

Artikel: Die Phasengliederung der Eisrandlagen des würmeiszeitlichen

Reussgletschers im zentralen Schweizerischen Mittelland

Autor: Annaheim, Hans / Bögli, Alfred / Moser, Samuel

Kurzfassung: The phases of Würm glaciation in the region of the Reuss glacier in the

central Swiss plateau

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-41144

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 14.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Es ist ersichtlich, daß der Quartärforschung im zentralen Molasseland noch zahlreiche Aufgaben warten. Besonders aufschlußreich dürfte die Erforschung der Entwässerungsverhältnisse zur Zeit der drei Hauptphasen sein, wobei namentlich die Gestaltung des Gewässernetzes während der A-Phase und die Frage seiner Vererbung über den maximalen Gletschervorstoß hinweg auch für die Deutung der Phase selbst bedeutungsvoll erscheint.

LITERATURVERZEICHNIS

1 Bögli A. (1951): Die Entstehung des Baldeggersees. Heimatkunde aus dem Seetal, 25.

2 Bögli A. (1955): Aus der Arbeit der Schweiz. Geomorphologischen Gesellschaft. Geographica Helvetica 10, p. 100 f.

3 EBERL B. (1930): Die Eiszeitenfolge im nördlichen Alpenvorlande. Augsburg.

4 Frey O. (1907): Talbildung und glaziale Ablagerungen zwischen Emme und Reuß. Denkschrift Allg. Schweiz. Naturf. Ges. 41

5 Heim A. (1919): Geologie der Schweiz, Bd. 1. Leipzig.

6 Jäckli H. (1956): Talgeschichtliche Probleme im aargauischen Reußtal. Geogr. Helv. 11, p. 46-59.

7 KAUFMANN F. J. (1872): Beiträge zur geol. Karte der Schweiz, 11.

8 KNAUER J. (1935): Die Ablagerungen der älteren Würm-Eiszeit (Vorrückungsphase) im süddeutschen und norddeutschen Vereisungsgebiet. Abhdl. Geol. Landesuntersuchung am Bayr. Oberbergamt, H. 21, München.

9 KNAUER J. (1937): Widerlegung der Einwendungen K. Troll's gegen die Vorrückungsphase der Würm-Eiszeit. Mitt. Geogr. Ges. München, 30.

- 10 KNAUER J. (1938): Über das Alter der Moränen der Zürich-Phase im Linthgletschergebiet. Abhdl. Geol. Landesuntersuchung Bayr. Oberbergamt, H. 33, München.
- 11 KNAUER J. (1954): Über die zeitliche Einordnung der Moränen der Zürich-Phase im Reussgletschergebiet. Geogr. Helv. 9, p. 71-85.

12 KOPP J. (1945): Geol. Atlas der Schweiz 1:25'000, Blatt 18, mit Erläuterungen. Bern.

- 13 Leemann A. (1958): Revision der Würmterrassen im Rheintal zwischen Dießenhofen und Koblenz. Geogr. Helv. 13, p. 89—173.
- 14 Moser S. (1958): Studien zur Geomorphologie des zentralen Aargaus. Diss. Basel, Mskr. (erscheint demnächst).
- 15 MÜHLBERG F. (1910): Geol. Karte der Umgebung des Hallwilersees und des oberen See- und Winentales 1:25 000, mit Erläuterungen. Aarau.
- 16 MÜHLBERG F. (1911): Der Boden des Aargaus. Festschrift zur Feier des 100-jährigen Bestehens der Aarg. Naturf. Ges. Aarau.

17 PENCK A. u. BRÜCKNER E. (1909): Die Alpen im Eiszeitalter, Bd. 2, Leipzig.

- 18 RATHJENS C. (1954): Das Problem der Gliederung des Eiszeitalters in physisch-geographischer Sicht. Münchner Geogr. Hefte, 6.
- 19 RATHJENS C. (1955): Zur Frage der Gliederung der Würmeiszeit. Petermanns Geogr. Mitt. p. 81-87.
- 20 TROLL K. (1926): Die jungglazialen Schotterfluren im Umkreis der deutschen Alpen. Forschungen z. deutschen Landes- und Volkskunde, 24, H. 4.
- 21 TROLL K. (1936): Die sogenannte Vorrückungsphase der Würm-Eiszeit und der Eiszerfall bei ihrem Rückgang. Mitt. Geogr. Ges. München, 29.

THE PHASES OF WÜRM GLACIATION IN THE REGION OF THE REUSS GLACIER IN THE CENTRAL SWISS PLATEAU

In the region of the Reuss glacier the terminal moraines of the Würm glaciation are developped in three distinct groups as follows: Phase B: 4 terminal moraines of the Würm maximum (Seon near Lenzburg; Hochwürm); they lie upon the Niederterrassenschotter (gravels of the low terrace), which were deposited during the glacial advance (Vorstoss-Schotter); beginning of the erosion by down-cutting and formation of erosion terraces in these gravels during the phase B. Phase A: A system of 5 frontal moraines (Seengen) about 4 km south of the maximal phase, with drumloid forms, degraded by the overriding glacier of the maximal progression (phase B); Vorrückphase (progressional phase), early Würm. Phase C: A third system of 2 terminal moraines (Hitzkirch) 13 km south of phase A. This moraine phase was not overrided by the glacier contrary to the opinion of Knauer. C is the recessional phase (Rückzugsphase, Zürich-phase), late Würm. The following chronological structure of Würm glaciation results: progressional phase (early Würm, A) - progression to the maximal phase (Hochwürm, B) recessional phase (late Würm, C) - afterwards recession to the border of the Alps etc. Interstadial deposits not being observed, the phases are probably not real stages, therefore there does not existe actually any possibility of coordinating these phases to Würm I or to Würm II. Finally, parallelisation of these phases with the systems of terminal moraines in the other valleys of the region of the Reuss glacier is discussed.