**Zeitschrift:** Intercura : eine Publikation des Geriatrischen Dienstes, des

Stadtärztlichen Dienstes und der Psychiatrisch-Psychologischen

Poliklinik der Stadt Zürich

Herausgeber: Geriatrischer Dienst, Stadtärztlicher Dienst und Psychiatrisch-

Psychologische Poliklinik der Stadt Zürich

**Band:** - (1999-2000)

Heft: 65

**Artikel:** Verhaltensskala bei frontotemporaler Demenz

Autor: Wettstein, A.

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-790264

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF: 25.10.2025** 

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

## Verhaltensskala bei frontotemporaler Demenz

nach Lebert, Pasquier, Souliez, Petit, 1998, überarbeitet von A. Wettstein

Fast 20% der degenerativen Demenzen sind frontotemporale Demenz (FTD), wie autoptisch festgestellt wird; trotzdem wird die FTD nicht genügend oft korrekt diagnostiziert und mit der Alzheimer'schen oder der vaskulären Demenz verwechselt. Eine solche Fehldiagnose kann die Resultate von pharmakologischen Versuchsbehandlungen von M. Alzheimer beeinträchtigen.

Die ersten Anzeichen einer frontotemporalen Demenz sind Verhaltensstörungen. Ziel dieser Studie war das Erfassen von frontotemporalen Verhaltensstörungen und Bestimmen wesentlicher Merkmale, welche die frontotemporale Demenz von Alzheimer- oder vaskulären Demenzen unterscheidet. Die Erfassungsskala frontotemporaler Dysfunktion ergab höhere Punktwerte bei FTD-Patienten als bei Patienten mit andern Demenzen (p <0.0001). Bei einem Grenzwert von drei Punkten der Skala wurden FTD-Patienten mit einer Spezifizität von 95% und einer Sensitivität von 91% diagnostiziert. Nicht-kognitive Symptome, die bekannterweise zu Hospitalisation führen können, könnten die entscheidenden Befunde zur Unterscheidung verschiedener Aetiologien leichter Demenzen sein.

# Erfassungsskala von Dysfunktion der Frontotemporallappen

Fehlsteuerung der Kontrolle über die eigene Persönlichkeit:

Vernachlässigt die Haarpflege

x mindestens 1 der obigen Kästchen = 1 Punkt

liegt vo.	r:
	Veränderung der Essensvorlieben (entwickelt z.B. Geschmack für Süssig keiten) Hyperoralität (isst übermässig, nimmt Nicht-Essbares in den Mund) Alkoholmissbrauch (entwickelt neu Lust auf alkoholische Getränke) Enthemmte Sprache (macht distanzlose, taktlose Bemerkungen) Enthemmtes Verhalten (benimmt sich blind für soziale Gegebenheiten, is taktlos) Reizbarkeit (wird grundlos leicht gereizt) Unangebrachte emotionale Reaktionen (lacht oder weint ohne Zusammen hang mit emotionalem Kontext oder Laune) Rastlosigkeit (kann jederzeit körperlich hyperaktiv werden, ist unfähig, län gere Zeit am selben Ort zu bleiben)
	x mindestens 1 der obigen Kästchen = 1 Punkt  Selbstvernachlässigung
	선사님 사람들은 아무슨 가장 보다 하는데 얼마를 하는데 얼마를 하는데 그렇게 하는데 나를 하는데 사람들이 살아 살아 살아 살아 살아 먹는데 그렇게 되었다.
	Wäscht sich nicht, ist schmutzig, vernachlässigt die persönliche Hygiene Nachlässig mit den Kleidern, unpassende, nicht zusammenpassende Beklei

	Egozentrisches Verhalten
_	Apathie (fehlende Initiative, muss angetrieben werden, etwas zu unternehmen, Schlaftendenz sofern ohne Anregung)
	Perseverierendes, stereotypes Verhalten (immer gleiche Gedankengänge wird ängstlich betreffend Geld, Essen, Tabak, Zeiten für das Essen usw.) Hypochondrie (klagt unbegründet über körperliche Leiden) Vernachlässigung des Sozialen (hat kein Interesse an sozialen Aktivitäten) x mindestens 1 der obigen Kästchen = 1 Punkt
	Affektstörungen
=	Hochstimmung (jederzeit begeistert) Scheinbare Traurigkeit (immer, mit ausdrucksloser Miene) Flacher Affekt (affektive Gleichgültigkeit, besonders gegenüber Angehöri
	gen) Rührseligkeit (Tendenz, bei Anstoss öfter, leichter und stärker zu weinen z.B. bei Gedanken (an Familie, Krankheit, traurige Ereignisse), bei Sympa thiebekundung, Ankunft oder Abreise von Besuchern, in Gegenwart von Fremden, bei Unfähigkeit, eine Aufgabe zu erfüllen, vor dem Fernsehgerä (tragische Szenen, Krieg usw.), beim Musikhören.  x mindestens 1 der obigen Kästchen = 1 Punkt

Total: mindestens 0, maximal 4 Punkte = ☐ Punkte
(≥ 3 typisch für frontotemporale Demenz mit 95% Spezifizität, 91% Sensitivität)