Zeitschrift: Mitteilungen aus dem Gebiete der Lebensmitteluntersuchung und

Hygiene = Travaux de chimie alimentaire et d'hygiène

Herausgeber: Bundesamt für Gesundheit

**Band:** 33 (1942)

**Heft:** 5-6

**Artikel:** Le dosage du glycogène dans les préparations de viande

Autor: Terrier, J.

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-983211

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 12.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# LE DOSAGE DU GLYCOGÈNE DANS LES PRÉPARATIONS DE VIANDE

par Dr J. Terrier, chimiste-adjoint du chimiste cantonal, Genève

La méthode que j'ai établie pour le dosage de l'amidon peut être appliquée sans autre au dosage du glycogène dans les préparations de viande.

## I. La préparation ne contient pas d'amidon

Peser 2 g à 2,5 g dans un tube de centrifugation en verre de Jena fort, ajouter un peu de carbonate de chaux praecip. puriss. (env. g 0,2) et faire deux traitements à l'alcool bouillant (voir publication qui précède: Le dosage de l'amidon en présence de glycogène\*), ajouter 10 à 12 cm³ de solution neutre de chlorure de calcium et continuer exactement comme pour le dosage de l'amidon.

Soustraire du nombre de cm³ de solution 0,1 N d'iode obtenu dans la titration finale 0,1 cm³ pour chaque g de produit pesé (voir encore publication qui précède) et multiplier par le facteur 0,0088 pour obtenir la teneur en glycogène.

## II. La préparation contient de l'amidon

- a) On dose l'amidon exactement comme je l'ai indiqué dans le mémoire qui précède: Le dosage de l'amidon en présence de glycogène.
- b) Dans une seconde prise, dont le poids doit être le même, on dose amidon plus glycogène en opérant comme sous chiffre I. Le nombre de cm³ de solution 0,1 N d'iode obtenu dans la titration est diminué de la correction indiquée plus haut, puis de celui obtenu sous a). La différence, multipliée par le facteur 0,0088, donne la teneur en glycogène.

Remarque: J'ai analysé de cette façon quelques préparations du commerce. La teneur en glycogène trouvée a oscillé entre 0,15 et 0,65 %.

## Zusammenfassung

Aus der Methodik der Stärkebestimmung hat sich ohne weiteres obenstehende Glykogenbestimmung in Fleischerzeugnissen ergeben.

<sup>\*)</sup> Si l'on redoute, pour l'ébullition avec la solution de chlorure de calcium, la production de mousse due aux restes d'alcool à 95 %, on peut très bien, dans ce cas, les éliminer par un traitement à l'éther. L'éther résiduel est ensuite chassé par un séjour dans une étuve à 50%.