

Zeitschrift:	Mitteilungen aus dem Gebiete der Lebensmitteluntersuchung und Hygiene = Travaux de chimie alimentaire et d'hygiène
Herausgeber:	Bundesamt für Gesundheit
Band:	58 (1967)
Heft:	2
Rubrik:	Radioaktivität der Lebensmittel im Jahre 1966 = Radioactivité des denrées alimentaires en 1966

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 27.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

MITTEILUNGEN
AUS DEM GEBIETE DER
LEBENSMITTELUNTERRICHTUNG UND HYGIENE
VERÖFFENTLICHT VOM EIDG. GESUNDHEITSAMT IN BERN
Offizielles Organ der Schweizerischen Gesellschaft für analytische und angewandte Chemie

TRAVAUX DE CHIMIE ALIMENTAIRE
ET D'HYGIÈNE

PUBLIÉS PAR LE SERVICE FÉDÉRAL DE L'HYGIÈNE PUBLIQUE À BERNE
Organe officiel de la Société suisse de chimie analytique et appliquée

ABONNEMENT:

Schweiz Fr. 22.— per Jahrgang (Ausland Fr. 27.—)	Preis einzelner Hefte Fr. 4.— (Ausland Fr. 5.—)
Suisse fr. 22.— par année (étranger fr. 27.—)	Prix des fascicules fr. 4.— (étranger fr. 5.—)

Band — Vol. 58	1967	Heft — Fasc. 2
----------------	------	----------------

Radioaktivität der Lebensmittel
im Jahre 1966

Radioactivité des denrées alimentaires
en 1966

*Arbeitsgemeinschaft zur Ueberwachung der Radioaktivität der Lebensmittel
Communauté de surveillance de la radioactivité des denrées alimentaires*

Commentaire

Comme ces dernières années, le présent rapport résulte de la collaboration des Laboratoires cantonaux de Bâle, Coire, Lausanne, St. Gall, du Laboratoire municipal de Zurich et du Service fédéral de l'hygiène publique à Berne. Le Laboratoire cantonal de Zurich a bien voulu s'occuper durant l'année écoulée de l'étude bibliographique de l'irradiation des denrées alimentaires (voir à ce sujet «*Alimenta*» **6**, 216, 1966).

Les dosages effectués durant l'exercice 1966 ont confirmé les conclusions du précédent rapport annuel, c'est-à-dire qu'aucun danger pour la santé de la population n'est à craindre dans l'état actuel de la contamination radioactive des

denrées alimentaires. Les travaux poursuivis au sein de la Communauté de surveillance gardent cependant toute leur importance, par les informations et les enseignements qu'ils apportent. Les méthodes de dosage peuvent encore être améliorées et dans de nombreux cas simplifiées, notamment en développant l'emploi de la spectrométrie- γ . Les résultats obtenus au cours de 1966 par cette dernière méthode ne sont publiés qu'en partie dans le présent rapport, nombre d'entre eux exigeant encore des vérifications et certaines mises au point.

Dans son ensemble, la contamination radioactive des denrées alimentaires a continué de diminuer en 1966. Elle reste une conséquence des essais nucléaires principalement de 1961 et 1962. En effet, les 5 essais nucléaires effectués dans l'atmosphère jusqu'à ce jour par la Chine (16 octobre 1964, 14 mai 1965, 9 mai, 27 octobre et 28 décembre 1966) et ceux de la France n'ont pas eu d'influence marquée sur la contamination radioactive des denrées alimentaires dans nos régions. Cependant, de l'iode-131 a pu être décelé dans le lait, après l'explosion de la bombe chinoise du 27 octobre 1966, et dans l'eau de pluie et la neige après l'explosion du 28 décembre. Les teneurs se sont révélées très faibles et un enrichissement poussé à été nécessaire pour pouvoir doser l'iode-131. La courte vie de ce radionuclide, et les dates de son apparition dans nos régions, autorisent d'affirmer qu'il provenait des essais effectués en Chine à fin 1966. Parallèlement, la spectrométrie- γ a permis d'enregister une nette augmentation de la contamination de l'herbe au cours du mois de novembre, environ 2 semaines après l'explosion du 27 octobre. Toutefois, la teneur en strontium-90 du lait n'a subi aucune modification mesurable, après les essais nucléaires chinois. Une faible augmentation de cette teneur pourra éventuellement se manifester au printemps 1967, sans qu'on puisse pour autant le cas échéant parler de radioactivité accrue.

Au cours de 1966, les travaux de la communauté ont été effectués dans l'ensemble comme prévu. Le lait, les céréales et le pain, ainsi que divers aliments pour enfants et aliments fortifiants, ont fait l'objet principal de la surveillance. Les fruits et les légumes furent aussi examinés, mais de manière moins détaillée. Des dosages comparatifs du strontium-90 dans le poisson de nos lacs ont pu être entrepris.

Lait

La teneur en strontium-90 du lait a diminué dans la même proportion en 1966 qu'en 1965, n'atteignant dans les deux cas que le 70 % de l'année précédente. La diminution constante qui a débuté en 1964 est illustrée par le tableau 1 et les figures 1, 2, 3 et 4. Elle est le plus marquée pour le lait de Meyrin, du Tessin et de Genève, les teneurs du lait de Mürren et de Champéry étant celles qui se sont le moins modifiées durant l'année 1966. Au sujet du lait de Mürren, il faut cependant relever que la moyenne de 1965 étant incertaine (voir rapport annuel 1965, p. 338) la constatation s'y rapportant n'est pas rigoureuse. Les dosages effectués en 1966 ont fourni pour la teneur en strontium-90 du lait une moyenne de 33 pCi⁹⁰Sr/l. Cette moyenne serait plus basse, si l'on avait tenu compte dans

son calcul des quantités de lait livrées à la consommation; le lait de Mürren, de Champéry et du Tessin, dont les teneurs en strontium-90 sont relativement élevées par rapport aux autres, ne constituent en effet qu'une partie négligeable de la production totale, ce qui n'est pas pris en considération dans la moyenne arithmétique ci-dessus.

En se basant tout de même sur cette moyenne, pour simplifier le problème, on peut indiquer que l'absorption journalière globale de strontium-90 par voie de nutrition a tout au plus atteint 49 pCi par personne en 1966 (1,5 fois 33*), au lieu de 71 pCi en 1965. On admet généralement que l'absorption journalière,

* Voir au sujet de cette évaluation le rapport 1964.

Tableau 1
Teneur en strontium-90 du lait (1962—1966)

Provenance	Strontium-90 pCi/l ^t ¹					Rapports				Nombre de dosages par année
	1962	1963	1964	1965	1966	1963 1962	1964 1963	1965 1964	1966 1965	
1 Berner Molkerei	16	36	45	33	23	2,25	1,25	0,73	0,70	4 (52)*
2 Canton de Vaud (lait en poudre)	14	35	51	34	23	2,50	1,45	0,67	0,68	9
3 Mürren	33	70	92	63**	60	2,12	1,31	0,68	0,95	4 (53)*
4 Genève	—	—	47	37	22	—	—	0,80	0,59	6
5 Meyrin	—	—	57	43	22	—	—	0,76	0,50	6
6 Lausanne	—	—	55	39	29	—	—	0,72	0,72	6
7 Moudon	—	—	57	43	28	—	—	0,75	0,65	6
8 Neuchâtel	—	—	59	40	25	—	—	0,69	0,61	6
9 Chaux-de-Fonds	—	—	89	56	38	—	—	0,63	0,68	6
10 Sion	—	—	23	22	—	—	—	0,79	—	—
11 Champéry	—	—	112	75	59	—	—	0,67	0,79	4
12 Lucerne	—	—	70	50	30	—	—	0,71	0,61	6
13 Frauenfeld	—	—	37	34	22	—	—	0,92	0,65	6
14 Tessin (S. Antonio)	—	—	132	84	49	—	—	0,64	0,58	6
Moyenne 4—14	—	—	68	48	32	—	—	0,71	0,67	—
Moyenne générale 1—14	—	—	67	47	33	—	—	0,70	0,70	—

¹ Dans les échantillons 1, 2 et 3 le strontium-90 a été dosé après incinération, et dans les échantillons 4 à 14 par échangeurs d'ions.

* Entre parenthèses, nombre de prélèvements par année.

** Moyenne incertaine.

même à très long terme, de 100 à 200 pCi de strontium-90 ne constitue aucun danger pour la santé.

On peut constater, dans le tableau 1, que les plus basses teneurs en strontium-90 rencontrées en 1966 concernent le lait de Genève, Meyrin, Frauenfeld, Berne («Berner Molkerei») et le lait en poudre du canton de Vaud, où elles n'atteignent que 22 à 23 pCi⁹⁰Sr/lt. Comme en 1965, les teneurs les plus élevées sont celles du lait de Mürren, de Champéry et du Tessin (S. Antonio), qui atteignent respectivement 60, 59 et 49 pCi⁹⁰Sr/lt.

Dans les autres régions la teneur varie de 25 à 38 pCi de strontium-90 par litre de lait.

L'activité des oxalates du lait a diminué en 1966 dans une proportion correspondant à celle de la teneur en strontium-90. Si l'on considère, par exemple, l'activité des oxalates moyenne du lait en poudre du canton de Vaud, on constate qu'elle représente en 1966, comme pour le strontium-90, le 70 % (37 : 53) de l'activité moyenne de 1965. La relation existant entre la teneur en strontium-90 et l'activité des oxalates n'a pratiquement pas varié au cours des trois dernières années (voir tableau 2).

Tableau 2

Teneur en strontium-90 et activité des oxalates du lait (1959—1966)

Année	Teneur en strontium-90 pCi/lt			Activité des oxalates pCi/lt			Rapport Teneur en strontium-90/ Activité des oxalates		
	BM	VD	Mü	BM	VD	Mü	BM	VD	Mü
1959	15	14	29	55	50	90	0,27	0,28	0,32
1960	11	11	27	23	30	56	0,48	0,37	0,48
1961	10	10	22	64	54	62	0,16	0,19	0,35
1962	16	14	33	67	59	93	0,24	0,24	0,35
1963	36	35	70	117	114	187	0,31	0,31	0,37
1964	45	51	92	74	84	145	0,61	0,61	0,63
1965	33	34	63	50	53	101	0,66	0,64	0,62
1966	23	23	60	33	37	96	0,70	0,62	0,63

BM = Berner Molkerei; VD = lait en poudre du canton de Vaud; Mü = Mürren.

Le facteur 0,71 établi pour calculer — en l'absence de produits de fission d'origine récente — la teneur en strontium-90 à partir de l'activité des oxalates (voir note de la figure 1) est applicable aux valeurs trouvées pour l'activité des oxalates du lait par les Laboratoires de Bâle, de St. Gall et de la ville de Zurich. Les teneurs en strontium-90 ainsi obtenues sont respectivement pour ces échantillons de 26, 30 et 31 pCi⁹⁰Sr/lt.

On obtient par le même calcul, pour le lait de Coire, de Davos et de Pontresina, respectivement 17, 72 et 72 pCi⁹⁰Sr/lt. Il est intéressant de relever que le lait provenant d'altitude élevée de la région des Alpes a une teneur nettement plus forte en strontium-90 que le lait de plaine. On doit en rechercher la cause principale dans le fait que la quantité de fourrage récoltée par unité de surface est plus faible en montagne qu'en plaine. Les conditions météorologiques, notamment le niveau des précipitations, jouent aussi un rôle important.

Fromage

Pour le fromage, la teneur en strontium-90 est tirée des résultats obtenus par le Laboratoire cantonal de Lausanne. Elle atteint en moyenne 257 pCi⁹⁰Sr/kg dans le fromage à pâte dure et 108 pCi⁹⁰Sr/kg dans le fromage à pâte molle et mi-dure. Rapportées au calcium, ces teneurs correspondent à celle du lait, étant respectivement d'environ 26 pCi⁹⁰Sr/g Ca (US) pour le fromage à pâte dure, 18 US pour le fromage à pâte molle et mi-dure, et 27 US pour le lait (33 : 1,2).

Céréales

La teneur en strontium-90 du *froment indigène* et de ses produits de mouture examinés en 1966 (récolte 1965) est en baisse par rapport à l'année précédente, mais la diminution est faible en regard de celle observée de 1963 à 1964 (voir page 99 et figures 5, 6 et 7)*.

Les moyennes établies pour les récoltes de 1964 et de 1965, exprimées en pCi⁹⁰Sr/kg, sont respectivement les suivantes: 122 et 103 pCi pour le grain, 43 et 30 pour la farine blanche, 95 et 55 pCi pour la farine bise, 384 et 254 pCi pour le son. Le rapport strontium-90/activité des oxalates n'est que légèrement plus faible pour la farine de 1965 (0,61) que pour le lait de la même année (0,70). L'activité des oxalates de la farine provient donc, cette année là, principalement du strontium-90 (+ yttrium-90). En 1963, ce rapport n'était pour la farine blanche que de 0,37; les produits de fission de courte vie contribuant à l'activité des oxalates, tels que le strontium-89, ont disparu depuis.

La teneur en strontium-90 de la *farine mise dans le commerce*, constituée d'un mélange dans la proportion d'environ 50 % (voir page 100) de farine indigène et étrangère, ne diffère pratiquement pas de la teneur trouvée pour la farine indigène.

Quant à la teneur en strontium-90 *du pain*, elle correspond dans l'ensemble à celle de la farine, compte tenu de la teneur en eau plus élevée du pain et du degré

* Nos remerciements vont à l'Administration fédérale des blés qui a mis, comme ces dernières années, à notre disposition les échantillons nécessaires à ces déterminations.

de mouture différent de celui des échantillons de farine indigène examinés. Elle n'atteint en moyenne que 9 pCi⁹⁰Sr/kg dans le pain blanc, 13 pCi dans le pain mi blanc et 23 pCi dans le pain bis (voir page 102 et 103).

Les aliments pour enfants à base de céréales ont des teneurs en strontium-90 correspondant également à celles des produits de la mouture (voir page 88).

Fruits

La teneur en strontium-90 des échantillons de fruits examinés en 1966 est faible. Elle varie de 4 pCi⁹⁰Sr/kg dans les pêches et les poires à 16 pCi⁹⁰Sr/kg dans les fraises. L'activité des oxalates correspond ici également aux teneurs en strontium-90 trouvées.

Légumes

Un nombre restreint seulement de légumes à été examiné. Les activités rencontrées sont normales, les légumes à feuilles (salade, épinards) étant davantage contaminés que les autres, comme toujours.

Poissons

Nous donnons ci-après, dans le tableau 3, les résultats obtenus pour une espèce commune de poisson, le vengeron («Schwalen»), provenant des lacs de Bienne, Constance, Sempach et de Thoune.

*Tableau 3
Teneur en strontium-90 et en calcium de poissons
(Vengeron; «Schwalen»)*

Provenance (lacs)	Chair			Arêtes (env. 50 g/kg)			Longeur des poissons cm
	strontium-90 pCi/kg	US*	calcium g/kg	strontium-90 pCi/kg	US*	calcium g/kg	
Bienne	15	8	1,84	850	22	39	15—19
Bienne	20	5	3,95	390	7	54	22—25
Bienne	24	8	3,07	655	7	88	27—28
Constance	25	8	3,11	537	8	67	14—18
Thoune	25	10	2,49	926	14	68	25—27
Sempach	24	6	3,95	919	15	59	26—30

* US = Unité Strontium = pCi⁹⁰Sr/g Ca.

On peut constater qu'il n'y a pas de différences marquées dans la teneur en strontium-90 de cette espèce de poisson, d'une provenance à l'autre. Elle est en moyenne plus élevée que la teneur rencontrée en 1963 et 1965 pour la féra du lac de Sempach. Ces valeurs et celles de la teneur en calcium doivent être confirmées par de nouveaux dosages.

Divers

L'échantillon d'helvelles séchées examiné a une teneur en strontium-90 assez forte mais tout de même admissible. Celle de l'échantillon de viande de boeuf, ainsi que celle de la poudre d'œufs, ne diffèrent pas essentiellement des teneurs rencontrées pour les autres catégories de denrées alimentaires examinées.

L'activité des oxalates des aliments fortifiants peut paraître un peu élevée en comparaison de celles d'autres produits; elle est ramenée à un degré moyen par la dilution que présuppose la consommation de ces produits.

Eaux

Comme les années précédentes, qu'il s'agisse d'eau minérale, d'eau de nappes souterraines ou d'eau des lacs, l'eau potable n'est pratiquement pas contaminée. La radioactivité de l'eau de pluie et de la neige est demeurée faible.

Iode-131

Vu leur assez faible puissance, il était prévisible que les essais nucléaires chinois ne pourraient avoir une incidence marquée sur la contamination radioactive des denrées alimentaires dans nos régions. Des dosages d'iode-131, entrepris durant les périodes consécutives aux deux derniers essais de fin 1966, ont cependant permis d'en déceler la présence dans le lait¹ et dans l'eau de pluie. La teneur en iode-131 s'est révélée très faible et il a fallu procéder à un enrichissement poussé pour que les dosages puissent se faire. Généralement, 4—5 litres de lait, respectivement d'eau, ont été passés sur échangeurs d'ions, après addition d'iodure de potassium comme entraîneur. L'iode-131 se trouvait ainsi concentré, à la fin des opérations chimiques précédant la mesure de l'activité, dans quelques 50 mg d'iodure d'argent inactif. La décroissance de l'activité a pu être suivie de manière suffisamment précise pour affirmer qu'elle correspondait bien à la période de l'iode-131. Si l'on considère sa courte période, ce radionuclide ne pouvait provenir que des essais nucléaires chinois de fin 1966, démontrant ainsi l'apparition dans nos régions des débris radioactifs environ 2 semaines après les explosions.

Le lait du commerce n'a pas été contaminé, le bétail n'étant normalement plus affouragé à l'herbe à cette époque de l'année.

Les résultats des principales de ces mesures sont indiqués dans les tableaux 4 et 5.

¹ Nous adressons nos remerciements à la Direction de la Station fédérale de laiterie du Liebefeld, qui nous a permis par sa collaboration d'obtenir les échantillons de lait nécessaires, en affourageant spécialement à l'herbe une vache durant une période prolongée.

Tableau 4
Teneur en iode-131 de lait frais et activité-γ de l'herbe,
après l'explosion chinoise du 27. 10. 66

	Lait: teneur en iode-131*		Herbe: activité-γ de 300 g d'herbe séchée (canal 0,36 Mev)	
	pCi/l		Imp./min.	
	lors du prélèvement	mesuré après 50 jours**	lors du prélèvement	mesure répétée 50 jours plus tard
1966				
3. 11.	0,0	—	—	—
4. 11.	0,0	—	8	9
7. 11.	0,0	—	—	—
8. 11.	0,0	—	9	6
11. 11.	0,0	0,0	9	6
12. 11.	—	—	37	9
13. 11.	1,2	0,0	—	—
14. 11.	1,2	—	—	—
15. 11.	1,3	—	33	10
16. 11.	1,2	—	—	—
17. 11.	2,4	0,0	53	10
18. 11.	1,9	—	—	—
21. 11.	1,0	—	38	16
22. 11.	0,9	—	—	—
23. 11.	0,9	—	60	16
24. 11.	1,7	0,0	affouragement au foin de l'été 1966 dès ce jour	
25. 11.	1,4	—	4	3
26. 11.	0,6	—	—	—
28. 11.	0,3	—	—	—
30. 11.	0,1	—	—	—
2. 12.	0,2	0,0	5	—

* A titre de comparaison, cette teneur s'était élevée jusqu'à plusieurs centaines de picocuries par litre en 1962/63.

** Des mesures intermédiaires ont permis de suivre la décroissance.

Après l'explosion du 27 octobre 1966, parallèlement au lait, nous avons examiné au spectromètre-γ les variations de l'activité de l'herbe utilisée comme fourrage. Il ressort clairement des résultats obtenus (voir tableau 4) que la radioactivité de l'herbe a subi une nette augmentation durant la période en question.

Tableau 5
*Iode-131 dans l'eau de pluie et la neige, à Berne, après l'explosion
 chinoise du 28. 12. 1966*

Date	Iode-131 pCi/l
7. 1. 1967	0,06
11. 1. 1967	6,9
12. 1. 1967	9,3
20. 1. 1967	3,0

Césium-137

Les filtrats contenant les métaux alcalins, recueillis après la précipitation de l'oxalate de calcium servant au dosage du strontium-90 et à la mesure de l'activité des oxalates, sont examinés par spectrométrie-γ à l'Institut de physique de l'Université de Fribourg (MM. Prof. O. Huber, Dr. J. Halter). Ces déterminations approximatives du césium-137 ont pour but notamment de calculer le rapport césium-137 / strontium-90, devant permettre en cas de nécessité — pour autant que la composition du mélange des produits de fission soit connue — de déduire rapidement la teneur en strontium-90 de la teneur en césium-137.

Les principaux résultats de ces déterminations se trouvent rassemblés dans le tableau 6 suivant:

Tableau 6
Teneur en césium-137 du lait, des céréales et de quelques fruits.
Rapport césium-137 / strontium-90

Désignation des échantillons	Date	Césium-137 pCi/l ou kg	Stron- tium-90* pCi/l ou kg	$\frac{137 \text{ Cs}}{90 \text{ Sr}}$	Mn-54 pCi/kg
Lait en poudre reconstitué du canton de Vaud	1. 1965	204	47	4,3	—
	2.	189	43	4,4	—
	3.	216	45	4,8	—
	4.	185	45	4,1	—
	6.	86	33	2,6	—
	7.	55	26	2,1	—
	8.	59	23	2,6	—
	9.	56	28	2,0	—
	10.	26	23	1,1	—
	11.	38	27	1,4	—
	12.	71	38	1,9	—
	2. 1966	48	28	1,7	—
Froment	3.	53	29	1,8	—
	4.	71	28	2,5	—
	5.	39	24	1,6	—
	6.	31	21	1,5	—
	8.	41	21	2,0	—
	récolte				
	Wil	1964	360	72	< 100
	Guin		570	120	4,7
Farine blanche	Huttwil		445	107	< 100
	Brunnen		470	96	4,9
	Renens		410	67	< 100
	Bellinzone		950	268	3,5
	France		290	47	240
	Canada	1963	620	188	< 100
					720
	Wil	1964	65	30	—
Farine bise (moyennes)	Guin		170	51	—
	Huttwil		150	10	3,3
	Brunnen		140	33	—
	Renens		130	28	—
	Bellinzone		310	106	4,6
	France		60	13	—
	Canada	1963	230	40	—
					—
Son (moyennes)	1964	400	95	4,2	160
	1964	1300	384	2,8	< 100

* Il s'agit de valeurs reprises des rapports 1965 et 1966.

Désignation des échantillons		Date (récolte)	Césium-137 pCi/kg	Stron- tium-90* pCi/kg	$\frac{^{137}\text{Cs}}{^{90}\text{Sr}}$	Mn-54 pCi/kg
Froment	Wil	1965	255	78	3,3	< 50
	Guin		270	92	2,9	—
	Huttwil		230	88	2,6	—
	Brunnen		280	95	3,0	—
	Renens		245	97	2,5	< 50
	Bellinzone		240	167	1,4	55
	Brigue		230	108	2,1	—
Farine blanche	Wil	1965	80	20	4,0	—
	Guin		80	31	2,6	—
	Huttwil		109	25	4,4	—
	Brunnen		108	24	4,5	—
	Renens		82	24	2,7	—
	Brigue		107	25	4,3	—
	Farine bise (moyennes)		181	55	3,3	—
Son (moyennes)		1965	550	254	2,2	—
Fraises du Valais		1965	< 38	44	< 0,9	—
		1966	< 30	16	1,9	—
Fraises d'Italie		5. 1965	< 32	23	< 1,4	—
		6. 1965	< 28	13	< 2,1	—
Pêches		6. 1965	41	7	5,9	—
Pêches d'Italie		1966	< 34	4	< 8,5	—
Cerises du Seeland		1965	105	15	7,0	—
		1966	55	6	9,2	—
Abricots d'Italie		1966	< 38	8	< 4,7	—
		8. 1965	500	15	33	—

On constate que les valeurs obtenues pour le rapport $^{137}\text{Cs}/^{90}\text{Sr}$ sont assez semblables aussi bien pour le lait que pour le froment, la farine, le son et les fruits. Cependant, à partir de juin 1965, le rapport diminue environ de moitié pour le lait. Il faut attribuer ce changement à un abaissement de la contamination directe de l'herbe par sa partie aérienne. On retrouve un peu la même diminution du rapport pour le froment, entre 1964 et 1965. Pour le poisson (un seul échantillon a été examiné) le rapport en question est nettement plus élevé que pour l'ensemble des autres denrées examinées.

Conclusions

La contamination radioactive des denrées alimentaires a continué de diminuer en 1966, et cela pratiquement dans la même proportion qu'en 1965. La moyenne

* Voir note page 82.

établie pour la teneur en strontium-90 du lait n'atteint plus que 33 pCi/l, représentant le 70 % de celle de 1965. Elle s'était élevée jusqu'à 67 pCi/l en 1964. En se basant sur la moyenne du lait, on peut admettre que l'apport journalier en strontium-90 de la ration alimentaire a été en 1966 au maximum de 50 pCi. Selon le guide de protection contre les radiations des USA, cette quantité ne présente aucun danger pour la santé, même à très long terme.


Une moyenne valable a pu être établie également pour la teneur en strontium-90 du froment et de la farine, ainsi que pour le pain. Les résultats obtenus pour les autres denrées alimentaires sont plus fragmentaires mais apportent tout de même des indications utiles.

L'iode-131 décelé dans le lait et l'eau de pluie, après les explosions chinoises de fin 1966, n'a atteint qu'un niveau insignifiant, démontrant cependant que des débris radioactifs étaient parvenus dans nos régions, environ deux semaines après chaque explosion, malgré l'éloignement et la puissance relativement faible des engins nucléaires en question. Quant aux essais nucléaires français, il ne nous a pas paru utile d'en rechercher les débris radioactifs dans les denrées alimentaires, les essais de 1966 ayant eu lieu dans l'hémisphère sud de notre planète.

En dehors des indications qu'il fournit sur le degré de contamination radioactive des denrées alimentaires et qui se trouvent rassemblées et commentées dans le présent rapport, le travail effectué en 1966 au sein de la Communauté de surveillance a notamment permis d'étendre nos connaissances en radioactivité sur le plan analytique et sur celui des techniques de dosage. Souhaitons que nous n'aurons pas à en faire usage dans des cas graves.

A. Miserez

Figure 1 Teneur en strontium-90 du lait de plaine (Berner Molkerei) et de montagne (Mürren 1650 m)



* Valeur incertaine.

En pointillé (○, ●): Teneurs en strontium-90 calculées à partir de l'activité des oxalates. Le facteur de conversion utilisé (0,71) a été établi en ajoutant du $^{90}\text{Sr} + ^{90}\text{Y}$ pur à du lait non contaminé. Les deux dernières valeurs ainsi calculées pour le lait de Mürren [a), b)] sont nettement plus élevées que la teneur obtenue par dosage direct du strontium-90. Dans ces 2 cas il faut admettre la présence, dans le lait de Mürren, de strontium-89 provenant de la bombe chinoise du 14 mai 1965, qu'on ne retrouve pas dans le lait de plaine (Berner Molkerei). En 1963 la différence est très marquée pour le lait des 2 provenances, ce qui correspond à la situation du moment.

Figure 2 Teneur en strontium-90 de lait en poudre de plaine (canton de Vaud)





Figure 3 Teneur en strontium-90 du lait frais de la «Berner Molkerei» (1), de Mürren (3) et du lait en poudre du canton de Vaud (2) de 1954 à 1966



Les petits cercles indiquent la teneur en strontium-90 calculée à partir de l'activité des oxalates ($\times 0,71$) en 1965 et 1966.

Figure 4 Teneur en strontium-90 du lait frais de diverses provenances




Figure 5 Teneur en strontium-90 du froment indigène de 1962 à 1965




Figure 6 Teneur en strontium-90 du froment et des produits de la mouture





Figure 7 Teneur en strontium-90 du froment et des produits de la mouture groupés entre-eux (dans la partie droite la teneur est rapportée au calcium)



Resultate / Résultats (1966)

Bezeichnung und Anzahl der Proben Désignation et nombre d'échantillons	Herkunft Provenance	Datum Date	Spezifische Beta-Aktivität Activité bêta spécifique		Strontium-90		Untersuchungs- Laboratorien Laboratoires d'analyses
			Totale pCi/l	Oxalat- Niederschlag Précipité des oxalates pCi/l	pCi/l	US	

A. Milch / Lait

Frischmilch/Lait frais 14 9 15 14	Berner Molkerei/ Laiterie bernoise	20. 12. 65—	1880 39 36 33 26	29 25 21 18	23 20 17 15	EGA/SFHP*	
		28. 3. 66					
		13. 4.—					
		6. 6. 66					
		13. 6.—					
		19. 9. 66					
		26. 9.—					
		27. 12. 66					
Mittelwerte/ Moyennes		20. 12. 65—	1173 38 1184 30	26 19	21 16	,, ,,	
		6. 6. 66					
		13. 6.—					
		27. 12. 66					

* Eidg. Gesundheitsamt / Service fédéral de l'hygiène publique.

		Berner Molkerei/ Laiterie bernoise Mittelwerte/ Moyennes	1963 1964 1965 1966	1484 1403 1290 ¹ 1180	117 74 50 33	36 45 33 23	30 36 26 18	EGA/SFHP „ „ „
15	Mürren	20. 12. 65– 28. 3. 66 4. 4.– 6. 6. 66	1480	91	59	50	„	
9		13. 6.– 19. 9. 66 26. 9.– 26. 12. 66	1444 1408 1318	83 125 77	53 75 55	45 60 46	„ „ „	
15	Mürren Mittelwerte/ Moyennes	20. 12. 65– 6. 6. 66 13. 6.– 26. 12. 66	1468 1370	88 102	56 65	47 53	„ „	

¹ Neuer Eichfaktor, berechnet mit einer genaueren Halbwertszeit für ⁴⁰K, welche ca. 10 % niedrigere Werte liefert als bisher / Nouveau facteur d'étalonnage, établi sur une période du potassium-40 reconnue plus exacte, et conduisant à des valeurs approximativement 10 % plus faibles que jusqu'ici.

Bezeichnung und Anzahl der Proben Désignation et nombre d'échantillons	Herkunft Provenance	Datum Date	Spezifische Beta-Aktivität Activité bêta spécifique		Strontium-90		Untersuchungs- Laboratorien Laboratoires d'analyses
			Total pCi/l	Oxalat- Niederschlag Précipité des oxalates pCi/l	pCi/l	US	
<i>Frischmilch/Lait frais</i>	Mürren	1963	1793	187	70	58	EGA/SFHP
	Mittelwerte/ Moyennes	1964	1800	145	92	77	"
		1965	1517 ¹	101	63	53	"
		1966	1410	96	60	50	"
1	Beznau	1966 14. 1	1097	49	—	—	Basel/Bâle
3	Böttstein	14. 1. 11. 5. 8. 11.	1218 1186 1257	51 26 41	— — —	— — —	" " "
3	Döttingen	14. 1. 11. 5 8. 11.	1287 1230 1241	49 37 42	— — —	— — —	" " "

¹ Siehe Fußnote Seite 91 / Voir note page 91.

<i>Frischmilch/Lait frais</i>	2	Kleindöttingen	11. 5. 8. 11.	1247 1267	36 28	— —	— —	Basel/Bâle „
	4	Rotberg	28. 2. 1. 6. 5. 7.— 28.12.	1292 1218	33 (25—43)* 25 (19—39)*	— —	— —	„
	6							„
	3	Villigen	14. 1. 11. 5. 8. 11.	1281 1270 1219	45 30 19	— — —	— — —	„ „ „
	3	Würenlingen	14. 1. 11. 5. 8. 11.	1208 1249 1205	38 35 30	— — —	— — —	„ „ „
	1	Aargau/Argovie ¹	8. 11.	1285	27	23	—	„
	7	Chur/Coire	1. 6.— 1. 12.	—	24 (5—54)*	— —	— —	Chur/Coire
	7	Davos	2. 6.— 1. 12.	—	101 (50—206)*	— —	— —	„

¹ Mischmilch aus / Lait de mélange de: Böttstein, Döttingen, Kleindöttingen, Villigen und Würenlingen.

* In Klammern: Extremwerte / Entre parenthèses: Valeurs extrêmes rencontrées.

Bezeichnung und Anzahl der Proben Désignation et nombre d'échantillons	Herkunft Provenance	Datum Date	Spezifische Beta-Aktivität Activité bêta spécifique		Strontium-90		Untersuchungs-Laboratorien Laboratoires d'analyses
			Total pCi/l	Oxalat-Niederschlag Précipité des oxalates pCi/l	pCi/l	US	
Frischmilch / Lait frais 3 7	Pontresina	1966 1. 6.— 30. 11.	—	102 (42—235)*	—	—	Chur/Coire
3	Genf/Genève Centrale	1. 1.— 31. 5. 1. 7.— 30. 11.	— — —	— — —	28 (27—29)* 17 (12—24)*	— — —	Lausanne
3	Meyrin	1. 1.— 31. 5. 1. 7.— 30. 11.	— — —	— — —	29 (27—30)* 17 (15—21)*	— — —	„
3	Neuenburg/ Neuchâtel Centrale	1. 1.— 31. 5. 1. 7.— 30. 11.	— — —	— — —	32 (29—34)* 18 (17—19)*	— — —	„

* In Klammern: Extremwerte / Entre parenthèses: Valeurs extrêmes rencontrées.

Frischmilch/Lait frais	3	Chaux-de-Fonds	1. 1.-	—	—	53 (48—58)* 33 (18—27)*	—	Lausanne
			31. 5.					
			1. 7.-					
			30. 11.					
	2	Champéry	1. 1.-	—	—	87 (83—92)* 31 (29—33)*	—	„
			30. 3.					
			1. 9.-					
			30. 11.					
	3	Lausanne Centrale	1. 1.-	—	—	30 (30—40)* 22 (16—35)*	—	„
			30. 5.					
			1. 7.-					
			30. 11.					
	3	Moudon	1. 1.-	—	—	40 (32—54)* 16 (12—20)*	—	„
			30. 5.					
			1. 7.-					
			30. 11.					
	3	Frauenfeld	1. 1.-	—	—	28 (24—32)* 15 (12—18)*	—	„
			30. 5.					
			1. 7.-					
			30. 11.					

Bezeichnung und Anzahl der Proben Désignation et nombre d'échantillons	Herkunft Provenance	Datum Date	Spezifische Beta-Aktivität Activité bêta spécifique		Strontium-90		Untersuchungs-Laboratorien Laboratoires d'analyses
			Totale pCi/l	Oxalat-Niederschlag Précipité des oxalates pCi/l	pCi/l	US	
<i>Frischmilch/Lait frais</i>	Luzern/Lucerne Centrale	1966					
		1. 1.-			38		
		30. 5.	—	—	(34—44)*	—	Lausanne
		1. 7.-			22		"
		30. 11.	—	—	(18—29)*	—	"
	Bellinzona	1. 1.-			62		
		30. 5.	—	—	(53—61)*	—	"
		1. 7.-			35		"
		30. 11.	—	—	(13—55)*	—	"
	Muolen	27. 4.	—	56	—	—	St. Gallen/ St. Gall
	Niederhelfenschwil	27. 4.	—	48	—	—	"
	Berneck	9. 5.	—	30	—	—	"
	Benken SG	9. 5.	—	31	—	—	"
	Krummenau	10. 5.	—	55	—	—	"
	Oberbüren	10. 5.	—	41	—	—	"
	Frümsen	11. 5.	—	22	—	—	"
	Tübach	11. 5.	—	34	—	—	"
		23. 5.	—	41	—	—	"

* In Klammern: Extremwerte / Entre parenthèses: Valeurs extrêmes rencontrées.

<i>Frischmilch/Lait frais</i>	Degersheim Grub SG	11. 5. 24. 5.	— —	47 56	— —	— —	St. Gallen/ St. Gall
	Mischmilch/ Lait de mélange	1. 4.— 10. 6.	1357 (1133—1524)*	43 (18—75)*	36 (17—54)*	—	Zürich/Zurich
<i>Vollmilchpulver / Lait en poudre entier</i>	Kanton Waadt/ Canton de Vaud	4. 2. 12. 3. 23. 4. 13. 5. 18. 6. 4. 8. 19. 9. 12. 11. 3. 12.	1233 1214 1185 1165 1199 1185 1133 1101 1119	44 48 44 38 33 33 24 30 36	28 29 28 24 21 21 18 19 23	22 24 23 20 17 17 15 15 19	EGA/SFHP „ „ „ „ „ „ „ „ „
	Mittelwerte/ Moyennes	4. 2.— 18. 6. 4. 8.— 3. 12.	1200 1135	41 31	26 20	21 16	„ „

Bezeichnung der Proben Désignation des échantillons	Herkunft Provenance	Datum Date	Spezifische Beta-Aktivität Activité bêta spécifique		Strontium-90		Untersuchungs- Laboratorien Laboratoires d'analyses
			Totale pCi/kg	Oxalat- Niederschlag Précipité des oxalates pCi/kg	pCi/kg	US	
Vollmilchpulver/ Lait en poudre entier	Kanton Waadt/ Canton de Vaud	1962	1365	59	14	11	EGA/SFHP*
		1963	1630	114	35	29	"
		1964	1510	84	51	41	"
		1965	1240 ¹	53	34	28	"
		1966	1170	37	23	19	"
<i>B. Käse / Fromage</i>							
<i>Schweizerkäsel/ Fromage suisse</i>		1966					
		Corcelles-Jorat	5.	—	—	131	—
		St. Gallen/St. Gall	1.	—	—	275	—
		La Mague	5.	—	—	173	—
		Le Châble	3.	—	—	185	—
		St. Gallen/St. Gall	4.	—	—	253	—
		Zollikofen	4.	—	—	394	—
			9.	782	139	—	—
		Pampigny	1.	—	—	145	—
		Henniez	10.	—	—	235	—

¹ Neuer Eichfaktor, berechnet mit einer genaueren Halbwertszeit für ^{40}K , welche ca. 10 % niedrigere Werte liefert als bisher / Nouveau facteur d'étalonnage, établi sur une période du potassium-40 reconnue plus exacte, et conduisant à des valeurs approximativement 10 % plus faibles que jusqu'ici.

<i>Ausländischer Käse/</i> <i>Fromage étranger</i>							
Fontal	Frankreich/France	1966	—	—	99	—	”
Port-Salut			—	—	28	—	”
Gouda	Holland/Hollande		—	—	77	—	”
Edam			—	—	93	—	”
Gouda	Dänemark/ Danemark		—	—	121	—	”
Samsoe			—	—	100	—	”
Gorgonzola	Italien/Italie		—	—	68	—	”
Cheddar	Australien/Australie		—	—	60	—	”
Raclette	Ausländisch/ Etranger		—	—	161	—	”

C. Cerealien / Céréales

Weizen/Froment	Schweiz/Suisse	Ernte/ Récolte 1965						Ca g/kg	EGA/ SFHP
	Wil (SG)		3586	168	78	208	0,37	„	
	Guin (FR)		3626	172	92	246	0,37	„	
	Huttwil (BE)		3648	163	88	225	0,39	„	
	Brunnen (SZ)		3643	189	95	240	0,40	„	

Bezeichnung der Proben Désignation des échantillons	Herkunft Provenance	Ernte Récolte	Spezifische Beta-Aktivität Activité bêta spécifique		Strontium-90		Untersuchungs- Laboratorien Laboratoires d'analyses	
			Totale pCi/kg	Oxalat- Niederschlag Précipité des oxalates pCi/kg	pCi/kg	US		
Weizen/Froment <i>Lien en poudre blanche</i>	Renens (VD) Bellinzone (TI) Brigue (VS)	1965	3474	192	97	261	0,36	EGA/ SFHP ,,
			3553	296	164	401	0,41	
			3424	196	108	253	0,42	
	Mittelwerte/ Moyennes	1962	4270	—	42	111	0,38	,,
		1963	4618	317	411	895	0,46	
		1964	3857	213	122	321	0,38	
		1965	3564	196	103	262	0,39	
Entsprech. Weißmehl/ Farine blanche correspondante	Wil (SG) Guin (FR) Huttwil (BE) Brunnen (SZ) Renens (VD) Bellinzone (TI) Brigue (VS)	1965	1248	44	20	87	0,23	,,
			1284	43	31	141	0,22	
			1296	42	25	127	0,20	
			1346	38	24	84	0,29	
			1131	40	30	126	0,24	
			1103	89	58	246	0,23	
			1128	45	25	108	0,23	

	Mittelwerte/ Moyennes	1962	—	—	15	67	0,23	EGA/ SFHP
		1963	1587	206	77	308	0,25	
		1964	1447	75	43	159	0,27	"
		1965	1219	49	30	131	0,23	"
<i>Entsprech. Backmehl/ Farine bise correspondante</i>	Mittelwerte/ Moyennes	1962	—	—	36	96	0,38	"
		1963	2761	371	144	400	0,36	"
		1964	3070	182	95	281	0,34	"
		1965	1892	92	55	182	0,30	"
<i>Entsprech. Kleiel/ Son correspondant</i>	Mittelwerte/ Moyennes	1962	—	—	91	108	0,84	"
		1963	12 650	2250	1211	1242	0,98	"
		1964	10 670	652	384	420	0,91	"
		1965	8382	412	254	300	0,83	"
<i>Weißmehl/Farine blanche**</i>	Mühle VSK. Zürich/ Moulin VSK, Zurich	Datum 14. 4. 1966	1384 1261 1732 2099	60 51 62 90	21 24 44 47	— — — —	Zürich/Zurich " " " "	
<i>Halbweißmehl/ Farine mi-blanche**</i>								
<i>Ruchmehl/Farine bise**</i>								
<i>Reis/Riz Maisgrieß/Semoule de maïs</i>	Siam Schweiz/Suisse	26. 1.	605 1434	13 11	— —	— —	Basel/Bâle " " "	

** Zusammensetzung der Mehlproben / Composition des échantillons de farine: Ruchmehl/Farine bise: 46 % Inland/Suisse, 54 % Auslandanteil/Etranger, Halbweiß/Farine mi-blanche: 58 % Inland/Suisse, 42 % Auslandanteil/Etranger, Weißmehl/Farine blanche: 58 % Inland/Suisse, 42 % Auslandanteil/Etranger.

Bezeichnung und Anzahl der Proben Désignation et nombre des échantillons	Herkunft Provenance	Datum Date	Spezifische Beta-Aktivität Activité bêta spécifique		Strontium-90		Untersuchungs- Laboratorien Laboratoires d'analyses	
			Totale pCi/kg	Oxalat- Niederschlag Précipité des oxalates pCi/kg	pCi/kg	US		
Brot/Pain weiß/blanc	4	Cossonay	1966 1. 2.- 31. 10.	981	—	11 (8-14)*	—	Lausanne
halbweiß/mi-blanc	4			1154	—	14 (13-15)*	—	„
schwarz/noir	4			1500	—	22 (15-28)*	—	„
weiß/blanc	4	Granges-Marnand		774	—	10 (8-13)*	—	„
halbweiß/mi-blanc	4			911	—	13 (10-18)*	—	„
schwarz/noir	4			1620	—	27 (23-34)*	—	„
weiß/blanc	4	Plainpalais		780	—	6 (5-8)*	—	„
halbweiß/mi-blanc	4			978	—	11 (6-14)*	—	„
schwarz/noir	4			1415	—	14 (15-18)*	—	„

* In Klammern: Extremwerte / Entre parenthèses: Valeurs extrêmes rencontrées.

Ruchbrot/Pain-bis	Zürich/Zurich	10.	1628	—	30	—	Lausanne
Halbweiß/mi-blanc			2502	—	10	—	„
Tessiner/tessinois			3132	—	7	—	„
schwarz/noir	Basel/Bâle	13. 6.	1462	—	27	—	„
halbweiß/mi-blanc	Bern/Berne	1967 9. 2.	--	—	16	69	EGA/SFHP
Ruchbrot/Pain-bis			—	—	20	75	„
<i>Kindernährmittel/</i>							
<i>Aliments pour enfants</i>							
Ceral Grießbrei/		1966					
Bouillie de semoule	Wander	20. 6.	5395	179	—	—	Basel/Bâle
Vollkorn/							
Céréales complètes	Galactina		1651	22	—	—	„
Lacto-Veguva	Wander	28. 9.	8487	317	—	—	Zürich-Stadt/ Zurich-ville
Pайдол-Kindergrieß/	Dütschler (SG)		2469	302	—	—	„
Semoule pour enfants							
Phosphat-Kindermehl/	Knorr		3072	50	22	—	„
Farine phosphatée							
pour enfants							
Phoscalcin-Kindermehl/	Hug, Malters		2044	55	55	—	„
Phoscalcin-farine							
pour enfants	Milupa		5531	69	54	—	„
Milivid-Kindergrieß/	Nestlé	30. 9.	9734	214	—	—	„
Milivid-semoule	Nestlé		13 574	380	—	—	„
pour enfants							
Pelargon							
Eledon							

Bezeichnung der Proben Désignation des échantillons	Herkunft Provenance	Datum Date	Spezifische Beta-Aktivität Activité bêta spécifique		Strontium-90		Untersuchungs- Laboratorien Laboratoires d'analyses
			Totale pCi/kg	Oxalat- Niederschlag Précipité des oxalates pCi/kg	pCi/kg	US	
<i>D. Früchte / Fruits*</i>							
Aepfel/Pommes	Schweiz/Suisse	1966					Basel/Bâle
Apfelingre/	Schweiz/Suisse	19. 10.	692	12	6	—	
Pommes séchées	Italien/Italie	11. 11.	4399	17	—	—	EGA/SFHP
Aprikosen/Abricots	"	27. 6.	2086	29	8	51	Basel/Bâle
"	"	12. 2.	1937	32	5	—	
Bananen - eßbarer Teil		31. 5.	2786	—	9	—	Zürich/Zurich
Bananes, sans la pelure							
Bananen-Schalen/							
Bananes pelure	Schweiz/Suisse	6664	18	11	—	—	
Birnen/Poires	Italien/Italie	9. 11.	849	8	4	—	Basel/Bâle
Erdbeeren/Fraises	"	24. 5.	1345	19	—	—	EGA/SFHP
	Wallis/Valais	6. 6.	1165	37	—	—	"
		27. 6.	1091	41	16	96	
Kirschen/Cerises	Schweiz/Suisse (Basel/Bâle)	7. 7.	1604	27	6	—	Basel/Bâle
Orangen/Oranges	Schweiz/Suisse		1498	19	6	25	EGA/SFHP
	Südafrika/ Afrique du sud	12. 12.	952	5	—	—	Basel/Bâle
Pfirsiche/Pêches	Kalifornien/ Californie	25. 10.	709	3	—	—	"

* Es handelt sich um gewaschene Früchte / Il s'agit de fruits lavés.

Trauben, weiß/ Raisin, blanc Zwetschgen/Prunes	Italien/Italie „ Elsaß/Alsace Schweiz/Suisse	12. 7. 27. 6. 27. 9. 6. 10.	1937 1545 1462 1507	32 8 20 24	5 4 6 5	— 62 — —	Basel/Bâle EGA/SFHP Basel/Bâle „
--	---	--------------------------------------	------------------------------	---------------------	------------------	-------------------	---

E. Gemüse / Légumes*

Fenchel/Fenouil Kopfsalat/Salade pommée Lauch/Poireau Rosenkohl/ Choux de Bruxelles Rotkraut/Choux rouges Sellerie/Céleri Spinat/Epinards	Italien/Italie Schweiz/Suisse Italien/Italie Holland/Hollande Schweiz/Suisse „ „ „ „	27. 1. 31. 3. 27. 1. 3807 31. 3. 27. 1. 31. 3. 4. 4. 20. 5.	1932 1690 2593 3807 3064 1639 3906 5519 4099	7 60 41 19 27 34 — 108 172	— 32 — — 19 — 15 87 —	— — — — — — — — —	Basel/Bâle Zürich/Zurich Basel/Bâle „ Zürich/Zurich Basel/Bâle Zürich/Zurich „ “
--	--	---	--	--	---	---	--

F. Verschiedenes / Divers

Kraftnährmittel/ Aliments fortifiants Jemalt Starkosan Pilze/Champignons Lorcheln/Hellovelles getrocknet/séchées „ Steinpilze, getrocknet/ Bolets séchés	Wander Friedmann (ZH) UdSSR Polen/Pologne Jugoslavien/ Jugoslavie	30. 9. 15. 8. 18. 8. 21. 10.	8956 6065 25 518 31 331 11 916	271 245 750 898 178	— — — 327 —	— — — — —	„ „ Basel/Bâle „ Zürich/Zurich
---	--	---------------------------------------	--	---------------------------------	-------------------------	-----------------------	--

* Es handelt sich um gewaschene Gemüse / Il s'agit de légumes lavés.

Bezeichnung der Proben Désignation des échantillons	Herkunft Provenance	Datum Date	Spezifische Beta-Aktivität Activité bêta spécifique		Strontium-90		Untersuchungs- Laboratorien Laboratoires d'analyses
			Totale pCi/kg	Oxalat- Niederschlag Précipité des oxalates pCi/kg	pCi/kg	US	
Rindfleisch/viande de bœuf	Polen/Pologne	1966 14. 9.	2300	19	13	—	Zürich-Stadt/ Zurich-ville
Gefriervolleil							
Poudre d'œufs lyophilisés	Polen/Pologne	13. 9.	1607	45	33	—	"
Salm/Saumon	Kanada	15. 11.	2180	1	—	—	Basel/Bâle

G. Wasser / Eau

Mineralwasser/ Eaux minérales		1966	pCi/l	pCi/l			
Henniez-Santé		9. 3.	—	1			"
Lostorfer			—	1			"
Meltinger			—	2			"
Meltinger-Silberquell			—	1			"
Passuger Theophil			—	2			"
Riedstern spez.			—	1			"
Weissenburger spez.			—	1			"
Zurzacher			—	1			"
Birmo (Birmenstorfer)			—	7			"
Emser Kränchen			—	1			"
Grenzacher			—	5			"
Staatl. Fachingen			—	1			"
Charrier			—	1			"

Contrexéville			—	1		Basel/Bâle
Evian			—	1		"
Perrier			—	1		"
Vichy Célestins			—	7		"
Vittel			—	1		"
<i>Trinkwasser/Eau potable</i>	<i>Basel/Bâle</i>	13. 4.	—	1		"
		23. 5.	—	1		"
		28. 9.	—	< 1		"
		7. 11.	—	1		"
		13. 12.	—	< 1		"
Bodensee Wasser- werk der Stadt	12. 1.	3	—		St. Gallen/ St. Gall	
St. Gallen/St. Gall Rohwasser	9. 2.	3	—			
	8. 3.	3	—		"	
	13. 4.	3	—		"	
	11. 5.	2	—		"	
	22. 6.	3	—		"	
	20. 7.	3	—		"	
	17. 8.	4	—		"	
	14. 9.	2	—		"	
	19. 10.	2	—		"	
	16. 11.	4	—		"	
	14. 12.	2	—		"	
Quellwasser	12. 1.	4	—		"	
Hundwil der Wasserversorgung	9. 2.	2	—		"	
St. Gallen/St. Gall	8. 3.	2	—		"	
	13. 4.	3	—		"	
	11. 5.	0	—		"	
	22. 6.	1	—		"	
	20. 7.	0	—		"	
	17. 8.	1	—		"	

Bezeichnung der Proben Désignation des échantillons	Herkunft Provenance	Datum Date	Spezifische Beta-Aktivität Activité bêta spécifique		Untersuchungs- Laboratorien Laboratoires d'analyses
			Totale pCi/l	Oxalat- Niederschlag Précipité des oxalates pCi/l	
Trinkwasser/Eau potable	Grundwasser Breitfeld der Wasserversorgung St. Gallen/St. Gall	1966			
		12. 1.	3	—	St. Gallen/ St. Gall
		9. 2.	3	—	"
		8. 3.	1	—	"
		13. 4.	3	—	"
		11. 5.	3	—	"
		22. 6.	4	—	"
		20. 7.	0	—	"
		17. 8.	1	—	"
		14. 9.	1	—	"
		19. 10.	3	—	"
		16. 11.	3	—	"
		14. 12.	0	—	"
Trinkwasser/Eau potable	Grundwasser der Wasserversorgung Bregenz	1966			
		12. 1.	2	—	"
		9. 2.	1	—	"
		8. 3.	1	—	"
		13. 4.	0	—	"
		11. 5.	1	—	"
		22. 6.	0	—	"

Trinkwasser/Eau potable	Bodensee Wasserwerk der Stadt Lindau i. B.	20. 7.	1			St. Gallen/ St. Gall
		7. 8.	3			
		14. 9.	1			
		19. 10.	4			
		16. 11.	2			
		14. 12.	0			
				roh filtriert		
		12. 1.	3 3			
		9. 2.	3 2			
		8. 3.	3 3			
		13. 4.	3 3			
		11. 5.	3 2			
Oberflächenwasser/ Eau de surface	Rhein/Rhin	22. 6.	2 4			„
		20. 7.	4 4			
		17. 8.	2 2			
		14. 9.	2 2			
		19. 10.	3 2			
		16. 11.	2 3			
		14. 12.	2 2			
		12. 1.	4			
		9. 2.	4			
		8. 3.	3			
		13. 4.	5			

Bezeichnung der Proben Désignation des échantillons	Herkunft Provenance	Datum Date	Spezifische Beta-Aktivität Activité bêta spécifique		Untersuchungs- Laboratorien Laboratoires d'analyses
			Totale pCi/l	Oxalat Niederschlag Précipité des oxalates pCi/l	
<i>Oberflächenwasser/ Eau de surface</i>	Bregenzer Aach	1966			
		14. 12.	3	—	”
		12. 1.	6	—	”
		9. 2.	27	—	”
		8. 3.	2	—	”
		13. 4.	4	—	”
		11. 5.	3	—	”
		22. 6.	5	—	”
		20. 7.	2	—	St. Gallen/ St. Gall
		17. 8.	4	—	
		14. 9.	1	—	”
		19. 10.	2	—	”
<i>Niederschläge/ Précipitations</i>	Schnee/Neige	16. 11.	6	—	”
		14. 12.	1	—	”
	Regen/Pluie	12. 1.	4	—	”
		29./30. 10.	7	—	”
		14. 11.	72	—	”
		28. 4.	30	—	”
		6. 5.	14	—	”
		10. 5.	10	—	”
		19. 5.	9	—	”
		27. 5.	33	—	”
		3. 6.	23	—	”

<i>Niederschläge/ Précipitations</i>	<i>Regen/Pluie</i>	6. 6.	37	—	St. Gallen/ St. Gall
		8. 6.	71	—	"
		13. 6.	100	—	"
		21. 6.	25	—	"
		4. 7.	52	—	"
		4./5. 7.	155	—	"
		5. 7.	32	—	"
		5./6. 7.	22	—	"
		7. 7.	55	—	"
		8. 7.	34	—	"
		11. 7.	49	—	"
		14. 7.	19	—	"
		15. 7.	17	—	"
		18. 7.	12	—	"
		22. 7.	28	—	"
		23. 7.	31	—	"
		25. 7.	15	—	"
		28. 7.	40	—	"
		2. 8.	14	—	"
		5. 8.	24	—	"
		8. 8.	11	—	"
		15. 8.	18	—	"
		16. 8.	11	—	"
		19. 10.	16	—	"
		21. 10.	27	—	"
		24. 10.	21	—	"
		26. 10.	41	—	"
		27./28. 10.	25	—	"
		4. 11.	6	—	"
		10. 11.	53	—	"

Bezeichnung Désignation	Herkunft Provenance	Datum Date	Spezifische Beta-Aktivität Activité bêta spécifique		Restaktivität Activité restante	Untersuchungs- Laboratorien Laboratoires d'analyses
			Totale pCi/l	^{40}K pCi/l		
			pCi/l			
<i>Flußwasser/Eau de rivière</i> Rhein/Rhin	Nähe/près Rheinau	1966				Zürich-Stadt/ Zurich-ville
		4. 1.	3,9	1,1	2,8	"
		12. 4.	3,9	1,3	2,6	"
		12. 7.	9,2	0,8	8,4	"
		4. 10.	2,4	1,0	1,4	"
		Au	1,8	1,4	0,4	"
		G 102	3,7	2,2	1,5	"
		G 105	1,4	2,3	—	"
		Hardhof	2,6	0,8	1,8	"
		G 401	3,9	1,1	2,8	"
<i>Limmat Grundwasser</i> <i>Nappe souterraine</i>	Rheinau	18. 10.	2,6	0,8	1,8	"
		4. 1.	3,9	1,1	2,8	"
		12. 4.	2,5	1,6	0,9	"
		12. 7.	8,8	0,8	8,0	"
		4. 10.	1,2	0,9	0,3	"
Gegend von Winterthur/ Région de Winterthur	Gegend von Winterthur/ Région de Winterthur	4. 10	0,6	0,7	—	"
		Hornsäge	2,2	1,2	1,3	"
		Luisenthal	0,8	1,1	—	"
		mittl. Au	1,3	1,1	0,2	"
		Weieracker	1,4	1,8	—	"
		Knorrenberg	1,3	1,1	0,2	"
		Stadtacker				

	Hard		2,6	2,3	0,3	Zürich-Stadt/ Zurich-ville
	Weiertal		1,3	0,8	0,5	
	Hardof					
	a. d. Limmat	18. 10.	1,7	1,5	0,2	"
	Sihl- und Lorzental	3. 10.	0,5	0,6	—	"
	Einlauf					
	Seewasserwerke					
	Moos					
	Rohwasser		2,8	0,8	2,0	"
	Reinwasser		2,5	0,9	1,6	"
	Lengg					
	Rohwasser		3,0	0,7	2,3	"
	Reinwasser		2,5	0,7	1,8	"
	Zürichsee					
	Oberfläche	11. 10.	3,4	0,7	2,7	"
	130 m tief		2,9	0,9	2,0	"
Seewasser - Zürichsee/ Eau du Lac de Zurich						