

Zeitschrift:	Mitteilungen aus dem Gebiete der Lebensmitteluntersuchung und Hygiene = Travaux de chimie alimentaire et d'hygiène
Herausgeber:	Bundesamt für Gesundheit
Band:	63 (1972)
Heft:	1
Artikel:	Dosage des et lactones dans les graisses alimentaires
Autor:	Martin, E. / Berner, Ch.
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-982787

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 26.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

- brome de 0,4 ppm en utilisant pour la lecture spectrophotométrique des cuves de 4 cm et en doublant la prise de produit.
- La méthode décrite a été appliquée au cas des fèves de cacao mais il est évident qu'elle peut être appliquée à d'autres produits.

Résumé

La méthode colorimétrique de *P. Jaulmes* pour le dosage du brome a été adaptée aux conditions de la lecture spectrophotométrique. Elle a été appliquée au dosage du brome dans des fèves de cacao. Cette méthode permet de déterminer une teneur en brome de 0,4 ppm.

Zusammenfassung

Die kolorimetrische Brombestimmung nach *P. Jaulmes* wird an die Spektrophotometrie angepaßt. Sie wurde für die Brombestimmung in Kakaobohnen angewendet und gestattet die Erfassung eines Bromgehalts ab 0,4 ppm.

Bibliographie

1. *P. Jaulmes, Mme S. Brun-Cordier et J. C. Cabanis*, Trav. Soc. Pharm. Montpellier, **20**, fasc. II, 84 (1960).

Dosage des γ et δ lactones dans les graisses alimentaires

Dr *E. Martin et Ch. Berner*

Laboratoire cantonal de chimie, Genève

1. Introduction

Les lactones sont des constituants aromatiques importants, rencontrées dans différents produits naturels. *Boldingh et Taylor* (1) ont démontré la présence dans le beurre de différentes δ lactones et dans des proportions plus faibles de γ lactones. *G. Jurriens et J. M. Oele* (2) ont noté par chromatographie sur colonne et en couche mince les hydroxyacides libres et estérifiés de la graisse de beurre. Il était intéressant pour nous de mettre au point une méthode de séparation rapide. Les lactones ont été séparées par extraction liquide-liquide puis dosées par chromatographie en phase gazeuse.

2. Principe

La graisse mise en solution dans l'éther de pétrole est débarrassée des acides gras libres par extraction de ces derniers à l'aide d'un solution aqueuse de bicar-

bonate de sodium. Les γ et δ lactones sont ensuite extraites de la solution éthérée sous forme d'acide-alcools à l'aide d'une solution de soude caustique. La solution aqueuse ainsi obtenue est acidifiée à l'aide d'acide sulfurique. Les γ et δ lactones libres sont extraites avec de l'éther de pétrole. Après évaporation de l'éther de pétrole, le résidu est repris par de l'iso-octane et chromatographié en phase gazeuse.

3. Réactifs

- Ether de pétrole Ph. Helv. V.
- Solution aqueuse à 10 % de NaHCO₃ en poudre très pur Merck.
- Solution aqueuse à 2 % de NaOH pro anal. Merck et 20 % de Na₂SO₄ Ph. Helv. V.
- H₂SO₄ 95—97 % pro anal. Merck.
- Iso-octane pour spectroscopie Merck.
- Solution étalon de γ et δ lactones de C₈ à C₁₂ dans l'iso-octane, contenant 60 µg de chaque lactone par ml d'iso-octane.

4. Appareillage

- Entonnoirs à décanter de 500 ml.
- Ballons de 250 ml, à fond plat et col rodé.
- Evaporateur rotatif.
- Chromatographe en phase gazeuse Perkin Elmer 900 avec enregistreur Perkin Elmer 165. Les colonnes utilisées ont les caractéristiques suivantes:

Phase stationnaire: Néopentylglycolsuccinate 8 %;

Support: chromosorb W 80/100 lavé à l'acide;

Longueur: 2 mètres;

Diamètre: $1/8$ ";

Gaz vecteur: N₂, 30 ml/minute;

Température constante: 180 °C;

Détecteur à ionisation de flamme;

Injecteur: température 300 °C;

Manifold: température 300 °C.

5. Mode opératoire

Tarer deux bêchers de 250 ml, forme haute, et peser dans chacun d'eux 50,00 g de graisse. Faire fondre la graisse en chauffant légèrement les deux bêchers. Verser le contenu de chaque bêcher dans un entonnoir à décanter de 500 ml. Rincer chaque bêcher avec 50 ml d'éther de pétrole qui sont versés dans l'entonnoir à décanter. Dans un des entonnoirs à décanter, ajouter 1 ml de solution étalon de γ et δ lactones. Bien mélanger le contenu de chaque ampoule de façon à obtenir une solution homogène. Verser dans chaque ampoule 100 ml de solution de bicarbonate de sodium et agiter 2 minutes. Laisser les phases se séparer. Eliminer la couche bicarbonatée (inférieure); cette phase contient les

acides gras libres sous forme de sels sodiques. Verser dans chaque ampoule 100 ml de solution de NaOH et Na₂SO₄. Agiter 2 minutes. La couche supérieure est éliminée par siphonage. La phase aqueuse (inférieure) contenant les acides-alcools est lavée avec 3 portions de 50 ml chacune d'éther de pétrole. L'éther de pétrole est éliminé par siphonnage. Verser lentement en agitant dans l'entonnoir à décanter 10 ml d'acide sulfurique concentré. Laisser refroidir. Extraire la phase aqueuse avec 3 portions de 50 ml chacune d'éther de pétrole. Les extraits éthérés combinés sont évaporés sous pression réduite dans l'appareil rotatif. Le résidu est repris par 1 ml d'iso-octane. Injecter dans le chromatographe, dans les conditions décrites sous appareillage, 1 µl de solution ainsi obtenue.

6. Résultats

En ce qui concerne la chromatographie en phase gazeuse, nous avons fait des essais avec différentes colonnes. Ainsi, une colonne de carbowax 20 M à 7 % sur chromosorb W 80/100 donne de bons résultats pour les γ lactones (pics symétriques). Par contre les δ lactones sur cette même colonne traînent (pics asymétriques). Avec une colonne de néopentylglycolsuccinate à 8 % sur chromosorb W 80/100 les pics sont symétriques aussi bien pour les γ lactones que pour les δ lactones.

Sur la figure 1 nous avons reproduit le chromatogramme obtenu avec cette colonne dans les conditions citées au § 4. Chaque pic représente environ 60 ng de lactone.


Colonne: 8% N.P.G.S./Chromosorb W 80/100

longueur: 2m - Diamètre : 1/8 "

Température : 180 °C

Sensibilité : 10x1

Quantité de lactone \approx 60ng



Colonne : 8% N.P.G.S./Chromosorb W 80/100

longueur : 2m - Diamètre : 1/8"

température : 180°C

Sensibilité : 10x1

Graisse A : 50g.




Fig. 2

Sur la figure 2 est représenté le chromatogramme correspondant à une graisse et sur la figure 3 le chromatogramme de la même graisse additionnée de γ et δ lactones de C_8 à C_{12} à une concentration de 1 ppm pour chaque lactone.

Dans le tableau 1 nous avons rassemblé les valeurs des rendements obtenus pour chaque lactone introduite dans une graisse végétale à une concentration de 1 ppm.

Tableau 1 Rendements d'extraction obtenus (%)

	δ lactones	γ lactones
C_8	67	69
C_9	65	63
C_{10}	100	12
C_{11}	45	0
C_{12}	46	0

Les rendements sont satisfaisants pour les δ lactones de C_8 à C_{12} . Il en est même pour les γ lactones de C_8 à C_9 . Le rendement tombe à 12 % pour la γ

Colonne : 8% N.P.G.S./Chromosorb W 80/100
 longueur : 2m - Diamètre : 1/8"
 température : 180°C
 Sensibilité : 10x1

Graisse A additionnée de 1 p.p.m. de chaque lactone




Fig. 3

décalactone. Il est pratiquement nul pour la γ undécalactone et la γ dodécalactone.

Résumé

Une méthode de séparation et de dosage des γ et δ lactones de C_8 à C_{12} dans les graisses a été mise au point. Ces lactones sont séparées de la graisse par extraction liquide-liquide. Le dosage est effectué par chromatographie en phase gazeuse avec étalon interne sur colonne de néopentylglycolsuccinate. Des teneurs en δ lactones de C_8 à C_{12} et en γ lactones de C_8 à C_9 inférieures à 1 ppm peuvent être aisément déterminées.

Zusammenfassung

Es wurde eine Methode zur Trennung und Bestimmung von γ - und δ -Lactonen von C_8-C_{12} in den Speisefetten ausgearbeitet. Die Lactone werden durch flüssig-flüssig Extraktion vom Fett getrennt; die Bestimmung erfolgt durch Gaschromatographie mit inneren Standards. So lässt sich ein Gehalt von unter 1 ppm von δ -Lactonen von C_8-C_{12} und γ -Lactonen von C_8-C_9 bestimmen.

Bibliographie

1. Boldingh J. et R. J. Taylor: Nature **194**, 909—913 (1962).
2. Jurriens G. et J. M. Oele: J.A.O.C.S. **42**, 857—861 (1965).