Zeitschrift: Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Bern

Herausgeber: Naturforschende Gesellschaft Bern

Band: - (1844)

Heft: 15-23

Artikel: Verzeichniss schweizerischer Schwämme, welche grösstentheils in der Umgebung von Thun gesammelt worden sind

Autor: Trog, J.G.

Register: Classis I. Hymenomycetes : Saamenhautschwämme

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-318165

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 07.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Classis I. HYMENOMYCETES. *Saamenhautschwämme.*

Ordo I. AGARICINI. *Blätterschwammartige.*

Genus I. AGARICUS. *Blätterschwamm.*

Series I. *LEUCOSPORI.* Weisssamer.

Subgenus I. AMANITA. *Wulstblätterschwamm.*

1. *Ag. cæsareus Schæff.* Hall. helv. 2430. Krombh. *t.* 8.! *) (Kaiserling). In Tannwäldern, die eine südliche Lage haben, bei uns selten (Bächenhölzli).
2. „ *phalloides Fr.* Hall. 2355. Krombh. t. 28. fig. 4—10! (Knollenblätterschwamm). In Tannwäldern, vom Juli bis Oktober mit weissem, mit gelbem und mit grünlichem Hut (Grüsisberg).
3. „ *muscarius Linn.* Hall. 2373. Schæff. t. 27. 28! Krombh. t. 9.! (Fliegenschwamm). In allen Wäldern, vom August bis Oktober. Grüsisberg, Bächenhölzli.
4. „ *pantherinus DeCand.* Hall. 2397. Schæff. t. 90! Krombh. t. 29. f. 10—13! (Pantherschwamm). In schattigen Wäldern, vom Juli bis Oktober. Grüsisberg, Bannwald.
5. „ *solitarius Bull.* t. 48 (der einsame Blätterschwamm). In lichten Wäldern der Ebene, Juli bis September. Rossweid.
6. „ *rubescens Pers.* Schæff. t. 91! Krombh. t. 10. f. 1—5! (Perlenschwamm). In Nadelholzwaldungen, vom Juli bis September. Lengenbühlwald, Grüsisberg.
7. „ *asper Pers.* Hall. 2365. Krombh. t. 29. f. 18—21! (rauhschuppiger Blätterschwamm). In Wäldern, Gärten, an Hecken etc., vom Juli bis Oktober. Bei Albligen an einer Hecke. Thun in einem Garten.
8. „ *vaginatus Bull.* (Scheidenschwamm):
   a) mit mäusegrauem *Ag. lividus* Auct. Schæff. t. 85. 86! Krombh. t. 1. f. 2—5!

---

*) Nur diejenigen Abbildungen, deren Citate mit einem ! versehen sind, habe ich vergleichen können; von den übrigen standen mir die Werke nicht zu Gebote.

b) mit bleifahlem *Ag. plumbeus Schæff.*

c) mit kastanienbraunem Hut. *Ag. badius* Schæff. t. 245! Krombh. t. 10. f. 6—9!

In Tannwäldern und an schattigen Hecken. Im Sommer und Herbst. Dorfhalden, Bächenhölzli, Grüsisberg, Schwarzenegg.

SUBGENUS II. LEPIOTA. *Ringblätterschwamm.*

9. *Agaricus procerus Scop.* Hall. 2371. Schæff. t. 22. 23! Krombh. t. 24. f. 1—12! (Parasolschwamm). In lichten und frischgeschlagenen Waldungen, vom August bis November. Der Hut hat bisweilen 1 Fuss im Durchmesser. Grüsisberg, Dorfhalden, Lengenbühlwald.

10. » *rachodes Vittad.* Mang. t. 20. Auf freiem Feld auf der Thunallmend, im November.

11. » *acutesquamosus Weinm.* — *trichochtoides.* Krombh. t. 1. fig. 18—20! In Wäldern, an Hecken, im Herbst. Balmholz.

12. » *clypeolarius Bull.* t. 405. 506. f. 2. Hall. 1372. In schattigen Wäldern, im Oktober. Grüsisberg, Dorfhalden.

13. » *confusus Trog.* Hut fleischig, zuerst glockig, dann gewölbt und endlich flach, nackt, glatt; Strunk ausgestopft, gleich dick, fast gestreift weiss, graulich werdend, mit einem einfachen, zurückgebogenen Ring; Lamellen vom Strunke entfernt, weiss, am Randende breiter. In einem sonnigen Garten, im November, in der *Chartreuse.*

14. » *cristatus Bolt.* Hall. 2356. Krombh. t. 25. f. 26—30! In Wäldern, Erlengebüschen und auf Rasenplätzen. Bannwald, Grüsisberg.

15. » *cepæstipes Weinm.* Fl. Dan. t. 1798. Auf Lohbeeten in Treibhäusern, im Herbst Im bot. Garten in Bern.

16. » *granulosus Batsch.* Krombh. t. 1. f. 12! In feuchten Tannwäldern von gelber, rother und weisser Farbe, vom Juli bis Dezember. Grüsisberg, Schwarzenegg.

17. » *carcharias Pers.* Icon. pict. t. 5. f. 1—3! A. granulosus, d. Fries. Krombh. t. 25. f. 21—25! In Tannwäldern. Seine Farbe ist gewöhnlich ein zartes Rosenroth, kömmt aber auch ganz weiss vor. Grüsisberg.

18. » *seminudus Lasch.* In Wäldern, Mai. Bei Bern.

SUBGENUS III. ARMILLARIA. *Armring-Blätterschwamm.*

19. *Agaricus bulbiger. Alb. et Schw.* In einem feuchten Tannwald, im Oktober. Dorfhalden.
20. » *aurantius Schæff.* t. 37! In Tannwäldern, vom August bis Oktober. Bächenhölzli, Grüsisberg.
21. » *melleus Fl. Dan.* A. Polymyces. Pers. (Hallimasch.). Schæff. t. 74! Hall. 2399? Auf faulenden Baumstöcken, im Herbst. Grüsisberg.
22. » *griseo-fuscus DeCand.* Auf Tannwurzeln, Oktober. Kandergrien.
23. » *mucidus Schrad.* Harzer's Schw. t. 35! Auf abgestandenen Buchen, September. Bächenhölzli.

SUBGENUS IV. TRICHOLOMA. *Haarsaumblätterschwamm.*

24. *Agaricus equestris Linn.* A. flavo-virens. Pers. Schæff. t. 41! In Wäldern, vom September bis Dezember. Grüsisberg, Bächenhölzli.
25. » *coryphæus Krombholz.* t. 68. f. 18—21? In Buchenwäldern. Bächenhölzli.
26. » *fucatus Fr.* In trockenen Tannwäldern, September, Oktober. Grüsisberg, Bächenhölzli.
27. » *flavo-brunneus Fr.* Schæff. t. 62! In feuchten Laubholzwäldern, August und September. Grüsisberg.
28. » *albo-brunneus Pers.* Hall. 2398. Schæff. t. 38! In Tannwäldern, vom August bis Oktober. Grüsisberg, Rustwald.
29. » *ustalis Fr.* Batt. t. 17, C. In Wäldern, vom August bis Oktober. Grüsisberg.
30. » *Russula Schæff.* t. 58! (der Honigtäubling). In Wäldern, den Herbst durch. Bächenhölzli, Dorfhalden.
31. » *rutilans Schæff.* Bolt. t. 14! In geschlagenen Waldungen, im September. Hardlisberg.
32. » *imbricatus Fr.* Hall. 2438. Schæff. t. 25! In Tannwäldern, im Spätherbst. Grüsisberg, Bächenhölzli.
33. » *vaccinus Schæff.* Hall. 2400. Batsch. f. 116! In Tannwäldern, im Oktober. Bächenhölzli, Grüsisberg.
34. » *polyphyllus DeCand.* In verschiedenen Wäldern, besonders Tannwäldern, im September und Oktober. Bächenhölzli, Grüsisberg.

35. *Agaricus terreus Schæff.* t. 64! In Tannwäldern, im September. Schwarzenegg, Bächenhölzli.
36. „ *saponaceus Fr.* Batsch. f. 203, a. b! Nach Regenwetter häufig in Nadelholzwaldungen, den Herbst durch. Bannwald, Dorfhalden.
37. » *hordus Fr.* Batsch. f. 203, c! In Wäldern, vom Juli bis September. Bannwald.
38. „ *virgatus Fr.* In Bergwäldern, September. Grüsisberg.
39. „ *limniscius Pers.* Batt. t. 17, D. In sonnigen Waldsäumen, im Oktober. Hardlisberg.
40. „ *sulphureus Bull.* t. 168. Hall. 2422. In Laubholzwäldern, im September. Rossweid, Kandergrien.
41. » *lascivus Fr.* Gesellig in Wäldern, im September und Oktober. Rossweid.
42. „ *cerinus Pers.* In Tannwäldern, Oktober. Tannwald bei Thierachern.
43. „ *gambosus Fr.* Lenz. t. 2. f. 6! Er scheint mit dem *Ag. Pomonæ Lenz* einerlei zu sein und wächst an sonnigen Rasenplätzen, vom Mai bis Juli. Kälberweid, Thunallmend.
44. „ *graveolens Pers.* Bull. t. 142. In Wäldern, an Waldsäumen im Gras, im Juni. Bächenhölzli, Uttigwäldchen.
45. „ *arcuatus Bull.* t. 443. Auf Wiesen, im Herbst. Einigen-Allmend.
46. „ *personatus Fr.* Bolt. t. 147! An schattigen Hecken, auf grasigten Stellen in Wäldern, im Herbst. Im Schwäbis.
47. „ *albo-fimbriatus Trog.* Hut etwas fest, filzig, stumpfbucklig, und bis an den Rand mit Schüppchen besetzt, röthlichbraun; Lamellen sehr gedrängt, gelblich mit weissgefranztem Rande; Strunk ausgestopft, dann hohl, gelblich dunkelroth werdend. In Tannwäldern, September. Grüsisberg.
48. „ *nudus Bull.* Harzer. t. 30! In Wäldern, im Oktober. Kandergrien.
49. „ *grammopodius DeCand.* Bull. t. 548. Auf Rasenplätzen in Tannwäldern, im Herbst. Bächenhölzli.
50. „ *melaleucus Pers.* Hall. 2387. In Wäldern und auf schattigen Weiden, vom Mai bis Oktober. Grüsisberg, Kälberweid.
51. „ *humilis Pers.* Buxb. Cent. 4. t. 32. Auf Grastellen in Wäldern, im Oktober und November. Uttigwald, Kälberweid.

SUBGENUS V. CLITOCYBE. *Strunkblätterschwamm.*

52. *Agaricus nebularis Batsch.* fig. 193! Hall. 2358. In Tannwäldern gemein, im September. Grüsisberg.
53. „ *gangrenosus Batt.* t. 20. f. M. In Wäldern, im Oktober. Dorfhalden,
54. „ *fumosus Pers.* Icon. pict. t. 7. f. 3! In Tannwäldern, im Herbst. Dorfhalden, Grüsisberg.
55. „ *curtipes Fr.* Auf sandigem Boden, im Frühling und Herbst. An der Zulg, auf Sandboden.
56. „ *opiparus Fr.* Schæff. t. 75! Gesellig in Tannwäldern, im Oktober und November. Grüsisberg.
57. „ *Trogii Fries.* Hut fleischig, fest, gewölbt ausgebreitet, stumpf, trocken, kahl; Strunk dicht, steif, kurz, unten verdickt, zottig und so wie die etwas herablaufenden, gedrängtstehenden, dünnen Lamellen, weiss. Geruch sehr lieblich. Auf Wiesen, bei Thierachern.
58. „ *odorus Bull.* Grev. Scott. t. 28! In Wäldern; riecht nach Anis und kömmt auch ganz weiss vor; vom August bis November. Grüsisberg, Bannwald, Bächenhölzli.
59. „ *cerussatus Fr.* Fl. Dan. t. 1796. In Nadelholzwaldungen, vom August bis Oktober. Grüsisberg.
    β. difformis. Sterb. t. 16, A. fand ich in dichten Rasen im Grüsisberg beim Flühli.
60. „ *tornatus Fr.* In Wäldern, im Oktober. Grüsisberg.
61. „ *candicans Pers.* Bull. 575. f. E. In Tannwäldern, im August. Dorfhalden.
62. „ *dealbatus Fr.* Sowerb. t. 123. Auf magern Viehweiden, August. Kälberweid.
63. „ *giganteus Fr.* Sowerb. t. 244. Auf schattigen Wiesen, im September. Räbgässli.
64. „ *maximus Fl. Wetter.* Buxb. Cent. 4. t. 1. In Wäldern, im November. Grüsisberg.
65. „ *infundibuliformis Fr.* Schæff. t. 212! In Wäldern zwischen Moos, im August. Grüsisberg, Dorfhalden.
66. „ *squamulosus Pers.* In Bergwäldern, vom Juni bis August.
67. „ *trullæformis Fr.* In Gebüschen und Wäldern, im September und Oktober. Grüsisberg.
68. „ *lentiginosus Fr.* In Wäldern, im Herbst. Uttigwäldchen.

69. *Agaricus parilis Fr.* In Tannwäldern, vom Juli bis Oktober. Kandergrien.

70. „ *gilvus Pers.* Bott. t. 22! In Tann- und Buchwäldern, vom August bis November. Grüsisberg.

71. „ *flaccidus Sow.* t. 185. In Tannwäldern, gesellig, zuweilen auch zu mehrern verwachsen, zwischen Moos, im August und September. Hardlisberg.

72. „ *cervinus Hoffm.* Hall. 2359. Nees Syst. f. 174! In feuchten Wäldern, im Spätherbst. Lengenbühlwald.

73. „ *cyathiformis Bull.* Bolt. t. 59, 145! Hall. 2449. In Wäldern, an der Erde und auf Stöcken, vom September bis Dezember. Kandergrien.

74. „ *suaveolens Schum.* Fl. Dan. t. 1912. f. 1. Auf Wiesen und Weiden, im Oktober. Thunallmend, Geissithal.

75. „ *metachrous Fr.* Hall. 2466. Gesellig in Wäldern, zwischen Moos, Oktober bis November. Rossweid, Tannwald bei Thierachern.

76. „ *fragrans Pers.* Krombh. t. 1. f. 34—38! Auf moosbewachsenen Rasen, vom September bis Dezember. Hüniboden.

77. „ *difformis Pers.* An schattigen Orten, vom August bis November. Grüsisberg.

78. „ *laccatus Scop.* Röthlich = *A. farinaceus Huds.* Hall. 2436. Schæff. t. 13! dunkelblau = *A. amethysteus Huds.* Hall. 2437. Bolt. t. 63! In Wäldern, an Holzwegen, vom August bis Oktober. Grüsisberg, Heimbergwald.

79. „ *Jonides Bull.?* In Tannwäldern, im September. Hardlisberg.

Subgenus VI. COLLYBIA. *Hellerblätterschwamm.*

80. *Agaricus radicatus Relh.* Greville Scott. crypt. t. 217! In Tannwäldern, vom Juni bis Oktober. Lengenbühlwald, Balmholz.

81. „ *fusipes Bull.* Krombh. t. 42. f. 9—11! (der Spindelschwamm). Er wächst in Büscheln am Fusse der Waldbäume, im August und September. Grüsisberg.

β. pileô albidô. Diese Abart ist seltener. Kandergrien.

82. „ *butyraceus DeCand.* Bull. t. 572. In Wäldern, vom Juni bis Oktober. Grüsisberg.

83. „ *phajopodius Bull.* t. 532. f. 2. Auf Torfland, im Oktober. Schwarzenegg.

84. *Agaricus velutipes Curt.* Batsch. f. 112! (der Schwarzfuss). An faulenden Weiden und Pappeln, bis weit in den Winter hinein. Auf der Allmend; auf dem Friedhof an Trauerweiden.

85. » *confluens Pers.* Batsch. f. 104! In sumpfigen Wäldern, vom August bis Oktober. Kandergrien.

86. » *ingratus Schum.* In Wäldern bei Bern, im Oktober. Hrn. Dr. Brunner.

87. » *tuberosus Bull.* Batsch. f. 93! Auf verfaulten Hutschwämmen in Wäldern, vom August bis November. Grüsisberg.

88. » *tenacellus Pers.* Icon. pict. t. 1. f. 3! In Nadelholzwäldern, auf Tannzapfen, im Sommer und Herbst. Eichibühl, Grüsisberg.

89. » *dryophilus Bull.* t. 434. In Wäldern, an der Erde, vom Mai bis Oktober.

90. » *clavus Bull.* Bolt. t. 39! Auf abgefallenen Aestchen, im Juni bis Oktober.

91. » *ocellatus Fr.* Bull. t. 569. f. 1. Auf Blättern und an der Erde, in Wäldern, vom August bis November. Grüsisberg.

92. » *plexipes Fr.* Fl. Dan. t. 2023. f. 2. Gesellig in der Nähe von faulenden Baumstöcken, im Spätherbst. Grüsisberg.

93. » *murinus Batsch.* f. 19! Auf magern Viehweiden, im Oktober. Kälberweid.

Subgenus VII. MYCENA. *Hautblätterschwamm.*

94. *Agaricus elegans Pers.* Fl. Dan. t. 2024. f. 2. In Tannwäldern, vom August bis November. Dorfhalden.

95. » *avenaceus Fr.* In Wäldern nach Regenwetter, vom September bis November. Grüsisberg.

96. » *rosellus Bull.* t. 518. Dieser kleine, ganz rosenfarbige Schwamm ist in Nadelholzwäldern häufig, August bis November. Grüsisberg, Kandergrien.

97. » *purus Pers.* Batsch. f. 20! In allen Wäldern, vom Juni bis November. Grüsisberg.

98. » *Adonis Bull.* t. 560. f. 2. Gesellig am Fusse von Bäumen, September, Oktober. Wäldchen an der Zulgmündung.

99. » *chloranthus Fr.* Obs. myc. t. 5. f. 2! In Gebüschen und auf Viehweiden, vom Juni bis Oktober. Thunallmend.

100. *Agaricus lineatus Bull.* t. 522. f. 3. Einzeln im Gras an freien Stellen in Laubholzwäldern, September. Zulghalden.

101. „ *luteo-albus Bolt.* t. 38. f. 2! In Tannwäldern, im Herbst. Grüsisberg.

102. „ *lacteus Pers.* Bolt. t. 37! Gesellig in Wäldern und Gebüschen, im August und September. Grüsisberg, Rossweid.

103. „ *galericulatus Scop.* Schæff. t. 52! Ein sehr gemeiner und veränderlicher Schwamm, welcher bald einzeln, bald rasenförmig, an der Erde und auf allerlei Bäumen vorkommt. Am Scherligweg, Grüsisberg.

104. „ *polygrammus Bull.* t. 395. In hohlen Baumstöcken, im Herbst. Kohlerenwald, Grüsisberg.

105. „ *alcalinus Vaill.* Schæff. t. 32! Hat einen auffallenden Geruch nach Salpetersäure; an der Erde und auf Baumstöcken, vom Mai bis Oktober. Grüsisberg.

106. „ *metatus Fr.* Paul. t. 122. f. 6. In Tannwäldern, im Spätherbst. *β. plicosus*, ebenfalls. Bächenhölzli.

107. „ *janthinus Fr.* Tannwälder, September, Oktober.

108. „ *griseus Batsch.* fig. 80. Auf Viehweiden, im September. Kälberweid.

109. „ *galopus Pers.* Fl. Dan. t. 1550. f. 2. In feuchten Tannwäldern nach Regenwetter; sein Strunk hat einen weissen Milchsaft, August bis November. Dorfhalden.

110. „ *epipterygius Scop.* Schæff. t. 31! In Wäldern, auf sumpfigem Boden. Grüsisberg, Dorfhalden.

111. „ *clavicularis Fr.* Bull. t. 80. Auf faulendem Tannholz, Oktober, November. Heimbergwald.

112. „ *vulgaris Pers.* Fl. Dan. t. 1678. f. 2. Dieser kleine, klebrige, graue Schwamm wächst gesellig auf abgefallenen Tannnadeln. Uttigwäldlein.

113. „ *corticola Pers.* Mich. t. 74. f. 8! Auf Laubholzbäumen. Bei Genf, H. Preiswerk.

114. „ *capillaris Fr.* Hall. 2346 und 2349. Mich. t. 80. f. 10. 11! Auf abgefallenen Blättern von Buchen, Erlen etc.

Subgenus VIII. OMPHALIA. *Kelchblätterschwamm.*

115. *Agaricus hydrogrammus Bull.* t. 564. f. A. Auf abgefallenen Baumblättern, September bis November.

116. *Agaricus pyxidatus Bull.* Nees Syst. f. 192! Auf Bergweiden, vom Mai bis November. Kileyberg.

117. „ *Epichysium Pers.* Icon. pict. t. 13. f. 1! An faulenden Stämmen von Laubholz, vom Juli bis Oktober. An der Zulg auf Populus.

118. „ *Oniscus Fr.* Bolt. t. 41! In Wäldern. Grüsisberg.

119. „ *stellatus Fr.* An faulenden Baumstöcken, vom Juli bis Oktober.

120. „ *Campanella Batsch.* Nees Syst. f. 191! An faulenden Baumstämmen, vom Mai bis im Dezember. Grüsisberg.

121. „ *setipes Fr.* Bull. t. 560. f. 3. An schattigen feuchten Stellen zwischen Moos, vom August bis Oktober. Grüsisberg.

122. „ *Fibula Bull.* Hall. 2370. Bull. t. 186. 550. f. 1. In Wäldern zwischen Moos und Gras, vom Mai bis Oktober. Uttigwäldchen.

123. „ *integrellus Pers.* Icon. et descr. t. 13. f. 5. Hall. 2348. Auf faulendem Holz, im Sommer und Herbst.

Subgenus IX. PLEUROTUS. *Seitenstielblätterschwamm.*

124. *Agaricus dryinus Pers.* Nees Syst. f. 177! An Stämmen von Laubholz, August bis November. Heimbergau.

125. „ *ulmarius Bull.* t. 510. (der Ulmenschwamm). In Wäldern, an den Wurzeln von Laubholz. Grüsisberg.

126. „ *ostreatus Jacq.* Krombh. t. 2. fig. 1. t. 41! (der Drehling). Auf faulenden Stöcken von Laubholz, Herbst. In der Au, an der Zulg.

127. „ *salignus Pers.* Paul. t. 22. (der Weidenschwamm). Auf Weiden und Pappeln, im Sommer und Herbst.

128. „ *petaloides Bull.* t. 226. 557. Auf buchenem Holz, vom September bis Dezember. Holzmatte.

129. „ *serotinus Pers.* Schrad. Abbild. 3. An faulendem Laubholz, vom November bis Januar. Wartgraben.

130. „ *nidulans Pers.* Icon. et desc. t. 6. f. 4. Auf Tannholz, im Oktober. An der Sägmühle zu Thun.

131. „ *applicatus Batsch* f. 125! An faulenden Stämmen, im Herbst und Frühling. Sägmühle.

132. „ *perpusillus Lumn.* Fl. Dan. t. 1295. f. 1. Auf Stämmen und Aesten, vom Sept. bis Dez. Grüsisberg, Holzmatte.

Series II. *HYPORHODII.* Rothsamer.

Subgenus X. PLUTEUS. *Hirschblätterschwamm.*

133. *Agaricus Pluteus Batsch.* f. 76! Hall. 2417. An Baumstämmen in Wäldern, vom Mai bis November. Bächenhölzli, Dorfhalden.
134. „ *umbrosus Pers.* Icon. et descr. t. 2. f. 5. 6. An Stämmen von Laubholz, vom August bis Oktober. An der Zulg.

Subgenus XI. ENTOLOMA.

135. *Agaricus sinuatus Bull.* t. 547. f. 1. In feuchten Waldungen, im September und Oktober. Dorfhalden.
136. „ *Prunuloides Fr.* Auf Wiesen und Viehweiden, vom August bis Oktober. Kälberweid.
137. „ *fertilis Pers.* Bolt. t. 69! An Zäunen, auf Wiesen und Viehweiden, im Herbst. Kälberweid.
138. „ *rhodopolius Fr.* Bolt. t. 6! In Wäldern, vom Juli bis November. Grüsisberg.

Subgenus XII. CLITOPILUS. *Hutblätterschwamm.*

139. *Agaricus Prunulus Scop.* Hall. 2344. Krombh. t. 2. f. 2—6! In Wäldern, vom Juni bis Oktober. Bächenhölzli, Grüsisberg.
140. „ *Orcellus Bull.* Batsch. f. 216! Auf Baumstöcken, im September. Bei Spietz.

Subgenus XIII. LEPTONIA. *Cyanblätterschwamm.*

141. *Agaricus chalybeus Pers.* Hall. 2459. Krombh. t. 2. f. 11—12! Auf schattigen Grasstellen, an Waldsäumen, vom Juli bis September. Grüsisberg.
142. „ *asprellus Fr.* Auf Viehweiden, Oktober. Kälberweid.

Subgenus XIV. NOLANEA. *Schellenblätterschwamm.*

143. *Agaricus pascuus. Fr.* Bolt. t. 35! Auf Viehweiden, vom Juni bis Dezember.
144. „ *junceus Fr.* Auf Torfland, vom Juli bis August. Schmidtmoos bei Amsoldingen.

145. *Agaricus nigripes Trog.* Hut fast häutig, glockig, stumpf, ohne Streifen, mit kleinen, etwas hellern Flocken bekleidet; Strunk röhrig, hin und her gebogen, kahl, schwarz; Lamellen fast frei, bauchig, dünn, röthlich gelb. In Tannwäldern, an feuchten Stellen, vom Juli bis Oktober. Dorfhalden. Er hat einen Thrangeruch.

146. „ *exilis Fr.* Auf grasigten Stellen in Buchwäldern, vom Juni bis September. Rustwald.

Subgenus XV. ECCILIA. *Grübchenblätterschwamm.*

147. *Agaricus politus Pers.* An sumpfigen Grasstellen in Wäldern, vom August bis Oktober. Wäldlein am Ausfluss der Zulg.

Series III. *DERMINI.* Rostsamer.

Subgenus XVI. PHOLIOTA. *Schuppenblätterschwamm.*

148. *Agaricus Secretani Fr.* In dichtem Tannwald, im Oktober. Bannwald.

149. „ *strophosus Fr.* Auf Viehweiden, im Oktober. Kälberweid.

150. „ *præcox Pers.* Schæff. t. 217. Auf Grasstellen in Wäldern, im Mai und Juni. Bächenhölzli.

151. „ *radicosus Bull.* Krombh. t. 62. f. 6—10! An Baumstämmen in schattigen Wäldern, im September und Oktober. Uttigwald, Grüsisberg.

152. „ *trichocephalus Trog.* Hut fest, glockig flach werdend, stumpf, mit eingewachsenen, glänzenden, haarförmigen strohgelben Schüppchen übersäet; Strunk dicht, unten etwas dicker, kahl, ohne Ring; Lamellen frei, vom Strunke entfernt, weiss, dann rostfarbig werdend. Auf Holz, im August.

153. „ *aurivellus Batsch.* t. 115. An Laubholzstämmen, im Oktober und November.

154. „ *filamentosus Schæff.* Batsch. f. 30! Auf Laub- und Nadelholz, im Herbst. Holzmatten.

155. „ *squarrosus Müll.* Hall. 2412. Schæff. t. 61! Am Fusse von Obstbäumen, im Oktober. Im Ried.

156. „ *reflexus Pers.* Schæff. t. 80! An schattigen Stellen in Wäldern, im August und September. Kandergrien.

157. *Agaricus adiposus Fr.* Batsch. F. 31! An faulenden Stöcken von Populus, im September. An der Zulg.
158. „ *flammans Fr.* An Tannstämmen, vom Juli bis Oktober. Dorfhalden.
159. „ *tuberculosus Schæff.* t. 79! An Stöcken von Laubholz, im Herbst. Zulghalden.
160. „ *mutabilis Schæff.* t. 9! An Baumstämmen, vom Mai bis November. Zulgrain, Uttigwald.

SUBGENUS XVII. HEBELOMA. *Thonblätterschwamm.*

161. *Agaricus lanuginosus Vaill.* Krombh. t. 3. f. 9—11! In Wäldern und Gebüschen, vom Juli bis Oktober. Am Ausfluss der Zulg.
162. „ *pyriodorus Pers.* Bull. t. 532. f. 1. In Wäldern, an Wegen, vom Juni bis September. Grüsisberg.
163. „ *scaber Fl. Dan.* Sowerb. t. 207. In Tannwäldern, im Juli und August.
164. „ *lacerus Fr.* Fl. Dan. t. 691. f. 1. In Wäldern, an feuchten Stellen, vom Mai bis Oktober. Grüsisberg.
165. „ *rimosus Bull.* Batsch. f. 107! (Rissiger Blätterschwamm). In Wäldern, an blosser Erde, vom Juni bis September. Rossweid, Grüsisberg.
166. „ *geophyllus Sow.* Pers. Icon. pict. t. 14. f. 2! In Wäldern, vom Juli bis Oktober.
167. „ *fastibilis Pers.* Schæff. t. 221! (der Eckelschwamm). In Wäldern, sehr oft in kreisförmigen Zeilen, vom Juli bis November. Hardlisberg.
168. *testaceus Batsch.* f. 178! Auf Viehweiden, im Herbst. Wylerfeld bei Bern.
169. „ *clavus Batsch.* f. 199! In Wäldern, zwischen Moos. Bächenhölzli.
170. „ *crustaliniformis Bull.* Batsch. f. 195! In feuchten Wäldern, im Oktober. Dorfhalden.
171. „ *longicaudus Pers.* Batt. t. 21, F. In bergigten Tannwäldern, im September und Oktober. Grüsisberg.

Subgenus XVIII. FLAMMULA. *Feuerblätterschwamm.*

172. *Agaricus lubricus Pers.* In Wäldern an der Erde und an Baumstämmen, vom August bis Oktober. Bächenhölzli.
173. „ *carbonarius Fr.* An Tannwurzeln, im Oktober. Grüsisberg.
174. „ *astragalinus Fr.* An Tannstämmen, vom August bis November. Dorfhalden.
175. „ *flavidus Schæff.* t. 35! In Wäldern, vom August bis November. Grüsisberg.
176. „ *picreus Fr.* Rasenförmig auf Tannstöcken, vom Juli bis November. Grüsisberg.

Subgenus XIX. NAUCORIA. *Nussblätterschwamm.*

177. *Agaricus lugubris Fr.* In Wäldern, im Juli und August. Grüsisberg.
178. „ *subglobosus A.* et *S.* In Nadelholzwaldungen, vom September bis November. Kandergrien.
179. „ *Cucumis Pers.* Sowerb. t. 344. In feuchten Wäldern, vom August bis Oktober. Wartboden.
180. „ *camerinus Fr.* An Tannstöcken und an der Erde, vom August bis November. Kandergrien.
181. „ *pediades Fr.* Paul. t. 106. f. 2, 3. Auf Viehweiden, vom Mai bis September. Kälberweid.
182. „ *Myosotis Fr.* In einem Kieferwäldchen auf feuchten Wergdingeln, im Mai. Eichibühl.
183. „ *tenax Fr.* An einem Eichenstamme, im Oktober.
184. „ *furfuraceus Pers.* Batsch. f. 98! Auf abgefallenen Aestchen, Blättern und an der blossen Erde, vom August bis Oktober. Zulgrain.
185. „ *porriginosus Fr.* Batt. t. 19. f. E. Auf Torfland in einem gelichteten Kieferwäldchen, im Oktober. Schwarzenegg.
186. „ *erinaceus Fr.* Sow. t 417. Auf faulenden Aestchen, im Dezember.
187. „ *conspersus Pers.* Krombh. t. 3. f. 12! In einem Erlenwald, im September. Zulgrain.

Subgenus XX. GALERA. *Helmblätterschwamm.*

188. *Agaricus ravidus Fr.* An Holz und an der Erde, im Herbst.
189. » *lateritius Fr.* Fl. Dan. t. 1846. f. 2. In Wäldern, vom Juli bis Oktober. Rossweid.
190. » *tener. Schæff.* t. 70. f. 6—8! Auf Viehweiden und in Laubholzgebüschen, an der Erde, vom Mai bis September. Kälberweid, Zulgrain.
191. » *conocephalus Bull.* t. 563. f. 1. In Wäldern und Gebüschen, im September. Heimbergau.
192. » *rubiginosus Pers.* Michel. t. 75. f. 8! In Wäldern, zwischen Moos, vom Juli bis November. Grüsisberg.
193. » *Hypnorum Schrank.* Hall. 2429. Batsch. f. 96! In Wäldern, vom Juli bis November.

Subgenus XXI. CREPIDOTUS. *Randblätterschwamm.*

194. *Agaricus mollis Schæff.* Batsch. f. 38! An Baumstämmen, vom August bis November. Schwarzenegg.
195. » *violaceo-fulvus Batsch.* f. 39! Auf Tannenholz, im November. Heimbergwald.
196. » *trichotis Pers.* Mycol. Eur. t. 26. f. 9! An faulen Tannstöcken, im Juni. Grüsisberg.

Series IV. *PRATELLUS.* Reifblätterschwamm.

Subgenus XXII. PSALLIOTA. *Kranzblätterschwamm.*

197. *Agaricus campestris Linn.* Hall. 2443. Krombh. t. 23. f. 1—8! (der Feldschwamm, *Champignon*). Auf Wiesen, in Gärten etc., im Sommer und Herbst. Thunallmend, Kälberweid.
198. » *arvensis Schæff.* Krombh. t. 23. f. 9—13! Auf Viehweiden, im Juni. Kälberweid.
199. » *æruginosus Curt.* Hall. 2444. Batsch. f. 213! In Tannwäldern, vom August bis November. Grüsisberg.
200. » *obturatus Fr.* Paulet t. 104. f. 6. Auf Aeckern, im Herbst.
201. » *melanospermus Fr.* Schæff. t. 51! Auf fetten Wiesen, im Herbst.
202. » *stercorarius Schum.* Bull. t. 566. f. 4. Auf Kuh- und Pferdemist, vom Mai bis Oktober. Kandergrien.

Subgenus XXIII. HYPHOLOMA. *Wollblätterschwamm.*

203. *Agaricus sublateritius Fr.* Schæff. t. 49! (der Bitterschwamm). An alten faulenden Baumstämmen, vom Mai bis Oktober. Grüsisberg.
204. » *capnoides Fr.* An Strünken und Baumwurzeln, vom August bis November. Frohnholz, Lengenbühlwald.
205. » *fascicularis Huds.* Hall. 2482. Krombh. t. 44. f. 4, 5! (der Schwefelkopf). In Wäldern und Baumgärten, vom Mai bis November.
a. *subterraneus.* In den Schiefergruben am Niesen.
206. » *lacrymabundus Bull.* Krombh. t. 42. f. 12—16! An Baumstämmen und an der Erde in Wäldern, vom August bis November. Bächenhölzli, Dorfhalden.
207. » *stipatus Pers.* Bull. t. 392. In Laubwäldern, vom Juli bis November. Thierachernwald.

Subgenus XXIV. PSILOCYBE. *Steifblätterschwamm.*

208. *Agaricus spadiceus Fr.* Schæff. t. 60. f. 4—6! Am Fusse von Erlen und anderm Laubholz, im Sommer. An der Zulg.
209. » *papyraceus Pers.* Bolt. t. 11! Auf Eichenstöcken, im Herbst. Zulgmündung.
210. » *cernuus Fl. Dan.* t. 1005. In Wäldern an der Erde, im Oktober. Kandergrien.
211. » *elongatus Pers.* Icon. et descr. t. 1. f. 4. In feuchten Wäldern zwischen Sphagnum, vom Juni bis November. Grüsisberg.
212. » *montanus Pers.* Schæff. t. 234. Im Gras, das ganze Jahr.
213. „ *callosus Fr.* Pers. M. E. t. 27. f. 3! An Strassen und grasigten Stellen, vom Mai bis November. Kälberweid.

Subgenus XXV. PSATHYRA. *Flockenblätterschwamm.*

214. *Agaricus strictus Trog.* Hut glockig, glatt, graublass; Lamellen purpürlich-umbrafarben, zahnförmig angehängt; Strunk gerade, kahl, weiss. An feuchten Stellen in Wäldern, im Gras, im Herbst.
215. » *fibrillosus Pers.* Zwischen abgefallenen Blättern.
216. » *pennatus Fr.* An Brandstellen und auf sandiger Erde, im Herbst. An der Zulg.

Series V. *COPRINARIUS*. Mistblätterschwamm.

Subgenus XXVI. *Panæolus*.

217. *Agaricus separatus Linn.* Bolt. t. 53! Auf Kuhmist und auf fettem Boden, vom Mai bis Oktober. Grüsisberg.
218. » *campanulatus Linn.* Batsch. f. 6! Auf Viehweiden und in Wäldern, vom Mai bis Oktober. Grüsisberg, Kälberweid.
219. » *fimicola Buxb.* Bolt. t. 66. f. 1! Auf Viehweiden, an Zäunen und Waldsäumen, im Frühling und Herbst. Lengenbühl.

Subgenus XXVI. PSATHYRELLA. *Kleiner Flockenblätterschwamm.*

220. *Agaricus impatiens Fr.* In feuchtem Gebüsch, September, November. Zulgrain.
221. » *crenatus Lasch.* Auf Viehweiden, im Sommer. Kälberweid.
222. » *disseminatus Pers.* Batsch f. 3! An Weiden und Aspen, im Frühling und Herbst. Thunallmend.

Genus II. COPRINUS. *Dintenschwamm.*

223. *Coprinus comatus Fr.* Schæff. t. 46, 47! (der Schopfschwamm), In Gärten, an Strassen und Zäunen, im Herbst. An der Zulg, im Schwäbis.
224. » *atramentarius Fr.* Hall. 2479. Schæff. t. 67, 68! Auf faulendem Holz, vom Juni bis Dezember. An der Zulg.
225. » *fimetarius Fr.* Schæff. t. 100! Auf Mist und faulem Holz, auch in Wäldern, vom Juli bis Oktober, nach starkem Regen.
226. » *niveus Pers.* Paul. t. 125. f. 2. Auf Pferdemist und dergl., vom August bis November. Grüsisberg.
227. » *micaceus Fr.* Hall. 2485. Schæff. t. 66. f. 4—6! An faulenden Baumstämmen, vom Mai bis November. Thunallmend, Kälberweid.
228. » *lagopus Fr.* An der tannenen Bekleidung einer Brunnstube, im Oktober.

229. *Coprinus domesticus Fr.* Bolt. t. 26! An Mauern, faulem Holz bei Regenwetter, im Frühling, Sommer und Herbst, in einem feuchten Magazin.
230. » *plicatilis Fr.* Sowerb. t. 364. Auf feuchter Erde, im Juni, in einem Garten.

Genus III. CORTINARIUS. *Schleierschwamm.*

Subgenus I. PHLEGMACIUM. *Schleimschleierschwamm.*

231. *Cortinarius caperatus Fr.* Fl. Dan. t. 1675. In Bergwäldern, vom Juli bis Oktober. Dorfhalden, Grüsisberg.
232. » *varius Schæff.* t. 42! In Wäldern, vom August bis Oktober. Grüsisberg.
233. » *variecolor Pers.* Krombh. t. 2. f. 26! In Wäldern, im September und Oktober. Grüsisberg.
234. » *infractus Pers.* In Nadel- und Laubholzwäldern, vom August bis Oktober. Kandergrien.

Subgenus II. MYXACIUM. *Rotzschleierschwamm.*

235. *Cortinarius glaucopus Schæff.* t. 53! In Wäldern und auf Heideland, vom August bis Oktober. Rustwald.
236. » *callochrous Spreng.* In Tann- und Laubholzwäldern, vom August bis Oktober. Grüsisberg.
237. » *turbinatus Bull.* t. 110. Hall. 2411. In Laub- und Nadelholzwaldungen, September bis November. Grüsisberg.
238. » *prasinus Schæff.* t. 218. In Wäldern bei Bern, im September. Burgdorfhölzchen.
239. » *scaurus Fr.* Hall. 2466. In allen Wäldern, vom Juni bis Oktober. Grüsisberg.
240. » *decoloratus Fr.* In Wäldern, im Herbst. Dorfhalden.
241. » *decolorans Pers.* In Tannwäldern, vom August bis Oktober. Bächenhölzli.
242. » *collinitus Sow.* Krombh. t. 3. f. 4! In gemischten Waldungen, vom Juli bis November. Bächenhölzli.
243. » *emunctus Fr.* In Tannwäldern, an feuchten Stellen, im Oktober. Dorfhalden.
244. » *vibratilis Fr.* In Tannwäldern, im Oktober. Grüsisberg.

Subgenus III. INOLOMA. *Fadenschleierschwamm.*

245. *Cortinarius opimus Fr.* In Wäldern bei Bern, im Juni.
246. „ *violaceus Linn.* Krombh. t. 2. f. 24, 25! In Laubholz- und Tannwäldern, vom August bis Oktober. Grüsisberg.
247. „ *albo-violaceus Pers.* In Laubholzwaldungen, im Oktober. Bächenhölzli.
248. „ *malachius Fr.* In Tannwäldern, vom August bis November. Rustwald.
249. „ *traganus Fr.* Schæff. t. 56! In Wäldern, vom Juli bis Oktober. Bannwald.
250. „ *callisteus Fr.* In Tannwäldern, im September und Oktober. Rossweid.
251. „ *Bulliardi Pers.* Bull. t. 431. f. 3. In Buchwäldern und an Waldsäumen, vom August bis Oktober. Hardlisberg.
252. „ *bolaris Pers.* Icon. pict. t. 14. f. 1! In Buchwäldern, vom August bis Oktober.

Subgenus IV. DERMOCYBE. *Faserschleierschwamm.*

253. *Cortinarius ochroleucus Schæff.* t. 54. In dichten Wäldern, im Oktober. Grüsisberg.
254. „ *anomalus Fr.* Bull. t. 431. f. 2. In Tannwäldern, vom August bis Oktober. Goldiwyl.
255. „ *spilomeus Fr.* In Tannwäldern, August und September.
256. „ *sanguineus Wulf.* Krombh. t. 2. f. 28 — 30! In dichten Wäldern, Juni bis November. Bannwald.
257. „ *cinnamomeus Fr.*
   a. *semisanguineus.* Hall. 2447 mit blutrothen Lamellen. Hüniboden.
   c. *et* d. mit safrangelben Lamellen, *conformis* und *croceus.* Hall. 2431. Schæff. t. 4! Batsch. f. 117!
   In allen Wäldern, vom Juni bis Dezember.
258. „ *orellanus Fr.* Linnæa V. t. 6. f. 9! In Buchwäldern, vom September bis November. Bannwald.

Subgenus V. TELAMONIA. *Ringschleierschwamm.*

259. *Cortinarius macropus Fr.* In Wäldern, im August und September. Erlengebüsch an der Zulg.

260. *Cortinarius bivelus Fr.* Hall. 2432. Schæff. t. 24! In feuchten Wäldern, vom Juli bis Oktober. Dorfhalden.
261. „ *bulbosus Sow.* t. 230. Hall. 2445. In Wäldern zwischen Gras oder Blättern, vom August bis Oktober. Rossweid.
262. „ *gentilis Fr.* Tannwälder, vom Juli bis Dezember. Kandergrien.
263. „ *brunneus Fr.* In Tannwäldern, Juli bis November. Rossweid.
264. „ *iliopodius Bull.* t. 586. f. 2, A, B. In Wäldern. Juli bis November.
265. „ *hemitrichus Pers.* In Wäldern und auf schattigen Wiesen, vom August bis November. Grüsisberg.

Subgenus VI. HYDROCYBE. *Nassschleierschwamm.*

266. *Cortinarius firmus Weinm.* Bull. t. 96. Tannwälder, im August. Grüsisberg.
267. „ *subferrugineus Batsch.* t. 186! Feuchter Tannwald, im Oktober. Dorfhalden.
268. „ *armeniacus Schæff.* t. 81! Tannwälder, vom Juli bis November. Bächenhölzli.
269. » *privignus Fr.* In einer gemischten Waldung, im September. Bächenhölzli.
270. „ *dilutus Pers.* Bolt. t. 10! In einem Walde bei Bern, September. Burgdorfhölzchen.
271. „ *lucidus Pers.* In Wäldern, im Herbst.
272. „ *imbutus Fr.* In Tannwäldern, im Oktober. Dorfhalden.
273. „ *leucopus Bull.* Krombh. t. 2. f. 31, 32! In Tannwäldern, im September und Oktober. Bannwald.
274. » *decipiens Pers.* In Tannwäldern, August bis November. Grüsisberg, Dorfhalden.

Genus IV. PAXILLUS. *Zwergschwamm.*

275. *Paxillus involutus Batsch.* t. 61! An Erlenstämmen, im Herbst. An der Gürbe bei Blumenstein.
276. „ *atro-tomentosus Batsch.* t. 32! An Tannstöcken, im Herbst. Bächenhölzli.

Genus V. GOMPHIDIUS. *Keulenblätterschwamm.*

277. *Gomphidius glutinosus Schæff.* Hall. 2369. Schæff. t. 36! In allen Wäldern, vom August bis November.
278. „ *viscidus Fr.* Schæff. t. 55! Seltener in Tannwäldern, August, Oktober. Grüsisberg.

Genus VI. HYGROPHORUS. *Feuchtschwamm.*

Subgenus I. LIMACIUM. *Schleimfeuchtschwamm.*

279. *Hygrophorus eburneus Bull.* Schæff. t. 39! In Wäldern, vom August bis Oktober. Dorfhalden.
280. „ *melizeus Fr.* Hall. 2416. Batsch. f. 70! Tannwälder, im September.
281. „ *purpurascens A. et S.* In Wäldern, im Oktober. Grüsisberg.
282. „ *erubescens Fr.* In Wäldern auf Grasplätzen, im September und Oktober. Grüsisberg.
283. „ *glutinifer Bull.* t. 258. In Tannwäldern, im Oktober. Grüsisberg.
284. „ *discoideus Pers.* In Tannwäldern, im Herbst. Hardlisberg.
285. „ *limacinus Fr.* Paulet t. 77. f. 3. In Wäldern, im Oktober. Grüsisberg.
286. „ *agathosmus Fr.* In Wäldern und auf Wiesen, im Herbst. Kandergrien.
287. „ *tephroleucus Pers.* In einem Tannwald, im Oktober. Grüsisberg.

Subgenus II. CAMAROPHYLLUS.

288. *Hygrophorus pratensis Fr.* Greville Crypt. 2. t. 91! In Wäldern, auf Wiesen und auf Viehweiden, im Herbst. Kälberweid, Grüsisberg.
289. „ *Meissneriensis Pers.* Bull. t. 587. Auf Viehweiden. Kälberweid.
290. „ *virgineus Jacq.* Batsch. f. 71! Auf Wiesen. Thunallmend.
291. „ *ovinus Bull.* t. 580. Auf Wiesen und Viehweiden. Kälberweid.

Subgenus III. HYGROCYBE.

292. *Hygrophorus ceraceus Sow.* t. 20. Hall. 2420. Auf Viehweiden, im Herbst.
293. „ *coccineus Schæff.* t. 302. Hall. 2421 b. Auf schattigen Wiesen.
294. „ *puniceus Fr.* Bolt. t. 67. f. 2! Auf schattigen Wiesen, im Sommer und Herbst. Goldiwyl.
295. „ *conicus Schæff.* t. 2! Hall. 2421 a. Auf Wiesen und Viehweiden, im Herbst. Thunallmend.
296. „ *psittacinus Schæff.* Hall. 2433. Harzer's Schw. t. 17 a! Auf Viehweiden. Kälberweid.
297. „ *murinaceus Bull.* t. 520. Auf Wiesen, August bis Oktober. Thunallmend.

Genus VII. LACTARIUS Fr. *Milchschwamm.*

Subgenus I. PIPERITES.

298. *Lactarius scrobiculatus Scop.* Schæff. 227, 228. (der Erdschieber). In allen Wäldern gemein, vom August bis Oktober. Grüsisberg.
299. „ *torminosus Schæff.* t. 12! Auf Heideboden, vom Juni bis Oktober. Teuffithal.
300. „ *pubescens Schrad.* Krombh. t. 13. f. 1—14! In Tannwäldern, im September. Goldiwyl.
301. „ *insulsus Fr.* Krombh. t. 12. f. 1—6! An Waldsäumen und auf schattigen Wiesen, im Herbst. Uttigwäldchen.
302. „ *flexuosus Pers.* Bull. t. 104. Auf feuchten Wiesen, im Juni. Bei Uttigen.
303. „ *blennius Fr.* Krombh. t. 69. f. 7—9. teste Fr. In Wäldern, September bis November. Rustwald.
304. „ *hysginus Fr.* Krombh. t. 14. f. 15, 16! In Tannwäldern, August und September. Uttigwäldlein.
305. „ *trivialis Fr.* Krombh. t. 14. f. 17, 18! In Wäldern, im Herbst. Hardlisberg.
306. „ *uvidus Fr.* Batsch. f. 202! In gemischten Wäldern, im Herbst. Bächenhölzli.
307. „ *piperatus Scop.* Hall. 2338. Krombh. t. 57. f. 1—3. t. Fr. In allen Wäldern, vom August bis Oktober.
308. „ *vellereus Fr.* Hall. 2339. Krombh. t. 57. f. 10—13. t. Fr. In Laubholzwaldungen, im Herbst.

Subgenus II. DAPETES.

309. *Lactarius deliciosus Linn.* Hall. 2419 (der Reizker). Krombh. t. 11! In Tannwäldern, im Herbst. Grüsisberg.

Subgenus III. RUSSULARES.

310. *Lactarius violascens Otto.* Krombh. t. 14. f. 13, 14! In Tannwäldern, im September. Grüsisberg.
311. „ *pallidus Pers.* Krombh. t. 56. t. Fr. In Tannwäldern, im August. Grüsisberg.
312. „ *quietus Fr.* Krombh. t. 40. f. 1—9! In gemischten Waldungen, Herbst. Bächenhölzli.
313. „ *vietus Gled.* Krombh. t. 14. f. 15, 16! In Erlengebüschen, im Sommer. Erlengebüsch bei Steffisburg.
314. „ *volemus Fr.* Lenz fig. 12! (Goldbrätling). In Tannwäldern, vom August bis Oktober.
315. „ *mitissimus Fr.* Krombh. t. 39. f. 16—18! In Laubholzwaldungen, Herbst. Grüsisberg.
316. „ *subdulcis Bull.* t. 222, A, B. In Tannwäldern, August und September.
317. „ *camphoratus Fr.* Krombh. t. t. 39. f. 21—24! In Tannwäldern, August. Grüsisberg.
318. „ *fuliginosus Fr.* Krombh. t. 14. f. 10—12! In schattigen Wäldern, vom August bis Oktober. Uttigwäldchen.

Genus VIII. RUSSULA Fr. *Täubling.*

Subgenus I. COMPACTÆ.

319. *Russula adusta Pers.* Krombh. t. 70. f. 7—13. t. Fr. In lichten Wäldern, vom Juli bis Oktober. Dorfhalden.

Subgenus II. FIRMÆ.

320. *Russula sanguinea Bull.* t. 42. In Tannwäldern, im August. Dorfhalden.
321. „ *furcata Pers.* Bull. t. 26. In gemischten Waldungen, im August. Lengenbühlwald.
322. „ *heterophylla Fr.* Paulet t. 75. f. 1—5. t. Fr. In Gebüschen und Wäldern, im September. Grüsisberg.

323. *Russula depallens Pers.* In gemischten Wäldern, im August. Bächenhölzli.
324. „ *fellea Fr.* Paulet t. 76. f. 4. t. Fr. In gemischten Waldungen, im August. Bächenhölzli.

Subgenus III. RIGIDÆ.

325. *Russula rubra Fr.* Schæff. t. 15. f. 4—6! In Tannwäldern, vom August bis Oktober. Uttigwald.
326. „ *virescens Pers.* Schæff. t. 94! In Wäldern, vom Juli bis November. Bächenhölzli.
327. „ *lactea Paul.* t. 74. f. 2. In einem dichten Tannwald, im September. Bannwald.

Subgenus IV. FRAGILES.

328. *Russula emetica Pers.* Hall. 2374. Schæff. t. 15! In Laubholzwäldern, im August. Uttigwäldlein.
329. „ *pectinata Bull.* t. 509. f. N. In Wäldern, im Oktober. Grüsisberg.
330. „ *ochroleuca Fr.* Krombh. t. 64. f. 7—9. fide Fr. In Tannwäldern, im Herbst.
331. „ *consobrina Fr.* In Tannwäldern, im Sommer.
332. „ *fœtens Pers.* Harzer t. 24! In Tannwäldern, im Sommer und Herbst. Bächenhölzli.
333. „ *fragilis Fr.* Hall. 2376. Bull. t. 509. f. T, U. In dichtem Tannwald, im September. Bächenhölzli.
334. „ *integra Linn.* Schæff. t. 92! In Tannwäldern, im September. Grüsisberg.
335. „ *aurata Fr.* Schæff. t. 15! In Wäldern, vom Juli bis September. Grüsisberg.
336. „ *decolorans Mich.* In Tannwäldern, September. Grüsisberg.
337. „ *alutacea Fr.* Schæff. t. 16. f. 6! In schattigen Wäldern, vom Juli bis September. Grüsisberg.
338. „ *ochracea Pers.* In Wäldern, im August und September. Lengenbühlwald.
339. „ *aurea Pers.?* In Wäldern, im Sommer. Grüsisberg.

Genus IX. CANTHARELLUS Fr.. *Faltenschwamm.*

340. *Cantharellus cibarius Fr.* Hall. 2326. Batsch. f. 120! In Tannwäldern, vom Juli bis in den Winter.
341. „ *aurantiacus Fr.* Nees Syst. f. 233! Bei Genf und Basel in Wäldern, Bruderholz.
342. „ *tubæformis Fr.* Sturm. t. 30. In Wäldern, im Herbst. Rossweid.
343. „ *infundibuliformis Scop.* Krombh. t. 4. f. 8—10! In Tannwäldern, Oktober. Grüsisberg.
344. „ *muscigenus Fr.* Nees Syst. f. 236! Auf Moosen, Jungermannien etc.
345. „ *muscorum Roth.* Usteri Annal. 1. t. 1. f. 4! Auf Bryum argenteum etc., im Winter. Kälberweid.
346. „ *crispus Pers.* Icones et descr. t. 8. f. 7. Auf Aestchen von Betula, Winter.
347. „ *Mühlenbeckii Trog.* Gestielt, löffelförmig; Hut häutig, gewölbt, schwärzlich, mit erhabenen, ungleichen, strahlförmigen Adern; Strunk seitlich stielrund, schwarz. Auf dem Faulhorn, auf Meesia alpina etc., im Juli. Dr. Mühlenbeck.

Genus XIII. NYCTALIS Fr. *Nachtschwamm.*

348. *Nyctalis Asterophora Fr.* Krombh. t. 6. f. 15 b! Auf faulenden Blätterschwämmen, im Spätherbst.
349. „ *parasitica Fr.* Bull. t. 574. f. 2. Auf faulenden Blätterschwämmen.

Genus XIV. MARASMIUS Fr. Der *Dürrling.*

350. *Marasmius oreades Bolt.* t. 151! Schæff. t. 77! (Herbst-Mousseron). Auf Wiesen und Viehweiden, im Sommer und Herbst. Bei Einigen.
351. „ *ramealis Bull.* t. 336. Auf Aestchen, Blättern und Moos. Grüsisberg.
352. „ *alliaceus Jacq.* Michel. gen. t. 78. f. 4! In Wäldern auf abgef. Blättern, vom Juli bis November. Grüsisberg.
353. » *androsaceus Linn.* Bolt. t. 32! In Wäldern, auf Tannnadeln. Rossweid.

354. *Marasmius Rotula Scop.* Michel. t. 74. f. 5! In allen Wäldern.
355. „ *perforans Hoffm.* Hall. 2351. Batsch. f. 10! Tannnadeln, September. Dorfhalden.
356. „ *Hudsoni Pers.* Sowerb. t. 164. Auf abgef. Blättern von Ilex, im Herbst.
357. „ *epiphyllus Pers.* Sowerb. t. 93. Auf abgef. Blättern, im Winter.

Genus XV. LENTINUS Fr. Der *Lederschwamm.*

358. „ *Lentinus pulverulentus Fr.* An Baumwurzeln, August. Bannwald.
359. „ *resinaceus Trog.* Hut fast fleischig, excentrisch, von einer ins Ochergelb ziehenden Zimmetfarbe; Lamellen gedrängt stehend, weiss, sägeförmig gezähnt; Strunk filzig, gelblich weiss; der ganze Schwamm ist harzig-klebrig. An faulenden Strünken, Oktober.
360. „ *cochleatus Pers.* Sowerb. t. 168. In Tannwäldern, im Sommer.
361. „ *flabelliformis Mich.* t. 65. f. 1! Bolt. t. 157! An Laubholzstämmen, März.

Genus XVI. PANUS Fr. *Knäuelschwamm.*

362. *Panus torulosus Pers.* Batsch. f. 33! An alten Baumstämmen, Juli, Oktober.
363. „ *conchatus Bull.* An Stämmen von Populus.
364. „ *inconstans Pers.* Schæff. t. 43, 44! An Baumstämmen, Sommer und Herbst.
365. „ *stipticus Bull.* Hall. 2338? Krombh. t. 44. f. 13—17! An Laubholz, Winter.

Genus XVII. SCHIZOPHYLLUM Fr. *Spaltblätterschwamm.*

366. *Schizophyllum commune Fr.* Hall. 2333. An Laubholzstämmen.

Genus XVIII. LENZITES Fr. *Lenzschwamm.*

367. *Lenzites betulina Fr.* Sowerb. t. 182. An Laubhölzern, im Winter. Lengenbühlwald.
368. » *variegata Bull.* t. 537. f. I, K, L. In Wäldern, im Sommer. Zulgmündung.

369. *Lenzites trabea Pers.* Bull. t. 442. f. A, C. In Wäldern und auf Bauholz.
370. „ *sepiaria Swartz.* Hall. 2331. Schæff. t. 76! Auf Tannholz.
371. „ *abietina Fr.* Bull. t. 442. f. 2. t. 541. f. 1. Auf Tannholz. Grüsisberg.

Ordo II. POLYPOREI. *Löcherschwammartige.*

Genus XIX. BOLETUS Fr. *Röhrenschwamm.*

Subgenus I. OCHROSPORUS. *Gelbsamer.*

372. *Boletus luteus Linn.* Krombh. t. 33! (Butterpilz). An Waldsäumen und auf schattigen Wiesen, im Herbst. Bächenhölzli.
373. „ *elegans Fr.* Hall. 2301. Krombh. t. 34. f. 1—10! An Waldsäumen und in lichten Wäldern, im Herbst. Bächenhölzli.
374. „ *collinitus Fr.* Schæff. t. 126! In Wäldern bei Bern, im August.
375. „ *granulatus Linn.* Krombh. t. 34. f. 11—14! In Wäldern, im Sommer und Herbst. Grüsisberg.
376. „ *bovinus Linn.* Krombh. t. 36. f. 8—11! (der Kuhpilz). In Tannwäldern, im Sommer und Herbst. Bächenhölzli.
377. „ *piperatus Bull.* Batsch. f. 128! In Wäldern, Sommer und Herbst. Dorfhalden.
378. „ *variegatus Swartz.* Krombh. t. 34. f. 15—18! (der Sandpilz). An Waldsäumen, vom Juli bis Oktober. Grüsisberg.
379. „ *Sistotrema Fr.* In Laubholzwäldern, im September. Zulgrain.
380. „ *subtomentosus Linn.* Hall. 2311. (Ziegenlippe). Schæff. t. 112. 133! In Wäldern, vom Juni bis Oktober. Heimbergau.
381. „ *appendiculatus Schæff.* t. 130! In Wäldern und auf schattigen Wiesen, im Herbst. In der Bächimatte.
382. „ *calopus Fr.* Krombh. t. 37. f. 1—7! In Wäldern, vom August bis Oktober. Grüsisberg.
383. „ *pachypus Fr.* Hall. 2308. Krombh. t. 35. f. 13—15! In Wäldern, vom August bis Oktober.
384. „ *Satanas Lenz.* Krombh. t. 38. f. 1—6! In Wäldern, im August. Bächenhölzli.
385. „ *luridus Schæff.* t. 107! Hall. 2307. (der Hexenpilz). In Wäldern, vom Juni bis September.

386. *Boletus rubeolarius Bull.* Bolt. t. 85! In Wäldern und an Waldsäumen.
387. „ *edulis Bull.* Hall. 2302. Krombh. t. 31. f. 1—15! In Wäldern und an Waldsäumen, vom Juni bis Oktober.

SUBGENUS II. DERMINUS. *Rostsamer.*

388. *Boletus strobilaceus Scop.* Pers. Mycol. Eur. 2. t. 19! In feuchten Wäldern, im August und September. Bannwald, Heimbergwald.
389. „ *viscidus Linn.* Pers. Mycol. Eur. t. 17. f. 1? An Waldsäumen, vom August bis Oktober. Bächenhölzli.
390. „ *porphyrosporus Fr.* In Wäldern bei Bern, im August.
391. „ *scaber. Fr.* Hall. 2310 et 2312. Krombh. t. 32. f. 12, 13! (Kapuzinerpilz). In lichten Waldungen, im Sommer und Herbst. Balmholz.

GENUS XX. POLYPORUS Fr. *Löcherschwamm.*

SUBGENUS I. MESOPUS. *Mittelstrunkige.*

392. *Polyporus ovinus Schæff.* t. 121. 122! (das Schafeuter). In Tannwäldern, im Herbst. Grüsisberg.
393. „ *leucomelas Fr.* Mich. t. 70. f. 3! In Tannwäldern, im Herbst. Dorfhalden.
394. „ *brumalis Pers.* Krombh. t. 4. f. 19—21! Auf faulendem Holz am Stockhorngebirge.
395. „ *ciliatus Fr.* An Laubholzstämmen, im Herbst. Kanderausfluss.
396. „ *Schweinitzii Fr.* Mich. t. 70. f. 1! In Wäldern, doch selten. Grauholz. Hr. Dr. Brunner.

SUBGENUS II. PLEUROPUS. *Seitenstrunkige.*

397. *Polyporus squamosus Huds.* Hall. 2278. Schæff. t. 101, 102! An Stämmen von Laubholz, im Sommer und Herbst.
398. „ *melanopus Pers.* Hall. 2299. var. Pers. Icon. pict. 4. f. 1. 2! An Baumstämmen. Grüsisberg.
399. „ *elegans Bull.* t. 46. In hohlen Weidenstämmen. Ausdauernd.
400. „ *nummularius Fr.* Nees Syst. f. 214! An dürren Aesten.

401. *Polyporus rugosus Trog.* Hut einzeln, etwas dick, runzlig, dunkelbraun filzig; Poren sehr klein, russig grau. Auf Pinus und Quercus.

402. „ *lucidus Fr.* Hall. 2293. Krombh. t. 4. f. 22—24! An Eichstämmen.

Obs. Obwohl ich diesen Schwamm niemals gefunden, so scheint er doch in der Schweiz vorzukommen, da Haller und Secretan ihn aufgenommen haben. Ich erhielt ihn von Freund Dr. Mühlenbeck.

Subgenus III. MERISMA. *Büschelförmige.*

403. *Polyporus umbellatus Fr.* Schæff. t. 111! (der Eichhaase). An Laubholzstämmen, bei uns höchst selten, im Herbst. Kandermündung.

404. „ *frondosus Schrank.* Hall. 2276. Schæff. t. 128, 129! (der Klapperschwamm). An Wurzeln von Eichen, September, Oktober. Bächenhölzli.

405. „ *cristatus Schæff.* Hall. 2291. Krombh. t. 48. f. 15, 16! In schattigen Wäldern, im Herbst.

406. „ *confluens Alb. et Schw.* Lenz. f. 27! In Wäldern, im Herbst. Grüsisberg.

407. „ *sulfureus Bull.* Hall. 2277. Schæff. t. 131, 132! An allerlei Bäumen, vorzüglich an Obst- und Kirschbäumen, im Sommer.

408. „ *fuliginosus Scop.* Paulet. t. 7. f. 2, 3. Am Fusse der Waldbäume, August.

Subgenus IV. APUS. *Strunklose.*

409. *Polyporus chioneus Fr.* Pers. M. E. 2. t. 15. f. 2! An faulenden Stämmen von Populus, im Herbst.

410. „ *lacteus Fr.* Rostk. t. 23. An Buchen- und Birkenstämmen, im Herbst.

411. „ *mollis Fr.* An Tannstöcken, im Sommer und Herbst. Grüsisberg.

412. „ *cæsius Schrad.* Schæff. t. 124! An Tannstöcken, im Herbst. Grüsisberg.

413. „ *spongiosus Fr.* Bolt. t. 165! An faulem Holz.

414. *Polyporus fumosus Fr.* Trattin. Austr. t. 3. f. 5. An einem Baumstock, im Oktober.
415. „ *adustus Willd.* Batsch. f. 226! An faulenden Stämmen von Populus, Salix, Herbst bis Frühling.
416. „ *carpineus Sow.* t. 231. An Stämmen von Laubholz.
417. » *dichrous Fr.* Bull. t. 501. f. 2. Auf Salix capræa, im Herbst.
418. „ *amorphus Fr.* Nees. f. 223! An Tannstämmen, im Spätherbst.
419. „ *hispidus Bull.* Krombh. t. 48. f. 7—10! An Obstbäumen, im Sommer.
420. „ *cuticularis Bull.* t. 462. An einer abgestorbenen Buche.
421. „ *dryadeus Pers.* Bull. t. 458. An Eichen, im Herbst.
422. „ *officinalis Fr.* Hall. 2284. Bull. t. 296. (Lerchenschwamm). An alten Stämmen von Pinus Larix. Im Wallis.
423. » *fomentarius Linn.* Hall. 2288. (der Zunderschwamm). An Buchen. Bei uns sehr selten.
424. „ *igniarius Linn.* Sowerb. t. 182. Auf Bäumen von Laubholz. Ausdauernd.
425. „ *Ribis Fr.* Hall. 2286. An Wurzeln von Ribes und Evonymus, im November. Ausdauernd.
426. „ *salicinus Pers.* An Weidenstämmen. Ausdauernd.
427. „ *cimamomeus Trog.* Bolt. t. 80? An Apfelbäumen. Ausdauernd.
428. » *pinicola Swartz.* Flor. Dan. t. 953. An faulendem Tannenholz. Ausdauernd.
429. „ *marginatus Pers.* Schæff. t. 138! An Stämmen von Laubholz. Ausdauernd.
430. „ *rufo-pallidus Trog.* Hut korkartig holzig, hart, runzlig uneben, russig rothbraun, endlich schwarz, inwendig flockig faserig, und nebst den langen, eckigen, kleinen Poren weiss, dann röthlich. An faulenden Tannen. Ausdauernd.
431. „ *roseus Alb. et Schw.* An faulen Stämmen.
432. „ *cinnabarinus Fr.* Hall. 2285. Bull. t. 501. f. 1. An Laubholz, im Herbst.
433. „ *radiatus Fr.* Sowerb. t. 190. An Tannstämmen, im November.
434. „ *cryptarum Bull.* Nees. Syst. f. 222! An dem Deichel eines Ziehbrunnens.
435. „ *albidus Trog.* Schæff. t. 124! An Stämmen von Laubholz.
436. „ *hirsutus Schrad.* An Eichenstämmen, im Sommer und Herbst. Auf Populus.
437. » *velutinus Fr.* An Laubholzstämmen, im Frühling bis Herbst.

438. *Polyporus zonatus Fr.* Hall. 2281 et 2283. Schæff. t. 269. An Weiden und Pappeln, im Sommer und Herbst.
439. „ *versicolor Linn.* Hall. 2282. Schæff. t. 268. An Eichenholz, im Herbst.
440. „ *Stereoides Fr.* An Tannstämmen. Bannwald.
441. „ *abietinus Fr.* Greville Scot. Crypt. 4. t. 226! An faulenden Tannstämmen, im Herbst.

Subgenus V. RESUPINATUS.

442. *Polyporus rhodellus Fr.* Bull. t. 442. f. D. Auf Buchenholz.
443. „ *Medulla panis Pers.* Hall. 2272. Bolt. t. 166. f. 2! An Balken etc.
444. „ *vulgaris Fr.* Bolt. l. c. f. a, b! An Balken und Brettern von Tannholz.
445. „ *tuberculosus DeC.* An Holzstämmen.
446. „ *terrestris Fr.* Pers. Icon. pict. t. 16. f. 1! An ganz verfaulten Stöcken.
447. „ *Radula Fr.* Auf tannigem Spältenholz.

Genus XXI. TRAMETES Fr. *Riechschwamm.*

448. *Trametes odorata Fr.* Schæff. t. 106! Auf Tannstöcken. Ausdauernd.
449. „ *suaveolens Fr.* Hall. 2280. Krombh. t. 4. f. 25! An Weidenstämmen.
450. „ *Bulliardi Fr.* Bull. t. 310. An Fagus, Betula und Salix.
451. „ *gibbosa Pers.* Sowerb. t. 194. Auf Stöcken von Fagus.

Genus XXII. DÆDALEA Pers. *Wirrschwamm.*

452. *Dædalea quercina Pers.* Hall. 2330. Greville Scot. 4. t. 238! An Eichenholz. Ausdauernd.
453. „ *confragosa Pers.* Bolt. t. 160! Auf Eichenholz.
454. „ *unicolor Fr.* Bull. t. 408. An abgestandenem Laubholz.

Genus XXIII. MERULIUS Fr. *Netzschwamm.*

455. *Merulius tremellosus Schrad.* Hall. 2329. Fl. Dan. t. 1553. An faulenden Stämmen von Laubholz.

456. *Merulius rufus Pers.* M. E. t. 16. f. 1, 2! In einem hohlen Weidenstamm.
457. „ *lacrymans Schum.* Krombh. t. 46. f. 1, 2! An gezimmertem Holz, in feuchten Gebäuden.

Ordo III. HYDNEI Fr. *Stachelschwammartige.*

Genus XXIV. FISTULINA Bull. *Leberschwamm.*

458. *Fistulina hepatica Fr.* Hall. 2315. (Fleischschwamm). Lenz. f. 29! An faulenden Eichstämmen, im Sommer und Herbst. Grüsisberg.

Genus XXV. HYDNUM Linn. *Stachelschwamm.*

Subgenus I. MESOPUS.

459. *Hydnum imbricatum Linn.* Krombh. t. 49! (derHabichtschwamm). In Tannwäldern, im September und Oktober. Dorfhalden.
460. „ *subsquamosum Batsch.* f. 43! In Tannwäldern, Herbst. Bannwald.
461. „ *repandum Linn.* Hall. 2325. Greville 1. t. 44! (der Stoppelschwamm). In Tannwäldern, im Sommer und Herbst. Grüsisberg.
462. „ *rufescens Schæff.* Harzer's Schw. t. 23! In Wäldern, im August. Bächenhölzli.
463. „ *violascens Alb. et Schw.* Krombh. t. 5. f. 11! In Tannwäldern. Bächenhölzli.
464. „ *suaveolens Scop.* In Tannwäldern. Grüsisberg.
465. „ *compactum Pers.* Schæff. t. 146! In Tannwäldern, im Herbst. Hardlisberg.
466. „ *aurantiacum Alb. et Schw.* Batsch. f. 222! In Tannwäldern. Bannwald.
467. „ *ferrugineum Fr.* Krombh. t. 50. f. 10. 11! Tannwälder, auf Rasenplätzen. Dorfhalden.
468. „ *cinereum Bull.* t. 419. In Tannwäldern. Bächenhölzli.
469. „ *velutinum Fr.* Bull. t. 453. In Tannwäldern, im Herbst. Grüsisberg.
470. „ *connatum Schult.* In Wäldern. Hardlisberg.

471. *Hydnum nigrum Fr.* Batsch. f. 223! In gemischten Waldungen. Uttigwäldchen.
472. „ *tomentosum Linn.* Schæff. t. 139! In Tannwäldern. Grüsisberg.

SUBGENUS II. PLEUROPUS.

473. *Hydnum auriscalpium Linn.* Hall. 2321. Greville Scot. 4. t. 196! Auf abgefallenen Zapfen von Pinus sylvestris. Bei Hilterfingen.

SUBGENUS III. MERISMA.

474. *Hydnum coralloides Scop.* Hall. 2317. Lenz. f. 32! Auf Tannholz.

SUBGENUS IV. APUS.

475. *Hydnum gelatinosum Scop.* Hall. 2319. Krombh. t. 50. f. 18—22! Auf faulen Tannstöcken. Grüsisberg.

SUBGENUS V. RESUPINATUS.

476. *Hydnum viride Fr.* Alb. et Schw. t. 6. f. 4! Auf Dædalea unicolor.
477. „ *mucidum Pers.* An gefälltem Eichenholz. Goldiwylstrasse.
478. „ *muscicola Pers.* Schrad. Spicil. t. 3. f. 3. Auf Moos.
479. „ *farinaceum Pers.* Flor. Dan. t. 1375. Auf abgef. Aestchen von Alnus.
480. „ *obtusum Schrad.* An Eichenholz.
481. „ *pseudo-boletus DeCand.* An Eichenstämmen.

GENUS XXVI. IRPEX Fr. *Zahnschwamm.*

482. *Irpex lacteus Fr.* An buchenen Stämmen und Aesten. Grüsisberg.
483. „ *spathulatus Fr.* Nees Syst. fig. 231! An faulendem Tannenholz.

GENUS XXVII. RADULUM Fr. *Raspelschwamm.*

484. *Radulum fagineum Fr.* An der Rinde von Fagus sylv.

Ordo IV. AURICULARINI. *Aderschammartige.*

Genus XXVIII. CRATERELLUS Fr. *Trompetenschwamm.*

485. *Craterellus lutescens Fr.* Merulius — Pers. Schæff. t. 157! In feuchten Wäldern. Grüsisberg.
486. „ *cornucopioides Fr.* Epicr. Cantharellus — Fr. Syst. Merulius — Pers. Hall. 2216. Schæff. t. 165, 166! In Wäldern, im Herbst. Bächenhölzli.
487. „ *sinuosus Fr.* Vaill. paris. t. 11. f. 11—13. In Gebüschen und Wäldern. Zulgrain.
488. „ *pusillus Fr.* Chevall. par. t. 7. f. 6. An der blossen Erde, im Herbst.
489. „ *clavatus Fr.* Schæff. t. 164! In Tannwäldern, vom August bis Oktober. Grüsisberg.
490. „ *pistillaris Fr.* Krombh. t. 54. f. 3—7! In Tannwäldern, im Herbst. Grüsisberg.

Genus XXIX. THELEPHORA Fr. *Warzenschwamm.*

491. *Thelephora undulata Fr.* Schæff. t. 278. In Wäldern bei Basel.
492. „ *palmata Fr.* Nees Syst. f. 151! In feuchten Tannwäldern, im Herbst. Bannwald.
   β. *anthocephala Fr.* Bull. t. 452. f. 1. An sandiger Erde.
493. „ *terrestris Ehrh.* Batsch. f. 121! An faulen Stöcken und an der Erde, im Herbst.
494. „ *cristata Fr.* Hall. 2262. Bull. t. 415. In Wäldern, vom August bis Oktober.
495. „ *laciniata Pers.* Bolt. t. 173! An hölzernen Dämmen auf Torfland.
496. „ *cæsia Pers.* Nees Syst. f. 254. An faulen Stöcken. Bannwald.
497. „ *puteana Schum.* Fl. Dan. t. 2035. f. 1. An eichenen Balken. Hünibachbrücke.
498. „ *isabellina Fr.* An alten Weidenstöcken, im Winter. Thunallmend.

Genus XXX. STEREUM Fr. *Seidenschwamm.*

499. *Stereum purpureum Fr.* Hall. 2264. Bull. t. 483. f. 1. An Stämmen von Laubholz, im Herbst.
500. » *hirsutum Fr.* Hall. 2265. Krombh. t. 5. f. 18! An Stämmen und Aesten von Laubholz.
501. „ *sanguinolentum Fr.* Greville Scott. 4. tab. 225! An Buchenholz. Bächenhölzli.
502. „ *rubiginosum Fr.* Hall. 2263. Sowerb. t. 26. An Eichenstämmen.
503. » *tabacinum Fr.* Bolt. t. 174! An Baumstämmen verschiedener Art.
504. „ *frustulosum Fr.* Eichenholz.
505. » *rugosum Fr.* An Stämmen von Laubholz.
506. „ *abietinum Fr.* An faulenden Tannstöcken. Grüsisberg.
507. „ *alneum Fr.* Auf Alnus glutinosa. Kandermündung.

Genus XXXI. AURICULARIA Bull. *Aderschwamm.*

508. *Auricularia mesenterica Bull.* Bolt. t. 172! An faulenden Bäumen.

Genus XXXII. CORTICIUM Fr. *Rindenschwamm.*

509. *Corticium salicinum Fr.* Auf alten Weidenstämmen.
510. „ *amorphum Fr.* In Bergwäldern, am Fusse der Tannen.
511. » *lacteum Fr.* In Wäldern.
512. „ *roseum Fr.* Auf Baumrinde.
513. „ *coeruleum Fr.* Sow. t. 350. An eichenen Balken.
514. » *quercinum Fr.* Nees Syst. f. 253! An Aesten von Laubholz.
515. „ *cinereum Fr.* An buchenem Spältenholz. Holzmatten.
516. „ *incarnatum Mich.* Auf Pyrus communis.
517. „ *comedens Fr.* Nees Syst. f. 255! An Aesten von Corylus.
518. » *aurantium Pers.* Auf Aestchen von Rosa canina.
519. „ *Sambuci Fr.* Grev. t. 242! An faulenden Stämmen von Sambucus.

Genus XXXIII. GUEPINIA Fr.

520. *Guepinia helvelloides Fr.* Jacq. Austr. t. 14. In Wäldern und an Zäunen.

Genus XXXIV. SOLENIA Hoffm. *Röhrchenpilz.*

521. *Solenia candida Pers.* Hoffm. Deutschl. Fl. t. 8. f. 1! An faulem Buchenholz.

Ordo V. CLAVARIEI. *Keulenschwammartige.*

Genus XXXV. CLAVARIA Linn. *Keulenschwamm.*

522. *Clavaria Botrytis Pers.* Schæff. t. 176! In Wäldern, Sommer und Herbst. Grüsisberg.
523. » *fastigiata Bull.* Hall. 2198. Pers. Comm. t. 4. f. 5! Auf Weiden und magern Wiesen, im Herbst. Kälberweid.
524. » *muscoides Linn.* Hall. 2199. Schæff. t. 173! Auf Rasen in Wäldern. Geissithal.
525 » *rugosa Bull.* Hall. 2202. Bolt. t. 115! In Wäldern. Grüsisberg.
526. » *cristata Pers.* Hall. 2200. Schæff. t. 170! In feuchten Wäldern. Teuffithal.
527. » *subtilis Pers.* Comm. t. 4. f. 2! In Laubholzwäldern. An der Zulg.
528. » *delicata Fr.* Auf faulen Stämmen von Populus.
529. » *aurea Schæff.* t. 287. In Wäldern, im Sommer und Herbst. Grüsisberg.
530. » *formosa Fr.* Krombh. t. 53. f. 5—7. t. 54. f. 21—22! In Laubholzwäldern. Rustwald.
531. » *dichotoma Secret.* In allen Tannwäldern. Grüsisberg.
532. » *sanguinea Secret.* In Tannwäldern. Grüsisberg.

Da ich die Beschreibung dieser beiden letztern Arten, welche bei uns häufig vorkommen, nirgends finde, als bei Secretan, so scheinen sie der Schweiz eigen zu sein.

533. » *abietina Pers.* Grev. t. 117! Am Fusse alter Tannen, vom August bis November.
534. » *flaccida Fr.* In Tannwäldern, im Spätherbst. Grüsisberg.
535. » *grisea Pers.* Krombh. t. 53. f. 9, 10! Auf Viehweiden. Kälberweid.
536 » *gracilis Pers.* In Tannwäldern selten, im Herbst. Heimbergwald.

537. *Clavaria stricta Pers.* Comment. t. 4. f. 1! An Tannwurzeln, vom August bis Oktober.
538. » *byssiseda Pers.* Comment. t. 3. f. 7! Auf Buchenholz.
539. » *fusiformis Sow.* Bolt. t. 110! Auf schattigen Rasen in Wäldern, im Herbst.
540. » *helvola Pers.* Grev. t. 37! Torfmoor an der Erde, Sommer und Herbst.
541. » *vermiculata Scop.* Mich. t. 87. f. 12! Auf Wiesen.
542. » *fragilis Holmsk.* Hall. 2203. Bolt. t. 111! In Wäldern und auf Viehweiden, im Herbst. Spithalsweid bei Blumenstein.
543. » *fumosa Pers.* Krombh. t. 53. f. 18! In Wäldern, im September. Hardlisberg.
544. » *pistillaris Linn.* Hall. 2204. Schæff. t. 169! In Buchwäldern.
545. » *ligula Schæff.* t. 171! In Tannwäldern. Grüsisberg.

Genus XXXVI. CALOCERA Fr.

546. *Calocera viscosa Pers.* Schæff. t. 174! An faulen Tannstöcken, im Herbst.
547. » *cornea Batsch.* t. 161! An faulendem Holz.

Genus XXXVII. GEOGLOSSUM Pers. *Kolbenschwamm.*

548. *Geoglossum viride Pers.* Nees Syst. f. 158! In Buchwäldern.
549. » *glabrum Pers.* Bolt. t. 111. f. 2! Auf feuchten Wiesen, Torfland, im Sommer und Herbst.
550. » *hirsutum Pers.* Nees Syst. f. 157! Auf feuchtem Land, Torfmoor, im Herbst.

Genus XXXVIII. TYPHULA Fr. *Rohrpilz.*

551. *Typhula erythropus Pers.* Bolt. t. 112! An einer tannenen Brunnröhre, im Herbst.
552. » *tenuis Fr.* Sow. t. 386. f. 5. Auf dürren Stengeln verschiedener Pflanzen.

Ordo VI. TREMELLINÆ. *Gallertpilze.*

Genus XXXIX. TREMELLA Fr. *Markschwamm.*

553. *Tremella foliacea Pers.* Bull. t. 406. f. A, a. Auf Eichenholz, im Spätherbst.

554. *Tremella mesenterica Pers.* Hall. 2261. Schæff. t. 168! An faulenden Stämmen, im Winter und Frühling.
555. „ *miniata Trog.* Rasenförmig, wellig, gelbroth, mit ganzem Rande. An der Rinde von Laubholz, im Winter.
556. „ *albida Huds.* Bull. t. 386. f. A. Auf faulenden Aestchen von Quercus, im Winter und Frühling.
557. „ *sarcoides With.* Nees f. 143. An der Rinde von gefällten Nussbäumen, im Spätherbst und Winter.

Genus XL. EXIDIA Fr. *Lappenschwamm.*

558. *Exidia Auricula Fr.* Hall. 2220. Bolt. f. 107! An alten Hollunderstämmen, im Herbst und Winter.
559. „ *recisa Fr.* Nees Syst. f. 141! Auf Weiden und andern Bäumen, im Winter.
560. „ *glandulosa Fr.* Bull. t. 420. f. 1. An Stämmen von Laubhoz, im Herbst und Winter.
561. „ *saccharina Fr.* Auf Buchenholz, im Spätherbst.
562. „ *repanda Fr.* Auf faulendem Laubholz, im Herbst und Winter.

Genus XLI. DACRYMYCES Nees. *Tropfenpilz.*

563. *Dacrymyces stillatus Nees.* Syst. f. 90! Hall. 2257. Auf faulendem Tannholz, im Winter.

Genus XLII. AGYRIUM Fr. *Glattpilz.*

564. *Agyrium nigricans Fr.* Auf abgef. Aestchen, im Winter.
565. „ *nigrum?* — Abart der vorigen?

Classis II. DISCOMYCETES. *Scheibenschwämme.*

Ordo I. HELVELLEI. *Mützenschwämme.*

Genus I. MORCHELLA Dill. *Morchel.*

566. *Morchella esculenta β. vulgaris Pers.* Hall. 2247, a. (die gemeine Morchel). Krombh. t. 16. f. 5, 6! Auf Wiesen, im April.