Zeitschrift: Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Bern

Herausgeber: Naturforschende Gesellschaft Bern

Band: - (1844) **Heft:** 15-23

Artikel: Verzeichniss schweizerischer Schwämme, welche grösstentheils in der

Umgebung von Thun gesammelt worden sind

Autor: Trog, J.G.

Register: Classis II. Discomycetes: Scheibenschwämme

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-318165

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

- 554. Tremella mesenterica Pers. Hall. 2261. Schæff. t. 168! An faulenden Stämmen, im Winter und Frühling.
- 555. " miniata Trog. Rasenförmig, wellig, gelbroth, mit ganzem Rande. An der Rinde von Laubholz, im Winter.
- 556. » albida Huds. Bull. t. 386. f. A. Auf faulenden Aestchen von Quercus, im Winter und Frühling.
- 557. » sarcoides With. Nees f. 143. An der Rinde von gefällten Nussbäumen, im Spätherbst und Winter.

GENUS XL. EXIDIA Fr. Lappenschwamm.

- 558. Exidia Auricula Fr. Hall. 2220. Bolt. f. 107! An alten Hollunderstämmen, im Herbst und Winter.
- 559. » recisa Fr. Nees Syst. f. 141! Auf Weiden und andern Bäumen, im Winter.
- 560. » glandulosa Fr. Bull. t. 420. f. 1. An Stämmen von Laubhoz, im Herbst und Winter.
- 561. " saccharina Fr. Auf Buchenholz, im Spätherbst.
- 562. » repanda Fr. Auf faulendem Laubholz, im Herbst und Winter.

GENUS XLI. DACRYMYCES Nees. Tropfenpilz.

563. Dacrymyces stillatus Nees. Syst. f. 90! Hall. 2257. Auf faulendem Tannholz, im Winter.

GENUS XLII. AGYRIUM Fr. Glattpilz.

- 564. Agyrium nigricans Fr. Auf abgef. Aestchen, im Winter.
- 565. » nigrum? Abart der vorigen?

Classis II. DISCOMYCETES. Scheiben-schwämme.

Ordo I. HELVELLEI. Mützenschwämme.

GENUS I. MORCHELLA Dill. Morchel.

566. Morchella esculenta β. vulgaris Pers. Hall. 2247, a. (die gemeine Morchel). Krombh. t. 16. f. 5, 6! Auf Wiesen, im April.

- 567. Morchella conica Pers. Hall. 2247, g. (die Spitzmorchel). Krombh. t. 16. f. 7—10! In Wäldern, vorzüglich auf Anhöhen, im Mai.
- 568. " semilibera DeCand. Krombh. t. 15. f. 19, 20. Auf Wiesen, im Mai.

GENUS II. HELVELLA Linn. Mützenschwamm. Lorchel.

- Helvella crispa Fr. Hall. 2240. (die Herbstlorchel). Krombh.
 t. 19. f. 27-29! In feuchten Waldungen, im Herbst. Heimbergwald.
- 570. » lacunosa Holmsk. Schæff. t. 162! (die Grubenlorchel). In Wäldern, im Herbst. Kandergrien.
- 571. » Infula Schæff. t. 159! In Tannwäldern, im Herbst. Grüsisberg.
- 572. » elastica Bull. t. 242. In feuchten Wäldern, im Herbst.

GENUS III. MITRULA Fr. Mützenschwamm.

- 573. Mitrula spathulata Fr. Spathularia flavida Pers. Schæff. t. 149! In Wäldern, auf Tannnadeln, im Herbst.
- 574. " cucullata Fr. Batsch. f. 132! Auf Tannnadeln, fast das ganze Jahr.
- 575. » paludosa Fr. In Sümpfen, auf faulenden Blättern, im Sommer.

GENUS IV. PEZIZA. Becherschwamm.

SUBGENUS I. ALEURIA.

- 576. Peziza Acetabulum Linn. Bull. t. 485. f. 4. In schattigen Wäldern. Bei Genf.
- 577. » venosa Pers. Jacq. Austr. t. 17. f. 1. In Gärten, zwischen den Buchseinfassungen, im April.
- 578. » badia Pers. Bolt. t. 99! In Gebüschen, im Frühling.
- 579. » abietina Pers. In Tannwäldern, im Herbst.
- 580. » leporina Batsch. f. 117! In Tannwäldern und auf Viehweiden.
- 581. » aurantia Fl. Dan. Hall. 2222. Schæff. t. 148! In Wäldern.
- 582. " umbrina Pers. Bull. t. 154. f. 2. In schattigem Gebüsch an der Erde.

- 583. Peziza alutacea Pers. Schæff. t. 155! In Wäldern, im Sommer und Herbst.
- 584. » repanda Pers. Icon. pict. t. 20. f. 3! In lichten Wäldern, an der Erde, Sommer.
- 585. » cerea Sow. t. 3. Auf faulendem Holz, im Sommer und Herbst.
- 586. " Marsupium Pers. In Wäldern, an der Erde.
- 587. » bufonia Pers. In Wäldern und an feuchten Orten.
- 588. " Macropus Pers. Hall. 2227. Schæff. t. 166! An faulen Stöcken, im Herbst.
- 589. » tuberosa Bull. t. 485. f. 2, 3. Auf schattigen Wiesen, im Frühling.
- 590. » violacea Pers. An Baumstämmen, im Winter.
- 591. » purpurascens Pers. M. E. t. 12. f. 10! In Wäldern, an der Erde.
- 592. " granulata Bull. t. 438. f. 3. Auf Kuhmist, Sommer und Herbst.
- 593. » leucoloma Rebent. Nees Syst. f. 268! An Tannstöcken, im Herbst.
- 594. " hæmastigma Fr. An sandiger Erde, im Spätherbsf.
- 595. » spurcata Pers. In Wäldern.
- 596. » fascicularis Alb. et Schw. t. 12. f. 2! An faulen Baumstämmen.

SUBGENUS II. LACHNEA Fr.

- 597. Peziza coccinea Jacq. Nees f. 288! In Wäldern, zwischen Moos, im Herbst.
- 598. " nigrella Pers. Hall. 2230. In Tannwäldern, im Spätherbst.
- 599. » brunnea Alb. et Schw. t. 9. f. 8! Auf faulendem Holz, Sommer und Herbst.
- 600. » hirta Schum. Auf sandiger Erde, nach Regenwetter.
- 601. » involuta Trog. Strunklos, gesellig fast rasenförmig; Becher fast kugelig, an der Basis mit langen, striegelförmigen Haaren bekleidet. Auf Aestchen von Eichenholz.
- 602. " umbrorum Fr. Michel t. 86. f. 19! An der Erde, auf faulendem Laub.
- 603. " crinita Bull. t. 416. f. 2. Auf faulenden Aestchen.
- 604. » livida Schum. Batsch. f. 154! An faulenden Stämmen von Salix und Populus, im Frühling.
- 605. » setosa Nees. f. 275! An verfaulten Baumstämmen, im Herbst.
- 606. "wirginea Batsch. Hall. 2239. Mich. t. 36. f. 15! Auf Rinde, Holz etc., das ganze Jahr.

- 607. Peziza nivea Hedw. Bull. t. 416. f. 5. Auf abgefallenen Aestchen, im Herbst.
- 608. » patula Pers. Nees Syst. f. 285! Auf Blättern und Holz, im Herbst und Frühling.
- 609. » calycina β. Abietis Fr. An abgef. Aestchen von Pinus Abies.
- 610. » bicolor. Bull. Nees Syst. f. 284! An Zäunen, im Frühling.
- 611. » cerinea Pers. Nees Syst. f. 283! An Hecken und schattigen Orten, im Herbst und Frühling.
- 612. » calyculæformis Schum. Auf faulendem Holz, im Herbst.
- 613. » clandestina Bull. Auf Rinde von Sambucus, im Frühling.
- 614. » albo-violascens Alb. et S. t. 8. f. 4! Auf Aestchen von Cratægus, im Winter.
- 615. » corticulis Pers. Auf Tannen- und anderm Holz, ausdauernd.
- 616. » hispidula Schrad. Auf abgefallenen Aestchen, im Frühling.
- 617. » spadicea Pers. An Aesten von Populus tremula, im April.
- 618. » variecolor Fr. Pers. icon. et descr. t. 8. f. 4, 5. Auf angeschwemmtem Holz, durchs ganze Jahr.
- 619. » Nidulus Schm. et Kunze. Auf Stengeln grösserer Pflanzen, im Frühling.
- 620. » anomala Pers. Sowerb. t. 369. f. 3. Auf abgefallenen Aestchen, ausdauernd.
- 621. » cæsia Pers. Nees Syst. f. 272! Auf abgef. Aestchen, im Herbst und Frühling.
- 622. » Mayadis Kramer. Auf Blättern von Zea Mais.

SUBGENUS II. PHIALEA.

- 623. Peziza firma Pers. Bolt. t. 105. f. 1! Auf faulenden Aestchen, im Winter.
- 624. » serotina Pers. Bolt. t. 98. f. 2! An Tannenholz, im Spätherbst.
- 625. » lutescens Alb. et Schw. Fl. Dan. t. 1440. f. 1. An Tannästchen, im Frühling.
- 626. » cyathoidea Bull. Nees Syst. f. 294! Auf Baumästchen und Pflanzenstengeln, durchs ganze Jahr.
- 627. » strobilina Fr. An den Schuppen der Tannzapfen, ausdauernd.
- 628. » Calyculus Sow. t. 116. Auf eichenen Aestchen, im Herbst.
- 629. » æruginosa Fl. Dan. Grev. t. 241! In Wäldern, auf faulem Holz, im Sommer und Herbst.
- 630. » pallescens Pers. Hoffm. Fl. g. crypt. t. 13. f. 5! Auf abgefallenen Aestchen, im Herbst.

- 631. Peziza lenticularis Bull. t. 300. f. a, c. An faulenden Baumstämmen, im Herbst.
- 632. » salicella Fr. Auf faulenden Aesten von Salix, vom Herbst bis in den Frühling.
- 633. " luteo-virens Fr. An buchenen Stämmen, im Herbst.
- 634. " carnea Fr. Auf abgefallenen Aestchen, im Herbst.
- 635. » imberbis Bull. t. 467. f. 2. An feuchtem Tannholz, im Herbst.
- 636. » herbarum Pers. An faulenden Halmen von Carex pendula, im Herbst und Winter.
- 637. " chrysocoma Bull. t. 376. f. 2. An Tannenholz, durchs ganze Jahr.
- 638. » vinosa Pers. An Stengeln von Urtica dioica, Herbst bis Frühling.
- 639. » rubella Pers. An halbverfaultem Holz, im Herbst, in Wäldern.
- 640. » atro-virens. β . seriata Fr. Auf Eichenholz.
- 641. » uda Pers. Hall. 2243. An feuchten Aestchen, vom Herbst bis Frühling.
- 642. » cinerea Batsch. f. 137! Hall. 2244. Auf Aestchen von Alnus, vom Herbst bis Frühling.
- 643. " vulgaris Fr. Auf Stengeln und Aestchen, im Winter. Grüsisberg.
- 644. " acicola Schmidt; Auf der untern Seite von Tannnadeln.
- 645. » livido-fusca Fr. Auf Zapfen von Pinus sylv., vom Herbst bis Frühling.
- 646. » atrata Pers. Nees Syst. f. 266! An Weidenstämmen, im Winter und Frühling.
- 647. "lævigata Fr. An dürren Stengeln grösserer Pflanzen, im Frühling.

SUBGENUS III. HELOTIUM.

- 648. " Peziza pithya Pers. Nees Syst. f. 287! Auf Aestchen von Pinus picea, im Winter und Frühling.
- 649. » aurea Fr. An abgeschältem Holz, im Winter und Frühling.
- 650. " alba Fr. An Blättern von Carex pendula, im Herbst.

GENUS IV. ASCOBOLUS. Schlauchwerfer.

651. Ascobolus furfuraceus Pers. Grev. Scot. 6. t. 307! Auf Kuhmist, nach Regenwetter.

- 652. Ascobolus porphyrosporus Fr. Auf Kuhmist, zu allen Jahreszeiten.
- 653. » glaber. Pers. Nees Syst. f. 297! Auf Kuhmist.

Ordo II. BULGARIEI.

GENUS V. LEOTIA Fr. Der Nagelschwamm.

- 654. Leotia circinans Pers. Icon. descr. t. 5. f. 5-7. In Tannwäldern, im Herbst.
- 655. » lubrica Pers. Nees Syst. f. 162! In Wäldern und auf Torfland, im Sommer und Herbst.
- 656. » atro-virens Pers. M. E. t. 9. f. 1-3! In Wäldern, an feuchten Stellen.

GENUS VI. BULGARIA Fr.

- 657. Bulgaria inquinans Fr. Hall. 2219. Krombh. t. 5. f. 49! Auf Eichenholz, im Herbst und Winter.
- 658. " pura Fr. An tannenem Spältenholz, im Herbst und Winter.
- 659. » sarcoides Fr. Hall. 2221. Batsch. f. 53! An Laubholzstämmen, im Herbst und Winter.

´ Ordo III. DERMEl. *Lederbecherschwämme*.

GENUS VII. DITIOLA Fr. Flockenpilz.

660. Ditiola radicata Fr. Hall. 2241. Nees Syst. f. 161! An faulendem Tannenholz, im Frühling.

Ordo IV. PATELLARIEI. Tellerpilzartige.

GENUS VIII. PATELLARIA. Tellerpilz.

661. Patellaria atrata Fr. Nees Syst. f. 265! Auf Aestchen von Tilia.

GENUS IX. CENANGIUM Fr. Leerschüsselpilz.

662. Cenangium Cerasi Fr. Pers. Icon. pict. t. 20. f. 1! Auf Aestchen von Cerasus, ausdauernd.

- 663. Cenangium Prunastri Pers. Auf Aestchen von Prunus.
- 664. " pithyum Fr. Obs. t. 5. f. 4! Auf Schuppen der Zapfen von Pinus sylvestris. Kandergrien.
- 665. » quercinum Fr. Nees Syst. f. 300! Auf Aestchen von Quercus.

GENUS X. EXCIPULA Fr. Schäälchenschwamm.

- 666. Excipula aspera Fr. An Stengeln von Osmunda.
- 667. » Angelicæ Trog. Punktförmig, aufgeschwollen, schwarz, Scheibe geöffnet, grauschwarz. Auf Stengeln von Ang. sylv.

Ordo V. PHACIDIACEI. Linsenpilzartige.

GENUS X. HYSTERIUM Tode. Ritzenpilz.

- 668. Hysterium pulicare Pers. Grev. 3. t. 167! Auf Aestchen.
- 669. » angustatum Pers. Grev. 3. t. 167! Auf Eichenholz.
- 670. » graphicum Fr. Sturm. Flor. t. 32. An der Rinde von Pinus sylvestris, Herbst bis Frühling.
- 671. » varium Fr. An Eichenholz, im Herbst.
- 672. » elatinum Pers. Auf Tannrinde; ausdauernd.
- 673. » degenerans Fr. Auf Aestchen von Vaccinium uliginosum.
- 674. "Rubi Pers. Grev. 1. t. 24! Auf Aestchen von Rubus.
- 675. » pinastri Schrad. Grev. 1. t. 60! Auf Tannnadeln.
- 676. » juniperinum Pers. Grev. 1. t. 26! Auf Blätter von Juniperus.
- 677. "melaleucum Fr. Obs. mycol. t. 2. f. 1! Auf Blättern von Vaccinium.
- 678. » commune Fr. Auf Stengeln von Pteris aquilina etc.
- 679. » arundinaceum Schrad. Journ. t. 3. f. 3. Auf Halmen von Arundo phragmites.
- 680. » Ilicis? Auf Bl. von Ilex aquifolium.

GENUS XII. PHACIDIUM Fr. Linsenpilz.

- 681. Phacidium alneum Fr. Auf Aestchen von Alnus.
- 682. " Pini Schmidt. Nees Syst. f. 399! Auf Aestchen von Pinus sylvestris.
- 683. » multivalve Schmidt. Greville t. 253! Auf Blättern von Ilex.
- 684. » dentatum Fr. Auf Eichenblättern.
- 685. » repandum Fr. A. et Schw. t. 4. f. 6! Auf Stengeln von Angelica sylv.

GENUS XIII. RHYTISMA Fr. Ritzblattschorf.

- 686. Rhytisma Andromedæ Fr. Auf Bl. von Andromeda polifolia, Sommer und Herbst.
- 687. » Vaccinii Fr. Auf Bl. von Vaccinium vitis idea.
- 688. » salicinum Fr. Grev. t. 118! Auf Bl. von Salix.
- 689. » acerinum Fr. Grev. t. 118! Auf Ahornblättern.
- 690. " punctatum Fr. Auf Bl. von Acer pseudo-platanus.

Ordo VI. STICTEL. Punktpilzartige.

GENUS XIV. STICTIS Pers. Punktpilz.

- 691. Stictis Pupula Fr. Auf Aestchen.
- 692. » radiata Pers. Nees f. 294! Auf abgefallenen Aestchen, vom Herbst bis in Frühling.
- 693. » tenuis Fr. Auf dürren Aestchen.
- 694. » bullata Pers. Auf abgef. Aestchen.
- 695. » parallela Fr. Auf altem Holz, ausdauernd.

Classis III. PYRENOMYCETES. Kernschwämme.

Ordo I. SPHÆRINI. Kugelschwammartige.

GENUS I. SPHÆRIA. Kugelpilz.

A. COMPOSITÆ.

SECT. I. PERIPHERICÆ.

- 696. Sphæria capitata Holmsk. Pers. M. E. t. 10. f. 1 4! Wächst parasitisch auf der Hirschtrüffel, im Herbst.
- 697. » ophioglossoides Ehrh. Pers. M. E. t. 10. f. 5, 6! In Wäldern, wie die vorige, auf der Hirschtrüffel.
- 698. » digitata Ehrh. Nees f. 304! An eichenen Wandstöcken, ausdauernd.
- 699. » polymorpha Pers. Nees f. 307! An buchenen Stöcken, in Wäldern, vom Frühling bis im Herbst.