Zeitschrift: Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Bern

Herausgeber: Naturforschende Gesellschaft Bern

**Band:** - (1853) **Heft:** 292-293

**Artikel:** Nachrichten von der Sternwarte in Bern

Autor: Wolf, R.

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-318409

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF: 26.11.2025** 

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# R. Wolf, Nachrichten von der Sternwarte in Bern.

# XLI. Beobachtungen der Sternschnuppen im Winterhalbjahre 1852 auf 1853.

(Vorgelegt am 7. Mai 1853.)

Die Beobachtungen der Sternschnuppen wurden auch in diesem Halbjahre nach dem frühern Plane <sup>1</sup>), so oft Geschäfte und Witterung es erlaubten, theils allein, theils mit Hülfe von Freunden und Schülern <sup>2</sup>), fortgesetzt. Die erhaltenen Beobachtungen zeigt folgende Tafel, welche je den Anfang der Beobachtungsviertelstunde, und die dem gewählten Richtpunkte in ihr entsprechende Sternschnuppenzahl enthält <sup>3</sup>):

Anfar	ø		A	nzahl	der	Sterr	schn	uppe	a.
der Beobac		ng.	∝Ursæ minoris.	& Serpentis.	c.Aquilæ.	y Pegasi.	ce Tauri.	clanis minoris.	BLeonis.
October 3	7	30		1	-		_		_
4	7	52		<del></del>		1	_	_	
	8	0			3			_	
18	7	28	1		3				<b> </b>

<sup>1)</sup> Siehe Nr. 245 und 262 der Mitth.

<sup>2)</sup> Ich bin in dieser Beziehung namentlich den Herren König, Moser, Wenger, Fischer, etc. zu Dank verpflichtet.

<sup>3)</sup> Die durch Mondschein modificirten Beobachtungsviertelstunden sind auch diesmal mit \* bezeichnet worden.

Anfar	) <u>P</u>		A	nzah	der	Steri	nschn	upper	1.	
der Beoba	7.	ing.	αUrsæ minoris.	a Serpentis.	αAquilæ.	gasi.	uri.	c.Canis minoris.	onis.	
Tag.	h	_		c Se	αAq	y Pegasi.	αTauri.	c.Ca	eta Leonis.	
October 19 20 22 Novemb. 3 5 9 10 14 18 25 Decemb. 5	791077867785101891168878910788977	0 57 15 57 12 8 10 12 15 24 57 27 50 56 25 40 0 30 0 57 0 45 15 0 45 6 45 6	1 - 0 0 - 1 1 1 - 3 - - 0 - 0 - - 0 - - 0 - - - - - - -			0 - - - 1 1 - - - 0 - 3 5	- 3 2 - 0 - 1 3 - 1 1 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			* ***
10 11	8 9 7 7	0 45 30 45 56	1 0 1 -	_ _ _	7 - 2 3	1 1 2 4 2 —	3 0 0 1 -	- 0 1 - -		

Anfa	ng		A	nzahl	der	Stern	schn	upper	1.
der Beoba		ng.	c.Ursæ minoris.	entis.	læ.	ısi.	<b>ن</b> ېز.	«Canis minoris.	.sı.
Tag.	h		c.Ursa	αSerpentis.	αAquilæ.	γ Pegasi.	⊄Tauri.	αCani	$\beta$ Leonis.
Decemb. 11	8 8	12 27	4	_	_	_	_	_	
12	7	15 30	0	_		_ 	0	_	_
16	7 8	45 15	1	_		$-\frac{1}{0}$	1	-	
~	9 9	42 57	_	_		1 2	_	1 1	_
19	10	12 0	1			-	_		=
20	8	15 5		-	_	_	0	_	_
20	8 10	30 10	1	_	_	_	_	0	<u>-</u>
26	8	57 0	_	_	0	1 2	_	_	_
29	6 7 8	42 57 12	1 1	-	=	_	_ _ 0	=	_
30	6 7	15 0		_	0	<u>_</u>	_	_	_
	7	55 10	2	_	_	_	_		_
31	8 6 7	0 20	<u> </u>	_	0	_	_	_	_
anuar 5	7 6 7	45 50	<u>_</u>	_	_	0	_	_	_
6	8	5 45	_	_	_	<u></u>	0	_	_
11 12	10 7	0 27	2	_	-	_	2	_	_
25	7 9 7	42 45 15	2 3 2 0	_		3	$\frac{0}{0}$	0 1 1	_

Anfar	ıg		A	nzahl	der	Stern	schn	appen	۱.	
der Beoba	10.000	ng.	ce Ursæ minoris.	c Serpentis.	nilæ.	gasi.	iri.	«Canis minoris.	onis.	
Tag.	h		a Urs	αSer	c.Aquilæ.	$\gamma$ Pegasi.	αTauri.	c Car	β Leonis.	
Januar 28 29 Februar 3 5 7 15 16 22 März 4 7 11 12 13 14	7 10 7 8 7 10 10 7 9 7 8 8 8 7 7 10 7 8 8 8 7 7 10 7 7 8 8 8 8 8 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	0 42 0 5 26 2 17 42 0 27 0 0 15 30 45 0 5 20 45 27 42 30				2 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -		0		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
22 25 29	7 8 8 7 7 8	0 10 42 57 15	- 0 - 0				0 1 2		- - - 0	**

Stelle ich, entsprechend wie früher, die Beobachtungen nach den verschiedenen Richtpunkten zusammen, so erhalte ich folgende Tafel viertelstündlicher Durchschnittszahlen:

Richtpunkte.	October.	Novemb.	Decemb.	Januar.	Februar	März.	Im Mittel.
α Ursæ min	0,5	1,3	0,9	1,4	0,2	0,4	0,8
α Serpentis	1,0	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		1,0
α Aquilæ	1,0 2,3	1,9	1,9		I <del></del>		2,0
γ Pegasi	0,5	0,8	1,9	1,3	0,5		1.0
α Tauri	1,7	1,4	1,0	0,4	0,0	0,6	0,8
α Canis min		0,0	0,7	0,7	0,0	0,4	0,3
$\beta$ Leonis					0,0	0,8	0,4
Im Mittel	1,2	1,1	1,3	0,8	0,1	0,6	0,9

Gruppire ich sie dagegen nach den Beobachtungsstunden, so erhalte ich die zweite Tafel viertelstündlicher Durchschnittszahlen:

Stunde.	October.	November.	December.	Januar.	Februar.	Närz.	Im Mittel.
5—6	- 1,2 0,8 - 2,0	2,0 1,5 1,6 0,5 0,7 0,0	 0,7 1,4 1,4 1,3 1,2	 0,0 1,1 0,0 1,5 1,0	- 0,5 0,0 0,0 0,0 -	- 0,6 0,6 - 0,0 -	 0,9 1,0 0,7 0,8 0,8 0,0
Im Mittel	1,3	1,0	1,2	0,7	0,1	0,4	0,8

Specielle Bemerkungen habe ich nicht beizufügen, — höchstens mein Bedauern auszusprechen, dass vom 11. bis 13. November und vom 1. bis 4. Januar beständiger Nebel jede Beobachtung unmöglich machte.

## XLII. Sonnenflecken-Beobachtungen in der ersten Hälfte des Jahres 1853.

Der Zustand der Sonnenoberfläche wurde fortwährend möglichst oft beobachtet, und zwar zählte ich im

			18	53.					Beobachtungs- tage.	Fleckenfreie Tage.	Gruppen.
Januar		100	•	•	3.00	•			21	0	14
Februa	ar	•		•	•	•	•	ě	15	0	10
März		٠		•	•	•	•	٠	24	1	9
April	•	•	•	ě	•		•		21	0	9
Mai .		•	•		٠			•	27	0	8
Juni .	•	•	•	•	•	•	•	•	21	0	9
	0	Im	Ga	nze	n	•	•	•	129	1	59

Die täglichen Beobachtungen sind in der folgenden Tafel enthalten und zwar gibt die Columne:

- A. Rechenschaft über die Influenz der Bewölkung und das angewandte Fernrohr: 1) bezeichnet, dass die Sonne frei gewesen und mit der Vergrösserung 64 eines vierfüssigen Frauenhofers beobachtet worden sei; 2) dass die Sonne durch Wolken oder mit einem tragbaren zweifüssigen Fernrohr anvisirt wurde; 3) dass jede Beobachtung vereitelt wurde;
- B. die Anzahl der an dem Beobachtungstage neu gegesehenen Gruppen;
  - C. die Anzahl sämmtlicher Gruppen;
- D. die Anzahl der in sämmtlichen Gruppen gezählten Einzelflecken;
- E. den Stand der Fackeln und Schuppen: 1) bezeichnet die gewöhnliche Häusigkeit und Intensität; 2) einen höhern Grad.

Sonnenflecken-Beobachtungen  $\Lambda$ . 1853.

		J	anu	ar.			Fe	bru	ar.			1	März	ż. 	
a.	A	В	C	D	Е	A	В	c	D	E	A	В	C	D	E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	1 3 3 3 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 3 3 1 2 2 3	4 1 0 0 - 1 0 0 - 2 - 1	4 3 2 2 - 1 1 2 2 2 - 3 2 3	9 7 1 1 3 2 2 1 4 6 6 7 12 3 9	1 1 1 1 2 1 2 1 - 1 1 1 2 - 2	3 3 2 2 1 2 1 3 3 3 1 1 1 3 2 2 1 3 1 3		- 11233 233 · 55 - 445 - 4	1 1 4 5 14 — 16 24 14 — 18 13 — 20 18 35 — 16		3 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 3 3 2 1 3 3 2 1 2	- 0 0 0 0 - 1 - 0 1 1 0 1 2 0 1	- 1 1 1 1 0 0 1 - 1 1 1 2 2 2 2 3 6 3 4 5		
23 24 25 26	1 1	1	<b>4</b> <b>5</b>	35 26	1	3 1	- - 1	- 2	_ 17	- - 2	1 1 1	1 0 1	5 4 5 5	18 16 15	1 2 1
27 28 29	3 2 1 3	1	5 6 - 5	12 23 19	- 2 - 1	3 3	-	-	_	-	1 3 2 1	0 - -	4	13 - 7	1 - 2 1
30 31	1 3	0	5	<u>–</u>	_						1	$\begin{vmatrix} 0 \\ 0 \end{vmatrix}$	4 3	18 15	1

### Sonnenflecken-Beobachtungen A. 1853.

**************************************		Ā	Apri	l.				Mai.	8				Juni		
	A	В	C	D	Е	A	В	c	D	E	A	В	c	D	E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	3 1 1 3 3 1 1 2 3 1 1 2 3	0 2 - 1 0 - 0 1 - 1 1	- 2 4 - 4 4 - 2 3 - 3 3 3		1 2 - 1 1 1 - 2 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3	21 17 21 16 11 6 4 2 3 - 5 6 12 15 9	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 2 3 1 1 3 3 1 1 1 3 3 2 3 1	1 0 2 1 2 1 1	2 2 1 - 1 3 - - 3 5 6 - - 4	18 7 5 9 20 - 12 19 20 - 17 - 25	1 1 1 2 1
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 2 3	1 1 - 0 - 0 1	3 4 5 4 3 3 1 2 2 2 0 1	11 24 29 10 9 26 3 14 — 6 6 0 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 3 3	1 0 0 0 0 0 0 - 2 1 0	3 2 2 2 2 1 1 3 4 4 2	9 10 15 27 28 51 36 10 19 14 3 —	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	211123133222	1000000	2 4 3 3 1 - 1 1 1 1 0	6 27 26 26 21 1 - 1 - 1 1 0	1 1 1 1

Am 5. und 7. Februar sah ich umsonst nach dem Durchzuge fremder Körperchen über die Sonnenscheibe,—cbenso am 12., 13. und 14. Mai. — Am 6. Januar schien mir ein Fleckchen etwas röthlich zu sein, — ebenso am 28. Juni, wo ich mir die Sonne auf dem Rigi unmittelbar nach Sonnenaufgang ohne Blendglas ansah.

Vorschrift zur Bereitung flüssigen Leimes: Man löse in einem glasirten Topfe über gelindem Feuer oder noch besser in dem Wasserbade, 1 Kilogramm Leim in 1 Litre Wasser auf. Wann aller Leim aufgelöst ist, giesse man unter beständigem Umrühren nach und nach 200 Gramm Salpetersäure (spezifisches Gewicht = 1,32) dazu, wedurch ein Aufschäumen entsteht, das von freigewordenem untersalpetrigsaurem Gase herrührt. Ist alle Säure zugegossen, so nimmt man den Topf vom Feuer und lässt ihn langsam erkalten, wobei der dicke Schaum nach und nach von selbst vergeht. [R. Sh. nach Dumoulin.]

Simon Lhuilier. "Les machines composées ont un grand avantage sur les machines simples: savoir en augmentant le nombre des machines simples qui entrent dans la composition d'une machine composée, on diminue le volume, le poids et le travail de cette dernière."

Simon Lhuilier. "J'ai cherché inutilement à déterminer, uniquement par les éléments, la position du centre de gravité d'un triangle sphérique. Je peux bien démontrer élémentairement quelques-unes des propositions qui y conduisent. Mais le développement complet de cette matière me parait dépendre des calculs appelés supérieurs." [R. Wolf.]

Berichtigung. In der Abhandlung Herrn Hipp's über die Translatoren (Nr. 279 d. Mitth.) sind auf Seite 118 die in den Columnen a und b enthaltenen Zahlenreihen mit den in den Columnen e und f enthaltenen zu vertauschen, und umgekehrt.

