

Zeitschrift: Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Bern
Herausgeber: Naturforschende Gesellschaft Bern
Band: - (1927)

Artikel: Die Alpenpflanzenkolonien des Napfgebietes und die Geschichte ihrer Entstehung
Autor: Lüdi, Werner
Kapitel: [Karten]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-319340>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 21.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



Kartenskizze des Oberen Emmegebietes.

Zeigt die Verbreitung der „Napf-
pflanzen“ in den zwischen der
Napfkette und den Voralpen
gelegenen Gebieten.

- subalpine Arten der
 □ subalpine Arten der
 } dem Napf fehlende, in den südlichen
 } Gebieten neu hinzukommende Arten.
- Felsfluren
Frischwiesen
Hochstauden
Wälder u. Geb.
Zwerggebüsche
Heidewiesen

a. Hauptkette d. Napfes

Abkürzungen.

B.	Brandsegg	L.	Lushütte
Bu.	Buchenhausfluh	Pf.	Pfeifer
E.	Enzischwand	R.	Rathausenegg
F.	Farnli-Esel	R.E.	Romooser-Enzi
He.	Hengstfluh 1374	Sch.	Schwesernboden
Ho.	Hohmatt	Schi.	Schinnenzinggen
K.	Kampfenknobel 1264	St.	Stächelegg
Kv.	Kröschenbrunnen	Ste.	Steinboden
		T.	Tomesboden




Abb. 1. Eifluf, Nordseite. Im Hintergrund Napfgipfel.



Abb. 2. Blick von oben in die Hengstflühe.




Abb. 3. Geissratfluf. Nordseite.




Abb. 4. Hochenzi und Napf von Südwesten.



Abb. 5. *Blechnum spicant*, Schwesternboden.



Abb. 6. Buchenwald mit Hochstauden, Napf.




Abb. 7. Felsvegetation an der Eiflüh.




Abb. 8. *Dryas octopetala*, Stächelegg.