

Zeitschrift: Mitteilungen / Schweizerische Vereinigung der
Versicherungsmathematiker = Bulletin / Association Suisse des
Actuaires = Bulletin / Swiss Association of Actuaries

Herausgeber: Schweizerische Vereinigung der Versicherungsmathematiker

Band: - (1992)

Heft: 1

Artikel: La réactivité des invalides dans les rentes futures d'invalidité

Autor: Chuard, Marc / Chuard, Philippe

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-967252>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 29.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

MARC CHUARD, Zurich et PHILIPPE CHUARD, Pully

La réactivité des invalides dans les rentes futures d'invalidité

1 Objectif et moyens

Pour répondre aux besoins, en prévoyance professionnelle notamment, les mathématiques actuarielles doivent permettre de calculer, en particulier, les valeurs actuelles servant à escompter

- la rente différée de retraite,
- la rente future d'invalidité,
- les cotisations.

Admettons que l'on dispose des quatre probabilités "pures"¹

- q_x^a de décès d'actif,
- I_x d'invalidité d'actif,
- q_x^i de décès d'invalidité,
- r_x de réactivité d'invalidité,

et que, comme c'est le cas d'ordinaire,

pour $x \geq 65$, on a $q_x^a = q_x^i = q_x$ et $I_x = r_x = 0$.

On peut alors calculer les effectifs

- Λ_x^a d'actifs
- Λ_x^i d'invalides

au moyen des formules²

$$\Lambda_{x+1}^a = \Lambda_x^a (1 - q_x^a) (1 - I_x) + \Lambda_x^i r_x \left(1 - \frac{1}{2} q_x^i \right) \frac{1 - q_x^a}{1 - \frac{1}{2} q_x^a}$$

$$\Lambda_{x+1}^i = \Lambda_x^i (1 - q_x^i) (1 - r_x) + \Lambda_x^a I_x \left(1 - \frac{1}{2} q_x^a \right) \frac{1 - q_x^i}{1 - \frac{1}{2} q_x^i}$$

¹ Notion introduite sous le nom de "unabhängige Wahrscheinlichkeit" par Joh. Karup dans une étude parue en 1875.

² Réf. [1], p. 40.

en partant de $\Lambda_{x_0}^a = Q$ et $\Lambda_{x_0}^i = 0$ avec, le plus fréquemment, $x_0 = 20$ et $Q = 100\,000$. On construit ainsi un “*modèle rationnel* pour l’activité et l’invalidité”³.

Les nombres obtenus se prêtant mal à un calcul simple des valeurs actuelles désirées, on suit alors le cheminement suivant. Introduisant une probabilité d’invalidité i_x définie par

$$i_x = I_x - \frac{\Lambda_x^i}{\Lambda_x^a} r_x \frac{1 - \frac{1}{2}q_x^i}{1 - \frac{1}{2}q_x^a}$$

on calcule

- l’ordre l_x^{aa} des actifs, et
- l’effectif λ_x^i des invalides

au moyen des formules

$$l_{x+1}^{aa} = l_x^{aa} (1 - q_x^a) (1 - i_x) \quad (l_{x_0}^{aa} = Q),$$

$$\lambda_{x+1}^i = \lambda_x^i (1 - q_x^i) + l_x^{aa} i_x \left(1 - \frac{1}{2}q_x^a\right) \frac{1 - q_x^i}{1 - \frac{1}{2}q_x^a} \quad (\lambda_{x_0}^i = 0).$$

On passe ainsi à un “*modèle pratique* pour l’activité et l’invalidité”⁴, construit à partir des probabilités q_x^a , i_x et q_x^i parmi lesquelles ne figure pas la probabilité r_x de réactivité. Observons que les deux modèles, rationnel et pratique, sont liés par les correspondances

$$l_x^{aa} = \Lambda_x^a \quad \text{et} \quad \lambda_x^i = \Lambda_x^i.$$

Le modèle pratique permet de calculer facilement les valeurs actuelles désirées. Pour cela on introduit encore le taux d’intérêt technique i qui apparaît dans les formules par le facteur d’escompte $v = \frac{1}{1+i}$.

³ Réf. [1], pp. 34 ss.

⁴ Réf. [1], pp. 24 ss.

2 Rentes d'actifs

Au moyen des nombres de commutation

$$D_x^{aa} = v^x l_x^{aa}$$

$$N_{x:65-x}^{aa(12)} = D_x^{aa} + D_{x+1}^{aa} + \dots + D_{64}^{aa} - \frac{11}{24}(D_x^{aa} - D_{65}^{aa})$$

on calcule la valeur actuelle de la rente différée d'actif (l'une des prestations envisagées)

$${}_{65-x}|\ddot{a}_x^{aa(12)} = \frac{D_{65}^{aa}}{D_x^{aa}} \ddot{a}_{65}^{(12)}, \quad \text{où} \quad \ddot{a}_{65}^{(12)} = \frac{N_{65}^{(12)}}{D_{65}},$$

et, pour l'escompte des cotisations, la valeur actuelle de la rente temporaire d'actif

$$\ddot{a}_{x:65-x}^{aa(12)} = \frac{N_{x:65-x}^{aa(12)}}{D_x^{aa}}.$$

3 Rentes immédiates d'invalid

Le calcul des valeurs actuelles pour rente future d'invalid nécessite le calcul préalable des valeurs actuelles pour rentes immédiates d'invalid. Comme, dans le modèle pratique, on a éliminé la probabilité r_x de réactivité, on se base, pour les rentes immédiates d'invalid, sur l'ordre simple l_x^i des invalides, construit au moyen de

$$l_{x+1}^i = l_x^i (1 - q_x^i) \quad (l_{x_0}^i = Q).$$

Les nombres de commutation

$$D_x^i = v^x l_x^i$$

$$N_{x:65-x}^{i(12)} = D_x^i + D_{x+1}^i + \dots + D_{64}^i - \frac{11}{24}(D_x^i - D_{65}^i)$$

permettent de calculer les valeurs actuelles

$$\ddot{a}_{x:65-x}^{i(12)} = \frac{N_{x:65-x}^{i(12)}}{D_x^i}$$

$$\ddot{a}_x^{i(12)} = \ddot{a}_{x:65-x}^{i(12)} + \frac{D_{65}^i}{D_x^i} \ddot{a}_{65}^{(12)}$$

4 Rentes futures d'invalidité

Deux cheminements différents peuvent être suivis pour obtenir des valeurs actuelles de rentes futures d'invalidité. Ils prennent pour base

- l'un le nombre l_{x+1}^{ai} d'actifs d'âge x , devenus invalides, *en vie à l'état d'invalidité à l'âge $x + 1$* , ce nombre se calculant au moyen de

$$l_{x+1}^{ai} = l_x^{aa} i_x \left(1 - \frac{1}{2} q_x^a \right) \frac{1 - q_x^i}{1 - \frac{1}{2} q_x^i},$$

- l'autre, le nombre b_x d'actifs d'âge x , devenus invalides avant l'âge $x + 1$, ce nombre se calculant au moyen de

$$b_x = l_x^{aa} i_x \left(1 - \frac{1}{2} q_x^a \right).$$

On peut observer que les deux nombres sont liés par

$$\left(1 - \frac{1}{2} q_x^i \right) l_{x+1}^{ai} = (1 - q_x^i) b_x.$$

Le cheminement basé sur b_x introduit, dans la valeur actuelle de la rente future d'invalidité, la valeur actuelle d'un prorata initial⁵. Ce prorata n'étant pas justifié dans le cas du fractionnement mensuel que nous adoptons ($m = 12$), nous faisons le choix du cheminement basé sur l_{x+1}^{ai} . Mais les développements qui s'y rapportent peuvent être facilement adaptés à l'autre cheminement.

Compte tenu des conditions adoptées, les nombres de commutation

$$D_x^{ai(12)} = v^{x+1} l_{x+1}^{ai} \left(\ddot{a}_{x+1}^{i(12)} + \frac{11}{24} \right)$$

$$N_x^{ai(12)} = D_x^{ai(12)} + D_{x+1}^{ai(12)} + \dots + D_{64}^{ai(12)}$$

permettent de calculer la valeur actuelle

$$\ddot{a}_x^{ai(12)} = \frac{N_x^{ai(12)}}{D_x^{aa}}$$

de la rente future *viagère* d'invalidité.

⁵ Réf. [1], pp. 81 ss.

Les nombres de commutation

$$D_{x:\overline{65-x}|}^{ai(12)} = v^{x+1} l_{x+1}^{ai} \left(\ddot{a}_{x+1:\overline{65-x-1}|}^{i(12)} + \frac{11}{24} \right)$$

$$N_{x:\overline{65-x}|}^{ai(12)} = D_{x:\overline{65-x}|}^{ai(12)} + D_{x+1:\overline{65-x-1}|}^{ai(12)} + \dots + D_{64:\overline{1}|}^{ai(12)}$$

permettent de calculer la valeur actuelle

$$\ddot{a}_{x:\overline{65-x}|}^{ai(12)} = \frac{N_{x:\overline{65-x}|}^{ai(12)}}{D_x^{aa}}$$

de la rente future *temporaire* d'invalidité.

Rappelons en passant que la fraction $\frac{11}{24}$, qui apparaît dans les nombres de commutation $D_x^{ai(12)}$ et $D_{x:\overline{65-x}|}^{ai(12)}$, est la moyenne des divers cumuls possibles de termes fractionnés payés pendant l'année au cours de laquelle commence la rente d'invalidité⁶:

$$\left(\frac{1}{12} + \frac{2}{12} + \dots + \frac{11}{12} \right) \frac{1}{12} = \frac{11}{24}.$$

On peut constater que, calculée selon le cheminement adopté (qui élimine un inutile prorata initial), la valeur actuelle $\ddot{a}_x^{ai(12)}$ ne dépend pas du fractionnement m (ici : $m = 12$).

5 Rente différée de vivant reposant sur la tête d'un actif

Désignons par ${}_{65-x|}\ddot{a}_x^{a(12)}$ la valeur actuelle d'une rente différée, reposant sur la tête d'un *actif* d'âge x et payée, s'il est *vivant*, dès l'âge 65, peu importe qu'il soit alors actif ou entre-temps devenu invalide.

La valeur actuelle en question apparaît dans la relation

$$l_{x\ 65-x|}\ddot{a}_x^{(12)} = l_x^{aa} {}_{65-x|}\ddot{a}_x^{a(12)} + \lambda_x^i {}_{65-x|}\ddot{a}_x^{i(12)}$$

construite à partir de

$$l_x = l_x^{aa} + \lambda_x^i.$$

⁶ Réf. [1], p. 76.

Comme

$${}_{65-x}|\ddot{a}_x^{(12)} = \frac{D_{65}}{D_x} \ddot{a}_{65}^{(12)} \quad \text{avec} \quad D_x = v^x l_x$$

et

$${}_{65-x}|\ddot{a}_x^{i(12)} = \frac{D_{65}^i}{D_x^i} \ddot{a}_{65}^{(12)}$$

on obtient⁷

$${}_{65-x}|\ddot{a}_x^{aa(12)} = \left(1 - \frac{\lambda_x^i l_{65}^i}{l_x^i l_{65}}\right) \frac{D_{65}}{D_x^{aa}} \ddot{a}_{65}^{(12)}.$$

Cette formule vérifie l'importante relation

$${}_{65-x}|\ddot{a}_x^{aa(12)} + \ddot{a}_{x:65-x}^{ai(12)} = {}_{65-x}|\ddot{a}_x^{aa(12)} + \ddot{a}_x^{ai(12)}$$

montrant que l'on peut obtenir de deux manières différentes la valeur actuelle globale des rentes de retraite et d'invalidité.

Pour la démonstration de la relation ci-dessus on peut mentionner que

$$\ddot{a}_x^{ai(12)} - \ddot{a}_{x:65-x}^{ai(12)} = \frac{D_{65}^i}{D_x^{aa}} \ddot{a}_{65}^{(12)} \sum_{t=x}^{64} \frac{l_{t+1}^{ai}}{l_{t+1}^i}$$

et que

$$\sum_{t=x}^{64} \frac{l_{t+1}^{ai}}{l_{t+1}^i} = \sum_{t=x}^{64} \left(\frac{\lambda_{t+1}^i}{l_{t+1}^i} - \frac{\lambda_t^i}{l_t^i} \right) = \frac{\lambda_{65}^i}{l_{65}^i} - \frac{\lambda_x^i}{l_x^i}.$$

6 Remarques

Les opérations qui sont l'objet des paragraphes précédents permettent d'atteindre l'objectif fixé au paragraphe 1. En effet soit

$${}_{65-x}|\ddot{a}_x^{aa(12)} + \ddot{a}_x^{ai(12)}$$

⁷ Réf. [2], formule (69); précisons que, dans les tables EVK 1980, les deux nombres l_{65}^i et l_{65} sont égaux.

soit

$${}_{65-x}| \ddot{a}_x^{a(12)} + \ddot{a}_{x:65-x}^{ai(12)}$$

donnent la valeur actuelle servant à escompter les prestations de rente différée de retraite et de rente future d'invalidité. Quant à la valeur actuelle

$$\ddot{a}_{x:65-x}^{aa(12)},$$

elle permet d'escompter les cotisations.

Les développements qui précèdent correspondent, d'une manière générale, à ceux sur lesquels sont construites les tables EVK 1980. Ils s'en écartent sur les deux points suivants:

- d'une part ils sont basés sur un effectif λ_x^i des invalides calculé au moyen d'une formule rectifiée⁸,
- d'autre part, pour les rentes futures d'invalidité, ils font intervenir le nombre l_{x+1}^{ai} au lieu de b_x (voir paragraphe 4 ci-dessus)⁹, ceci afin d'éliminer un inutile prorata initial.

S'agissant des résultats numériques, les écarts occasionnés par les choix que nous avons faits sont sans importance majeure.

Les tables VZ 1990, comme celles qui les ont précédées, font intervenir un élément supplémentaire. Elles tiennent compte de la réactivité dans la valeur actuelle des rentes d'invalidité. Pour cela elle remplacent l'ordre simple l_x^i des invalides par l'ordre composé¹⁰ l_x^{ii} qui dépend des deux probabilités

$$\begin{array}{ll} q_x^i & \text{de décès} \\ r_x & \text{de réactivité} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{d'invalidité,} \\ \text{d'invalidité.} \end{array}$$

La construction des formules qui sont alors nécessaires, considérée comme une extension des développements rappelés dans les paragraphes précédents, n'a pas été, à notre connaissance, l'objet de publications. Il est en outre intéressant d'apprécier l'influence de cette extension sur les résultats numériques. C'est pourquoi l'étude que nous avons entreprise et qui fait l'objet des paragraphes suivants devrait être,

⁸ Réf. [1], pp. 30 et 33. Réf. [2], formule (11).

⁹ Réf. [2], formules (64) et (70).

¹⁰ Réf. [3], formules (27/36) à (30/39).

nous l'espérons, une utile contribution dans le domaine actuariel de la prévoyance professionnelle.

7 Rentes immédiates d'invalidité; calcul avec l_x^{ii}

Au moyen des probabilités q_x^i et r_x on construit l'ordre composé des invalides l_x^{ii} avec

$$l_{x+1}^{ii} = l_x^{ii}(1 - q_x^i)(1 - r_x) \quad (l_{x_0}^{ii} = Q)$$

Les nombres de commutation

$$D_x^{ii} = v^x l_x^{ii}$$

$$N_{x:65-x}^{ii(12)} = D_x^{ii} + D_{x+1}^{ii} + \dots + D_{64}^{ii} - \frac{11}{24} \left(D_x^{ii} - D_{65}^{ii} \right)$$

permettent de calculer les valeurs actuelles

$$\ddot{a}_{x:65-x}^{ii(12)} = \frac{N_{x:65-x}^{ii(12)}}{D_x^{ii}}$$

$$\ddot{a}_x^{ii(12)} = \ddot{a}_{x:65-x}^{ii(12)} + \frac{D_{65}^{ii}}{D_x^{ii}} \ddot{a}_{65}^{(12)}$$

8 Rentes futures d'invalidité; calcul avec l_x^{ii}

Pour tenir compte de la probabilité r_x de réactivité il faut, dans les nombres de commutation $D_x^{ai(12)}$ et $D_{x:65-x}^{ai(12)}$ servant à calculer les valeurs actuelles $\ddot{a}_x^{ai(12)}$ et $\ddot{a}_{x:65-x}^{ai(12)}$ (voir paragraphe 4 ci-dessus), remplacer

- les valeurs actuelles $\ddot{a}_x^{i(12)}$ et $\ddot{a}_{x:65-x}^{i(12)}$
par $\ddot{a}_x^{ii(12)}$ et $\ddot{a}_{x:65-x}^{ii(12)}$
- le nombre d'actifs d'âge x devenus invalides, en vie à l'état d'invalidité à l'âge $x + 1$, $l_{x+1}^{ai} = \lambda_{x+1}^i - \lambda_x^i(1 - q_x^i)$
par $\Lambda_{x+1}^{ai} = \lambda_{x+1}^i - \lambda_x^i(1 - q_x^i)(1 - r_x)$

On observe qu'en remplaçant l'ordre simple l_x^i par l'ordre composé l_x^{ii} dans le l_{x+1}^{ai} du modèle pratique on obtient le Λ_{x+1}^{ai} du modèle rationnel¹¹. En effet la différence

$$\Lambda_{x+1}^{ai} - l_{x+1}^{ai} = \lambda_x^i (1 - q_x^i) r_x$$

s'obtient également en tenant compte, dans

$$\Lambda_{x+1}^{ai} - l_{x+1}^{ai} = l_x^{aa} (I_x - i_x) \frac{1 - \frac{1}{2} q_x^a}{1 - \frac{1}{2} q_x^i} (1 - q_x^i),$$

de ce que les équivalences

$$\Lambda_x^a = l_x^{aa} \quad \text{et} \quad \Lambda_x^i = \lambda_x^i$$

sont obtenues (voir paragraphe 1) lorsque

$$I_x - i_x = \frac{\lambda_x^i}{l_x^{aa}} r_x \frac{1 - \frac{1}{2} q_x^i}{1 - \frac{1}{2} q_x^a}.$$

Il résulte de ce qui précède

– que les nombres de commutation

$$D_x^{aai(12)} = v^{x+1} \Lambda_{x+1}^{ai} \left(\ddot{a}_{x+1}^{ii(12)} + \frac{11}{24} \right)$$

$$N_x^{aai(12)} = D_x^{aai(12)} + D_{x+1}^{aai(12)} + \dots + D_{64}^{aai(12)}$$

permettent de calculer la valeur actuelle

$$\ddot{a}_x^{aai(12)} = \frac{N_x^{aai(12)}}{D_x^{aa}}$$

de la rente future viagère d'invalidité

¹¹ Réf. [1], p. 39.

– que les nombres de commutation

$$D_{x:\overline{65-x}|}^{a_{ii}(12)} = v^{x+1} \Lambda_{x+1}^{ai} \left(\ddot{a}_{x+1:\overline{65-x-1}|}^{ii(12)} + \frac{11}{24} \right)$$

$$N_{x:\overline{65-x}|}^{a_{ii}(12)} = D_{x:\overline{65-x}|}^{a_{ii}(12)} + D_{x+1:\overline{65-x-1}|}^{a_{ii}(12)} + \dots + D_{64:\overline{1}|}^{a_{ii}(12)}$$

permettent de calculer la valeur actuelle

$$\ddot{a}_{x:\overline{65-x}|}^{a_{ii}(12)} = \frac{N_{x:\overline{65-x}|}^{a_{ii}(12)}}{D_x^{aa}}$$

de la rente future *temporaire* d'invalidité.

9 Rente différée de vivant reposant sur la tête d'un actif; calcul avec l_x^{ii}

Désignons par ${}_{65-x|}\ddot{a}_x^{\underline{a}(12)}$ (avec un indice supérieur droit a souligné) la valeur actuelle d'une rente différée, reposant sur la tête d'un actif d'âge x et payée, s'il est vivant, dès l'âge 65, qu'il soit alors actif ou entre-temps devenu invalide, dans le cas où les rentes d'invalidité sont calculées en tenant compte de la probabilité r_x de réactivité des invalides. Les développements conduisant à

$${}_{65-x|}\ddot{a}_x^{\underline{a}(12)} = \left(1 - \frac{\lambda_x^i l_{65}^{ii}}{l_x^{ii} l_{65}} \right) \frac{D_{65}}{D_x^{aa}} \ddot{a}_{65}^{(12)}$$

sont ceux du paragraphe 5 ci-dessus dans lesquels on remplace l'ordre simple l_x^i par l'ordre composé l_x^{ii} .

Les deux relations

$$l_{x\ 65-x|}\ddot{a}_x^{(12)} = l_x^{aa} {}_{65-x|}\ddot{a}_x^{\underline{a}(12)} + \lambda_{x\ 65-x|}^i \ddot{a}_x^{ii(12)}$$

$${}_{65-x|}\ddot{a}_x^{\underline{a}(12)} + \ddot{a}_{x:\overline{65-x}|}^{a_{ii}(12)} = {}_{65-x|}\ddot{a}_x^{aa(12)} + \ddot{a}_x^{a_{ii}(12)}$$

sont vérifiées par la formule de ${}_{65-x|}\ddot{a}_x^{\underline{a}(12)}$ indiquée ci-dessus. Ceci en confirme la validité, de même que celle du procédé pour le calcul avec l_x^{ii} des valeurs actuelles de rentes futures d'invalidité (paragraphe 8 ci-dessus).

10 Remarques sur le calcul des valeurs actuelles avec l_x^{ii}

Les valeurs actuelles

$${}_{65-x}|\ddot{a}_x^{aa(12)} + \ddot{a}_x^{aii(12)}$$

et

$${}_{65-x}|\ddot{a}_x^{a(12)} + \ddot{a}_{x:65-x}^{aii(12)},$$

qui tiennent compte des développements contenus dans les paragraphes 7, 8 et 9, répondent de deux manières différentes, mais équivalentes, aux besoins exprimés initialement pour l'escompte de la rente différée de retraite et de la rente future d'invalidité. Cependant, en plus des valeurs actuelles récapitulées dans le paragraphe 6, calculées pour le même objectif mais de manière traditionnelle, elles font intervenir la réactivité dans les rentes d'invalidité. Elles constituent donc une extension du calcul traditionnel, réalisable lorsque l'on dispose de probabilités r_x de réactivité. Observons en passant que la valeur actuelle $\ddot{a}_{x:65-x}^{aa(12)}$ pour l'escompte des cotisations et celle ${}_{65-x}|\ddot{a}_x^{aa(12)}$ de la rente différée d'actif ne sont pas touchées par la prise en considération de la réactivité.

Les développements des paragraphes 7 à 9 permettent, en partant des probabilités

q_x^a	de décès	d'actif,
i_x	d'invalidité	d'actif (modèle pratique),
q_x^i	de décès	d'invalidité,
r_x	de réactivité	d'invalidité,

de construire les valeurs actuelles dépendant de l'ordre composé l_x^{ii} . Pour atteindre le même objectif les tables VZ 1990 partent des probabilités

q_x	de décès des vivants (groupant les actifs et les invalides),
$j_x = \frac{\lambda_x^i}{l_x}$	d'être invalide,
${}^*I_x = I_x \left(1 - \frac{1}{2}q_x^a\right)$	d'invalidité d'actif (modèle rationnel) ¹² ,
$1 - s_x^i = (1 - q_x^i)(1 - r_x)$	de rester invalide.

¹² désignée par i_x dans les tables. Réf. [3], (23/32).

Observons qu'on peut passer de ces probabilités aux précédentes. En particulier, sans donner les développements qui y conduisent,

$$1 - q_x^i = \frac{j_{x+1}(1 - q_x) - j_x(1 - s_x^i)}{2(1 - j_x) * I_x + j_x(1 - s_x^i) - j_{x+1}(1 - q_x)}.$$

Rappelons encore que la probabilité q_x de décès des vivants est liée aux probabilités q_x^a , q_x^i et i_x par¹³

$$(l_x^{aa} + \lambda_x^i)q_x = l_x^{aa} q_x^a \left(1 - \frac{1}{2}i_x\right) + l_x^{aa} i_x \left(1 - \frac{1}{2}q_x^a\right) \frac{\frac{1}{2}q_x^i}{1 - \frac{1}{2}q_x^i} + \lambda_x^i q_x^i$$

Le choix de l'une ou de l'autre des séries de probabilités de départ n'affecte pas les résultats obtenus. Par contre les valeurs actuelles des tables VZ 1990 pour rentes futures d'invalidité sont construites au moyen du nombre d'invalides¹⁴ $B_x = *I_x l_x^{aa}$ alors que, pour éviter un prorata initial de rente qui ne se justifie pas, les développements du paragraphe 8 font intervenir le nombre d'invalides Λ_{x+1}^{ai} . Mais cela ne modifie que peu les résultats numériques.

Pour exprimer la probabilité $1 - s_x^i$ les tables VZ 1990 utilisent une formule de récurrence de l'effectif des invalides¹⁵ qu'on peut écrire

$$\lambda_{x+1}^i = \lambda_x^i(1 - s_x^i) + l_x^{aa} *I_x \left(1 - \frac{1}{2}s_x^i\right).$$

Cette formule fournit de bons résultats numériques, mais elle diffère de la formule exacte

$$\lambda_{x+1}^i = \lambda_x^i(1 - s_x^i) + l_x^{aa} *I_x \frac{1 - q_x^i}{1 - \frac{1}{2}q_x^i}$$

sur laquelle, en particulier, reposent les développements des paragraphes 8 et 9. La formule ci-dessus découle de celle de Λ_{x+1}^i mentionnée au début du paragraphe 1.

¹³ Réf. [1], p. 31.

¹⁴ Réf. [1], p. 37, formule (6), Réf. [3], formules (30/39).

¹⁵ Réf. [3], formule (23/32) de $1 - s_x^i$.

11 Illustration numérique

Il est intéressant de faire apparaître l'influence numérique de l'introduction, dans les calculs, de la probabilité r_x de réactivité.

C'est à cela que servent les tableaux annexés 1 à 6.

Le tableau 1 fournit les données utilisées:

- q_x^a et i_x sont des valeurs arrondies à 5 décimales, calculées à partir des $^*q_x^{aa}$ et *i_x des tables EVK 1980¹⁶;
- q_x^i provient des mêmes tables¹⁷;
- $r_x = 0,5 \cdot 0,964867^{x-20} - 0,1$ ajuste des probabilités de réactivité proposées par P. Nolfi (Technische Grundlagen für Pensionsversicherungen VZ 1960, Zürich 1959)¹⁸;
- I_x est obtenu indirectement au moyen de la formule de i_x indiquée au paragraphe 1;
- q_x est calculé au moyen des autres probabilités (formule du paragraphe 10).

Pour le calcul des valeurs actuelles indiquées dans les tableaux suivants on a en outre adopté:

- le taux d'intérêt de 4 % l'an,
- la valeur $\ddot{a}_{65}^{(12)} = 10,894$ fournie par les tables EVK 1980 4 %¹⁹.

Précisons que les valeurs de tous les tableaux sont calculées avec le maximum de précision possible, puis arrondies au moment de l'impression.

Les tableaux 2 à 4 comprennent des valeurs calculées avec un modèle pratique construit à partir de q_x^a , i_x , q_x^i , et qui donc ne font pas intervenir la réactivité dans les rentes d'invalidité.

Les tableaux 5 et 6 comprennent des valeurs qui tiennent compte de la réactivité dans les rentes d'invalidité.

La dernière colonne du tableau 6 permet de comparer les valeurs actuelles pour la retraite et l'invalidité

$$A = {}_{65-x}|\ddot{a}_x^{a(12)} + \ddot{a}_{x:65-x}^{ai(12)} = {}_{65-x}|\ddot{a}_x^{aa(12)} + \ddot{a}_x^{ai(12)},$$

¹⁶ Réf. [2], colonnes 6 et 7 des tables.

¹⁷ Réf. [2], colonne 8 des tables.

¹⁸ Valeurs également utilisées dans Réf. [1], p. 47.

¹⁹ Réf. [2], 4 %, colonne 51.

calculées sans tenir compte de la réactivité dans les rentes d'invalidé, et

$$B = {}_{65-x}|\ddot{a}_x^{a(12)} + \ddot{a}_{x:65-x}^{aia(12)} = {}_{65-x}|\ddot{a}_x^{aa(12)} + \ddot{a}_x^{aia(12)},$$

qui tiennent compte de la réactivité. Il apparaît que, dans l'exemple numérique choisi (qui entre dans le cadre de la réalité), l'usage de l_x^{ii} au lieu de l_x^i a pour effet une augmentation de la valeur actuelle. On observe donc que $B > A$, ce qui provient de ce que $\ddot{a}_x^{aia(12)} > \ddot{a}_x^{ai(12)}$. Il convient, à ce propos, de faire les remarques suivantes:

- a) les définitions données et les conditions envisagées conduisent à $l_x^{ii} < l_x^i$ (cas $x = 20$ mis à part); cela entraîne que $D_x^{ii} < D_x^i$ et que $\ddot{a}_x^{ii(12)} < \ddot{a}_x^{i(12)}$;
- b) la différence $\Lambda_{x+1}^{ai} - l_{x+1}^{ai} = \lambda_x^i(1 - q_x^i)r_x$
montre que $\Lambda_{x+1}^{ai} > l_{x+1}^{ai}$;
- c) le remplacement, dans le nombre de commutation

$$D_x^{ai(12)} = v^{x+1} l_{x+1}^{ai} \left(\ddot{a}_{x+1}^{i(12)} + \frac{11}{24} \right),$$

de l'ordre l_x^i par l_x^{ii} pour arriver à

$$D_x^{aia(12)} = v^{x+1} \Lambda_{x+1}^{ai} \left(\ddot{a}_{x+1}^{ii(12)} + \frac{11}{24} \right),$$

a donc deux effets opposés.

La remarque c) est également valable pour les valeurs actuelles $\ddot{a}_x^{ai(12)}$ et $\ddot{a}_x^{aia(12)}$. On constate que l'effet de la remarque a) est moins fort que celui de b).

Quant à l'importance numérique du changement on peut observer qu'elle est faible. L'augmentation de B par rapport à A passe par un maximum pour $x = 55$ mais n'atteint pas 1 %.

12 Conclusion

D'ordinaire le calcul de valeurs actuelles pour rentes de retraite et d'invalidité se fait à partir des trois catégories de probabilités d'invalidité d'actif, de décès d'actif et de décès d'invalidé. Les formules actuarielles nécessaires pour cela sont connues et utilisées depuis longtemps. Ce n'est pas le cas pour une extension dont l'objectif est de prendre en considération les probabilités de réactivité d'invalidé dans les rentes d'invalidité. L'étude de cette question fait apparaître que ce but peut être atteint au moyen de formules correctement adaptées et dont l'élaboration est intéressante.

Les conséquences de l'extension envisagée sur le montant des valeurs actuelles sont faibles. De ce point de vue, prendre cette extension en considération dans l'élaboration de tables actuarielles n'apparaît donc pas comme indispensable, mais dépend plutôt d'appréciations personnelles.

Marc Chuard
"Zürich" Versicherungs-Gesellschaft
Mythenquai 2
8022 Zürich

Philippe Chuard
av. de Lavaux 93
1009 Pully

Références

- [1] *Philippe Chuard*: Mathématiques actuarielles des caisses de pensions. Institut de sciences actuarielles de l'Université de Lausanne, 1981.
- [2] Technische Grundlagen der Eidgenössischen Versicherungskasse EVK 1980, Bern, 1980.
- [3] Technische Grundlagen für Pensionsversicherungen VZ 1990. Versicherungskasse der Stadt Zürich, 1990.

Annexe

Tableau 1

x	q_x^a	I_x	q_x^i	r_x	i_x	q_x
20	0.00116	0.00010	0.02000	0.40000	0.00010	0.00116
21	0.00105	0.00014	0.02000	0.38243	0.00010	0.00105
22	0.00095	0.00017	0.02000	0.36548	0.00010	0.00095
23	0.00086	0.00020	0.02000	0.34913	0.00010	0.00087
24	0.00078	0.00023	0.02000	0.33335	0.00010	0.00079
25	0.00071	0.00025	0.02000	0.31813	0.00010	0.00072
26	0.00065	0.00027	0.02000	0.30344	0.00010	0.00066
27	0.00060	0.00029	0.02000	0.28926	0.00010	0.00061
28	0.00056	0.00030	0.02000	0.27559	0.00010	0.00058
29	0.00053	0.00031	0.02000	0.26239	0.00010	0.00055
30	0.00051	0.00032	0.02000	0.24966	0.00010	0.00053
31	0.00050	0.00035	0.02000	0.23737	0.00012	0.00052
32	0.00052	0.00038	0.02000	0.22552	0.00014	0.00054
33	0.00054	0.00042	0.02000	0.21408	0.00017	0.00056
34	0.00058	0.00045	0.02000	0.20305	0.00018	0.00061
35	0.00064	0.00049	0.02000	0.19240	0.00021	0.00067
36	0.00072	0.00052	0.02000	0.18213	0.00022	0.00075
37	0.00081	0.00056	0.02000	0.17222	0.00024	0.00085
38	0.00091	0.00059	0.02000	0.16265	0.00026	0.00095
39	0.00102	0.00063	0.02000	0.15343	0.00028	0.00107
40	0.00114	0.00066	0.02000	0.14452	0.00030	0.00119
41	0.00128	0.00077	0.02010	0.13593	0.00040	0.00134
42	0.00144	0.00089	0.02020	0.12764	0.00050	0.00150
43	0.00162	0.00102	0.02030	0.11965	0.00060	0.00169
44	0.00182	0.00115	0.02040	0.11193	0.00070	0.00190
45	0.00204	0.00129	0.02050	0.10448	0.00080	0.00213
46	0.00228	0.00152	0.02074	0.09730	0.00100	0.00239
47	0.00254	0.00187	0.02100	0.09037	0.00131	0.00267
48	0.00282	0.00232	0.02129	0.08368	0.00170	0.00297
49	0.00312	0.00290	0.02160	0.07723	0.00221	0.00331
50	0.00344	0.00358	0.02194	0.07100	0.00280	0.00367
51	0.00379	0.00449	0.02230	0.06499	0.00361	0.00407
52	0.00415	0.00561	0.02269	0.05919	0.00461	0.00450
53	0.00453	0.00695	0.02310	0.05360	0.00581	0.00497
54	0.00494	0.00850	0.02354	0.04821	0.00721	0.00549
55	0.00536	0.01026	0.02400	0.04300	0.00882	0.00605
56	0.00581	0.01282	0.02449	0.03797	0.01123	0.00667
57	0.00629	0.01659	0.02500	0.03313	0.01484	0.00737
58	0.00679	0.02158	0.02554	0.02845	0.01967	0.00816
59	0.00731	0.02778	0.02610	0.02394	0.02570	0.00905
60	0.00787	0.03515	0.02669	0.01958	0.03293	0.01009
61	0.00845	0.04245	0.02730	0.01538	0.04017	0.01124
62	0.00905	0.04960	0.02794	0.01133	0.04741	0.01251
63	0.00968	0.05650	0.02860	0.00742	0.05466	0.01388
64	0.01034	0.06306	0.02929	0.00364	0.06192	0.01535

Tableau 2

x	$\lambda_x^a = l_x^{aa}$	$\lambda_x^i = \lambda_x^i$	l_x	l_x^i	l_x^{ai}
20	100000	0	100000	100000	0
21	99874	10	99884	98000	10
22	99759	20	99779	96040	10
23	99654	29	99683	94119	10
24	99559	38	99597	92237	10
25	99471	48	99519	90392	10
26	99390	56	99447	88584	10
27	99316	65	99381	86813	10
28	99246	74	99320	85076	10
29	99181	82	99263	83375	10
30	99119	90	99209	81707	9
31	99059	97	99156	80073	9
32	98998	107	99105	78472	12
33	98932	118	99051	76902	14
34	98863	132	98995	75364	16
35	98787	147	98935	73857	18
36	98704	165	98868	72380	20
37	98611	183	98794	70932	21
38	98507	203	98710	69514	24
39	98392	224	98616	68123	25
40	98264	247	98511	66761	28
41	98122	271	98394	65426	29
42	97958	304	98262	64111	39
43	97768	346	98115	62816	48
44	97551	397	97949	61540	58
45	97306	457	97762	60285	67
46	97029	525	97554	59049	77
47	96711	610	97321	57824	96
48	96340	722	97061	56610	125
49	95905	868	96773	55405	162
50	95394	1058	96453	54208	209
51	94800	1299	96099	53019	264
52	94100	1607	95707	51836	338
53	93278	1999	95276	50660	428
54	92315	2487	94802	49490	535
55	91197	3085	94282	48325	656
56	89908	3803	93711	47165	792
57	88382	4704	93086	46010	994
58	86522	5878	92400	44860	1291
59	84245	7401	91646	43714	1674
60	81480	9337	90817	42573	2128
61	78177	11724	89901	41437	2636
62	74403	14487	88890	40306	3083
63	70234	17544	87778	39180	3462
64	65752	20808	86560	38059	3765
65	61043	24188	85231	36944	3990

Tableau 3

x	D_x^{aa}	D_x^i	D_x	$N_{x:65-x}^{i(12)}$	$N_x^{ai(12)}$	$N_{x:65-x}^{ai(12)}$
20	45639	45639	45639	714610	32880	12291
21	43828	43006	43832	670178	32807	12221
22	42094	40525	42102	628310	32735	12153
23	40432	38187	40444	588857	32670	12091
24	38840	35984	38855	551680	32606	12031
25	37313	33908	37331	516648	32543	11971
26	35849	31951	35869	483637	32485	11916
27	34444	30108	34467	452531	32429	11864
28	33096	28371	33121	423219	32373	11812
29	31803	26734	31829	395598	32323	11765
30	30560	25192	30588	369571	32276	11722
31	29367	23738	29396	345045	32230	11680
32	28220	22369	28251	321934	32176	11630
33	27117	21078	27149	300157	32116	11576
34	26055	19862	26090	279636	32047	11513
35	25034	18716	25072	260298	31975	11449
36	24051	17637	24091	242077	31896	11379
37	23104	16619	23147	224907	31817	11309
38	22192	15660	22238	208727	31732	11235
39	21314	14757	21362	193481	31646	11161
40	20467	13906	20519	179114	31557	11084
41	19652	13103	19706	165576	31466	11008
42	18864	12346	18923	152820	31352	10912
43	18104	11631	18168	140801	31216	10800
44	17369	10957	17439	129479	31059	10674
45	16659	10321	16737	118814	30886	10536
46	15972	9720	16059	108768	30697	10387
47	15308	9153	15404	99308	30473	10216
48	14662	8616	14772	90401	30196	10008
49	14035	8108	14162	82018	29854	9758
50	13423	7628	13572	74131	29433	9458
51	12826	7173	13002	66711	28929	9110
52	12242	6744	12451	59734	28315	8701
53	11668	6337	11918	53177	27576	8228
54	11104	5953	11403	47016	26699	7690
55	10547	5589	10904	41230	25677	7095
56	9998	5245	10421	35799	24507	6454
57	9451	4920	9954	30703	23115	5741
58	8896	4612	9500	25924	21403	4934
59	8329	4322	9060	21444	19302	4038
60	7746	4047	8633	17249	16775	3082
61	7146	3788	8217	13321	13816	2125
62	6539	3542	7812	9645	10548	1262
63	5935	3311	7418	6209	7087	580
64	5343	3093	7034	2998	3539	143
65	4769	2887	6659	0	0	0

Tableau 4

x	$\ddot{a}_x^{i(12)}$	$\ddot{a}_{x:65-x}^{i(12)}$	${}_{65-x} \ddot{a}_x^{aa(12)}$	${}_{65-x} \ddot{a}_x^{a(12)}$	$\ddot{a}_x^{ai(12)}$	$\ddot{a}_{x:65-x}^{ai(12)}$
20	16.347	15.658	1.138	1.590	0.720	0.269
21	16.315	15.583	1.185	1.655	0.749	0.279
22	16.280	15.504	1.234	1.723	0.778	0.289
23	16.244	15.421	1.285	1.794	0.808	0.299
24	16.205	15.331	1.338	1.868	0.839	0.310
25	16.164	15.237	1.392	1.944	0.872	0.321
26	16.121	15.137	1.449	2.023	0.906	0.332
27	16.075	15.030	1.508	2.106	0.941	0.344
28	16.026	14.917	1.570	2.191	0.978	0.357
29	15.974	14.797	1.634	2.280	1.016	0.370
30	15.919	14.670	1.700	2.373	1.056	0.384
31	15.860	14.535	1.769	2.469	1.097	0.398
32	15.798	14.392	1.841	2.569	1.140	0.412
33	15.732	14.240	1.916	2.674	1.184	0.427
34	15.662	14.079	1.994	2.782	1.230	0.442
35	15.588	13.907	2.075	2.895	1.277	0.457
36	15.509	13.726	2.160	3.013	1.326	0.473
37	15.425	13.533	2.249	3.136	1.377	0.489
38	15.336	13.328	2.341	3.265	1.430	0.506
39	15.242	13.111	2.438	3.399	1.485	0.524
40	15.142	12.881	2.539	3.539	1.542	0.542
41	15.036	12.636	2.644	3.685	1.601	0.560
42	14.925	12.378	2.754	3.838	1.662	0.578
43	14.809	12.105	2.870	3.998	1.724	0.597
44	14.687	11.817	2.991	4.165	1.788	0.615
45	14.559	11.512	3.119	4.341	1.854	0.632
46	14.425	11.190	3.253	4.525	1.922	0.650
47	14.286	10.850	3.394	4.718	1.991	0.667
48	14.142	10.493	3.544	4.920	2.059	0.683
49	13.994	10.116	3.702	5.134	2.127	0.695
50	13.841	9.719	3.871	5.359	2.193	0.705
51	13.683	9.300	4.051	5.596	2.255	0.710
52	13.521	8.858	4.244	5.846	2.313	0.711
53	13.353	8.391	4.453	6.111	2.363	0.705
54	13.181	7.898	4.679	6.391	2.404	0.693
55	13.003	7.377	4.926	6.688	2.434	0.673
56	12.820	6.825	5.197	7.002	2.451	0.645
57	12.632	6.241	5.498	7.336	2.446	0.608
58	12.438	5.620	5.841	7.692	2.406	0.555
59	12.238	4.962	6.238	8.071	2.318	0.485
60	12.032	4.262	6.708	8.476	2.166	0.398
61	11.820	3.517	7.271	8.907	1.934	0.297
62	11.600	2.723	7.946	9.366	1.613	0.193
63	11.373	1.875	8.754	9.850	1.194	0.098
64	11.138	0.969	9.725	10.360	0.662	0.027
65	10.894	0.000	10.894	10.894	0.000	0.000

Tableau 5

x	l_x^{ii}	Λ_x^{ai}	D_x^{ii}	$N_{x:65-x}^{ii(12)}$	$N_x^{ai(12)}$	$N_{x:65-x}^{ai(12)}$
20	100000	0	45639	90608	32880	12291
21	58800	10	25803	54061	32868	12280
22	35587	14	15016	33201	32853	12264
23	22129	17	8978	20953	32834	12245
24	14115	20	5507	13565	32811	12223
25	9222	23	3459	8997	32785	12197
26	6162	25	2223	6105	32757	12168
27	4206	27	1459	4232	32726	12137
28	2930	29	977	2994	32692	12104
29	2080	29	667	2159	32657	12069
30	1504	30	464	1586	32621	12033
31	1106	31	328	1184	32582	11995
32	826	34	236	899	32540	11953
33	627	37	172	692	32494	11907
34	483	41	127	541	32442	11856
35	377	44	96	428	32385	11801
36	299	48	73	343	32323	11741
37	239	51	56	278	32256	11676
38	194	55	44	228	32183	11606
39	159	58	35	188	32105	11533
40	132	61	28	157	32022	11454
41	111	64	22	132	31933	11372
42	94	75	18	111	31828	11277
43	80	86	15	95	31707	11168
44	69	99	12	81	31567	11044
45	60	111	10	70	31409	10907
46	53	124	9	60	31231	10756
47	47	146	7	52	31023	10583
48	42	179	6	45	30767	10377
49	37	221	5	39	30452	10130
50	34	275	5	34	30063	9834
51	31	337	4	30	29590	9487
52	28	420	4	26	29006	9076
53	26	521	3	22	28294	8596
54	24	639	3	19	27434	8044
55	22	773	3	16	26415	7426
56	21	922	2	14	25229	6751
57	19	1135	2	12	23807	6001
58	18	1443	2	10	22054	5153
59	17	1837	2	8	19895	4212
60	16	2301	2	6	17290	3211
61	16	2814	1	5	14232	2208
62	15	3259	1	4	10845	1307
63	14	3622	1	2	7259	597
64	14	3892	1	1	3604	146
65	13	4064	1	0	0	0

Tableau 6

x	$\ddot{a}_{x:ii(12)}$	$\ddot{a}_{x:65-x:ii(12)}$	$65-x \ddot{a}_x^{a(12)}$	$\ddot{a}_{x:aii(12)}$	$\ddot{a}_{x:65-x:aii(12)}$	B/A
20	1.986	1.985	1.590	0.720	0.269	1.0000
21	2.096	2.095	1.655	0.750	0.280	1.0007
22	2.212	2.211	1.723	0.780	0.291	1.0014
23	2.335	2.334	1.794	0.812	0.303	1.0019
24	2.466	2.464	1.868	0.845	0.315	1.0024
25	2.604	2.601	1.944	0.879	0.327	1.0029
26	2.752	2.747	2.024	0.914	0.339	1.0032
27	2.909	2.901	2.106	0.950	0.352	1.0035
28	3.076	3.065	2.192	0.988	0.366	1.0038
29	3.255	3.238	2.281	1.027	0.379	1.0040
30	3.445	3.420	2.374	1.067	0.394	1.0041
31	3.648	3.613	2.470	1.109	0.408	1.0042
32	3.864	3.816	2.571	1.153	0.424	1.0043
33	4.095	4.028	2.675	1.198	0.439	1.0045
34	4.339	4.249	2.784	1.245	0.455	1.0047
35	4.598	4.479	2.898	1.294	0.471	1.0049
36	4.872	4.715	3.016	1.344	0.488	1.0051
37	5.161	4.957	3.140	1.396	0.505	1.0052
38	5.464	5.202	3.268	1.450	0.523	1.0054
39	5.780	5.448	3.403	1.506	0.541	1.0055
40	6.108	5.692	3.543	1.565	0.560	1.0056
41	6.446	5.931	3.690	1.625	0.579	1.0056
42	6.794	6.161	3.844	1.687	0.598	1.0057
43	7.150	6.379	4.005	1.751	0.617	1.0059
44	7.510	6.580	4.173	1.817	0.636	1.0061
45	7.872	6.761	4.350	1.885	0.655	1.0063
46	8.233	6.915	4.535	1.955	0.673	1.0065
47	8.590	7.040	4.729	2.027	0.691	1.0067
48	8.941	7.131	4.934	2.098	0.708	1.0070
49	9.282	7.183	5.150	2.170	0.722	1.0073
50	9.610	7.192	5.378	2.240	0.733	1.0077
51	9.921	7.154	5.618	2.307	0.740	1.0082
52	10.213	7.064	5.872	2.369	0.741	1.0086
53	10.480	6.919	6.141	2.425	0.737	1.0090
54	10.722	6.716	6.426	2.471	0.724	1.0094
55	10.933	6.450	6.727	2.504	0.704	1.0095
56	11.112	6.121	7.045	2.523	0.675	1.0094
57	11.256	5.724	7.382	2.519	0.635	1.0092
58	11.362	5.259	7.740	2.479	0.579	1.0089
59	11.428	4.724	8.122	2.389	0.506	1.0083
60	11.452	4.117	8.526	2.232	0.415	1.0075
61	11.432	3.439	8.954	1.992	0.309	1.0063
62	11.367	2.688	9.404	1.658	0.200	1.0047
63	11.257	1.864	9.877	1.223	0.101	1.0029
64	11.099	0.968	10.372	0.675	0.027	1.0012
65	10.894	0.000	10.894	0.000	0.000	1.0000

Résumé

L'étude présentée fournit les moyens actuariels de tenir compte de la réactivité des invalides dans les rentes futures d'invalidité. Elle permet d'apprécier les conséquences numériques de cette éventualité.

Zusammenfassung

Diese Abhandlung zeigt, mit welchen versicherungsmathematischen Mitteln die Reaktivierung der Invaliden in den Barwerten der anwartschaftlichen Invalidenrenten berücksichtigt werden kann. Anhand eines Beispiels bietet sie die Möglichkeit, sich ein Bild vom numerischen Einfluss der Reaktivierung zu machen.

Summary

This paper gives actuarial methods which respect the impact of rehabilitation on contingent invalidity annuities. By way of an example, one can see the numerical consequences of such a rehabilitation.