Zeitschrift: Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Schaffhausen

Herausgeber: Naturforschende Gesellschaft Schaffhausen

Band: 42 (1997)

Artikel: Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1994

Autor: Widmer, Michael / Weibel, Urs

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-584822

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 28.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1994

von

Michael Widmer und Urs Weibel

Vorbemerkung

Das Untersuchungsgebiet umfasst den Kanton Schaffhausen; Beobachtungen aus grenznahen Gemeinden (Kantone Zürich und Thurgau sowie deutsche Nachbarschaft) wurden mitberücksichtigt. Keine Erwähnung fanden Beobachtungen von Wasservögeln östlich der Rheinbrücke Stein am Rhein.

Im vorliegenden Bericht sind Beobachtungen berücksichtigt, welche auf Meldekarten an die OAS-Zentrale gesandt wurden sowie Meldungen an den Informationsdienst (ID) der Schweizerischen Vogelwarte Sempach. Nicht berücksichtigt sind Beobachtungen, welche im Rahmen der Kartierungen für den neuen Schweizer Brutvogelatlas erhoben wurden. Für eine Zusammenstellung der ID-Meldungen danken wir Hans Schmid von der Schweizerischen Vogelwarte Sempach herzlich.

Die Reihenfolge der Vogelarten richtet sich nach der Liste der Vogelarten der Schweiz (WINKLER, R. 1989; Separatdruck aus dem Ornithologischen Beobachter).

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 1994: Hanspeter Bieri, Hemmental (HB); Jürg Cambensy, Schaffhausen (JC); Verena Halder, Hallau (VH); Freddy Hoogeveen, Oberschlatt / TG (FH); Markus Jenny, Russikon / ZH (MJ); Daniel Kessler, St. Gallen (DK); Roland Marti, Schaffhausen (RM); Hans Minder, Neuhausen a.Rhf. (HM); Andreas Müller, Schaffhausen (AM); Ruedi und Rosmarie Müller, Buchberg (RRM); Thomas Nabulon, Rüdlingen (TN); Andres Overturf, Hallau (AO); Hannes Richter, Thayngen (HR); Martin Roost, Schaffhausen (MR); Werner Schümperlin, Rheinklingen / TG (WS); Albin Schweri, Bibern (AS); Martin Stelzer, Schleitheim (MS); Urs Thalmann, Schleitheim (UT); Kurt Wanner, Schaffhausen (KW); Michael Widmer, Radolfzell / D (MW).

Artenliste

Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*): Am 18. Mai 1 Paar mit Nistmaterial im Eschenriet, Unterschlatt / TG (FH). Sichere Brutnachweise stammen von der Schaarenwis und von der Petri (beides Gemeinde Unterschlatt / TG; FH). Im Alten Rhein, Rüdlingen waren 3 Paare zur Brutzeit anwesend (TN, MW); ein weiteres Paar brütete am Egelsee, Thayngen (HR). Eine grössere vorbrutzeitliche Ansammlung von mindestens 100 Ind. konnte auf dem Rhein vor der Petri am 4. März beobachtet werden (FH).

Haubentaucher (*Podiceps cristatus*): Im Alter Rhein, Rüdlingen brüteten 3 Paare, davon 2 erfolgreich (TN, MW). Ein sicherer Brutnachweis stammt von der Bibermündung bei der Bibermühle (FH).

Kormoran (Phalacrocorax carbo): Winter / Frühjahr: Bei der Bibermühle bis zum 17. April regelmässig meist unter 10 Ind. beobachtet; ausser am 20. Januar waren 12 Ind. und am 17. April 22 Ind. im Gebiet (WS). Auf der Unteren Rheininsel Rüdlingen waren die Zahlen mit 1 bis 4 Ind. ebenfalls sehr tief; maximal wurden 16 Ind. am 17. März angetroffen (MW). Der letzte Wintergast wurde am 27. März festgestellt (TN). Herbst / Winter: Am Alten Rhein, Rüdlingen konnten die ersten Herbstdurchzügler (5 Ind.) am 20. August beobachtet werden (TN). Die Zahlen blieben in der Folge ebenfalls sehr tief: max. suchten am 23. Oktober 6 bis 8 Ind. im Alten Rhein nach Nahrung (MW).

Grosse Rohrdommel (Botaurus stellaris): Am 9. Oktober 1 Ind. im Alten Rhein, Rüdlingen (TN).

Nachtreiher (Nycticorax nycticorax): Am 30. März 1 adultes Ind. nahrungssuchend am Morgetshofsee, Thayngen (KW) und am 3. August 1 Ind. Petri, Unterschlatt / TG (FH).

Silberreiher (Egretta alba): Am 1. Oktober 1 Ind. bei Wunderklingen, Hallau in SSW-Richtung wegfliegend (FH).

Graureiher (Ardea cinerea): In der bekannten Brutkolonie auf der Unteren Rheininsel bei Rüdlingen wurden mindestens 16 besetzte Horste gezählt (RRM, TN, MW). KURT WANNER fand am Morgetshofsee am 30. März einen Bodenhorst mit einem brütenden Altvogel. Am 7. Mai war das Nest leer, was leider auf einen vorzeitigen Raub schliessen lässt.

Purpurreiher (Ardea purpurea): Am 19. April 1 Ind. Bibermühle, Hemishofen (WS).

Weissstorch (Ciconia ciconia): Am 12. April zogen 2 Ind. in NE-Richtung über das Quartier Niklausen, Stadt Schaffhausen (KW), am 14. Juli 2 Ind. in W-Richtung über die Breite, Schaffhausen (MR) und am 19. Juli war 1 beringtes Ind. zwischen Ramsen und Rielasingen / D zu beobachten (FH).

Pfeifente (Anas penelope): Winter / Frühjahr: Am 31.1. 1 ♂ (RRM), am 6. Februar und 13. Februar je 1 Ind. (TN) im Alten Rhein, Rüdlingen, am 23. Januar, 21. Februar und 5. März je 1 Ind. auf dem Rhein bei der Bibermühle (WS). Herbst / Winter: Am 7. November waren 38 Ind. auf dem Rhein bei der Laag, Dörflingen, am 25. November waren 69 Ind. und am 23. Dezember noch 15 Ind. auf dem Rhein bei Katharinental / TG (FH). Am 23. Oktober 1 Paar und am 11. Dezember 1 ♀ im Alten Rhein, Rüdlingen (MW).

Schnatterente (Anas strepera): U.a. noch am 3. Mai 1 Ind. Petri, Unterschlatt / TG (FH).

Knäkente (Anas querquedula): Am 31. August und 1. September je 4 Ind. und am 4. September noch 1 Ind. auf dem Rhein bei Bibermühle (WS).

Löffelente (Anas clypeata): Am 22. Februar 1 Ind. und am 16. April 3 Ind. auf dem Rhein bei der Bibermühle (WS). Am 11. September 1 Ind. im Schlichtkleid Alter Rhein, Rüdlingen (MW).

Kolbenente (Netta rufina): Auf dem Rhein im Bereich der Bibermühle war die Kolbenente regelmässig zwischen Mitte Februar und Ende April anzutreffen; Maximum am 3. April und 4. April mit 140 Ind. bzw. 120 Ind. und nochmals am 15. April 120 Ind. (WS). Auf dem Rhein bei der Petri wurde das Frühjahrszugmaxima am 21. März mit 203 Ind. erreicht. Dort hielten sich noch am 3. Mai 5 Ind. auf und anschliessend konnten noch bis zum 3. August 1 bis 2 Ind. beobachtet werden (FH). Am 15. August 1 führendes [♀] mit 5 ca. 6-tägigen Jungen bei Diessenhofen (KW). Am 11. September konnten im Alten Rhein Rüdlingen 5 Ind. (im Verband schwimmend; wahrscheinlich ausgewachsene Jungvögel) festgestellt werden (MW).

Moorente (Aythya nyroca): Zwischen Anfang Jahr und 7. März waren regelmässig Moorenten auf dem Rhein bei der Bibermühle anzutreffen; max. 4 Ind. am 21. Februar (WS).

Hybrid Reiher-Tafelente (Aythya fuligula x ferina): Am 10. Januar und 23. Januar 1 ausgefärbtes ♂ auf dem Rhein bei Neuhausen (DK).

Bergente (Aythya marila): Am 9. Oktober 2 Ind. Alter Rhein, Rüdlingen (TN).

Schellente (Bucephala clangula): Am 13. August 1 Ind. Petri, Unterschlatt / TG (FH).

Zwergsäger (Mergus albellus): Zwischen dem 19. Januar und 7. März regelmässig auf dem Rhein bei der Bibermühle; max. am 3 Ind. am 22. Januar (WS).

Mittelsäger (Mergus serrator): Zwischen dem 17. Januar und 29. Januar 2 Ind. auf dem Rhein bei der Bibermühle (WS).

Gänsesäger (Mergus merganser): Wieder liegt eine Reihe von Frühlings- und Sommerbeobachtungen vor: Am Alten Rhein, Rüdlingen wurden am 3. April 1 ♂ und noch am 20. April 2 Paare

beobachtet (RRM). Auf dem Rhein bei der Bibermühle waren am 6. April 2 Ind. (FH), am 3. Mai waren 2 Ind. bei der Petri, Unterschlatt / TG (FH) und am 18. Mai konnten 2 Ind. (dieselben?) auf dem Rhein beim Schaaren, Unterschlatt / TG registriert werden (FH).

Wespenbussard (Pernis apivorus): Am 12. Mai flog vermutlich noch ein Durchzügler über Hemmental (HB); Mitte Juni war 1 Ind. über der Gräte, Merishausen zu beobachten (AM). Vom Gebiet Grätental, Emmerberg liegen aus früheren Jahren mehrere Brutzeitmeldungen vor (RM). Eine weitere Sommerbeobachtung stammt vom 19. Juli von 1 Ind., welches zwischen Hofenacker, Ramsen und Rosenegg zwischen Gottmadingen und Rielasingen / D beobachtet (FH).

Schwarzmilan (Milvus migrans): THOMAS NABULON schätzt den Bestand für die Gemeinde Rüdlingen auf 1 bis 2 Paare.

Rotmilan (Milvus milvus): ANDRES OVERTURF schätzt den Brutbestand in den Klettgaugemeinden Wilchingen, Hallau, Oberhallau, Neunkirch, Guntmadingen und Beringen auf mindestens 7 Brutpaare. Der Bestand der Gemeinde Rüdlingen wird auf 1 bis 2 Paare geschätzt (TN).

Rohrweihe (Circus aeruginosus): Am 24. März 1 ♂ beim Bannbuck, zwischen Hallau und Wilchingen (AO), am 1. Mai 1 Ind. im Eschheimertal, Schaffhausen (FH, MR) und am 29. Mai ein sehr später Durchzügler (1 Ind. weibchenfarbig) zwischen Trasadingen und Wilchingen (AO). Am 11. September 1 adultes ♀ über dem Dorf Rüdlingen (MW).

Kornweihe (Circus cyaneus): Winter / Frühjahr: Am 22. Januar 1 of und 1 weibchenfarbiges Ind. im Dreieck Neunkirch-Hallau-Oberhallau (AO). Herbst / Winter: Vom 27. November bis Februar 1995 1 of und 1 weibchenfarbiges Ind. Widen, Neunkirch (AO).

Habicht (Accipiter gentilis): Am 7. Januar 1 Ind. Petri, Unterschlatt / TG (FH) und am 22. März 1 Ind. Bibermühle, Hemishofen (WS). Am 18. Juni 1 Ind. Nähe Alter Rhein, Rüdlingen (TN). In einem Waldstück nördlich Rüdlingen am 29. April 1 Ind. und gleichenorts am 30. Juni 1 Jungvogel (TN). Am 24. Juni 1 Ind. Nähe Paradies / TG (FH).

Fischadler (Pandion haliaetus): Am 23. März sass 1 Ind. auf einem Baum am Ufer am Alten Rhein, Rüdlingen (RRM); 2 Ind. waren am 14. April über Neu-Paradies / TG Richtung NE fliegend zu beobachten (FH) und am 23. April flog 1 Ind. über der Stadt Schaffhausen in NNE-Richtung (MR).

Turmfalke (Falco tinnunculus): Beringungszahlen aus der Region Schaffhausen: total wurden 14 Bruten kontrolliert; 10 davon waren erfolgreich und es konnten total 39 Junge (1mal 1, 1mal 2, 1mal 3, 3mal 4, 3mal 5 und 1mal 6) beringt werden (HM).

Baumfalke (Falco subbuteo): Am 21. April 1 Ind., am 23. Mai 6 Ind. und am 19. Juli 1 Ind. bei der Bibermühle (FH, MR). Am 23. April 1 Ind. Engeweiher, Schaffhausen (FH), am 18. Mai 1 Ind. Petri, Unterschlatt / TG (FH), am 19. Mai 1 Ind. ruhend auf Acker nordöstlich Wilchingen (AO), am 23. Mai 2 Ind. segelnd zwischen Schleitheim und Oberwiesen (UT), am 26. Mai 1 Ind. südlich Wilchingen (TN), am 28. Mai 1 Ind. Breite, Schaffhausen (MR) und am 30. Mai 1 Ind. über Brennisbüel, Schleitheim (HB). Regelmässige Brutzeitbeobachtungen von 1 bis 2 jagenden Ind. wurden auch zwischen der Thurmündung / ZH und dem Alten Rhein, Rüdlingen gemacht (RRM, TN).

Wanderfalke (Falco peregrinus): Am 28. April 1 Ind. über der Altstadt Schaffhausen (MR), am 22. September 1 Ind. bei der Steigkirche, Schaffhausen (HB) und am 22. Dezember 2 Ind. (davon einer mit Beute) Paradies / TG (FH).

Rebhuhn (Perdix perdix): Keine Meldung eingetroffen.

Wachtel (Coturnix coturnix): URS THALMANN stellte am 1. Mai zwischen 0500 und 0600 Uhr auf einer Fläche von ca. 2 km² westlich Schleitheim 8 schlagende Wachtelhähne fest. Weitere einzeln rufende Wachteln wurden am 7. Mai, 16. Mai und 21. Juni östlich Dorf Hallau (AO), am 26. Mai (2 rufende Hähne), am 13. Juni zwischen Trasadingen und Wilchingen (AO) festgestellt. In den Widen bei Neunkirch wurden maximal 18 rufende Hähne festgestellt, dort gelang auch ein sicherer Brutnachweis (MJ).

Wasserralle (Rallus aquaticus): Am 5. März 2 Ind. Alter Rhein, Rüdlingen (MW). Regelmässig zur Brutzeit in der Petri beobachtet; Beobachtung von mindestens 2 Jungvögeln bestätigen eine sichere Brut (FH). Am 13. September 3 Ind. Petri, Unterschlatt / TG (FH) und am 23. Oktober 2 Ind. Alter Rhein, Rüdlingen (MW).

Teichhuhn (Gallinula chloropus): Am 10. Mai, am 17. August und 19. August je 1 Ind. Petri, Unterschlatt / TG (FH). Am 20. August 1 immat. Ind., am 4. September und 9. Oktober je 2 immat. Ind. Alter Rhein, Rüdlingen (TN).

Blässhuhn (Fulica atra): Am 21. März 1 teilalbinotisches (80 %) Ind. auf dem Rhein bei Büsingen (FH).

Kranich (*Grus grus*): Am 7. November 2 Ind. ziehend über Schaffhausen (MR), am 10. November zog eine unbestimmte Anzahl rufender Kraniche zwischen 0200 und 0245 Uhr nachts über Schleitheim (MS).

Kiebitz (Vanellus vanellus): Am 24. Februar und 27. Februar waren im Dreieck Hallau - Oberhallau - Neunkirch 27 bzw. 23 Ind. zu beobachten. Ein grösserer Trupp von 60 Frühjahrsdurchzüglern war ebenfalls am 24. Februar in den Widen, Neunkirch festzustellen (AO). Gleichenorts waren im Herbst am 27. November 7 Ind. anwesend (AO). Zwei Brutversuche im Gebiet Widen blieben leider erfolglos (MJ).

Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*): Am 12. Oktober (FH) und am 14. Oktober (MR) je 1 Ind. Widen, Neunkirch.

Grünschenkel (*Tringa nebularia*): Am 18. April 1 Ind. Schaaren, Unterschlatt / TG (FH) und zwischen dem 29. August und 3. September 1 Ind. bei der Bibermühle (WS).

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*): Heimzug: Am 4. März 1 Ind. Petri (FH), am 25. März 1 Ind. bei der Bibermühle (WS) und am 24. April 1 Ind. im Eschenriet, Unterschlatt / TG (MR). Wegzug: Am 26. Juli 2 Ind. Petri, am 13. August 1 Ind., am 17. August 2 Ind. und am

25. August 1 Ind. im Eschenriet, Unterschlatt / TG (FH). Winter: Am 31. Dezember 1 Ind. am Rhein bei der Petri (FH).

Flussuferläufer (Actitis hypoleucos): Heimzug: Am 5. Mai 5 Ind. am Rhein zwischen Langwiesen / ZH und dem Schaarenwald / TG (MR). Wegzug: Regelmässig zwischen dem 19. August und 13. September bei der Petri (max. 3 Ind. am 24. August; FH) und zwischen dem 1. August und 3. September am Rhein bei der Bibermühle (max. 7 Ind. am 2. September; WS). Ein Trupp von 10 Ind. war am 21. August am Rhein im Bereich des Schaarenwald zu beobachten (MR). Am 31. Juli und 11. September je 1 Ind. am Rhein bei Rüdlingen (MW).

Weisskopfmöwe (Larus cachinnans): Vom 8. Januar bis 20. März waren regelmässig 2 Ind. bei der Bibermühle zu beobachten; am 3. April sogar 5 Ind. (WS). Am 25. Dezember 1 Ind. Stadt Schaffhausen (DK).

Flussseeschwalbe (Sterna hirundo): Vom 18. Mai bis 23. Mai hielten sich 2 Ind. bei der Bibermühle auf (WS); am 28. Juni war gleichenorts 1 Ind. zu beobachten (FH).

Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger): Am 17. Mai 12 Ind. bei der Bibermühle (WS).

Hohltaube (Columba oenas): Zwei Brutzeitbeobachtungen stammen aus dem Randengebiet: am 21. April rief 1 Ind. am NE-exponierten Abhang des Randenhorns, Merishausen (AM, MW) und am 24. April konnte 1 rufendes Ind. an der W-Flanke des Schleitheimer Schlossrandens registriert werden (HB). Weitere rufende Ind. wurden noch am 26. Juni und 6. Juli an der Egghalde, Rüdlingen (TN) festgestellt. Beobachtungen von nahrungssuchenden Trupps wurden zwischen dem 1. April und 29. Mai auf Feldern bei der Kiesgrube Bannbuck zwischen Hallau und Wilchingen (max. 6 Ind.; AO) sowie am 19. Juli bei der Bibermüli (5 Ind.; FH) gemacht.

Turteltaube (Streptopelia turtur): Brutzeitbeobachtungen stammen von der Kiesgrube Büsingen / D (1 Ind. am 7. Mai; FH), vom oberen Schaarenweiher, Unterschlatt / TG (1 Ind. rufend am 10. Mai; FH), vom Neuhauser Wald, Nähe Aazheimerhof (1 Ind. rufend am 17. Mai;

FH), von der Kiesgrube Wasserfallen, Hallau (1 Brutpaar; AO) und von der Kiesgrube Bannbuck, Wilchingen (1 Brutpaar; AO). THOMAS NABULON schätzt den Bestand in der Gemeinde Rüdlingen auf 4 bis 6 Brutpaare; sämtliche Vorkommen finden sich auf Meereshöhen zwischen 350 und 410 m ü.M.

Schleiereule (*Tyto alba*): Beringungszahlen aus der Region Schaffhausen: Es wurden 12 Bruten kontrolliert, 10 davon waren erfolgreich. total wurden 35 Jungvögel beringt (1mal 1, 4mal 3, 3mal 4, 2mal 5; HM). Am 21. April rief 1 Ind. am nördlichen Dorfrand von Merishausen (AM, MW).

Waldkauz (Strix aluco): Ein schlechtes Jahr für den Mäusejäger! 1994 wurden in der Region Schaffhausen nur 6 Junge (3mal 2 Junge) beringt (HM).

Waldohreule (Asio otus): Keine Meldung eingetroffen.

Mauersegler (Apus apus): Am 23. Mai mind. 400 Ind. in einem Trupp bei der Bibermühle (MR).

Alpensegler (Apus melba): Erstbeobachtung in der Stadt Schaffhausen am 20. März 3 Ind. (MR). Der Brutbestand der Stadt Schaffhausen wird von HANS MINDER auf 40 Brutpaare geschätzt. Am 7. Juli wurden die Brutplätze kontrolliert; die Jungvögel zum Teil beringt: im Obertor waren es 8 Bruten (1mal 1 Junges, 5mal 2 Junge, 1mal 3 Junge sowie noch ein Altvogel brütend auf 2 Eiern), im Schwabentor waren es 12 Bruten (2mal 1 Junges, 3mal 2 Junge und 7mal 3 Junge). Der Brutbestand des St. Johann-Kirchturmes wird auf mindestens 20 Brutpaare geschätzt (HM). Am 26. Juni kreisten mind. 50 bis 60 Ind., am 3. August mind. 100 Ind. über der Stadt Schaffhausen (DK). Am 14. August konnten 40 jagende Ind. über Schleitheim beobachtet werden (MS).

Eisvogel (Alcedo atthis): Regelmässige ganzjährige Beobachtungen (z.T. mit Brutverdacht oder Brutnachweis) an den bekannten Orten Bibermühle (WS, FH), Schaarenwies-Petri (FH) und am Alten Rhein, Rüdlingen (TN, MW). Zwischen der Badeanstalt Flurlingen und dem Rheinfall konnte 1 Ind. mehrmals zwischen April und August beobach-

tet werden (ob dort ein neuer Brutplatz ?; KW). Am 2. April war 1 Ind. an einem Gartenteich auf der Breite (Stadt Schaffhausen), rund 1 km vom Rhein entfernt, anzutreffen (MR); am 26. August 1 Ind. am Weier Lochgraben, Hallau (ID-Meldung; A. BORGULA).

Wiedehopf (*Upupa epops*): Am 15. Mai Ind. nahrungssuchend in Rebberg bei Buchberg (TN). Nach Beobachtungen von Rebbauern hielt sich während der Brutzeit nur 1 Ind. im Gebiet auf (mündliche Mitteilung von Landwirten an TN).

Wendehals (*Jynx torquilla*): Brutzeitmeldungen stammen aus Schleitheim (am 7. Mai 1 rufendes Ind.; AO), aus Hallau (am 30. Mai und 1. Juni 1 Ind. mehrmals rufend im Obstgarten Oberwisen; VH) und aus Merishausen (AM).

Grauspecht (Picus canus): Die Meldungen stammen fast ausschliesslich aus der Gemeinde Rüdlingen: am 5. März 1 und am 1. Mai 2 rufende Ind. auf der Unteren und Oberen Rheininsel (MW), am 27. März 1 rufendes Ind. im Eggholz (TN) und am 26. Mai 1 Ind. in Rebberg Nähe Dorf (TN). Mehrere Frühjahrsbeobachtungen stammen aus dem Raum Lahnbuck-Breite, Schaffhausen (MR).

Grünspecht (Picus viridis): Brutzeitmeldungen stammen aus den Gemeinden Hallau: ganze Brutzeit im Watelen (AO) und vom Obstgarten Oberwisen: am 16. September und 17. September 1 Jungvogel beobachtet; VH); Schleitheim: rufende Ind. am 16. April am Staufenberg und im Schwerzedel (AO) und am 24. April im Raum Eschenhau-Heerenwies (HB); Siblingen: 1 rufendes Ind. am 2. Mai Näppental (AO); Hemmental: regelmässig gehört vom 5. März bis Ende Mai (HB); Schaffhausen: mindestens 3 rufende Ind. auf der Breite (MR) und Rüdlingen: mindestens 3 Brutpaare auf Gemeindegebiet (TN, MW).

Mittelspecht (Dendrocopos medius): Beobachtungen aus dem Schaarenwald, Unterschlatt / TG von je 1 Ind. vom 18. Mai und 6. September (FH). Am 11. September rief 1 Ind. auf der Oberen Rheininsel bei Rüdlingen; das Tier suchte Nahrung an Eichen und Pappeln (MW). Ein sicherer Brutnachweis stammt aus dem Gebiet

zwischen Herblingen und Thayngen. Dort fütterte am 20. Mai 1 Altvogel an einer Bruthöhle in einer Eiche (KW).

Kleinspecht (Dendrocopos minor): Am 4. März 1 rufendes Ind. bei der Petri (FH) und am 1. April 1 Ind. Chlus, Breitequartier Schaffhausen (MR). Bei Rüdlingen konnten von März bis Anfang Mai regelmässig rufende und trommelnde Kleinspechte beobachtet werden (TN, MW); max. 3 Ind. am 27. März (TN). Am gleichen Ort konnte am 11. September 1 ♂ bei der Nahrungssuche beobachtet werden (MW). Am 30. August 1 ♂ Gehren, Hemmental (HB).

Heidelerche (Lullula arborea): Am 16. März 1 singendes ♂ um 10.30 Uhr am bekannten Brutplatz in den Rebbergen von Hallau. Leider blieb diese Feststellung die einzige in diesem Jahr (VH). Am 21. April 1 Paar nahrungssuchend in Getreideacker auf der Tüele, Merishauser Randen (AM, MW). Ein Herbstdurchzügler am 14. Oktober 1 Ind. Widen, Neunkirch (MR).

Uferschwalbe (*Riparia riparia*): In der Kiesgrube Wasserfallen bei Hallau konnten mindestens 80 Röhren gezählt werden (AO).

Bachstelze (Motacilla alba): Eine Winterbeobachtung von 1 Ind. am 10. Januar und 23. Januar am Rhein bei Neuhausen (DK).

Wasseramsel (Cinclus cinclus): Am 3. April 1 Paar fütternd an der Wutach bei Wunderklingen, Hallau. Ein Altvogel war beringt und hatte einen Alu-Ring am linken und einen gelben Kunststoffring am rechten Lauf (AO).

Nachtigall (Luscinia megarhynchos): Ein Durchzügler sang in untypischem Habitat am 23. April im Gehren, Hemmental (HB). Ein weiterer möglicher singender Durchzügler wurde am 4. Mai oberhalb Hallau auf 560 m ü.M. vernommen (AO). Ein weiterer Sänger war am 10. Mai am oberen Schaarenweiher, Unterschlatt / TG anzutreffen (FH). Am Rheinufer bei Flaach konnten 3 Sänger am 1. Mai und 22. Mai registriert werden (TN, MW); am gleichen Ort wurde am 4. Juni noch 1 singende Nachtigall gehört (TN).

Hausrötel (*Phoenicurus ochruros*): Eine Winterbeobachtung: 1 Ind. am 22. Januar in der Kiesgrube Wasserfallen, Hallau (AO).

Gartenrötel (Phoenicurus phoenicurus): In Hemmental wurden zur Brutzeit an 3 Orten singende of festgestellt (HB). Weitere einzelne Sänger wurden am 25. April im Hauental, Schaffhausen (HB), am 17. Mai beim Hof Heerenwies, Schleitheim (HB) vernommen. Eine sichere Brut wurde vom Oerlifall und eine wahrscheinliche Brut aus dem Niklausenquartier (beide Stadt Schaffhausen) gemeldet (MR). Eine sehr seltene Mischbrut konnte THOMAS NABULON bei Rüdlingen finden. Dort brütete ein Gartenrotschwanz-of mit einem Hausrotschwanz-perfolgreich. 5 Jungvögel, also Hybriden zwischen Garten- und Hausrotschwanz, flogen aus.

Braunkehlchen (Saxicola rubetra): Am 7. Mai 1 Ind. bei der Bibermühle, Hemishofen (FH) und am 11. September 1 Ind. auf Obstbaum sitzend, Nähe Rüdlingen (MW).

Schwarzkehlchen (Saxicola torquata): Im Gegensatz zum Vorjahr keine Meldungen eingetroffen.

Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe): Sämtliche Beobachtungen stammen vom Heimzug: Am 21. April 1 Ind. Bibermühle (FH, MR), am 27. April 2 Ind. zwischen Hallau und Wilchingen (AO), am 1. Mai 1 Ind. Eschheimertal, Schaffhausen (FH, MR), am 6. Mai 3 Ind. Sellmatten südwestlich Hallau (AO), am 7. Mai 2 Ind. Bibermühle (FH) und am 10. Mai 2 Ind. auf Acker bei der Petri, Unterschlatt / TG (FH).

Rotdrossel (Turdus iliacus): Am 27. März 1 singender Durchzügler bei Rüdlingen (TN).

Feldschwirl (Locustella naevia): Wie schon 1992 und 1993 sind auch dieses Jahr keine Meldungen aus dem Kanton Schaffhausen eingetroffen, welche auf eine Brut hindeuten. Ein Durchzügler sang am 1. Mai in einer Hecke bei Schleitheim; eine Nachsuche am 8. Mai blieb erfolglos (UT). Weitere Beobachtungen stammen aus dem grenznahen Kanton Zürich bzw. aus der deutschen Nachbarschaft: Vom 1. Mai bis mindestens 22. Mai war 1 Sänger im Werdhölzli,

Flaach / ZH anzutreffen (TN, MW) und am 7. Mai sang 1 Ind. (wahrscheinlich auch noch Durchzügler) bei Murbach / D (FH).

Gelbspötter (Hippolais icterina): Am 7. Mai 1 Sänger bei Murbach / D (FH).

Klappergrasmücke (Sylvia curruca): Am 21. April wurden die ersten Frühjahrsdurchzügler (mind. 3 Ind.) bei der Bibermühle beobachtet (FH, MR). Einzelne Sänger wurden festgestellt am 27. April und 22. Mai in Rüdlingen (TN), am 4. Mai bei der Bergkirche, Hallau (AO), am 15. Mai (AO) und am 28. Mai (UT) in Schleitheim. In Atlingen, Hallau sang 1 σ vom 1. Mai bis 7. Mai täglich am gleichen Ort (AO). Südlich des Dorfes Hallau sang noch am 13. Juni 1 σ (AO).

Dorngrasmücke (Sylvia communis): Am 3. Mai sang 1 ♂ am bekannten Brutort in Rebberg oberhalb Hallau (AO). Am 7. Mai wurden 3 singende ♂ bei Murbach / D kartiert (FH). An zwei Orten im Klettgau wurden auch im Juni noch Dorngrasmücken festgestellt: am 13. Juni 1 Sänger am Bahndamm zwischen Trasadingen und Wilchingen (AO) und am 1. Juni und 15. Juni 1 Sänger in Rebberg oberhalb Oberhallau (VH).

Berglaubsänger (Phylloscopus bonelli): Einzelne Sänger wurden an folgenden Orten festgestellt: am 16. Juni an südexponiertem Steilhang unterhalb des Schleitheimer Randenturms (HB), am 17. Juni an der Oberberghalde, Hemmental (HB) und am 26. Juni am Siblinger Schlossranden (ID-Meldung; M. KÄPPELI).

Kohlmeise (Parus major): Eine Ringfundmeldung: ein am 18. Februar in Hemmental durch HANS MINDER beringtes \$\partial\$ wurde 25 Tage später am 15. März in Oberfranken / BRD von einer Katze erbeutet (Distanz: 350 km).

Pirol (Oriolus oriolus): Am 7. Mai und 23. Mai je 2 Ind. bei der Bibermühle (FH, MR). THOMAS NABULON schätzt den Brutbestand der Gemeinde Rüdlingen auf 5 bis 7 Brutpaare. Die Feststellungen stammen aus Höhen zwischen 350 und 420 m ü.M. Weitere Brutzeitmeldungen stammen von der Petri (u.a. 2 rufende Ind. am 10. Mai),

vom Ried zwischen Ramsen und Rielasingen / D (am 19. Juli 2 Ind.) und vom oberen Schaarenweiher (am 26. Juli 1 Ind. rufend; alle FH).

Rotkopfwürger (Lanius senator): Zwischen dem 1. Juni und 7. Juni sang 1 ♂ in einem Obstgarten bei Beggingen (KW). Über eine Brut ist nichts bekannt geworden.

Tannenhäher (Nucifraga caryocatactes): Am 18. Februar rief 1 Ind. auf einer Tanne, mitten im Dorf Hallau (VH); am 29. Mai (!) war 1 Ind. auf der Breite, Stadt Schaffhausen zu beobachten (MR) und vom 8. bis 30. September war 1 Ind. bei Hemmental festzustellen (HB).

Dohle (Corvus monedula): Von zwei Orten wurden sichere Brutnachweise gemeldet: 2 Brutpaare (Baumbrüter) zwischen Schleitheim und Beggingen (HB) und 12 Brutpaare wurden am 11. Mai an der Steigkirche, Schaffhausen (Gebäudebrüter) gezählt (HB).

Kolkrabe (Corvus corax): Wiederum fand eine Brut im Cementwerk Thayngen statt; am 21. April waren mind. 2 Jungvögel im Horst; beide Altvögel wurden beobachtet (MW). Am 24. September wurde 1 Ind. auf dem Hagen, Merishausen festgestellt (MW).

Ortolan (Emberiza hortulana): Am 24. April 3 Ind. (2 ♂, 1 ♀) auf einem Feldweg bei Oberhallau (VH).

Grauammer (Miliaria calandra): ANDRES OVERTURF kartierte in den Monaten März bis Juni um unteren Klettgau Grauammern. Am 17. März suchten westlich von Unterneuhaus 11 Ind. Nahrung, 1 ♂ davon singend. Bis Ende Juni konnten im Raum Wilchingen - Trasadingen - Unterneuhaus 1 bis 8 ♂ beobachtet werden. Am 29. Mai konnten ein nestbauendes ♀ (Nestanlage in Rapsfeld) und am 14./15. Juni Fütterungsflüge zu diesem Nest festgestellt werden. Das Nest wurde eine Woche später verlassen aufgefunden (vermutlich Nestraub). Weitere singende ♂ wurden im Mai auch auf dem Hallauer- und Oberhallauerberg sowie im Gebiet der Siblingerhöhe kartiert (AO). Im Gebiet Widen hielten sich bis Ende Juni 6 singende ♂ auf (MJ).

Adresse der Autoren:

Michael Widmer, Ungarbühlstrasse 73, 8200 Schaffhausen Urs Weibel, Oberwiesstrasse 3, 8213 Neunkirch

