

**Zeitschrift:** Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubünden  
**Herausgeber:** Naturforschende Gesellschaft Graubünden  
**Band:** 16 (1870-1871)

**Artikel:** Beitrag zur Hemipterenfauna Graubündens  
**Autor:** Frey-Gessner, E.  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-594525>

#### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 17.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

II.  
Beitrag  
zur  
**Hemipterenfauna Graubündens.**  
von  
**E. Frey-Gessner,**  
Conservator am entomologischen Museum in Genf.

---

**Hemiptera Heteroptera \*).**

**Corisa limitata** Fieb. Anfg. VIII. ob Sedrun ca. 1400 M.  
s. m.

**Hydrometra Costae** HS. Ende Juli und Anfg. August, um  
Sedrun: Nalps 1800 M.; Steintthal 1950 M.; bei  
Cavorgia, Mompé-Medels, Surrhein, Rueras  
1300—1400 M.; Oberalppass, Pass da Tiarms  
2100 M.

Wo nur immer in den Alpen ein Tümpelchen sich  
findet, gleiten gewiss solche *Hyd. Cost.* darauf herum.

**Aradus corticalis** L. St. Moritz unter Lärchenrinde. (1900 M.)

---

\*) Bevor ich mich an ein zuverlässiges Verzeichniss der von mir ge-  
fangenen Hemiptera homoptera wage, muss meine Sammlung vorerst noch  
einer gründlichen Revision unterworfen werden. Doch aufgeschoben ist nicht  
aufgehoben!

**Zosmenuis Laportai Fieb.** Anf. August. Sedrun, Cavorgia von Kräutern geschöpft; vielleicht von *Chenopodium*, worauf die Art bei uns sehr häufig ist.

**Z. capitatus Wlf.** Mitte Octob. Untervaz unter Juniperusbüschen.

**Monanthia cardui L.** Ende Juli zahlreich an Köpfen von *carduus nutans* an den Kelchblättern sitzend. Sedrun 1400 M.; Mitte August ob Klosters im Prättigau 12—1300 M.

**M. gracilis H. S.** var. *capucina* Germ. (*setulosa* Fieb.). Mitte October am Fuss des Calanda bei Untervaz unter Thymus und Juniperusbüschen.

**M. Wolfi Fieb.** Mitte October bei Untervaz am Fuss des Calanda unter Juniperusbüschen (sonst den Sommer über auf *Echium vulgare*).

**Tetraphleps vittatus Fieb.** Ende Juli auf Rothannen bei Sedrun, Surrhein. (1400 M.)

**Anthocoris nemorum. Lin.** Ende Juli, Sedrun auf div. Pflanzen.

**Piezosthetus bicolor Scholtz.** Anfg. August, Cavorgia bei Sedrun unter Tannenrinde; 1 geflgt. Expl. ♀

**Triphleps niger Wlf.** Ende Juli, um Ragaz\*), Mayenfeld. Mitte October, an der Halde St. Luzi bei Chur.

**S. xanthochila Fieb.** Ende August am Rheinufer bei Mayenfeld.

**S. saltatoria L.** Ende Juli und Anfg. August am Rheinufer und in feuchten Waldstellen um Sedrun und

---

\*) Obgleich Ragaz, Pfäfers etc. zum Gebiete von St. Gallen gehören, glaubte ich dennoch die bezüglichen Vorkommnisse hier mit aufnehmen zu dürfen, da sich dieselben im anstossenden bündnerischen Gebiete sicherlich ebenfalls finden.

von Sedrun nach Surrhein auf der Strasse, und im Strimthal, Plateau Calmot, bis 2300 M. s. m.

**S. melanoscela Fieb.** Ende Juli auf den Sandufern des Rheins bei Mayenfeld; Surrhein bei Sedrun in der Nähe des Rheines.

**S. hirsutula Flor.** Ende Juli im Nalpsthäl auf der Alluvion hinter dem Alphüttenhügel. (1826 M.)

**S. littoralis Lin.** Wie vorige, überdiess noch im Strimthal. Plateau Calmot bis 2300 M.

**Harpactor annulatus Fab.** Ende Juli unter Steinen auf der Alp Fremd-Vereina im Prättigau. (1962 M.)

**Colliocoris pedestris Wlf.** Anfg. August um Sedrun unter Steinen ob dem Dorf. Anfang October bei Untervaz am Fuss des Calanda unter Juniperusbüschen.

**Nabis subapterus De Geer.** Mitte October, Halde St. Luzi bei Chur (gehört zu den abundanten ubiquisten).

**N. brevis Schltr.** Ende August, um Ragaz, Mayenfeld. Mitte October, Untervaz, Calanda, sonst auch überall sehr verbreitet.

**N. flavomarginatus Schlitz.** Anfg. August bei Sedrun, auf kraut- (klee-) reichen Wiesen.

**Lygaeus equestris Lin.** Ende Juli, Sedrun auf blühenden Kräutern aller Art, besonders Sambucus.

**Nysius Jakobeæ Schll.** Fürggels-Egg ob Ragaz am Piz Lun eine ganze Colonie von üppigem Grasboden geschöpft. (1200 M.)

**N. thymi Wlf.** Anfg. August zahlreich auf Epilobium, kurzem Gras, und von Thymusbüschen um Sedrun. 1400 M.

**Megalonotus chiragra Fb.** Ende Juli, Sedrun. Unter Steinen.

**Homalodema abietis Lin.** Sedrun, Surrhein, Ende Juli, zwischen den Schuppen von Roththannenzapfen.

**Trapezonotus agrestis Fall.** Anfang August, zwischen Moos und kurzem Gras auf dem Felsklotz bei der Kirche in Cavorgia bei Sedrun, zahlreich und meist sehr dunkle, mit wenig Gelb gezierte und sehr kleine Exemplare; Mitte October ebenfalls einige kleine Stücke unter Juniperusbüschen am Fuss des Calanda bei Untervaz.

**Rhyparochromus phoeniceus Rssi.** Ende Juli — Anfg. August um Sedrun unter Steinen in Feld und Wald; alles braungelbe Varietät, keine rothen.

**R. pini L.** Ueberall gemein. — Anfg. August: Fläscher Allmend Luziensteig; Mitte October: St. Luzi bei Chur, Fuss des Calanda bei Chur unter Thymus, Erica, Juniperus etc. etc.

**Berytus montivagus. Br.** Mitte October bei Untervaz am Fuss des Calanda unter Thymus und Juniperusbüschen sehr zahlreich. Im Ganzen bedeutend kleinere Exemplare als diejenigen der Juragegenden und aus dem Molassenland. Theilweise auch ohne alle Zeichnung auf der Membran.

**B. clavipes Fabr.** Ebenso häufig und am nämlichen Ort wie voriger, auch unter Carexbüschen. (Auch um Ragaz.)

**B. minor H. S.** Ebendaselbst und zu gleicher Zeit, aber um etwa um die Hälfte so zahlreich wie *montivagus* oder *clavipes*.

**Metacanthus elegans Curt.** Mitte October bei Untervaz am Fuss des Calanda unter Ononisbüschchen.

**Arenocoris spinipes** Fall. In einem Carexbusch zwischen den Wurzelfasern am Fuss des Calanda bei Untervaz ein Stück erbeutet; das zweite Stück erhielt ich von Carl Caveng, dem Sohne des freundlichen Gastwirths zur Krone in Sedrun.

**Bathysolen nubilus** Fall. Ebenfalls Mitte October am Fuss des Calanda bei Untervaz unter Juniperusbüschen erbeutet. Eine Colonie von mehreren Exemplaren.

**Coreus pilicornis** Klg. Ende Juli. Um Mayenfeld, Luziensteig, Ragaz.

**Verlusia rhombaea** L. Mitte October, Chur St. Luzi unter Grasbüschchen ein Exemplar.

**Gonocerus juniperi** Dahl. Mitte October. Unter einem Juniperusbusch, um zu überwintern, bei Untervaz.

**Therapha hyoseiami** Lin. Ende Juli. Auf verschiedenen Pflanzen um Ragaz, Luziensteig.

**Corizus crassicornis** L. Wie voriger, nur noch viel zahlreicher.

**C. capitatus** Fab. Ebenso. — Noch auf dem Piz Alun.

**C. parumpunctatus** Schll. So häufig wie vorige. — Juli, August.

**Monalocoris filicis** L. Anfg. August zahlreich auf Farren am Bergabhang bei Cavorgia (Sedrun).

**Bryocoris pteridis** Fl. Ebendaselbst an einer Stelle eine grosse Colonie erbeutet.

**Myrmecoris gracilis** Grsk. Mitte October am Fuss des Calanda bei Untervaz ein einziges Exemplar unter einem Juniperusbusch erbeutet.

**Miris laevigatus** Lin. Ueberall häufig in der Ebene. — Mitte October. Halde bei Chur.

**M. sericans** Fieb. Ende Juli auf Kräutern und Gebüschen, (Ragaz, Valens) Sedrun, Surrhein, Cavorgia bis 1500 M. — nicht gerade zahlreich, doch auch nicht selten.

**M. holsatus** Fab. Häufig bis hoch in die Alpen hinauf. — (Valens, Ragaz, Branggisalp.) Klosters im Prättigau im Slappinathalausgang. 1300 M.

**Loptoterna dolabrata** Fab. Juli und Aug. auf blumigen Wiesen und Weiden bis 1500 M. (Vasön) Piz Lun, Klosters, Cavorgia, Sedrun.

**Cremuscephalus umbratilis** Fall. Im Juli und August, ohne Zweifel überall auf Tannen und Lärchen zerstreut vorkommend bis an die obere Baumgrenze. Calanda, Sedrun, Cavorgia.

**Oncognathus binotatus** Fabr. Anfang August: Fläscher Allmend bei Mayenfeld.

**Homodemus marginellus** Fb. Im Sommer überall auf blumenreichen Wiesen und Weiden (Scabiosen, Esparsetten etc.). Mayenfeld, Sedrun.

**Calocoris fulvomaculatus** Fall. Anfg. August: Sedrun, ein ganz dunkel gefärbtes Exemplar.

**C. alpestris** Mey. Anfang August. Zahlreich auf Nesseln, Cavorgia bei Sedrun.

**C. Chenopodii** Fab. Ueberall gemein. Juli und August: Fläscher Allmend.

**Phytocoris pini** Kschb. Ende Juli einige Exemplare bei Sedrun (1400 M.) von Pinus picea geklopft.

**Capsus annulipes** H. S. Juli und Aug. auf Lärchen, besonders in Alpen bis zur oberen Gränze derselben. Engadin, Ragaz,

**C. capillaris** Fabr. Juli. Piz Alun.

**Charagochilus Gyllenhalii** Fab. Ende Juli, um Ragaz auf blumenreichen Weiden (Galium etc.). Cavorgia jenseits Sedrun. (1500 M.)

**Polymerus holosericeus** Hhn. Ende Juli um Pfäffers.

**Plesiocoris rugicollis** Fall. Anfang August, Sedrun, Cavorgia auf krautartigen Pflanzen hie und da gesellschaftlich; auch auf Alnus viridis.

**Lygus pratensis** Fab. Dieser abundante Ubiquist findet sich auch überall um Sedrun auf allerlei Blüthen; ferner im Prättigau um Klosters.

**L. campestris** Hhn. Wie voriger.

**L. rubricatus** Fall. Ende Juli sehr zahlreich um Sedrun, Surrhein auf Pinus picea.

**L. contaminatus** Fall. Ende Juli ob Surrhein bei Sedrun massenhaft auf den am Weg in's Nalps stehenden Büschen von Alnus viridis.

**L. pabulinus** Lin. Von der Thalsohle bei Mayenfeld bis in die Alpen hinauf auf Nesseln und andern krautartigen Pflanzen, Salix etc. — z. B. Anfg. August bei Cavorgia, Sedrun.

**Poeciloscytus unifasciatus** Fab. In der Ebene (Mayenfeld) auf Galium gesellschaftlich, Juni, Juli..

**Hadrodema pinastri** Fall. Anfg. August von Föhren geklopft, um Ragaz, Luziensteig.

**Orthops montanus** Schll. Ende Juli, Anfg. August. Um Sedrun von Pinus picea geklopft.

**O. flavovarius** Fab. Dieses überall vorkommende Insekt findet sich auch um Ragaz und Sedrun bis über 1500 M. s. m. auf verschiedenen Blüthen, besonders Dolden.

**Stiphrosoma leucocephala L.** Ueberall auf trockenen Weiden, in der Thahlsohle bis ziemlich hoch an die Berghänge hinauf; oft gesellschaftlich, z. B. Ende Juli. Furggels-Egg ob Pfäffers.

**Halticus luteicollis Pz.** Ende Juli auf trockenen Grasbördern um Ragaz, Mayenfeld.

**H. pallicornis L.** Ubique frequens. Den ganzen Sommer hindurch an trockenen Grasbördern auf Thymus, Scabiosa, Centaurea, Hieracium etc. bis über 1500 M. Ragaz, Pfäffers, Branggis-Alp, Piz Lun, Klosters, Sedrun, Cavorgia.

**Globiceps flavomaculatus Fab.** Wie voriger. Doch mehr einzeln; nicht gesellschaftlich.

**Meconema ambulans Fall.** Anfang August, Cavorgia ein ♀ erhascht.

**Aethorhinus angulatus Fall.** Ende Juli. Sedrun auf verschiedenen Gesträuchen (Salix) und Kräutern der Rheinalluvionen.

**Ortocephalus saltator Hhn.** Ende Juli. Ragaz hie und da.

**Atractotomus mali Mey.** Anfg. August. Fläscher Allmend.

**Tinicephalus hortulanus Mey.** Wie voriger.

**Criocoris crassicornis Hhn.** Ende Juli. Auf Blumen an Grasbördern um Ragaz.

**Plagiognathus arbustorum Fab.** Meistens auf Nesseln, aber auch häufig auf andern Gewächsen. Bis ziemlich hoch in die Alpen hinauf. Sommer. — Z. B. Branggis-Alp 1000 M.

**P. viridulus Fall.** Ueberall häufig vom Thal bis in die Alpen hinauf; Juli und August: Valens, Piz Lun, Branggis-Alp, Ragaz, Sedrun, Cavorgia.

- Agaliastes pulicarius Fall.** Sommer. Ueberall häufig. Flässcher Allmend, Furggles-Egg, Sedrun, Cavorgia.
- Camaronotus confusus Kbm.** Ende Juli, Anfg. August, um Sedrun, Cavorgia auf Salix und Pinus etc.
- Teratoscopus plagiatus H. S.** Juli um Ragaz.
- Placochilus seladonicus Kbm.** Um Ragaz, Anfg. August.
- Macrocoleus laricis. nov. sp.** Im Juli auf Lärchtannen auf der Furggels-Egg und Piz Lun etc. bis 1500 M.
- M. solitarius Mey.** Ende Juli. Um Ragaz auf Waldbinsen.
- Mormidea baccarum Lin. (Fieb.)** Ueberall auf Dolden etc. Ende Juli Sedrun; Klosters, Prättigau.
- Asopus luridus Fab.** Anfg. August. Um Ragaz auf Gebüschen.
- Sciocoris macrocephalus Fieb.** Ende Juli um Ragaz.
- S. terreus Schk.** Mitte October unter Juniperusbüschen bei Untervaz.
- Schirus moris Lin.** Sedrun, von Carl Caveng gesammelt.
- S. dubius Scop.** Ebenso.
- Eurygaster hottentotus Fab.** Mitte October. Am Fuss des Calanda bei Untervaz unter Steinen und Juniperusbüschen.
- E. maurus L.** Ueberall häufig das ganze Jahr hindurch, unter Steinen, Pflanzen, auf Dolden, Getreideähren etc. etc., z. B. Calanda bei Untervaz.
- Graphosoma lineata L.** Im Herbst sehr häufig auf Dolden.
- Odontoscelis fuliginosus L.** Aug. Mayenfelder Allmend.