Zeitschrift: Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubünden

Herausgeber: Naturforschende Gesellschaft Graubünden

Band: 104 (1986-1987)

Artikel: Veränderungen an der Flora gedüngter Bergwiesen des Unterengadins

Autor: Voser, Peter

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-594721

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 19.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Veränderungen an der Flora gedüngter Bergwiesen des Unterengadins

Von Peter Voser

Anschrift des Verfassers: Dr. Peter Voser Forschungsstelle für Naturschutz und angewandte Ökologie 8708 Männedorf

Eine Untersuchung im Auftrag des Amtes für Landschaftspflege und Naturschutz des Kantons Graubünden.

1. Einleitung

1.1 Die verschwundene Blütenpracht der Talwiesen

Viel zu spät bemerkten die botanisch interessierten Naturkundler wie die Flora der Talwiesen verarmte. Die früher allgegenwärtigen Wiesenblumen überlebten auf immer kleiner werdenden Restflächen.

Da diese meist auf mühsam bewirtschaftbaren Hängen lagen, wurden viele der Verbrachung überlassen, in Schafweiden umgewandelt oder aufgeforstet.

Weitere Objekte an bevorzugter Südlage wurden überbaut oder in meist moderne Rebberge umgewandelt.

1.2 Rückgang der Bergwiesenflora in Voralpenzonen

Neueste Inventare zeigten, dass die Verarmung der Wiesenflora nicht auf die Hügelstufe des Mittellandes beschränkt ist.

In manchen Voralpenregionen verschwand die Bergwiesenflora ebenso schnell wie vorher in den untersten Lagen. Im Berggebiet des Kantons Zug fanden wir beispielsweise nur noch einzelne kleine Bergwiesen mit einem grösseren Anteil an typischen Bergblumen.

1.3 Vergleichende Wiesenaufnahmen im Unterengadin

Vor 10 Jahren wurden in Futterwiesen des Unterengadins und des oberen Münstertals Ertragsmessungen zur Untersuchung der durch Rothirsche verursachten Ertragsausfälle durchgeführt (Voser 1987). Auf 27 dieser Messstellen hat nun der Verfasser 1986 die Wiesenvegetation nochmals aufgenommen. Der Vergleich mit den Probeflächenaufnahmen von 1976/77 soll zeigen, ob diese meist recht produktiven, gedüngten Bergwiesen in der Zwischenzeit eine ähnliche Entwicklung erfahren haben, wie die eingangs geschilderten Futterwiesen der Hügel- und der Voralpenzone.

Zusätzlich erhielten wir vom Landwirtschaftsamt Graubünden und von der Toni-Molkerei Chur Angaben über die Entwicklung der Viehbestände und der Milchablieferung der 5 untersuchten Gemeinden.

1.4 Geographie und Klima

Das Unterengadin ist ein Teil eines inneralpinen Trockengebietes. Winter, Frühling und Herbst sind oft trocken, die Winter kalt und der Sommer erstaunlich warm. Allerdings fallen die Unterschiede von Jahr zu Jahr deutlicher aus als in anderen Teilen der Schweiz.

Ein Grossteil flussnaher Gebiete liegt in der mittleren und in der oberen Ackerbaustufe, welche hier deutlich höher steigt als in ozeanischen Alpenregionen.

Die meisten der aufgenommenen Wiesen liegen auf Schotterterrassen, einige auf älterem Rüfenschutt.

Die unterste Aufnahme stammt von Pradella bei Scuol auf 1135 m ü. M., die oberste von Livels bei Breil auf 1602 m ü. M.



Abbildung 1: Blumen und artenreiche Bergwiesen bedecken noch viele Hänge der Unterengadiner Landschaft.



Abbildung 2: Kümmel, Esparsette, Klappertopf, Wiesensalbei und Schafgarbe gehören zur Bergwiese. Die Flora der untersuchten Wiesenflächen hat sich in den letzten 10 Jahren kaum verändert.

2. Bewirtschaftungsformen und Wiesentypen

Zum besseren Verständnis werden ein paar Begriffe kurz beschrieben:

Kunstwiesen liegen auf ackerfähigen, oft terrassierten Böden. Sie werden gelegentlich oder regelmässig umgepflügt, ein oder zwei Jahre für Kartoffeln, Mais oder Gerste genutzt und danach mit einer Kleegrasmischung eingesät.

Dauer- oder **Naturwiesen** unterliegen dieser Fruchtfolge nicht, sondern werden immer zur Rauhfuttergewinnung bewirtschaftet.

Manchmal wird eine Wiese auch nur gepflügt und direkt wieder mit einer Kleegrasmischung angesät.

Fettwiesen werden regelmässig gedüngt. Auf Grund ihrer botanischen Zusammensetzung gehören sie im Unterengadin vorwiegend zu den Goldhaferwiesen (*Polygono-Trisetion*). Ihr Ertrag liegt in der Regel zwischen 50 und 70 kg Rauhfutter pro Are und Jahr.

Magerwiesen erhalten höchstens sporadisch Düngergaben, da sie meistens auf flachgründigen Böden, auf kupiertem Gelände oder weit vom Heustadel entfernt liegen. Solche Wiesen liefern Erträge von 20 bis 40 kg Rauhfutter pro Are und Jahr. Magerwiesen besitzen einen wesentlich grösseren Artenreichtum als Fettwiesen.

Viele Magerwiesenpflanzen sind auf Fettwiesen nicht konkurrenzkräftig genug und werden durch andere Arten und durch den früheren Schnitt verdrängt. Hingegen gibt es keine Fettwiesenarten. Selbst Knaulgras, Rotklee und Pfaffenröhrchen kommen auch in Magerwiesen, dort aber in geringerer Menge, vor.

Schnittzahl. Die meisten gedüngten Wiesen werden jährlich zweimal gemäht. Im untersten Teil werden gelegentlich drei Schnitte durchgeführt. Gegen das Oberengadin nimmt der Emdertrag ab.

Die Magerwiesen sind einschürig. Ihr später Schnitt macht sie zumal in tieferen Lagen für zahlreiche Schmetterlinge wegen der Entwicklungsdauer der Raupenphase besonders wertvoll. Viele abgelegene Magerwiesen dienen als Reserve für Trockenjahre. Sie werden nur mit mehrjährigen Unterbrüchen gemäht.

3. Veränderungen beim Viehbestand und bei der Milchablieferung

Die 27 erwähnten Messstellen liegen in den 5 Gemeinden Scuol, Tarasp, Lavin, Susch und Zernez. Für diese Gemeinden lieferten das Landwirtschaftsamt und die Toni-Molkerei Angaben über die Viehbestände umgerechnet in Grossvieheinheiten (GVE) und über die Milchablieferung.

Dabei weisen Scuol, Lavin und Susch einen deutlichen Anstieg des Viehbestandes aus (Tab. 1). In Zernez blieb dieser ungefähr konstant, bei Tarasp sank er.

Einen ganz markanten Anstieg zeigt die Milchablieferung (Tab. 2). Nur Scuol zeigt etwa gleichbleibende Werte. Tarasp, Lavin und Susch verdoppelten die Milchmenge, auch die Zernezer Landwirte steigerten die Ablieferung deutlich.

Tabelle 1	
Grossvieheinheiten (GVE) in der Mitte der 70er und 80er Jahre	

GVE	1975	1976	1977	1984	1985	1986
Scuol	296,4	307,15	281,15	343,6	375,35	376,3
Tarasp	204,35	215,75	196,95	172,4	167,4	158,6
Lavin	220,8	229,1	211,2	246,4	239,3	247,3
Susch	107,15	123,1	112,55	147,5	136,7	133,9
Zernez	532,9	549,55	523,1	512,9	511,05	545,7

Tabelle 2 Milchablieferung in der Mitte der 70er und 80er Jahre

Liter	1976	1977	1984	1985	1986
Scuol	390 735	379 376	403 836	353 156	358 354
Tarasp	82 385	113 896	236 865	227 920	231 171
Lavin	197 954	209 184	409 621	410 031	411 647
Susch	110 962	108 074	224 341	227 971	222 830
Zernez	413 376	405 766	503 763	552 935	543 830

Neben der Milchproduktion stieg auch der Kleinviehbestand (Schafe, Ziegen), welcher in den GVE-Zahlen integriert ist. Rückläufig war hingegen die Bestossung der Alpen mit Pensionsvieh aus dem Unterland.

Laut Landwirtschaftsberater Denoth ist diese beeindruckende Leistungssteigerung nur zum Teil auf Mehrerträge bei der Futterproduktion zurückzuführen. Vielmehr war sie auch das Ergebnis der besseren Futterkonservierung (Heubelüftung) und Futterverwertung durch leistungsfähigere Kühe.

Heute ist die Milchablieferung auch im Berggebiet kontingentiert, so dass dieser Produktionszweig kaum weitere Zuwachsraten aufweisen wird.

Ein Ausweichen auf die Fleischproduktion ist ebenfalls unwahrscheinlich.

4. Veränderungen der Bergwiesenflora

4.1 Dauerwiesen

Die Ergebnisse von Kapitel 3 lassen eine starke Verarmung der Flora der Fettwiesen in den letzten 10 Jahren erwarten.

Zumindest auf unseren Dauerbeobachtungsflächen ist aber keine solche Verarmung eingetreten! Das heisst aber nun nicht, dass alle Fettwiesen artenreiche Blumenwiesen sind. Die Tabelle 3 gibt zunächst über die Anzahl der gefundenen Wiesenpflanzen Auskunft.

1976 und 1977 wurden jeweils 2-3 fest angelegte Probeflächen (i, a1, a2) von 5×5 m Grösse aufgenommen. Diese können nun mit der Aufnahme 1986, welche möglichst genau an der gleichen Stelle wie vor einem Jahrzehnt aufgenommen worden ist, verglichen werden.

Auch wenn die alten und die neuen Flächen nicht genau deckungsgleich sind, müsste eine deutliche Verarmung der Wiesenflora sichtbar werden. Nur auf 3 Flächen wurden 1986 etwas weniger Arten gefunden. Auf 4 Flächen wurden etwas mehr, und auf 3 Flächen sogar bedeutend mehr Arten registriert, während auf 6 Flächen die Artenzahl etwa gleich blieb.

Tabelle 3 Veränderungen bei der Artenzahl auf 25 m² grossen Probeflächen der Dauerwiesen

Messstelle	Ort	7	6		77		86	Veränderung
		a1	i	a1	a2	i		
12	Pradella, Scuol	21	21	20	19	22	25	+
22	Tarasp			29	33	30	29	O
24	Tarasp			21	20	21	24	+
30	Lavin	29	28				25	_
31	Lavin	15	18				11	_
34	Lavin	33	36		27	28	34	O
35	Lavin	21	23	22	22	21	26	+
36	Lavin	19	23				28	+
37	Lavin	20	19				17	\neg
43	Susch	26	26				26	O
44	Susch			22	20	18	27	++
45	Susch	21	24	21	20	22	29	++
46	Susch	28	26				26	Q
55	Zernez	23	19				22	O
56	Zernez	16	20				22	O
58	Zernez			22	28	28	35	++
48	Susch							
	Magerwiese bewirtschaftet	41	32		49	43	46	O
59	Zernez							
	Magerwiese verbracht			38	35	33	30	N <u> </u>

Legende

- + leichte Zunahme 86
- ++ starke Zunahme 86
- leichte Abnahme 86
- - starke Abnahme 86
- o kein deutlicher Unterschied

Tabelle 4 Mittlere Nährstoffzahl auf den Probeflächen von Tabelle 3 (Dauerwiesen)

Messstelle	Ort	76 77	86 Veränderung
		a1 i a1 a2	i
12	Pradella, Scuol	3,2 3,2 3,3 3,4 3	,3 3,3 0
22	Tarasp	3,1 3,1 3	,2 3,2 o
24	Tarasp	3,2 3,3 3	,2 3,2 o
30	Lavin	3,3 3,5	3,5 o
31	Lavin	3,4 3,2	3,5 o
34	Lavin	3,3 3,3 3,3 3,3	3,3 o
35	Lavin	3,3 3,3 3,2 3,3 3	,1 3,2 o
36	Lavin	3,2 3,3	3,2 o
37	Lavin	3,7 3,5	3,6
43	Susch	3,1 3,1	3,3 +
44	Susch	3,4 3,6 3	,6 3,3 –
45	Susch	3,6 3,5 3,5 3,6 3	,5 3,4 o
46	Susch	3,3 3,4	3,4 o
55	Zernez	3,3 3,5	3,6 +
56	Zernez	3,4 3,2	3,2 o
58	Zernez	3,5 3,3 3	,5 3,3 o
48	Susch	2,7 2,8 2,8 2	,8 2,9 o
59	Zernez	2,5 2,5 2	,5 2,5 o

T 1	
Legend	6
Legend	

- + leichte Zunahme 86
- ++ starke Zunahme 86
- leichte Abnahme 86
- - starke Abnahme 86
- kein deutlicher Unterschied

Nährstoffzahlen

- 1 sehr nährstoffarm
- 2 nährstoffarm
- 3 mittel
- 4 nährstoffreich
- 5 überdüngt

In Tabelle 4 wird die mittlere Nährstoffzahl der gleichen Flächen angegeben. Diese Zahl wurde auf Grund der Zeigerwerte der Wiesenpflanzen nach den Artenlisten berechnet. Die Zeigerwerte der einzelnen Pflanzenarten werden im Anhang angegeben.

Bei der mittleren Nährstoffzahl wirkten sich die Veränderungen noch weniger aus als bei der Artenzahl: nur auf zwei von 16 Flächen nahmen die Nährstoffzeiger leicht zu, in einer ab, auf den übrigen gab es keine Abweichungen. Welche Wiesenpflanzen besonders häufig und welche selten vorkommen, ist in der Tabelle 5 dargestellt. Gesamthaft wurden auf den Fettwiesenflächen 71 Pflanzenarten gefunden, 64 davon in den Dauerwiesen.

7 Arten kamen dabei in fast allen Flächen vor, nämlich:

Knaulgras Dactylis glomerata)

Rotklee Trifolium pratense)

Weissklee *Trifolium repens*)

Pfaffenröhrchen (Taraxacum officinale)

Goldhafer (trisetum flavescens)

Schafgarbe (Achillea millefolium)

Frauenmänteli (Alchemilla xantochlora)

Zumindest die ersten vier produzieren auch in Fettwiesen der übrigen Landesteile einen bedeutenden Teil der Rauhfuttererträge.

In den «Rängen» 8–30 finden wir die meisten typischen Vertreter der farbenprächtigen aber gleichwohl gedüngten Bergwiesen. Auffallend häufig kommen in den Unterengadiner Wiesen

Kümmel (Carum carvi)

Grosse Bibernelle (Pimpinella major) und

Echtes Stiefmütterchen (Viola tricolor)

vor, während auf der Alpennordseite häufige Arten wie das Wiesenschaumkraut (Cardamine pratensis), der Kriechende Günsel (Ajuga reptans) und die Ährige Rapunzel (Phytheuma spicatum) hier fehlen.

Tabelle 5 Engadiner Wiesen; Häufigkeit der gefundenen Arten in 27 Aufnahmen

Wissenschaftlicher Name	Vallader	Deutscher Name		6 Aufnahmer von einge- wachsenen Kunstwieser	
Dactylis glomerata	bardügl	Knaulgras	22	6	
Trifolium repens	trafögl alb	Weissklee	22	6	
Trisetum flavescens	tarset gelg	Goldhafer	21	6	
Trifolium pratense	trafögl cotschen	Rotklee	21	6	
Taraxacum officinale	latitschun cumün	Pfaffenrohr	20	6	
Achillea millefolium	iva milliföglia	Schafgarbe	20	5	
Alchemilla xanthochlora	ruanaida cumüna	Frauenmänteli	18	3	
Carum carvi	sempulè	Kümmel	18	6	
Veronica chamaedrys	veronica giamandra	Gamander-Ehrenpreis	16	3	
Poa pratensis	poa da prà	Wiesen-Rispengras	15	4	
Viola arvensis	viola da chomp	Ackerveilchen	15	2	
Silene vulgaris	silena cumüna	Gewöhnliches Leimkraut	15	4	
Heracleum sphondylium	rasvenna da prà	Bärenklau	14	5	
Ranunculus acer	ranunchel asper	Scharfer Hahnenfuss	14	3	
Rumex acetosa	fögliascha da prà	Sauerampfer	14	4	
Centaurea scabiosa	centaura scabiosa	Skabiosenflockenblume	14	5	
Myosotis silvatica	chalamandrin da god	Waldvergissmeinnicht	13	3	
Silena dioeca	silena cotschna (necla c.)	Rote Waldnelke	13	3	
Rhinanthus					
alectorolophus	claffa craista	Klappertopf	13	3	
Colchium autumnale	minchületta d'utuon	Herbstzeitlose	13	2	
Ranunculus bulbosus	ranunchel barlunà	Knolliger Hahnenfuss	13	5	
Chaerophyllum silvestre	charfögl da prà	Wiesenkerbel	12	2	
Helictotrichon pubescens	avaina füffa	Flaumhafer	12	3	
Pimpinella major	pimpinella gronda	Grosse Bibernelle	12	1	

Vicia cracca	vetscha d'utschè	Vogel-Wicke	11	3
Alopecurus pratensis	cua d'vuolp da prà	Wiesen-Fuchsschwanz	10	4
Tragopogon orientalis	latvacha oriental	Wiesenbocksbart	10	3
0 1 0	plantagen mezdan	Mittlerer Wegerich	9	3
Plantago media			9	
Phleum pratense	flioula da prà	Wiesen-Lieschgras	9	1
Chrysanthemum	8.1	37. 5	0	4
leucanthemum	margaritta gronda	Margerite	8	1
Festuca pratensis	fustigliun da prà	Wiesenschwingel	8	2
Phyteuma orbiculare	grifla raduonda	Rundköpfige Rapunzel	8	2
Festuca ovina	fustigliun blau	Schafschwingel	6	2
Poa trivialis	poa grassitscha	Gewöhnliches Rispengras	6	1
Vicia sepium	vetscha da saiv	Zaun-Wicke	6	2
Geranium silvaticum	gerani da god	Waldstorchenschnabel	6	
Anthoxanthum				
odoratum	fastü odurus	Ruchgras	5	
Plantago lanceolata	plantagen lantschetta	Spitzwegerich	5	2
Lamium album	urtia morta alba	Weisse Taubnessel	5	1
Sanguisorba officinalis	stalivetta officinala	Wiesenknopf	5	
Festuca rubra	fustigliun cotschen	Rotschwingel	4	1
Agrostis stolonifera	agrostin ruschnantà	Kriechender Windhalm	4	1
Salvia pratensis	salvgia da prà	Wiesensalbei	4	2
Campanula patula	brunzina lada	Wiesen-Glockenblume	4	2
Polygonum bistorta	badalais-ch d'serp	Schlangenknöterich	4	
Arrhenatherum elatius	•	Glatthafer	4	2
	avaina glischa		4	2
Medicago lupulina	spogna d'luf	Hopfenklee		
Cerastium caespitosum	cornetta cumüna	Gewöhnliches Hornkraut	3	1
Lotus corniculatus	cornichel cornü	Hornklee	3	1
Medicago sativa	spogna sativa	Luzerne	3	2
Crepis biennis	flur d'gromma champestr		3	2
Trollius europaeus	rol europeic	Trollblume	3	
Onobrychis viciifolia	esparsetta vetscha	Esparsette	3	1
Pimpinella saxifraga	pimpinella pitschna	Kleine Bibernelle	2	1
Campanula rotundifolia	brunzina raduonda	Rundblättrige		
		Glockenblume	2	2
Leontodon hispidus	flur d'porch (daintliun			
	gruogl)	Steifhaariger Löwenzahn	2	
Centaurea nervosa	centaura pennada	Fedrige Flockenblume	1	
Thalictrum minus	ruta pitschna	Kleine Wiesenraute	1	
Deschampsia caespitosa	chantina da tschisp	Drahtschmiele	1	
Equisetum arvense	sprella da chomp	Ackerschachtelhalm	1	1
Trifolium montanum	trafögl da muntogna	Bergklee	1	1
Campanula glomerata	brunzina püschlada	Knäuelige Glockenblume	1	1
Briza media	briza media	Zittergras	1	
Bromus erectus	tschintschigniva drizzada		1	
	•	Wilde Rübe	1	1
Daucus carota	carotta		1	1
Knautia arvensis	guaivdetta	Acker-Witwenblume	1	1
Lathyrus pratensis	tajaplatta da prà	Wiesenplatterbse	1	

Romanische Namen: Flurin Bischoff



Abbildung 3: Die Perücken-Flockenblume, eine der seltensten Wiesenblumen des Gebietes.

Die Artenlisten wurden auf im letzten Jahr nicht mehr gefundene und auf neu erschienene Arten untersucht. Dabei bestätigte sich zunächst die grosse Übereinstimmung zwischen den alten und neuen Aufnahmen.

Nur bei 6 Arten traten Verschiebungen in der Beobachtungshäufigkeit auf (Tabelle 6).

Tabelle 6
Deutlich häufiger und seltener beobachtete Pflanzenarten und ihre Artmächtigkeit in den entsprechenden Aufnahmen. (+: spärlich, 1: ziemlich reichlich bis 5 % der Gesamtfläche bedeckend.)

verschwunden	Name	N-Zahl	neu beobachtet
	Knolliger Hahnenfuss		
1	(Ranunculus bulbosus)	2	+1+++++
	Waldstorchenschnabel		
1	(Geranium silvaticum)	4	++++
	Margrite (Chrysanthemum		
1 + 1 + 11	leucanthemum)	3	+
	Löwenzahn		
11+++11	(Leontodon hispidus)	3	
	Wiesenbocksbart		
1 + 11	(Tragopogon orientalis)	3	
	Vogelwicke		
1 111	(Vicia cracca)	2	1

Der Knollige Hahnenfuss und der Waldstorchenschnabel verschwanden nur in je einer Probefläche, wurden aber in 7 respektive in 4 Probeflächen neu gefunden. Vier weitere Arten wurden hingegen deutlich weniger oft gefunden. Einen Rückgang der Margrite haben bereits andere Beobachter vermutet. Der Löwenzahn ist eine allgegenwärtige Pflanze, die 1986 vielleicht in den Fettwiesen nur etwas weniger in Erscheinung trat. Das gleiche gilt für die Vogelwicke. Beim Wiesenbocksbart ist ein leichter Rückgang eher denkbar.

Tabelle 7 Veränderungen bei der Artenzahl auf 25 m² grossen Dauerflächen; eingewachsene Kunstwiesen

Messstelle	Ort	Alter 1976	7	6		77		86	Veränderung
			a	i	a1	a2	i		
10	Pradella	über 4 Jahre			12	18	15	24	++
13	Pradella	über 4 Jahre	27	26	22		25	32	++
28	Tarasp	ca. 3 Jahre			10	11	10	23	++
32	Lavin	über 4 Jahre	16	13	14	10	13	19	++
40	Susch	2-3 Jahre			10	5	12	27	++
42	Susch	über 4 Jahre			21	19	21	24	О
11	1986 gepflügt								
14	1986 gepflügt								
33	1986 gepflügt								

Legende

- + leichte Zunahme 86
- ++ starke Zunahme 86
- leichte Abnahme 86
- -- starke Abnahme 88
- kein deutlicher Unterschied

4.2 Kunstwiesen

Sechs Fettwiesen waren 1976/77 als Kunstwiesen angesprochen worden (Tab. 7). Sie sind seither nicht mehr umgepflügt worden. In 5 der 6 Probeflächen hat die Artenzahl stark, in einer Probefläche weniger stark zugenommen.

Die mittlere Artenzahl stieg von 15 im Jahre 1977 auf 25 bei der letzten Aufnahme. 55 der 71 in Fettwiesen gefundenen Arten kamen mindestens einmal in Kunstwiesen vor (Tab. 9).

Dies zeigt, dass gelegentliches Umpflügen und Einsaat von Kleegrasmischungen sich langfristig weniger einschneidend auf die Artenvielfalt auswirkt, als man vermuten könnte. Viele Wurzelstöcke überleben diesen drastischen Eingriff, Samen können auflaufen und sich gegen die Konkurrenz der weniger an das Bergklima angepassten Zuchtpflanzen behaupten.

Die mittlere Nährstoffzahl deutet in einem Fall auf eine deutliche Ausmagerung hin (Tab. 8). Die restlichen Flächen zeigen keine oder nur leichte Veränderungen.

Tabelle 8
Mittlere Nährstoffzahl auf den Dauerflächen der Kunstwiesen

Messstelle	Ort	Alter 1976	76			77		86	Veränderung
			a	i	a1	a2	i		
10	Pradella	über 4 Jahre			3,3	3,4	3,4	2,8	
13	Pradella	über 4 Jahre	3,1 3	,1	3,1	3,0		2,9	О
28	Tarasp	ca. 3 Jahre			3,6	3,5	3,6	3,3	_
32	Lavin	über 4 Jahre	3,5 3	,5	3,5	3,6	3,6	3,4	О
40	Susch	2-3 Jahre			3,2	3,2	3,2	3,3	О
42	Susch	über 4 Jahre			3,3	3,3	3,3	3,3	О
11	1986 gepflügt								
14	1986 gepflügt								
33	1986 gepflügt								

Legende

- + leichte Zunahme 86
- ++ starke Zunahme 86
- leichte Abnahme 86
- - starke Abnahme 86
- o kein deutlicher Unterschied

Nährstoffzahlen:

- 1 sehr nährstoffarm
- 2 nährstoffarm
- 3 mittel
- 4 nährstoffreich
- 5 überdüngt

5. Folgerungen

Trotz eines starken Anstiegs der Milchproduktion in den 5 untersuchten Gemeinden, ist die Flora auf den Probeflächen der Fettwiesen in den letzten 10 Jahren nicht verarmt.

Auf alten Kunstwiesen konnte eine deutliche Regeneration der Wiesenflora nachgewiesen werden.

Fast alle Probeflächen lagen in den am stärksten genutzten Teilen des Unterengadins.

Zwischen der Artenvielfalt der einzelnen Wiesen bestehen jedoch grosse Unterschiede. Auch im Unterengadin gibt es jedoch zahlreiche artenarme Dauerwiesen, die vor allem mit einem Dutzend «Allerweltspflanzen» bewachsen sind.

Die meisten artenarmen Probeflächen lagen in tiefgründigen, gut bewirtschaftbaren ertragreichen Fettwiesen. Die Beregnung sichert auch in Trockenjahren einen guten Ertrag beim Heu- und beim Endschnitt.

Die Ergebnisse dieser Arbeit sind also ausserordentlich schwierig zu interpretieren: einerseits kein Rückgang, in manchen Fällen sogar eine Vergrösserung der Artenvielfalt auf den Fettwiesen, andererseits recht artenarme Dauerwiesen, die, wie ein Augenschein belegt, recht gross sein können.

Zumindest zeigen sie, dass die Vielfalt der blumenreichen Bergwiesen nicht einfach durch das Klima und den späten Heuschnitt gesichert ist.



Abbildung 4: Aussergewöhnlich vielfältige Magerwiese im Bereich des zukünftigen Verladebahnhofes Susch-Lavin.



Abbildung 5: Leider werden mit dem Druckfass auch flachgründige Trockenrasen für die Güllendüngung erreichbar. (Dunkle Flächen im Vordergrund.)

Vor ein paar Jahren ist in der ganzen Schweiz die Milchkontingentierung eingeführt worden. Dank dieser Massnahme dürften die Futterwiesenerträge nicht weiter zunehmen.

Ob damit auch die Wiesenflora der artenreicheren gedüngten Futterwiesen im heutigen Umfange erhalten bleibt, könnte eine Wiederholung unserer Aufnahmen in etwa fünf Jahren zeigen.

Gleich wichtig ist aber die Erhaltung der noch vielfältigeren Trocken- und Magerwiesen. Verbrachung oder die Umwandlung in Weiden schadet diesen für die Flora wie für die Insekten besonders wertvollen Lebensgemeinschaften ebenso stark wie eine intensivere Bewirtschaftung. Oft ist das Heuen solcher Wiesen für die Bergbauern sehr mühsam.

Der Bund fördert die Erhaltung von Trocken- und Magerwiesen durch Beiträge für die Bewirtschaftung von Grenzertragsflächen. Es ist zu hoffen, dass diese Leistungen noch verbessert und bei den Landwirten vermehrt bekanntgemacht werden. So könnte in diesem Bereich der Sicherung der verbliebenen Naturwerte Erfolg beschieden sein.

6. Literatur

- BISCHOF, N. 1981: Gemähte Magerrasen in der subalpinen Stufe der Zentralalpen. Teildruck der Hab. -Schrift der Phil.-Nat. Fak. der Univ. Basel. Separatdruck aus Bauhinia, Bd. 7, Heft 2, S. 81-128.
- Braun-Blanquet, J. 1961: Die inneralpine Trockenvegetation. Geobotanica selecta 1: 273 S.
- BÜNDNER BAUERNVERBAND (1979): Wildschäden in Graubünden, Chur, (Der Bündner Bauer; Sondernummer).
- ERHARDT, A. 1985: Wiesen und Brachland als Lebensraum für Schmetterlinge: Eine Feldstudie im Tavetsch (GR). Basel: Birkhäuser.
- HUNDT, R. 1985: Untersuchungen zur Höhenstufendifferenzierung der Polygono-Trisetion-Gesellschaften im Gebiet von Davos. Ber. Geobot. Inst. ETH., Stiftung Rübel, Zürich 52, 74–116.
- KLEIN, A. KELLER, H. 1983: Trockenstandorte und Bewirtschaftungsbeiträge, Hrsg: Bundesamt für Forstwesen, Abt. Natur- und Heimatschutz. Bern, 2. Aufl.
- LANDOLT, E. 1977: Ökologische Zeigerwerte zur Schweizer Flora. Veröff. Geobot. Inst. ETH, Stiftung Rübel, Zürich 64.
- ROHNER, J. 1972: Studien zum Wandel von Bevölkerung und Landwirtschaft im Unterengadin. Basel: Helbling & Lichtenhahn. (Basler Beiträge zur Geographie; 14).
- Schreiber, K.F.: Wärmegliederung der Schweiz auf Grund von phänologischen Geländeaufnahmen in den Jahren 1969–1973. Massstab 1:200 000. Hrsg. Eidg. Justiz- und Polizeidepartement, Der Delegierte für Raumplanung.
- VOSER, P. 1987: Einflüsse hoher Rothirschbestände auf die Vegetation im Unterengadin und im Münstertal, Kanton Graubünden. Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchungen im schweizerischen Nationalpark, Band 16, Heft 82.
- ZOLLER, H. 1964: Flora des schweizerischen Nationalparks und seiner Umgebung. Neuchâtel: Attinger. (Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchungen im schweizerischen Nationalpark; 9 (51).

Dank

Folgenden Stellen und Personen möchte ich für ihre Beiträge und Unterstützung herzlich danken.

Amt für Landschaftspflege und Naturschutz, Chur Landwirtschaftsamt Graubünden, Chur Toni-Molkerei, Chur Herrn Flurin Bischoff, Sent Herrn Otto Denoth, Landwirtschaftsberater, Ftan