

Zeitschrift:	Sammlungen von landwirthschaftlichen Dingen der Schweizerischen Gesellschaft in Bern
Herausgeber:	Schweizerische Gesellschaft in Bern
Band:	2 (1761)
Heft:	4
Artikel:	Von den verschiedenen Arten der Gerste und ihrer Pflanzung bey uns
Autor:	Tschiffeli, J.R.
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-386545

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 29.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



XXV.

Von den
verschiedenen Arten der Gerste
und ihrer Pflanzung bey uns.

Meine Herren!

Sie beliebten vor wenigen Tagen mir zu befehlen, daß ich Ihnen zum Behelf der Hochlobl. ökonomischen Gesellschaft in London, von dem Anbau und dem Gebrauch der verschiedenen Gersten-Arten in unsern Gegenden hinlängliche Nachricht vorlege. Hier ist sie, so weit meine wenige eigene Erfahrung und die Kenntniß erfahrnerer Landwirthe, die ich zu Rathe gezogen, solche ertheilen kan.

Nebenhaupt bauet im Berner - Gebiet der Landmann im flachen Lande außer zum Gebrauch seiner Haushaltung wenig Gersten; da hingegen die, so auf den Bergen, oder auch in hochgelegenen Thälern wohnen, dieselbe in so grosser

grosser Menge pflanzen, als ihnen nur möglich ist.

Beyde handeln meines Erachtens vernünftig. Der Bauer glaubt, und nicht ohne Grund, die Gerste zehre den Acker mächtig aus; dieses weiß er aus der Erfahrung, ohne sich zu bekümmern, ob würflich, wie ich vermuthe, der schnelle Wachsthum dieser Getreid-Art daran Schuld sey.

Da nun im flachen Lande der Bauer insgmein ziemlich grosse Güter, und durch und durch weit mehr Getreid-Acker, als aber Wiesen und Gras-Gärten besitzet, so hütet er sich bey seinem beständigen Mangel an Dünger gar sehr vor allem, was sein Ackerland aushängern könnte.

Die Besitzungen in unsern Hochländern sind hingegen überhaupt weit eingeschränkter, und bestehn meistens in den fettesten Wiesen. Hier ist also Dünger im Überflusse, und der Bauer hat keine andre Sorge, als auf seinen kleinen Ackerl dasjenige anzusäen, wovon er die reichste und sicherste Erndte zu hoffen hat.

Beydes findet er bey dem Gersten-Bau, ungeacht der gewöhnlich allzudichten Aussaat, giebt sie in gemeinen Jahren das 10. 11. bis 12. fältige Korn, da hingegen der * Dinkel oder Spelt, welcher im deutschen Berner-Gebiet als das Haupt-Getreid angebauet wird, unter gleichen Umständen käumerlich 6. fältige Frucht bringt, und dennoch im Preise immer etwas niedriger als die Gerste bleibt.

Nicht

* Zea dicoccos.

Nicht weniger müssen unsre Bergleute dahin sehen, daß sie solche Getreid-Arten pflanzen, welche die Härigkeit ihres Clima ausdauern mögen. Da, wo sie recht hoch liegen, ist alle Aussaat des Winter-Gewächses ohne Ausnahme vergeblich. Haber, Gersten, und etwas Sommer-Roggen, sind die einzigen Feldfrüchte, die in diesen kalten Gegenden zur Reife gelangen, und weil der Saame erst im May in die Erde gebracht wird, von der ungeheuren Menge des allzuspäth wegschmelzenden Schnees nicht erstickt werden.

Unsre verschiedene Gersten lohnen gar selten reichlich, wann sie nicht in einen fruchtbaren Grund gebracht werden, es mag nun derselbe diese Eigenschaft der Natur oder der Kunst schuldig seyn. Doch kan der Boden für die Gersten auch zu reich seyn; Stock-Gerste ist die einzige, die einen ziemlich hohen Grad der Fettigkeit in der Erde ertragen mag.

Je schwerer der Grund von Natur ist, desto fleißiger muß er gearbeitet worden seyn, wenn Gersten darinn gedeyen soll; ist aber alles mit Sorgfalt auf solchem Lande beschickt worden, so liefert es bey günstiger Witterung eine erstaunliche Erndte; da hingegen überhaupt etwas kiesichter Grund bey uns niemals so reiche Frucht bringet, aber auch im Gegensatz bey mittelmäßiger Arbeit und Besserung mehr abträgt, als die an sich selbst kalte Leimerde zu thun vermögend ist.

Insgemein wird zur Gersten-Saat solcher Boden gewählt, welcher zuvor Lein, * Erdäpfel, gelbe Rüben sc. sc. getragen hat. Ein solches Land ist dazu sehr geschickt; nicht nur hat es noch ziemliche Besserung in sich, sondern es ist auch durch das Fretten (starke Bearbeiten) und Hacken bey dem vorigen Anbauu mürbe gemacht worden.

Sæt der Landmann die Gerste im Frühjahr, so richtet er sich nach der Witterung, und wartet so lange, bis er keine strenge Kälte mehr besorget. Wo das Clima nicht gar zu roh ist, fällt die Saat-Zeit gemeinlich in das Ende des Mierzens, oder in den Anfang des Aprillmonats. In den Gebirgen aber verziehn sie öfters bis in die Mitte des Maymonates. So bald nun die Zeit vorhanden ist, ackert der Landmann den Grund auf, sæt im Verhältniß von 6. 7. bis 8. ** Berner-Mäßen auf die Fuchart, und hacket, wenn er sorgfältig ist, den Saamen mit der Haue unter, da hingegen viele andere ihn schlechtweg mit der Egge unter die Erde bringen.

Ist das Land etwas mager, und lieget nicht zu weit von der Hand, so kommt der Bauer seiner Saat, so bald die Nacht-Frosté vorbey sind, ein paar mal mit Beschüttj zu Hülfe, die er des Abends reichlich darüber ausgiesset. Dieses Wort lässt sehr Schweizerisch, drücket aber recht wohl aus, was es bedeuten soll. Wir verstehen dadurch eine schickliche Mischung von Wasser.

* Solanum esculentum tuberosum.

** In dem ersten Theile unserer Sammlungen ist der Halt dieser Mäßen ausgesetzt.

Wasser, es sey mit Harn von allerley Vieh, oder auch mit kurzem Miste. Diese Art zu düngen thut eine unvergleichliche Wirkung bey den Pflanzen, die schnell wachsen, und deren Wurzeln nicht allzutief in die Erde dringen.

Wird hingegen die Gerste zu Herbstzeit gesät, so verfährt man dabey wie im Frühling; anstatt der Beschüttung aber leget der Landmann ein wenig Mist oben auf. Dieser schirmet die noch zarten Pflanzen vor der Kälte, und wird durch den schmelzenden Schnee allmählig zu der Wurzel gebracht. *

Wir pflanzen hier zu Lande hauptsächlich 4. Sorten von Gersten.

1.) Die gemeine langährige Gersten meistens mit Hachlen versehn. *Hordeum distichum*.

2.) Die Zeil-Gersten ohne Hachlen. *Hordeum distichum*, *Spica breviore & latiore*, *grana confertis*.

3.) Die 4.zeilige Stock-Gersten. *Hordeum tetraestichum*.

4.) Die

* Neben dieser allgemeinen Besorgung pflegen sind einiger Zeit die geschicktesten Land-Verständige den Saamen nach der Aussaat einzuwälzen; und wenn derselbe nachwärts so hoch gewachsen, daß er bald den ersten Knotten ansetzen will, so wird der Acker mit einer Egge von scharfen Dornen bestrichen. Die Erfahrung zeigt, daß diese beyde Arbeiten, die doch wenig Zeit erfordern, die Gersten-Felder, die deren genossen, von allen übrigen auszeichnet, indem die Haupt-Halmen kurz hernach eine solche Menge Neben-Halmen treiben, daß der Boden davon gleich als mit einem Teppich bedeckt wird.

4.) Die nackte Gersten. Naked Barley
Milleri.

Die 3. ersten Sorten sind eigentlich bey uns Sommer-Gersten, sie werden aber im flachen Lande alle von Zeit zu Zeit im Herbst ausge säet; sonst arten sie nicht nur nach und nach aus; sondern die Winterung ist auch das sicherste Mittel, sie vor dem Brand zu verhüten.

Hingegen ist die 4te Sorte diejenige, welche wir die mehrere Zeit im Herbst säen, und also unsere eigentliche Winter-Gersten. Doch wird sie auch zu Zeiten gesämmt, je nachdem es die Gelegenheit oder andere Umstände erfordern.

Die erste Sorte ist die schlechteste, sie wird aber am häufigsten angebaut, weil sie mit schlechterem Grund als die übrigen Sorten vor lieb nimmt.

Die zweyte ist weit körnichter, und diejenige, welche von unsern Bierbrauern vorzüglich gesucht wird.

Die dritte trägt weit reichlicher als die 3. andern, fordert aber einen recht fetten Boden.

Die vierte ist die reichste an Mehl, und wird daher vorzüglich von denen gekauft, die daraus Brod backen. In dem Brod armer Leute und der Taglohner macht die Gersten ungefähr den sten Theil aus.

Sehr viel Gersten wird nicht zu Mehl gemacht, sondern nachdem sie von der Hülse gesäubert ist, in einer Stampfe-Mühle nur gebrochen, und von unsern Landleuten, auf verschiedene

dene Weise gekocht, als eine nährhafte und recht gesunde Speise genossen. Den Melch - Kühen des Tags etliche Handvoll Gersten, mit etwas Salz vermischt, dargereicht, verschaffet ihnen viele und kräftige Milch. Es ist meines Erachtens das beste Gelecke, womit man diese nützlichen Thiere erfrischen kan.

Endlich dann wird die Gersten in ziemlicher Menge gemälzt. Wie ich schon angezeigt habe, so brauchen die Bierbrauer hiezu sonderlich und vorzüglich die 2te Sorte. Diese ist überhaupt die grobkörnichste. Soll sie dem Brauer anstehn, so muß sie noch überdas, dünnhäutig, von hellem Ansehen, weißlicher Farbe, und recht rein seyn. Das vornehmste aber, bey allen Arten von Gersten, ist für unsre Brauer, daß sie im Frühjahr gesäet worden. Sie wissen aus richtiger Erfahrung, daß vor dem Winter gesäete Gersten gar nicht taugt, da sie sonst zu allem andern Gebrauche von gleicher Gute ist. Der Verkäufer kan auch in diesem Stücke den Bauer nicht betriegen. Denn gewinterte Gersten hat ohne Ausnahme eine blaulichte Farbe, die sie von gesömmter Gerste bey dem ersten Anblicke unterscheidet. Wird sie aber wieder gesömmert, so kommt bey der ersten Erndte die weissere Farbe wieder zum Vorschein.

J. R. Tschiffelj.