

**Zeitschrift:** Orion : Zeitschrift der Schweizerischen Astronomischen Gesellschaft  
**Herausgeber:** Schweizerische Astronomische Gesellschaft  
**Band:** - (1955)  
**Heft:** 47

**Rubrik:** Aus der Forschung

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 24.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Aus der Forschung

### Definitive Sonnenfleckenrelativzahlen für 1954

(Eidg. Sternwarte, Zürich)

Januar	0.2	Mai	0.8	September	1.5
Februar	0.5	Juni	0.2	Oktober	7.0
März	10.9	Juli	4.8	November	9.2
April	1.8	August	8.4	Dezember	7.6
Jahresmittel = 4.4		Minimum: Juni 1954			

Prof. Dr. M. Waldmeier

### Jahresmittel der Sonnenfleckenrelativzahlen 1947—1954

Die nachstehenden Relativzahlen der Eidg. Sternwarte, Zürich, geben einen Ueberblick über die stetige Abnahme der Sonnen-tätigkeit in den letzten 8 Jahren, d. h. seit dem letzten ausserordent-lich hohen Maximum im Jahre 1947 bis zum Minimum von 1954:

1947 = 151.6	1950 = 83.9	1953 = 13.9
1948 = 136.3	1951 = 69.3	1954 = 4.4
1949 = 134.7	1952 = 31.5	

### Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen Januar-Februar 1955

(Eidg. Sternwarte, Zürich)

Monat	Jan.	Feb.	Monat	Jan.	Feb.	Monat	Jan.	Feb.
Tag			Tag			Tag		
1.	22	19	12.	31	26	23.	8	19
2.	17	28	13.	28	28	24.	19	28
3.	11	32	14.	27	10	25.	21	28
4.	19	34	15.	18	8	26.	25	30
5.	32	32	16.	16	16	27.	25	30
6.	22	32	17.	15	7	28.	19	26
7.	23	34	18.	10	0	29.	16	
8.	29	24	19.	9	0	30.	12	
9.	31	28	20.	7	0	31.	22	
10.	36	27	21.	8	0			
11.	33	27	22.	8	9			

Monatsmittel: Jan. = 20.0, Feb. = 20.8

Prof. Dr. M. Waldmeier, Zürich

### Nova Sagittarii 1955

Nach einer Meldung des Harvard Observatoriums hat Dr. G. Haro, Direktor des Tonanzintla Observatoriums, am 16. Februar 1955 in der Position

$$\alpha_{1875.0} 17^{\text{h}} 57.5^{\text{m}} \quad \delta_{1875.0} -31^{\circ} 38' ,$$

also inmitten der Milchstrasse, im Sternbild des Schützen eine Nova 11. Grösse aufgefunden, die ihre maximale Lichtentfaltung bereits überschritten haben dürfte. (Circ. IAU No. 1491 und Nachrichtenbl. der Astr. Zentralstelle No. 247.)

R. A. N.

## **Der Rotationssinn der Spiralnebel**

So merkwürdig dies auch erscheint, bis jetzt war es noch nicht möglich, die Rotationsrichtung der Spiralnebel, einschliesslich unserer eigenen Milchstrasse, in Bezug auf die Form der Spiralarme eindeutig zu bestimmen.



*NGC 1300 im Sternbild Eridanus*

Einer der rätselhaften «Balken-Spiralnebel», dessen Arme nicht, wie üblich, direkt aus der Sternwolke im Zentrum entspringen, sondern scharf von einem durchgehenden Balken abknicken. Eine Milchstrasse mit Milliarden Sonnen. Aufnahme: «Hale»-Teleskop der Palomar-Sternwarte (Durchmesser des Parabolspiegels: 5 Meter) (Vergrösserung). Nach Lindblad und Mayall würde dieser Spiralnebel im Gegenuhrzeigersinn, nach Oort, van de Hulst und Müller im Uhrzeigersinn rotieren.

Auf Grund von spektrographischen Untersuchungen und Beobachtungen von Dunkelwolken in gewöhnlichen und Balken-Spiralen leiteten die Astronomen Mayall und Lindblad vor einigen Jahren die Vermutung ab, die betrachteten Milchstrassen rotieren so, dass sich ihre Spiralarme in der Rotationsrichtung öffnen.

In letzter Zeit haben Untersuchungen an der radiofrequenten Strahlung von 21.2 cm Wellenlänge des Wasserstoffes gezeigt, dass

die interstellare Materie unserer Milchstrasse — die als Quelle für diese Strahlung angesehen werden muss — sich in weiten Spiralarmen um das Milchstrassenzentrum zu legen scheint. In der Richtung der Sternbilder Cassiopeia-Perseus fanden Oort, van de Hulst und Müller drei hintereinanderliegende Materie-Verdichtungen, die als zu Spiralarmen gehörend gedacht werden können. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass die konvexen Seiten dieser Arme der Milchstrassenrotation vorangehen, im Gegensatz also zur Vermutung von Mayall und Lindblad.

F. E.

### Photographischer Meteor-Registrierapparat

Am 10. September 1953 ist in Lagny (Frankreich) ein als «Policeman-Météores» (Meteor-Polizei) bezeichneter Apparat in Betrieb gesetzt worden, der bei fester Aufstellung ein Himmelsfeld von  $48^{\circ}$  Durchmesser photographisch überwacht. Der Apparat bestimmt die Winkelgeschwindigkeit der Meteore und den Zeitpunkt ihres Erscheinens auf Bruchteile einer Minute genau. In Louveciennes, 41 km von Lagny, wurde ein zweiter «Policeman-Météores» aufgestellt. Das gleichzeitige Arbeiten der beiden Apparate ermöglicht die Bestimmung der Höhe und die Geschwindigkeit in Kilometern. Die Laboratorien des Centre National de la Recherche Scientifique (Institut d'Astrophysique et Observatoire de Haute Provence) und ein Privatateliers in Paris haben diesen Apparat in gemeinsamer Arbeit geschaffen.

(Documentation des Observateurs)

### Mondphasen und Luftdruck

Der deutsche Meteorologe W. Köppen hat in mühevollen Untersuchungen versucht, irgend eine Beziehung zwischen den Mondphasen und dem Luftdruck (und damit in gewisser Hinsicht auch dem Wetter) zu finden. *Er gelangte zu keinem positiven Ergebnis.*

(Naturwissenschaftliche Rundschau Nr. 8, 1954)  
(VdS Nachrichtenblatt Sept. 1954, Nr. 9)

### Neuer Komet Harrington-Abell (1955 a)

Der erste Komet des Jahres 1955 wurde von den beiden amerikanischen Astronomen Harrington und Abell (Mt. Palomar) mit der 48-Zoll-Schmidt-Kamera entdeckt. Die Auffindung erfolgte am 22. März 1955 in der Position AR  $11^{\text{h}}08.4^{\text{m}}$ ,  $\delta +20^{\circ}21'$ , also in der Region des Sterns  $\delta$  Leonis. Das sehr lichtschwache Objekt (Größe  $17^{\text{m}}$ ) wies einen Kern und einen kurzen Schweif auf. (Circ. IAU. Nr. 1494.)

R. A. N.