Zeitschrift: Orion: Zeitschrift der Schweizerischen Astronomischen Gesellschaft

Herausgeber: Schweizerische Astronomische Gesellschaft

Band: - (1959)

Heft: 66

Rubrik: Aus der Forschung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 13.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Aus der Forschung

Provisorische Sonnenflecken-Relativzahlen April—September 1959

(Eidg. Sternwarte, Zürich)

(Lings	, Stormwarte	, Zurien)				
Tag	April	Mai	Juni	Juli	August	September
1.	249	108	152	142	177	290
2.	242	112	133	118	210	256
3.	174	113	148	138	213	202
4.	159	105	166	158	225	161
5.	124	96	162	136	212	148
6.	108	138	180	127	207	144
7.	101	156	181	110	179	135
8.	132	188	177	131	175	136
9.	144	252	172	129	170	157
10.	177	268	160	127	155	141
11.	197	295	172	133	180	155
12.	189	285	176	135	160	170
13.	178	265	165	160	125	148
14.	193	240	170	180	139	151
15.	170	204	158	185	129	168
16.	142	182	172	190	151	130
17.	109	187	161	193	158	87
18.	119	198	174	195	174	100
19.	108	185	182	184	182	120
20.	132	187	173	160	180	143
21.	128	151	162	132	200	132
22.	138	145	170	94	200	155
23.	186	149	188	113	205	136
24.	186	143	157	105	217	155
25.	203	178	184	113	212	105
26.	184	188	184	134	220	106
27.	165	177	184	156	231	92
28.	165	132	160	181	274	87
29.	160	99	158	182	301	80
30.	115	106	147	193	292	76
31.		130		190	284	
	Monatsmittel: April		159.2	Juli	149.3	
	I.Zoliutoi	Mai	173.0	August	198.0	
		Juni	167.6	September		
		Juni	101.0	September	174.4	

M. Waldmeier

Zwei neue Kometen Alcock I (1959 e) und Alcock II (1959 f)

Der englische Amateur-Astronom G. E. D. Alcock hat in einem Abstand von nur fünf Tagen zwei Kometen entdeckt, nämlich am 25. Aug. 1959 den Kometen 1959 e, als Objekt mit Kern 10. Grösse, im Sternbild der Krone, und am 30. Aug. 1959 den Kometen 1959 f, als Objekt 6. Grösse, mit kurzem Schweif, in der Konstellation des Krebses. Bis zum Niederschreiben dieser Zeilen sind der Redaktion nur zwei Beobachtungen in der Schweiz gemeldet worden. Dr. E.

Leutenegger, Frauenfeld, beobachtete den ersten Kometen (1959 e) am 30. Aug., um 20^h30^m W. Z., und Paul Wild, Bern, anfangs September, als Wölkchen von 3' Durchmesser bei einer Helligkeit von 10^m . Dagegen wurden der Astronomischen Zentralstelle in Kopenhagen verschiedene Beobachtungen beider Kometen aus Europa, Südafrika und Amerika gemeldet. Komet 1959 f stand anfänglich ungünstig nahe der Sonne. Die Helligkeiten beider Kometen nahmen sehr rasch ab. Paul Wild, Bern, berechnete für den Kometen 1959 f folgende Bahnelemente:

Perihel-Durchgang	1959 Sept. 15.9267
Länge des aufsteigenden Knotens	224.647 0
Neigung der Ebene der Bahn	104.11 °
Abstand des Perihels vom aufsteigenden Knoten	300.966 °
Periheldistanz	0.16406

Dr. Kresák macht darauf aufmerksam, dass die Elemente des Kometen 1959 f eine gewisse Aehnlichkeit mit denjenigen des Kometen Bruhns (1853 d) aufweisen.

Nachr. Bl. der Astron. Zentralstelle, 13. Jahrg., No. 5/6 Circ. Int. Astr. Union, No. 1686/94 Astr. Informationsdienst (SAG), No. 84/85

R. A. N.

Neue Entfernungsbestimmungen galaktischer Sternhaufen

H. L. Johnson, Lowell Observatory, Flagstaff, Arizona (USA), hat auf Grund photoelektrischer Messungen im ultravioletten, blauen und gelben Licht für eine Reihe von galaktischen Sternhaufen, d. h. solchen, die zu unserem Milchstrassensystem gehören, die Entfernungen neu bestimmt. Wir geben unten die Werte für einige bekannte Sternhaufen. Diese Werte unterliegen allerdings einer Unsicherheit von 10—20 %.

		Entfernung in	
Sternhaufen	Sternbild	Parsec	Lichtjahren
Hyaden	Stier	40	130
Plejaden	Stier	126	410
Praesepe (Krippe)	Krebs	158	515
M 39	Schwan	250	820
M 34	Perseus	440	1440
M 25	Schütze	550	1790
M 67	Krebs	830	2700
M 36	Fuhrmann	1260	4100
M 11	Schild	1740	5700
Chi und h	Perseus	2250	7300

(Astrophysical Journal)

R. A. N.