

<b>Zeitschrift:</b>	Orion : Zeitschrift der Schweizerischen Astronomischen Gesellschaft
<b>Herausgeber:</b>	Schweizerische Astronomische Gesellschaft
<b>Band:</b>	6 (1961)
<b>Heft:</b>	72
 <b>Artikel:</b>	Mars : présentation 1960-1961
<b>Autor:</b>	Cortesi, S.
<b>DOI:</b>	<a href="https://doi.org/10.5169/seals-900297">https://doi.org/10.5169/seals-900297</a>

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 23.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## MARS : PRÉSENTATION 1960 - 1961

### Rapport N° 8 du «Groupe planétaire SAS»

Rapporteur: S. Cortesi, Locarno-Monti

<i>Observateur</i>	<i>E. Antonini</i>	<i>S. Cortesi</i>
Lieu	Genève	Locarno-Monti
Instrument	réfracteur 162 mm	réflecteur 250 mm réfracteur 150 mm
Grossissements	220 × 310 ×	226 × 305 × 375 ×
Qualité moyenne des images	4,5	5,0
Total dessins	6	36
Période d'observation	du 30. 11. 1960 au 10. 2. 1961	du 1. 12. 1960 au 9. 3. 1961

#### *Considérations générales*

En opposition le 30 décembre 1960, Mars s'est présenté très haut dans le ciel de nos régions, son diamètre maximum a atteint 15'',3; après la date de l'opposition la latitude de son centre a peu varié autour de la valeur de 0°, c'est-à-dire que le centre du disque coïncidait presque exactement ( $\pm 2^\circ$ ) avec l'équateur planétaire. Pour l'hémisphère boréal on avait:

- commencement de l'hiver: le 2 juillet 1960
- commencement du printemps: le 8 décembre 1960
- commencement de l'été: le 26 juin 1961


On devait donc s'attendre à voir diminuer la calotte polaire N, celle australe étant absente pour la période d'observation: ce qu'en effet on a facilement constaté. La planète fut assez bien suivie à Locarno-Monti, la petite taille du disque étant en quelque sorte compensée par les bonnes images dues à la grande hauteur de la planète sur l'horizon.

Le présent rapport se base surtout sur les observations du soussigné, M. Antonini ayant été défavorisé par le temps à Genève et M. Courvoisier ayant son instrument provisoirement hors de service. Avec regret nous avons dû constater d'autre part qu'aucun autre observateur suisse n'a répondu à notre appel et ne nous a envoyé des observations.

#### *Description des principales particularités de la planète*

La nomenclature est celle suggérée par la commission 16a de l'U.A.I. avec la variante de donner, pour les petits détails et canaux, outre les coordonnées, leur nom propre selon l'usage courant (exemple: Nodus Laocoontis 250°, + 20°); pour les canaux on donne les coordonnées de leur point moyen (exemple: Titan 170°, - 10°). Nous divisons la planète en régions, suivant l'usage de la «Commission of Mars» de la BAA.

*Région I: entre 250° et 10° (Syrtis Major-Sinus Meridiani) (voir dessins N° 2, 3, 6 et 7).*



Planisphere (février 1961). Observateur: S. Cortesi, Locarno-Monti. Réflecteur 250 mm - réfracteur 150 mm.

Les régions à l'est de Syrtis Major, profondément changées dans ces dernières années, par rapport aux observations du passé, n'ont pas présenté, cette année, des variations d'aspect appréciables comparativement à la présentation 1958-1959, sauf peut-être une tonalité moins foncée de Nodus Lao-coontis ( $250^{\circ}$ ,  $+ 20^{\circ}$ ). Entre ce dernier et l'extrémité de Mare Cimmerium (Gomer Sinus  $240^{\circ}$ ,  $0^{\circ}$ ) une large trainée floue, très peu contrastée, était visible surtout en janvier (le canal Adamas des observateurs américains?). Syrtis Major, de forme triangulaire, a été vue plus sombre dans sa partie nord-ouest; Hellas pas particulièrement claire, sauf les 19 et 21 janvier. Au nord de Syrtis Major, bien visibles, les taches allongées de Sithonius Lacus, Cassius, Nilosyrtis, Protonilus et Ismenius Lacus. Ces régions étaient bien séparées de la bordure sombre de la calotte polaire N (comprenant Boreosyrtis et Cecropia) par les zones plus claires de Umbra et Dioscuria. Coloe Palus vu comme condensation sombre le 26 janvier. Mare Serpentis sombre, Pandorae Fretum, Yaonis Regio et Hellespontus plus clairs.

*Région II: entre  $10^{\circ}$  et  $130^{\circ}$  (Margaritifer S.-Aonius S.)* (voir dessins 9 et 10).

Oxus difficilement visible, Indus ( $25^{\circ}$ ,  $+ 18^{\circ}$ ) au contraire bien vu les 23 février et 2 mars, avec un diamètre planétaire de moins de  $10''$ ! Mare Erythraeum sombre, Lunae Palus grand, bien plus sombre qu'en 1958, Ganges ( $60^{\circ}$ ,  $+ 2^{\circ}$ ) toujours bien visible, large et flou. Niliacus Lacus assez pâle, mais Mare Acidalium mieux visible qu'en 1958, bien dégagé des blancheurs polaires boréales. Nilokeras visible. Tempe claire. Solis Lacus et Nectar bien visibles, sombres. Bosphorus ( $80^{\circ}$ ,  $- 40^{\circ}$ ) vu sombre le 13 janvier, plus clair le 16 février. Coprates, Tithonus Lacus, Phoenicis Lacus visibles, Aonius Sinus clair.

*Région III: entre  $130^{\circ}$  et  $250^{\circ}$  (Mare Sirenum-Mare Tyrrhenum)* (voir dessins 1, 4, 5 et 8).

M. Sirenum nous a paru moins sombre qu'en 1958, mais toujours bien visible; Symplegades Insulae ( $185^{\circ}$ ,  $- 30^{\circ}$ ) très apparentes, claires (Antonini). Dans les vastes étendues de Amazonis on a remarqué les habituelles ombres plus ou moins vagues, parmi lesquelles on a pu identifier Ascreus Lacus ( $100^{\circ}$ ,  $+ 20^{\circ}$ ) Eumenides ( $140^{\circ}$ ,  $+ 5^{\circ}$ ) Nodus Gordii ( $145^{\circ}$ ,  $- 6^{\circ}$ ), Titan ( $170^{\circ}$ ,  $- 10^{\circ}$ ) et Orcus ( $180^{\circ}$ ,  $+ 10^{\circ}$ ). Trivium Charontis et Cerberus plus sombres au début de janvier qu'en février. Phlegra et Styx visibles, ainsi que Propontis. Elysium vue plus claire les 28 et 30 décembre qu'en février. Entre Mare Tyrrhenum et Mare Cimmerium Hesperia était visible avec difficulté (6. février).

*Région IV: zones polaires.*

La calotte polaire nord, très grande au début des observations, s'est progressivement réduite par la suite; après la date de l'opposition une bordure sombre a toujours été visible, parfois étroite et très foncée, parfois plus large et grise. La calotte polaire sud est toujours demeurée invisible; à sa place on a souvent remarqué les habituels voiles blancs diffus, s'étendant parfois jusqu'à des latitudes assez basses ( $- 50^{\circ}$ ). On se rappellera que l'hémisphère austral de la planète venait de quitter l'été le 8 décembre pour entrer dans son automne.

### *Formations nuageuses.*

Comme pendant la précédente présentation, l'atmosphère de Mars est restée limpide, si l'on excepte les nuages blancs souvent visibles au terminateur; remarquable, à ce point de vue, le voile cachant M. Sirenum, au bord ouest, le 13 janvier 1961.

### *Colorations.*

Aucune mention de couleur n'a été notée, à part la teinte normale ocre ou rose des zones désertiques et les gris plus ou moins sombres, peut-être de tonalité tirant un peu sur le vert dans les taches boréales (Mare Acidalium).



### *Conclusions.*

En nous référant aux observations dont le résumé est donné ci-dessus, nous avons pu tirer les conclusions suivantes :

- 1) atmosphère martienne limpide (comme en 1958), donc détails bien visibles;
- 2) régions sombres de l'hémisphère austral moins intenses qu'en 1958;
- 3) taches sombres de l'hémisphère boréal un peu plus foncées et mieux visibles qu'en 1958.



Ces deux dernières constatations sont en accord avec l'allure des saisons de Mars; pendant la présentation 1958-1959 l'hémisphère sud de la planète se trouvait en plein été, tandis que pendant celle de cette année il était déjà dans l'automne; l'hémisphère nord, en hiver à la fin de 1958, était cette fois au printemps. Ce décalage de presque une demi-saison explique selon nous, les différences notées entre les aspects aréographiques observés pendant les deux présentations, en considérant que les conditions de transparence atmosphérique martienne étaient à peu près les mêmes.

Sur les dessins et sur le planisphère le nord est en bas et l'est à gauche, les détails se déplaçant, avec la rotation de la planète, de droite à gauche, comme dans l'observation télescopique.



1) 5. 1. 1961     $\omega = 163^\circ$   
 $\varphi = +1^\circ, 4$    Diam. =  $15'', 2$   
220, 310 X   Image = 6 à 7


2) 21. 1. 1961     $\omega = 354^\circ$   
 $\varphi = -1^\circ$    Diam. =  $13'', 7$   
310 X   Image = 3 à 5



3) 27.1.1961  $\omega = 301^\circ$   
 $\varphi = -1^\circ, 2$  Diam. = 13"  
310  $\times$  Image = 3



4) 10.2.1961  $\omega = 193^\circ$   
 $\varphi = -1^\circ, 3$  Diam. = 11", 4  
310  $\times$  Image = 5

Figures 1 à 4 : Observateur: E. Antonini, Genève; réfr. équatorial de 162 mm.



5) 28.12.1960 19 h 30 TU.  
 $\omega = 218^\circ$   $\varphi = +2^\circ, 5$   
Diam. = 15", 4  
226  $\times$  Image = 7



6) 21.1.1961 16 h 30 TU.  
 $\varphi = 322^\circ$   $\varphi \approx -1^\circ$   
Diam. = 13", 7  
305  $\times$  Image = 5



7) 27. 1. 1961 17 h 00 TU.  
 $\omega = 277^\circ$   $\varphi = -1^\circ, 2$   
Diam. = 13", 0  
305 x Image = 3 à 4

8) 14. 2. 1961 21 h. 30 TU.  
 $\omega = 178^\circ$   $\varphi = -1^\circ, 1$   
Diam. = 11", 0  
305 x Image = 7

Figures 5 à 10 : Observateur: S. Cortesi, Locarno-Monti.



9) 18. 2. 1961 17 h 30 TU.  
 $\omega = 83^\circ$   $\varphi = -0^\circ, 8$   
Diam. = 10", 6  
305 x Image = 5

10) 23. 2. 1961 17 h 30 TU.  
 $\omega = 36^\circ$   $\varphi = -0^\circ, 4$   
Diam. = 10"  
305 x Image = 6