Zeitschrift: Orion: Zeitschrift der Schweizerischen Astronomischen Gesellschaft

Herausgeber: Schweizerische Astronomische Gesellschaft

Band: 32 (1974)

Heft: 140

Artikel: Jupiter: présentation 1972: opposition: 24 juin 1972

Autor: Cortesi, S.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-899631

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 02.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

JUPITER, Présentation 1972

Opposition: 24 juin 1972 Rapport No. 25 du «Groupement planétaire SAS» Par S. Cortesi, Locarno-Monti

Observateur	Instrument	Dessins	Photos	Période d'observation
D. Amiguet	lunette 110 + 162	22	_	17. 6.72
Lausanne	télescope 200 mm			17. 8.72
C. Botton	télescope 200 mm	120	_	28. 5.72
Bordeaux (F)	•			25. 10 .72
S. Cortesi	télescope 250 mm	7	-	18. 6.72
Locarno-Monti				3. 11. 72
R. Germann	télescope 200 mm	3	_	22. 2.72
Wald (ZH)	- n			4. 10. 72
F. Jetzer	télescope 200 mm	45	_	19. 3.72
Bellinzona				7. 11. 72
A. Materni	télescope 200 mm	2	_	17. 2.72
Bellinzona	•			25. 6. 72
F. MEYER	lunette $110 + 162$	58	_	18. 3.72
Lausanne	télescope 200 mm			30. 10. 72
N. Travnik, Matias	lunette 152 mm	9	7	14. 5. 72
Barbosa (Brazil)				15. 9. 72



Fig. 1: Dessin Cortesi, 7. 7. 1972, 21^h $40^{\rm m}$ T.U. $\omega_1 = 227.6^{\circ}$, $\omega_2 = 118.5^{\circ}$.



Fig. 2: Dessin F. Meyer, 13. 7. 1972, $21^{\rm h}52^{\rm m}$ T.U. $\omega_1=242.4^{\circ},\,\omega_2=$




Fig. 3: Dessin F. Jetzer, 9. 8. 1972, $21^{\rm h}25^{\rm m}$ T.U. $\omega_1=30.5^{\circ},~\omega_2=29.7^{\circ}.$



Fig. 4: Dessin D. Amiguet, 10. 8. 1972, $20^{\rm h}58^{\rm m}$ T.U. $\omega_1=171.5^{\circ},\,\omega_2=163.7^{\circ}.$



Fig. 5: Dessin F. Jetzer, 19. 9. 1972, $18^{\rm h}00^{\rm m}$ T.U. $\omega_1=255.6^{\circ},\,\omega_2=303.1^{\circ}.$




Fig. 6: Photo N. Travnik auf Tri X Pan-Film, $\frac{1}{2}$ Sek. 29. 6. 1972 ohne Zeitangabe, $\omega_1 = 30.5^{\circ}$, $\omega_2 = 348.9^{\circ}$. Dans les images le nord est en bas, l'est à droite.

ORION Jg. 32. (1974) No. 140

Nous remercions en outre M. F. Zehnder (Birmenstorf) qui, comme d'habitude, nous a envoyé de précieuses observations du passage au mér. centr. de la Tache Rouge.

1. Considérations générales.

En dépit de la très basse situation de la planète sur notre horizon, cette année les observations de nos collaborateurs sont bien plus nombreuses et aussi de meilleure qualité que celles de l'année passée.

2. Description détaillée (dénominations B.A.A.)

S.P.R. uniformes.

S.S.T.B. en général visible, mais d'une manière assez variable: tantôt seulement comme bordure sombre des SPR, tantôt comme fine bande bien séparée des SPR, tantôt large et floue, tantôt même double (MEYER).

W.O.S. toutes les trois bien visibles pendant toute la présentation, à l'exception de D-E, très difficile à voir à partir de la mi-août (Botton-Jetzer-Meyer). Occasionnellement on a observé d'autres taches claires plutôt éphémères à la même latitude des WOS.

S.T.B. toujours importante et régulière, bien qu'un peu moins large que l'année passée.

Tache Rouge: aussi bien visible que l'année passée mais peut-être d'une couleur un peu moins vive.

S.E.B.s. la ranimation de l'année passée n'a pas laissé de traces à cette latitude et cette bande est apparue très fine ou parfois même invisible.

S.E.B.n. les matériaux issus de la ranimation de 1971 ont renforcé davantage cette bande la rendant très large et intense, mais sans grands détails particuliers, pendant toute la présentation.

E.Z. comme pendant ces dernières années elle était étroite et toujours occupée par des voiles et des taches claires ou foncées.

N.E.B. large et sombre, parfois double, riche en détails, elle demeure la plus active et importante bande de la planète.

N.T.B. en général visible, bien que pas très sombre.

N.N.T.B. parfois bien visible, parfois notée seulement comme bordure sombre des NPR.

N.P.R. comme SPR, peut-être un peu plus claires qu'elles.

3. Colorations.

T.R. notée rose, rose-pâle, rose grisâtre par tous les observateurs; à partir de juillet elle fut vue rose intense ou même rouge (!) par MEYER et JETZER. Les bandes principales et SPR étaient marron, NPR gris bleuâtre (JETZER).

Le 7. 7. Cortesi a noté: STB gris-bleuâtre; SEBn ocre; NEBs brune, NEBn grise neutre; NTB ocre; NNTB gris-bleuâtre.

4. Photographies.

Cette année nous avons reçu seulement une petite série d'agrandissements sur papier faite par N. Travnik à l'Observatoire Astronomique Flammarion au Brésil. En dépit de la modeste ouverture de la lunette employée (152 mm) on reconnait facilement sur ces photos tous les détails les plus intéressants de la planète. Les films employés sont le Kodak Tri X Pan (400 ASA) et le Ilford HP4; avec un filtre jaune, la pose était de ½ sec.

5. Périodes de rotation.

5.1. Tache Rouge (graphique No. 1)


Les positions en longitude du centre de la T.R., reportées dans le graphique No. 1 dérivent exclusivement des observations du passage au méridien central de la planète. Malgré la forte dispersion des données nous avons pu interpoler une courbe moyenne (en petits traits sur le graphique) qui peut représenter le déplacement en longitude de la T.R. pendant cette présentation. On voit que la position n'a pas changé sensiblement entre le début de mars et le début d'octobre, ainsi la période moyenne de rotation correspondante est celle du syst. II (9h55m40,6s), néanmoins pendant ce laps de temps la position de la T.R. a subi une oscillation de ± 1,5°.

5.2. W.O.S. (graphique No. 2)

D'après les nombreux passages au mér. centr. observés par nos collaborateurs, nous avons pu dresser le graphique No. 2 avec lequel nous avons tracé les droites des mouvements moyens, nous permettant de calculer les données reportées dans le tableau ci-dessous:

On voit un net ralentissement du mouvement de rotation de ces taches, mais en particulier de F-A; ainsi la période moyenne de rotation des trois WOS a été la plus lente jamais observée

W.O.S.	Position	is en 1972, le		Périodes de rotations moyennes		
	1.6	24.6	1.10	pendant prés. 1972	entre oppositions 1971–1972	
F-A	352°	340°	288°	9h55m19,1s	9h55m16,8s	
D-E	207°	194°	138°	9h55m17,4s	9h55m15.2s	
В-С	67°	53°	355°	9h55m16,4s	9h55m13,4s	
Moyennes				9h55m17,6s	9h55m15,1s	



6. Latitude des bandes.

Nos calculs des latitudes se basent cette année sur les données suivantes:

- a) série de mesures au micromètre à double image du 6. 8. 72 (poids 3 dans la moyenne) de S. Cor-TESI.
- b) moyenne des estimations visuelles à l'oculaire de F. Jetzer des 3. 6/4. 7/20. 7/31. 7/24. 8 (poids 1 dans la moyenne).

Les formules pour les calculs des latitudes zéno-

graphiques sont reportées dans ORION No. 80, p. 110. La latitude moyenne du centre du disque était de -2,1°.

Le déplacement vers sud de SSTB c'est accentué cette année; les deux bandes équatoriales se sont élargies, leurs bords s'étant déplacés vers l'extérieur (c.-à-d. le bord sud de SEBn vers sud et le bord nord de NEBn vers nord). On note en outre une nette migration vers des latitudes plus boréales de NTB et NNTB.

ORION Jg. 32 (1974) No. 140

Objet	Observate	Observateur			T (moyenne)	
,	Jetzer	JETZER MEYER AMIGUE		T moyenne	1962/68	
SPR	3,0	2,6	2,7	2,8	2,8	
SSTB	·	2,5	3,0	2,8	3,2	
STZ	1,2	_	_	1,2	1,0	
STB	5,1	4,6	4,5	4,7	5,0	
TR	5,6	5,0	5,3	5,3	4,8	
STrZ	1,0	_	_	1,0	1,0	
SEBs	3,0	-2,7	2,8	2,8	-	
SEBn	6,0	5,3	5,1	5,5	5,3	
EZn	3,0	2,6	2,8	2,8	2,2	
NEB	6,0	5,1	5,0	5,4	5,3	
NTB	3,2	2,4	3,0	2,9	3,5	
NPR	2,5	2,2	3,0	2,6	2,8	

7. Cotes d'intensité (T).

Les chiffres donnés dans les premières trois colonnes du tableau représentent les moyennes de nombreuses estimations s'étendant pratiquement sur toute la présentation.

Par rapport à l'année passée on notera: SSTB, Tache Rouge et NTB un peu plus claires; EZ plus sombre.

8. Conclusions.

Cette présentation a été très calme avec les principales caractéristiques suivantes:

- 1. bandes équatoriales toujours larges et sombres avec, entre elles, une ZE étroite et voilée.
- ralentissement accentué du mouvement des WOS qui continue la tendance de ces dernières années.
- 3. la ranimation de SEB de 1971 n'a pas pratiquement laissé de traces à la latitude de SEBs.
- 4. déplacement vers nord de NTB et NNTB.

Objet	mesures (y	$= (\sin \beta''')$	Latitude zénographique β''				
,	microm.	visuelles	moyenne pesée	1972	1971	1908/47 (BAA)	
centre SSTB (limite SPR)	-0,657	0,673	-0,661	—45,5°	-44,2°	—41,7°	
centre STB	-0,414	0,459	0,425	—28,9°	—29,6°	—29,0°	
centre SEBs	-0,266	·	-0,266	—18,6°	—18,5°	—18,1°	
bord sud SEBn	-0,161	0,118	-0,150	—11,4°	— 9,3°	— 9,3°	
bord nord SEBn (EB)	+0,040	+0,090	+0,053	+ 1,1°	+ 2,0°	— 7,3°	
bord sud NEBs	+0,116	+0,175	+0,131	+ 5,8°	+ 6,3°	+ 7,2°	
bord nord NEBn	+0,317	+0,383	+0,333	+18,5°	+16,3°	+17,5°	
centre NTB	+0,494	+0,523	+0,501	+29,6°	+25,2°	+27,8°	
centre NNTB	+0,652	+0,661	+0,654	+40,6°	+36,7°	+37,0°	

Adresse de l'auteur: S. Cortesi, Specola Solare, 6605 Locarno-Monti.

ORION-Rückruf

Die erfreuliche Zunahme der Mitgliederzahl der SAG, insbesondere in der 2. Jahreshälfte 1973, sowie die wachsende Nachfrage nach bestimmten Heften früherer Jahrgänge veranlassen uns, um die Rückgabe der folgenden, einwandfrei erhaltenen ORION-Nummern zu bitten:

No. 133, No. 134, No. 136. Diese Nummern werden dringend gesucht, da sie trotz anfänglicher Vorratshaltung vergriffen sind. Wir sind weiter für eine Rückgabe der folgenden Nummern dankbar:

No. 123, No. 124, No. 126, No. 127 und No. 130/131.

Generalsekretariat der SAG/SAS; W. Lüthi, Generalsekretär, Fichtenweg 6, 3400 Burgdorf.