Zeitschrift: Orion: Zeitschrift der Schweizerischen Astronomischen Gesellschaft

Herausgeber: Schweizerische Astronomische Gesellschaft

Band: 68 (2010)

Heft: 361

Artikel: Zwei Meteorströme im Dezember

Autor: Baer, Thomas

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-898021

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 01.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Zwei Meteorströme im Dezember

C





Mit den Geminiden und den Ursiden zählt der Dezember neben den Monaten August und November zu den Sternschnuppen-Monaten schlechthin. Im Schatten der Perseïden geht er aber oft etwas in Vergessenheit. Dieses Jahr dürfte sich wegen des Mondes vor allem das Geminiden-Maximum am 13. lohnen.

■ Von Thomas Baer

Viele Besucherinnen und Besucher einer Sternwarte wissen, dass im August viele Sternschnuppen fallen. Jedes Jahr wird der Perseïden-Meteorstrom entsprechend auch in den Medien angekündigt. Was viele aber nicht wissen, dass über das Jahr verteilt noch unzählige Sternschnuppenströme mehr aktiv sind, sicher nicht in gleicher Intensität wie die Perseïden mit ihren gegen 100 Meteoren stündlich, aber es ist durchaus lohnenswert, auch nach ihnen einmal Ausschau zu halten. Der Geminiden-Meteorstrom etwa ist zwischen dem 7. und

pro Stunde! Im Unterschied zu den Perseïden dringen die Auflösungsprodukte des erzeugenden Objektes, des Planetoiden 3200 Phaeton, verhältnismässig langsam in die obere Erdatmosphäre ein (35 km/s). Am meisten Sternschuppen wird man in der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember 2010 erhaschen können. Das Maximum erwarten die Astronomen am 14. Dezember gegen 09:00 Uhr MEZ. In den frühen Morgenstunden dürfte also eine allmähliche Zunahme der Meteore registriert werden. Dann ist auch der zunehmende Halbmond untergegangen, womit sein Licht die Beobachtung nicht mehr beeinträchtigt. Wie der Name verrät, haben die Geminiden ihren Radianten im Sternbild der Zwillinge (lat. Gemini) knappe 2° westlich von Kastor (α Gemini). Von hier aus scheinen die Sternschnuppen sternförmige in alle Richtungen über den Himmel zu huschen.

Ursiden-Meteore zum Winteranfang

Etwas ungünstiger, da um die Vollmondzeit herum aktiv, sind dieses Jahr die Ursiden-Meteore. Ihre Fallrate ist mit zehn Exemplaren stündlich weit geringer. Es handelt sich ebenfalls um recht langsame Sternschnuppen, die ihren Ursprung im Kometen 8P/Tuttle haben.

Jupiter am Abendhimmel

Seit seiner Opposition im vergangenen September haben sich Jupiters Aufgangszeiten stetig verfrüht, womit wir ihn in den Monaten Dezember und Januar mit Einbruch der Dunkelheit bereits im Süden erspähen können. Nach wie vor ist Gasplanet das dominante Nachtgestirn schlechthin, denn die anderen hellen Planeten versammeln sich allesamt am Morgenhimmel. Am 13. Dezember 2010 steht zunehmende Halbmond 6° nordwestlich von Jupiter, im Januar 2011 erfolgt das «Rendez-vous» bereits am 10.. Auch die beiden äusseren Planeten Uranus und Neptun lassen sich zumindest im Dezember noch gut teleskopisch beobachten. Etwas einfacher dürfte der blau schimmernde Uranus zu entdecken sein, da er sich in unmittelbarer Nähe von Jupiter aufhält. Saturn geht erst in dn frühen Morgenstun-

den auf, während sich Merkur und Venus Ende Monat und wa ist zwischen dem 7. und zu Beginn des neuen 17. Dezember aktiv und Deneb * Andromeda Jahres am Morgenbringt es ebenfalls himmel in Szene M 31 auf stattliche 120 setzen (vgl. fol-Sternschnuppen gende Seite). Scheat Pleiaden Pegasus Widder Enif 19.12. Stier 14.12 Schlangen-Aldebaran Uranus Walfisch Jupiter Neptun SW

Anblick des abendlichen Sternenhimmels Mitte Dezember 2010 gegen 17.45 Uhr MEZ (Standort: Sternwarte Bülach)