Zeitschrift: Parkinson : das Magazin von Parkinson Schweiz = le magazine de

Parkinson Suisse = la rivista di Parkinson Svizzera

Herausgeber: Parkinson Schweiz

Band: - (2018)

Heft: 131: Angehörige : Rolle der Angehörigen = Proches : le rôle de

l'entourage = Congiunti : il ruolo dei familiari

Rubrik: Aktuelles aus der Forschung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



Intensives Laufbandtraining



Eine Parkinsonbetroffene wird beim Laufbandtraining angeleitet. Foto: Reto Schneider

Aus einer Phase-II-Studie um PhD Margaret Schenkman der Universität Colorado geht hervor, dass sich intensives Laufbandtraining positiv auf die Motorik von Parkinsonbetroffenen auswirkt.

An der Studie beteiligten sich 128 Parkinsonbetroffene, die noch nicht medikamentös behandelt wurden. Eine Gruppe trainierte moderat viermal wöchentlich auf dem Laufband (Maximalpulsrate 60–65%), eine zweite Gruppe trainierte viermal wöchentlich intensiv (Maximalpulsrate 80-85%) und 40 Personen bildeten die Kontrollgruppe ohne Training.

Nach sechs Monaten zeigte sich, dass bei der Gruppe mit dem intensiven Training die motorischen Fähigkeiten klar weniger zurückgegangen waren als bei den andern beiden Gruppen. Bei der intensiv trainierenden Gruppe sank der motorische Wert auf der Unified Parkinson's Disease Skala lediglich um 0,3 Punkte. Bei der moderat trainierenden Gruppe sank der Wert durchschnittlich um 2,0 Punkte und bei der Kontrollgruppe um 3,2 Punkte.

Die Forscher empfehlen daher ein hochintensives Ausdauertraining für Parkinsonbetroffene in einem frühen Krankheitsstadium. Das Ergebnis müsse noch durch eine Phase-III-Studie gestützt werden.

Quelle: Margaret Schenkman et al., Jama Neurology, 2018: 75 (2), 219-226

Auswirkungen der **THS-Therapie**

Studien zur Wirkung der Tiefen Hirnstimulation zeigen Erfreuliches. Der «Hirnschrittmacher» beeinflusst die motorischen Fähigkeiten positiv, mindert das Sturzrisiko, verzögert psychotische Symptome und stabilisiert die Stimmung.

Die Tiefe Hirnstimulation (THS), bei der mittels implantierter Elektroden Hirnareale im Bereich des Subthalamus stimuliert werden, verbessert die motorischen Fähigkeiten von Parkinsonbetroffenen. Das haben mehrere Studien über die als Durchbruch geltende THS-Therapie belegt. Neu zeigen zwei kürzlich abgeschlossene Langzeitstudien, dass auch andere Symptome von Parkinson positiv beeinflusst werden.

«Langfristig eingesetzte THS im Bereich des Subthalamus war mit einem geringeren Risiko für häufig wiederkehrende Stürze assoziiert. Auch das Einsetzen von psychotischen Symptomen liess sich durch diese Behandlung verzögern.» Das sagte Dr. Philipp Mahlknecht der Medizinischen Universität Innsbruck am 4. Kongress der European Academy of Neurology (EAN) in Lissabon. In der von Mahlknecht vorgestellten Beobachtungsstudie wurden über 50 Parkinsonbetroffene mit THS-Therapie verglichen mit Betroffenen ohne THS. Hingegen keinen Einfluss hatte die langfristige THS-Behandlung auf Demenz.

Die nachträgliche Auswertung der deutsch-französischen Earlystim-Studie, einer weiteren Langzeitstudie, fand, dass die THS-Behandlung bei fortgeschrittenem Parkinson die Stimmung stabilisiert. Entgegen früheren Befürchtungen, diese Therapie könnte emotionale Schwankungen sowie Störungen der Impulskontrolle bewirken, zeigt die im Fachmagazin Lancet Neurolgy publizierte Auswertung im Gegenteil, dass Fluktuationen mit der Stimulationsbehandlung abnehmen und die Befindlichkeit sich deutlich verbessert. «Die Studie liefert gute Argumente, die THS auch für ausgewählte Patienten mit neuropsychiatrischen Fluktuationen oder Impulskontrollstörungen zu empfehlen», sagte Prof. Dr. Günter Deuschl von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie.

Quellen: Pressetext vom 19. Juni 2018: 4. EAN-Kongress in Lissabon 2018, Abstract TCLIN05: Philipp Mahlknecht et al., «Has deep brain stimulation changed the natural history of Parkinson's disease?»; Pressestelle der DGN vom 4. April 2018

Kürzlich zum Thema erschienen: Optimierungstechnik bei THS (vgl. Magazin 130)

Senioren und Seniorinnen beim Wandern: Die Tiefe Hirnstimulation mindert laut Studie das Sturzrisiko. Foto: Fotolia





Kaufrausch: Mit Dopaminagonisten behandelte Parkinsonbetroffene können Störungen der Impulskontrolle entwickeln. Foto: Fotolia

Störung der Impulskontrolle als häufige Nebenwirkung

Es gibt Parkinsonbetroffene, die zum Erstaunen ihrer Angehörigen eher unerwünschte Leidenschaften entwickeln wie Spielsucht, Kaufrausch oder Hypersexualität. Eine Studie zeigt einen Zusammenhang mit der Einnahme von Dopaminagonisten.

Vielen Angehörigen von Parkinsonbetroffenen sind plötzlich auftauchende Eigenheiten des erkrankten Familienmitglieds peinlich, so sehr, dass sie diese eher nicht thematisieren. Daher ist das Ergebnis einer französischen Studie eine Überraschung. Über die Hälfte der mit Dopaminagonisten behandelten untersuchten Betroffenen zeigte eine oder mehrere neu entwickelte Störungen der Impulskontrolle wie Kaufrausch, Sexsucht, Essstörungen oder Spielsucht. Je höher die Dosierung war und je länger die Behandlung dauerte, desto stärker zeigten sich die Störungen der Impulskontrolle. Dopaminagonisten lindern motorische Symptome der Parkinsonkrankheit, können aber - auch gemäss früheren Studien – unerwünschte Nebenwirkungen haben.

Eine Forschergruppe beobachtete während mehrerer Jahre 411 Parkinsonbetroffene, von denen die meisten mit Dopaminagonisten behandelt wurden. Gut 40 Prozent der teilnehmenden Betroffenen waren Frauen. Nach fünf Jahren Behandlung hatte rund die Hälfte der Probanden

eine oder mehrere Störungen der Impulskontrolle entwickelt. Beziehungen gingen in die Brüche wegen der Sexsucht, finanzielle Not entstand wegen des Kaufrausches.

Die Ergebnisse der französischen Studie lassen einen hohen Leidensdruck des familiären Umfeldes erahnen. Daher empfiehlt der Studienleiter Dr. Jean-Christophe Corvol des Pariser Spitals Pitié Salpêtrière, vor der Behandlung mit Dopaminagonisten Betroffene und Angehörige zu sensibilisieren, damit diese entsprechende Beobachtungen frühzeitig melden.

Ein weiteres Ergebnis der Studie war, dass die Störungen nach dem Absetzen der Dopaminagonisten mit der Zeit verschwanden. Was sich nach dem Absetzen der Medikamente wieder verschlimmert. sind die motorischen Symptome.

Quellen: Neurology, 20. Juni 2018 (doi 10.1212/ WNL.00000000000005816]; Agence Télégraphique Suisse ATS, 21. Juni 2018



Grosse Belastung

Die Belastung der Angehörigen von Parkinsonbetroffenen ist das Jahresthema von Parkinson Schweiz. Auch am 4. Kongress der European Academy of Neurology (EAN) in Lissabon war die Belastung der Angehörigen ein Thema.

Eine internationale Studie um PhD Pablo Martinez-Martin vom Instituto de Salud Carlos III in Madrid hat die Situation von 500 pflegenden Angehörigen von Parkinsonbetroffenen untersucht. Die Ergebnisse zeigen deutlich eine Zunahme der Belastung von Angehörigen bei fortschreitender Parkinsonkrankheit.

40 Prozent der Angehörigen, die einen Parkinsonbetroffenen mit fortgeschrittener Krankheit betreuen, fühlen sich laut Studie mittel bis schwer belastet. Bei den Angehörigen von Betroffenen im mittleren Krankheitsstadium waren es 17,6 Prozent und bei Angehörigen von Betroffenen kurz nach der Diagnose 7,1 Prozent. Die Ergebnisse zeigen zudem, dass pflegende Angehörige von Betroffenen mit fortgeschrittener Krankheit aufgrund ihrer Belastung häufiger selber medizinische Behandlung benötigen.

Quellen: Pressetext vom 19. Juni 2018; Abstract vom 4. EAN-Kongress in Lissabon 2018: Yash Jalundhwala et al., «Evaluating the burden of advanced Parkinson's Disease on caregivers», European Journal of Neurology, 2018: 25 (Suppl. 2), 90-276

Kürzlich zum Thema erschienen: Wenn es plötzlich zu viel wird (vgl. Magazin 129)

HINWEIS

Comtan® wieder erhältlich

Aus produktionstechnischen Gründen hatte Novartis im Februar 2017 entschieden, das Parkinsonmedikament Comtan® vom Schweizer Markt zu nehmen. Seit Juli 2018 ist das Medikament über die Orion Pharma AG wieder in der Schweiz erhältlich. Es gibt die Packungsgrössen 200 mg mit 30 Filmtabletten und 200 mg mit 100 Filmtabletten. Quelle: Orion Pharma AG