Zeitschrift: Parkinson : das Magazin von Parkinson Schweiz = le magazine de

Parkinson Suisse = la rivista di Parkinson Svizzera

Herausgeber: Parkinson Schweiz

Band: - (2018)

Heft: 131: Angehörige : Rolle der Angehörigen = Proches : le rôle de

l'entourage = Congiunti : il ruolo dei familiari

Rubrik: Novità dal mondo della ricerca

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 21.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



Allenamento intenso



Allenamento con il tanis roulant. Foto: Reto Schneider

Uno studio di fase II diretto dalla PhD Margaret Schenkman dell'Università del Colorado rivela che l'allenamento intensivo con il tapis roulant giova alla motricità delle persone con Parkinson.

Allo studio hanno partecipato 128 parkinsoniani non ancora sottoposti a terapia farmacologica. Un gruppo si è allenato moderatamente quattro volte la settimana sul tapis roulant (60-65% della frequenza cardiaca massima), un secondo gruppo si è allenato intensamente quattro volte la settimana (80-85%), mentre 40 persone formavano il gruppo di controllo senza

Dopo sei mesi si è visto che nel gruppo allenatosi intensamente le facoltà motorie erano diminuite nettamente meno che negli altri due gruppi. Nel caso del gruppo sottoposto ad allenamento intensivo, il valore motorio è sceso solo di 0,3 punti sulla scala Unified Parkinson's Disease Rating Scale. Nel gruppo con allenamento moderato, il valore è calato mediamente di 2,0 punti e nel gruppo di controllo di 3,2 punti.

I ricercatori consigliano quindi un allenamento della resistenza molto intenso per i parkinsoniani a uno stadio precoce della malattia. Il risultato dovrà essere confermato da uno studio di fase III.

Fonte: Margaret Schenkman et al., Jama Neurology, 2018: 75 (2), 219-226

Effetti della terapia con SCP

I risultati degli studi sull'efficacia della stimolazione cerebrale profonda sono incoraggianti. Il «pacemaker cerebrale» influisce positivamente sulle facoltà motorie, riduce il rischio di cadute, rallenta i sintomi psicotici e stabilizza l'umore.

La stimolazione cerebrale profonda (SCP), che prevede l'impianto di elettrodi in grado di stimolare aree cerebrali nella regione del nucleo subtalamico, migliora le facoltà motorie dei parkinsoniani: lo hanno dimostrato vari studi vertenti su questa tecnica, considerata una svolta terapeutica. Ora due nuovi studi di lunga durata rivelano che essa ha effetti positivi anche su altri sintomi del Parkinson.

«Abbiamo osservato che la SCP utilizzata su un lungo periodo nella regione del subtalamo si associa a un minore rischio di cadute frequenti. Questa terapia ha inoltre permesso di ritardare l'insorgenza di sintomi psicotici», ha dichiarato il Dr. Philipp Mahlknecht della Medizinische Universität di Innsbruck al 4° congresso della European Academy of Neurology (EAN) svoltosi a Lisbona. Nello studio presentato da Mahlknecht, oltre 50 parkinsoniani con terapia SCP sono stati messi a confronto con malati di Parkinson senza SCP. La terapia SCP di lunga durata non ha invece influito sulla demenza.

Dall'analisi successiva dello studio franco-tedesco Earlystim, un'altra ricerca di lunga durata, è emerso che la terapia con SCP nel Parkinson avanzato stabilizza l'umore. Stando all'articolo pubblicato sulla rivista specializzata Neurology, contrariamente a quanto temuto in precedenza – ovvero che questa terapia potesse provocare variazioni dell'umore e disturbi del controllo degli impulsi – si è osservato che la stimolazione riduce le fluttuazioni e migliora nettamente l'umore. «Lo studio ha fornito argomenti utili per raccomandare la SCP anche per pazienti selezionati che presentano fluttuazioni neuropsichiatriche o disturbi del controllo degli impulsi», ha commentato il Prof. Dr. Günter Deuschl della Società tedesca di neurologia (DNG).

Fonti: Pressetext del 19 giugno 2018; 4. Congresso EAN di Lisbona 2018, abstract TCLIN05: Philipp Mahlknecht et al, «Has deep brain stimulation changed the natural history of Parkinson's disease?»; Ufficio stampa della DGN, 4 aprile 2018

Apparso recentemente: Tecnica di ottimizzazione della SCP (vedi Rivista Parkinson 130)

Anziani a spasso: stando a uno studio, la stimolazione cerebrale profonda riduce il





Shopping compulsivo: i parkinsoniani trattati con dopaminoagonisti possono sviluppare disturbi del controllo degli impulsi. Foto: Fotolia

Disturbo del controllo degli impulsi: un effetto secondario frequente

Ci sono malati di Parkinson che, con grande stupore dei loro familiari, sviluppano passioni poco gradite, quali gioco d'azzardo, acquisti compulsivi o ipersessualità. Uno studio dimostra il nesso con l'assunzione di dopaminoagonisti.

Per molti congiunti, l'improvvisa comparsa di comportamenti peculiari da parte del familiare malato è fonte di imbarazzo, a tal punto che preferiscono non parlarne. L'esito di una ricerca francese è pertanto sorprendente: in oltre la metà dei parkinsoniani trattati con dopaminoagonisti coinvolti nello studio si sono riscontrati uno o più disturbi del controllo degli impulsi manifestatisi da poco tempo, quali shopping compulsivo, ipersessualità, disturbi alimentari o mania del gioco d'azzardo. Più alto era il dosaggio e maggiore la durata della terapia, più marcati risultavano questi disturbi. I dopaminoagonisti alleviano i sintomi motori del Parkinson, però - come dimostrano anche studi precedenti - possono avere effetti indesiderati.

Un gruppo di ricercatori ha tenuto sotto osservazione per diversi anni 411 parkinsoniani, la maggior parte dei quali era trattata con dopaminoagonisti. Un buon 40% del campione era composto da donne. Dopo cinque anni di terapia, circa la metà dei soggetti osservati ha sviluppato uno o più disturbi del controllo degli impulsi.

Diverse relazioni sono andate a rotoli a causa dell'ipersessualità, mentre la mania del gioco d'azzardo ha causato gravi problemi finanziari.

I risultati dello studio francese evidenziano la grande sofferenza che affligge l'entourage familiare. Il Dr. Jean-Christophe Corvol dell'ospedale Pitié Salpêtrière di Parigi, direttore dello studio, consiglia perciò di sensibilizzare i malati e i loro familiari prima dell'inizio della terapia con dopaminoagonisti, invitandoli a segnalare tempestivamente eventuali comportamenti anomali.

Lo studio ha anche dimostrato che dopo la sospensione dell'assunzione di dopaminoagonisti questi disturbi scompaiono gradualmente. Come rovescio della medaglia, subentra tuttavia un nuovo peggioramento dei sintomi motori.

Fonti: Neurology, 20 giugno 2018 (doi 10.1212/WNL.000000000005816); Agenzia Telegrafica Svizzera ATS, 21 giugno 2018



Un grande carico

Il carico che grava sui congiunti dei parkinsoniani: è questo il tema dell'anno di Parkinson Svizzera. Lo stesso argomento è stato trattato anche in occasione del 4° congresso della European Academy of Neurology (EAN) tenutosi a Lisbona.

Uno studio internazionale diretto dal PhD Pablo Martinez-Martin dell'Instituto de Salud Carlos III di Madrid ha esaminato la situazione di 500 familiari curanti di persone con Parkinson, evidenziando chiaramente che l'onere a carico dei congiunti aumenta di pari passo con la progressione della malattia.

Stando a questa ricerca, il 40% dei familiari che assistono un malato con Parkinson avanzato avverte un carico da medio a forte. Fra i caregiver di parkinsoniani a uno stadio medio della malattia questa percentuale scende al 17,6%, per attestarsi sul 7,1% tra i familiari di chi ha ricevuto da poco la diagnosi.

Questi risultati mostrano inoltre che i familiari che assistono parkinsoniani a uno stadio avanzato necessitano a loro volta più spesso di cure mediche a causa del carico a cui sono sottoposti.

Fonti: Pressetext del 19 giugno 2018; European Journal of Neurology, 2018: 25 (Suppl. 2), 90–276

Apparso recentemente: Non ce la faccio più! (vedi Rivista Parkinson 129)

INFORMAZIONE

Comtan® nuovamente disponibile

Per motivi tecnici legati alla produzione, nel febbraio 2017 Novartis aveva deciso di ritirare il farmaco antiparkinson Comtan® dal mercato svizzero. Dal mese di luglio 2018, questo medicinale è nuovamente disponibile in Svizzera tramite la Orion Pharma SA. Esso è ottenibile in confezioni da 200 mg con 30 compresse rivestite oppure da 200 mg con 100 compresse rivestite.

Fonti: Orion Pharma AG