

Zeitschrift: Infokara : Fachzeitschrift der Schweizerischen Gesellschaft für palliative Medizin, Pflege und Begleitung

Herausgeber: Schweizerische Gesellschaft für palliative Medizin, Pflege und Begleitung

Band: 5 (2000)

Heft: 4

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use


The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 25.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

The active substance from the yew tree. The effect on the lung.
Taxol® – For the first-line treatment of NSCLC.

TAXOL®
SEMISYNTHETIC PACLITAXEL



kassenzulässig / admis par les caisses

TAXOL® (Paclitaxelum, INN) Indikationen: 1) Erst- und Zweitbehandlung des fortgeschrittenen Ovarialkarzinoms; 2) metastasierendes Mammakarzinom, falls eine anthrazyklinhaltige Standardtherapie versagt hat oder nicht indiziert ist; 3) Nichtkleinzelliges Bronchialkarzinom, falls ein chirurgischer Eingriff und/oder eine Strahlenbehandlung nicht angezeigt sind. **Dosierung/Anwendung:** Je nach Indikation 175 (135) mg/m² Körperoberfläche, als intravenöse Infusion über eine Zeitspanne von 3 (24) h. Eine Prämedikation mit Kortikosteroiden, Antihistaminika und H₂-Antagonisten ist erforderlich. **Kontraindikationen:** Schwere Überempfindlichkeitsreaktionen auf Paclitaxel oder Hilfsstoffe des Präparates, Ausgangswert an neutrophilen Granulozyten unterhalb 1500/mm³, Schwangerschaft und Stillzeit. **Vorsichtsmassnahmen:** Knochenmarkdepression als dosislimitierender Faktor. Taxol ist bei Patienten mit schweren Leberfunktionsstörungen nicht empfohlen. **Unerwünschte Wirkungen:** Knochenmarkdepression mit 28% schweren Neutropenien (<500/mm³), 1% längerdauernde schwere Neutropenien mit 24% infektiösen Episoden, 34% leichtere Überempfindlichkeitsreaktionen (17% aller Behandlungszyklen), 66% periphere Neuropathien (Parästhesien), davon 5% schwerwiegend, Arthralgien und/oder Myalgien bei 60% der Patienten, in 13% schwerwiegend. **Packungen:** 1* Mehrdosen-Stechampulle mit 30mg und 100mg Paclitaxel (Liste A). Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Arzneimittelkompendium der Schweiz.

